

JONSTONI
HISTORIA
NATURALIS
DE
ARBORIBUS
TOM. II.

D. b.

6

Dir. I-402.6, N.

40

Schrank

A 4

18


L


605.

6 vol.

D b 6

Dir. 2,4





IOANN. IONSTONI
HISTORIAE NATVRALIS
DE
ARBORIBVS
ET
PLANTIS
LIBRI X.

TABVLIS CENTVM TRIGINTA SEPTEM

AB ILLO CELEBERRIMO

MATHIA MERIANO

AERI INCISIS ORNATI
EX SCRIPTORIBVS TAM ANTIQVIS,
QVAM RECENTIORIBVS

MAXIMA CVRA COLLECTI,

QVOS

OB RARITATEM DENVO INPRIMENDOS


SVSCEPIT.

TOMVS SECVNDVS
TABVLAS CXXXVII, EXHIBENS.

FRANCISCVS IOSEPHVS ECKEBRECHT

BIBLIOPOLA HEILBRONNENSIS

M DCC LXIX.



IOANN. IONSTON
HISTORIAE NATURALIS
ARBORIBVS

ET

PLANTIS

III 503003

LIBR. I. X.

TABULIS CENTVM TRIGINTA SEPTVM

AB ILL. HERRINGO

MATTHIA MERIANO

AERI INCISIS ORNATI

EX SCRIPTO TAM ANTIQVVS

QVAM RECENTIORIBVS

MAXIMA CURA COLLECTI

CVRS

OB RARITATEM DVNO IMPRIMENDOS

SVPERBIT

TOMVS SECVNDVS


TABVLIS CXXXII EXHIBENS

FRANCISCVS JOSEPHVS KERNERVS


FRANCISCVS JOSEPHVS KERNERVS

1946/47

111



III 503004



HISTORIAE NATVRALIS

DE ARBORIBVS

LIBER V.

De Arboribus Bacciferis.

CAPVT I.

De Bacciferis tam Indigenis quam Exoticis.

ARTICVLVS I.

De Bacciferis Classis primæ.

PVNCTVM I.

De Tilia.

Tilia.
TABVLA
LXIV.

Bacciferæ Classis primæ sunt 1. Tilia. 2. Ostrya. 3. Viburnum. 4. Platanus. 5. Ricinus. Sassafras & Alnus baccifera, de qua alibi agemus.

De Tiliæ in genere descriptione pauca apud Veteres occurrunt. Sole ad Aquilonem scandente, folia verti scribit Plinius, ad mille usus petenda. Proditum id & Theophrasto: & apud Varronem legimus, cum se converterint, solstitium fieri dicitur. Benignitati id tribuendum naturæ, inquit Plinius, quæ debebat discrimen hoc indubitatis signis notasse; & manibus ipsis agricolarum ingessisse, ut conspectu syderis si-

gnum habeatur. Theophrastus tempori adscribit, in quo φυλλοβολία accidit. ὥστε γενησάντα καταξηρανθέντα decidunt. Robustiora ἐπιστροφὴν duntaxat patiuntur. Omnium pomorum adulterium gestare addit Plinius. Diversis quippe modis vidit arborem insitam, & juxta Tiburtes tiliam omni genere pomorum onustam; alio ramo nucibus, alio baccis, aliunde vite, ficis, pyris, puniceis, malorumque generibus, sed huic vita brevis fuit. Dividitur in *Mar-*
rem & Feminam. I. *Mari* lignum durum, flavum, ὀζωδέστερον & ἐνωδέστερον. Cortex crassior, ac detractus inflexibilis, διὰ τὴν σκληρότητα. Nec

A

femen

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 10. Plin.
H. N. l. 16.
c. 14.

Tilia. semen fert, nec florem. II. *Femina* crassior arbor, materies candidior, medulla exigua & quæ teredinem non sentit, proceritate perquam modica. Cortex *ἐνκάμπος*, dulcis & suavis. *Folium* forma hederacea πλὴν ἐκ προσαγωγῆς, μᾶλλον ἢ περιφέρεια, καὶ τὸ πρὸς τῇ μίχρῳ κυρτότατον. Ἀλλὰ κατὰ μέσον καὶ εἰς ὀξύτερον τὴν συναγωγὴν ἔχον, καὶ μακρότερον, ἔπελον δὲ κύκλῳ καὶ κεχαραγμένον. De Flore &

Theophr. H. P. l. 3. c. 10. *Fructu* ita Theophrastus. Τὸ μὲν ἄνθος καλυκῶδες παρὰ τὸν τῆς ξύλης μίχρον, καὶ παρὰ τὴν εἰς νέοντα κάχρυν ἐφ' ἑτέρῃ μίχρῃ. Χλοερὸν δὲ ὅταν ἡ καλυκῶδες ἐκκαλυπτόμενον δὲ ἐπίξανθον. ἡ δὲ ἄνθησις, ἅμα τοῖς ἡμέροις, ὁ δὲ καρπὸς, στρογγύλος πρόμακρος, ἡλίκος κυάριος, ὁμοῖος τῷ τῆς κίττης, γονίας ἔχων ὁ ἄνθος πέντε διόν ἰσῶν ἐξεχασῶν καὶ εἰς ὀξὺ συναγομένων. ὁ δὲ μὴ ἄνθος ἀδιαρρότερος. Διακινζόμενος δὲ ὁ ἄνθος ἔχει μικρὰ ἅπαντα καὶ λεπτὰ σπερμάτια, ἡλίκα καὶ ὁ τῆς ἀνδραφάξυος. *Locum* si spectes, Montes & valles diligit; aquosa inprimis. In

Theophr. H. P. Asia difficulter, ut Theophrastus ait, reperitur. In stercoreto solo optime proficit; ægre in arido. Quantum ad *Usum* ἐμεργός ἐστὶ τὸ ὅλον ob mollitiem. Naves longæ, arcæ, mensuræque exinde. Ex cortice τὰς κίσας faciunt. Ex eodem vasa corbesque ac patentiora quædam mesibus vindemiisque convehendis; nec non tuguriorum prætexta fieri scribit Plinius. Mirum vero in hac arbore, fructum a nullo animalium attingi: *foliorum* corticisque succum esse dulcem, quod tamen apud Recentiores falsum. Cinesias Poëta, Phillyreus ab Aristophane dictus est, quod propter gracilitatem tiliaceis asseribus corpus suum fulciret. Antoninus Pius quoque tabulis tiliaceis in pectore fulciebatur. Dabat & pistioribus umbram. Palladius *sylvestris* meminit, ex eaque mel apes colligere.

II. *Recentiores* quoque in *Marem* & *Feminam* distinguunt.

I. *Tilia mas* est duplex. I. *Foliis ulmi*. 2. *Folio maximo montana*.

Dodon. Peint. 6. l. 4. c. 16.

I. *Tilia mas folio Ulmi* cortices habet lentos ac obsequiosos, & ad funes conficiendos idoneos, sed tamen paulo duriores ac fragiliores.

Lignum durius, nodosius, & ex luteo coloratius, Ulmi satis simile: *folia* lata, haudquaquam lævia, sed asperiora, propemodum veluti Ulmi, in quibus tamen folliculi nulli gignuntur. *Fructum* adeo raro profert, ut sterilis, nec ullum facere fructum existimetur. Est autem hic planus, rotundus, & uti majoris *Thlaspi* infarctus; coherentque plures e longiusculis pediculis racematim.

II. *Tilia mas folio maximo montana*, forte *Mas Theophrasti*, arbor nova est, & ramosa. *Cortex* lanuginosus, subrufus; *folia* vix rotundantur, ex virore nigricant, vulgaris foliis quadruplo majora, profunde ferrata, hirsuta, in dorso præsertim, quod nervorum eminentia decorat. Per septendecim annos observavit florem & fructum Bauhinus, sed frustra. *Provenit* in Mutite monte Basileæ vicino.

II. *Tilia femina* duplex etiam est.

1. *Folio majore*. 2. *Folio minore*.

I. *Tilia femina folio majore*, Græcis *Philyra*, Gvilandino, Castori *Phyllirea*, nonnullis *sativa*. Arbor est procera & ramis brachiata. *Radices* profunde in latum exspatiantur. *Cortici* in caudice crasso subnigricanti, ex luteo interius inalbicanti lentus & dulcis subest, interque hunc & lignum, alii tenues, veluti membranæ visuntur. *Materies* enodis, inalbicans, facile cælo cedit. Ex *foliorum* quæ lævia, acuminata, inferna parte magis hirsuta, alis, ligulæ longæ, albæ, foliaceæ oriuntur; ex horum costa media pediculus, qui in aliquot petiolos abit; quorum singuli *florem* sustinent, umbellatum, albicantem, apicibus luteis, stylo albicante: totum obvallant calycis dehiscens quinque segmenta, albida, pingua. *Profertur* Majo & Junio. *Fructus*, qui Augusto maturatur, rotundus, angulosus, hirsutus, cui intus *semen* vel nucleus. Ex semine Septembri sponte fatiscente & deciduo, primis statim diebus colliculus unam & alteram unciam altus, bina folia ostentans prorumpit: horum unumquodque in quinque divisuras, veluti digitos diffecatur. Ad

Bauh. H. P. l. 8. c. 1. p. 157.

Bauh. H. P. l. c.

anti-

antiquarum radices sæpe quercuum
uvæ simile observatur. *Nascitur*
passim in Italia, asperis inprimis mon-
tibus, Gallia, Hispania, Germania,
Anglia, Polonia, &c. Est Mogun-
tiæ in Cœnobio S. Albani, quæ XX
crassis lapideis columnis fulcitur. Ba-
fileæ juxta summum templum, ad
Rheni alluentis ripam, visitur amœ-
nitate topiaria. Habetur & circa
Tigurum, cujus maximæ truncum
si duo viri mediocres amplectantur,
dodrantes adhuc quinque supersint:
qualem & in medio prædio in rusti-
ci horto videre est. Est & Amers-
furti, cujus mensa XX convivas ex-
cipiat & tegat, adeo densis ramis fo-
lisque, ut ne radii quidem solares
penetrent. Creditur supra centesi-
mum annum vivere. Nata bono
mortalium, si *Usum* spectes. Nam
usta *materia*, carbonibus aceto re-
stinctis, cum oculis cancrorum gru-
mosum sanguinem exigit. Carbo-
nes pulverem pyrium ingrediuntur.
Habentur & libri, qui in delicatio-
ribus *corticibus* scripti sunt. Viti
Nurtingæ pedali latitudine; longitu-
dine competente, in circulum plexi,
quos cinis imponebant. Lintea lixi-
vio in eis perfusa, ut corticoso cir-
culo supereminente, cineres cum li-
xivio supereminentes continerentur.
Idem commansus vulnera congluti-
nat: intermedius aqua maceratus,
lentore suo ambustis remedio est.
Folia, quæ ex roris cœlestis incubitu
ita oblinuntur, ac si melle madefacta
fuissent, trita & conspersa, pedum
tumores discutiunt. Succuse recen-
tibus vino mistus & calide artubus
infriktus, spasmo flatulento opitula-
tur, in gravidis inprimis. Humor

e *medulla* castrata defluens, capillos
illicus reddit. Aqua ex *floribus* de-
stillata, epilepsia, faciei fucio & tor-
minibus ventris prodest. *Fructuum*
pulvis dysenteriam & impari nume-
ro deglutitus hæmorrhagiam na-
rium ad miraculum sistit: *Viscum*
epilepticis salutare.

II. *Tilia femina folio minore* Tra- Bauh. H. P.
go est *sylvestris*. Arbor patula & l. 8. c. 3.
torosior. *Materies* lenis, alba: cor-
tex magis quam superioris scaber.
folia betulæ, rigidiora nec hirsuta.
Flores usque ad undecim aliquando
umbellati, pallidi, odorati, ex luteo
foliolo seu amento tardius quam su-
perioris prodeunt, cum lentore aci-
di. *Fructus* parvi, hirsuti, angulo-
si. *Nascitur* passim in Germania &
Silesia, tam sylvis, quam montibus.
Illi quæ Montbelgardi in fori angu-
lo, tugurium amplum superstru-
ctum cum mensis, jucundum com-
messantium receptaculum. Ad hanc
Telesiana Bauhini ab arce Ducum
Wirtembergensium ita dicta, quæ
fulmine tacta fuit noctu mense Se-
ptembri, & sub ea novem, quæ sta-
bulabantur, vaccæ.

Ex EXOTICIS huc refero Caa- Marcgr. H.
guacuibra Brasiliensium, floribus est B. l. 3. c. 3.
tiliæ similibus & *Boa Tsinking Ja-
vanorum*, folio *Tiliæ*. Parva est il-
la arbor, *caudice* sine ramis, *ligno* fra-
gili. *foliis*, quæ superiora vestiunt ses-
quipedem longis, pedem latis & co-
piosis, ad tactum mollibus & hirsu-
tis, cum insignibus venis. *Fructu*
nigro, quem aves comedunt. *Ista* Bont. H. N.
præalta truncis multis & acutis spi- & M. l. 6.
nis obdito. *Flori* rubro siliquæ succe- c. 44.
dunt, in quibus rubræ iidem fabæ
nascuntur, gratissima turdis esca.

PUNCTVM II.

De Ostrya & Viburno.

Vid.
TAB.
LXIV.
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 10.
Plin. H. N.
l. 13. c. 21.

I. OSTRYÆ, quæ & ὄστρος, unica
est apud *Veteres* species, O-
xyæ (id est Fago, scissima Gazæ)
tum satum *cortice* similis, *folio* py-
ri non multo oblongiore, in acutum
contractiore & majore, fibris multis
& crassis, a medio dorsi in modum

costarum recta secundum magnam
fibræ porrectis, in fibris ipsis ruga-
to & in ambitu leviter serrato: *ma-
teria* dura, decolore, albida: *fructu*
pusillo, oblongo, hordeo simili, fla-
vo: *radices* sublimes habet. Et Pli- Plin. l. c.
nio *Ostryæ*, quæ & *Ostrya*, arbor si-
milis

Ostria & *milis* Fraxino cortice & ramis, *foliis* pyri, paulo tamen longioribus, crassioribusque ac rugosis incisuris, quæ per tota discurrunt: *semine* hordeo figura simili & colore.

II. EX RECENTIORVM descriptione est duplex, 1. *Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis*, & 2. *Ulmo similis, fructu racemoso lupulo simili*.

Matthiol. in Dioseor. 1. *Ostrya ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis* est Trago *Ornus*, Matth. Dodon. Tabern. Camer. *Carpinus*, Clusio *Fagulus herbariorum*, Gesnero *Fagus sepiaria*, Lugdunensi *Ulmus Attinia*, Lobelio *Betulus*, Bauhino *Fagus sepium*, vulgo *Ostrya Theophrasti*. Insignis aliquando est altitudinis. *Caudex* crassus, cortice subalbido, *materie* albicante & solida. Ex *ramis* primo vere nuncamenta ac *fuli* dependent foliati, oblongi, foliorum acutorum, membranaceorum ex viridi fuscorum, agminibus dense stipati. *Fructus* in longo pediculo spicæ instar, foliorum angustorum ligulis alatis obvallatus, pyramidalis corculi effigie, hordeo similis, striatus, compressus, lignosus; qui proveniens duo foliola, pomorum foliolis fere similia producit. *Gaudet* aquosis & præruptis. In monte Atho & aliis Macedoniae frequens. In Germania, Pannonia, Polonia & Gallia sylvis. Habetur & in Arduenna ac Sohia sylva in Brabantia. *Lignum* quia solidissimum & durissimum, ad rotas molares, trochleas & alia, quæ pondus sustinere debent, instrumenta expetitur. Ex crassioribus virgis crates fiunt.

Casalp. apud Bauhin. l. c. II. *Ostrya ulmo similis fructu racemoso lupulo simili*, aliis *lupulus* arborecens dicitur. Fert in cacuminibus *racemulum* densum flavescens, qui ex folliculis quibusdam membranaceis oblongis constat. In singulis tanquam utriculis *semina* singula parva, cartilagineo & candido

cortice obducta. *Provenit* in montibus Hetrureis.

II. *VIBURNUM*, ut vulgo vocatur, non occurrit apud Veteres tanquam planta singularis. Virgulti enim & fruticis cujusque, teste Strabone & Nemesiano, proprium nomen est. Casalpinus *Rhus Coriariorum Theophrasti* & Plinii esse putat, de qua suo loco videatur. Recentioribus vocatur *Lantana*, & Lugdunensi *Spiræa Theophrasti* Dalechampii. Frutex est arborecens, qui in amplitudinem magis diffunditur. Ex *radicibus*, qui ἐπιπόλαιοι, bicubitales, digiti crassitudine *virgæ* exsurgunt, cortice rufo & pulvere farinaceo adperso, *materie* pauca, viridi, *medulla* alba & copiosa. *Folia* alni æmula, hirsuta, pulvisculo albo inferna parte conspersa, sapore adstringente. *Flores* in umbella, candidi, quinquefolii, foliis extrorsum modice reflexis, cum staminibus longis, qui Lugduni Aprili, Geneva Maji; in Alsatia Junio; circa Basileam etiam Octobri visi sunt. *Baccæ* primo virides, post rubræ, quod mense Julio plerumque fit, nigræ tandem in Septembri, compressæ, viscosæ & dulces; quibus *semen* unum, latum, compressum, striatum, osseo cortice vestitum. Observatum circa Basileam, Norimbergam, ad Rhenum, & in Italia inter Veronam & Castelfranco Martio mense pene floridum. *Nascitur* inter dumeta, solo inculto, argilloso & forti. De *Uso* habe. *Folia* in vino austero decocta ad dentes vacillantes, gingivarum rheumatismos, columellæ procidentiam & faucium fluxiones commode adhiberi. Eadem in lixivio decocta capillos denigrare. Ex *radicum* corticibus sub terra maceratis & subinde decoctis, & tuis viscum parari. *Uvarum* acinos arefactos antequam maturecant, & in pulverem tritos alvi fluxiones sistere. Ex *furculis* optima ad oculos aqua paratur.

De Platano.

Vid.

T A B.

LXIV.

Dioscor. M.

M. l. i. c. 107.

l. 4. c. 164. &

138. l. 3. c. 7.

Theophr.

H. P. l. i. c. 9.

& 16. & l. 3.

c. 2. l. 4.

c. 18. l. 5.

c. 8.

Theophr.

H. P. l. i. 4.

c. 7.

Plin. H. N.

l. 12. c. 1.

& 2.

I. **P**latanum ex *Veteribus* non describit Dioscorides. Ex aliis tamen locis aliquid de eo colligas. Ricino Platani *folia*, majora, leviora, nigrioraque tribuit. Glycyrrhizæ *fructus* magnitudine ejusdem pillularum (sic *fructus* vocat) & asperiorum] Xanthii ad modum earundem spinosus seu echinatus. Apud *Theophrastum* invenies, arborem esse autu facilem: *radices* in summa terra dispersas, quæ tamen, si locum commodum nactæ fuerint, facile & altiora subeant. *Materiem* celeriter putrescere, *corticem* disrumpi; *semen* manifeste producere eoque gigni, quod aliquando in tripode aeneo nata sit. Tremula dixisse *folia*, quod Cæsalpinus scripsit, nullibi reperias; lata esse dixit Plinius, inter primas germinare. Negabant tum in Adria esse, præterquam Diomedis delubro; inque universa Italia raram adfirmabant, quanquam multi magnique fluvii utrobique eam perluerent. Riguus enim, palustribus & aquarum ripis gaudet. At in aliis locis plurima nasci credebatur. Secundum *Plinium* per mare Ionium in Diomedis insulam ejusdem tumuli gratia primum inuenta, inde in Siciliam transgressa, atque inter primas donata Italiae? & jam ad Morinos usque pervecta, ad tributarium etiam pertinens solum, ut gentes vestigal & pro umbra pendant. Dionysius prior, Siciliae tyrannus, Rhegium in urbem transtulit eas, domus suæ miraculum, ubi postea factum gymnasium: nec potuisse in amplitudinem adolescere, & alias fuisse in Italia, ac nominatim Hispania, apud auctores invenitur. Hoc actum circa urbis captae ætatem: tantumque postea honoris increvit, ut mero infuso enutrientur: compertum id maxime prodesse radicibus, docuimusque etiam arbores vina potare. In regione Aulocrene, per quam ab Apamaea in Phrygiam itur, ostenditur Platanus, ex qua pependit Marsyas ab

Apolline victus, quæ jam tum magnitudine electa est. Fuit & Delphis Agamemnonis manu sacra, & altera in Caphyis Arcadiae luco. De *Uso* nota. *Folia* viridia trita & illita non obscure phlegmonas nascentes adjuvare. Iisdem suos nidos ciconiae contra vespertillones tutantur. *Cortices* decoctos dentibus dolentibus in collutione adhiberi. *Pillulas* ambustis cum adipe inservire. *Lanuginem* spiritu attractam arteriam exsiccando offendere. Fit e *baccis* sale & aqua maceratis aliquando oleum ad lumina. Duo ejus *Plinio* genera. Major nempe, quæ platanus & πλατάνιστος; & *Chamaeplatanus*, coactæ brevitatis. In istis quædam magnitudinis, radicum, foliorum, & regerminationis diversitas. *Magnitudinis*. Erat enim clara in *Lycia*, gelidi fontis socia, amoenitate itineri adposita, domicilii modo cava, LXXX. atque unius pedum specu, nemoroso vertice, & se vastis protegens ramis, arborum instar, agros longis obtinens umbris: ac ne quid desit speluncæ imagini, faxea intus crepidinis corona muscosos complexa pumices: tam digna miraculo, ut Lucinius Mutianus ter Cos. & nuper provinciæ ejus legatus, prodendum etiam posteris putarit, epulatum intra eam se cum duodevicesimo comite large ipsa toros præbente fronde, ab omni adflatu securum, optantem imbrium per folia crepitus, lætiores, quam marmorum nitore picturæ varietate, laquearium auro cubuisse in eadem. Haud minus patula illa fuit in *Lydia*, quam Xerxes monili aureo donavit, & uni ex immortalibus mandavit custodiendam. Aliud exemplum Cæsar principis in *Veliterno rure* mirati unius tabulata, laxisque ramorum trabibus scamna patula, & in ea epulati, circumsparsa umbra XV. convivarum ac ministerii capaci triclinio, quam cœnam adpellavit ille nidum. *Radicum*. Celebrata enim in ambu-

Theophr.

H. P. l. 4.

c. 4.

Plin. H. N.

l. 12. c. 1.

Aelian. Var.

Hist. l. 2.

c. 14.

Varro R. R.

l. 1. c. 37.

B

latione

Platanus. latione Academiae *Athenis* una, quæ novella adhuc, radices triginta trium cubitorum egit. XXXVI placuere Plinio. *Foliorum*. Erat enim *Cortina* in insula Creta una juxta fontem, insignis utriusque linguis monumentis, nunquam folia demittens: statimque ei Graeciae fabulositas superfuit, Jovem sub ea cum Europa concubuisse: quasi vero non alia ejus generis fuisset in Cypro. *Regerminationis* singulare apud Theophrastum exemplum. Longitudine decem cubitis major: crassitudine ut quatuor viri vix amplecterentur, in Antandro & Philippis erat. Cum ramis capulatis, truncoque securi luxato procidisset, ἀνεφύη, ὡς κτὼρ καὶ δέισα τῆ βάρε, καὶ ἀνέβλω. καὶ ὁ φλοιὸς περιέφυη πάλιν. Plinius circumdolutis asseribus vestibulum sponte factum ait.

Theophr.
H. P. l. 4.
c. 19.

Plin. H. N.
l. 16. c. 32.

II. RECENTIORIBVS duplex est Platanus, *Vulgaris* & *Indica*.

Baubin. H. P. l. 8. c. 11. p. 170. I. *Platanus vulgaris* arbor est vasta, Nuci in amplitudinem explicitae similis. *Caudex* procerus, statim in ramos dividitur. *Cortex* laevis corio similis, cujus scabriores tunicas singulis mensibus deponit. *Materia* inter Quercum & Fagum media. *Virgae* seu furculi ex intervallo nodis & geniculis praecinguntur, quibus singulorum annorum numerantur germinationes. *Folia* instar palmarum humanae divisa, dura, robusta Aceri similia & hyeme decidua. Penes eadem cum vere germinavit, *globuli*, de longis pediculis, asperi & velut lanugineis flosculis pleni, qui paulatim in majusculas *pillulas* excrescunt, parvo castaneæ echino aequales. *Hirsutae* hae, lanuginosae, & acerosae apiculis seu conicis asperatae. Autumno in tot *semina*, quot apiculi seu aculei fatiscunt; eaque oblonga, flava, aspera & papposa lanugine involuta. Effigie glandis alii faciunt. *Rara in orbe nostro*.

Florentiae olim prope pomaeria & in suburbio speciosas Lobelius observavit, satas sine dubio, exque iis ramos & furculos, maturis jam fere echinis, defregit. Visuntur & Romæ plantatae in viridariis, & Leidæ in Horto Medico, sed minus proceræ, nec ita densis foliis. Sponte nascuntur in Creta & montana Ida juxta torrentis fontem in valle foliis omnibus deciduis; in monte Atho, ubi altitudine Cedris montis Libani comparari possunt; in monte Tauro, ubi hyeme cortices exuunt. Altissimi & Antiochiæ in monte Castagna. Habentur & in Sicilia ad Ætnæ radices. Constantinopoli adlata; Vienna ad aliquot Orgyas Clusio crevit. De usu nihil occurrit. Montis Atho incolæ cymbas ex trunco parant.

Bellon. obs.
c. 20.

II. *Platanus Indica* est duplex. I. *Nieremb.* *Abaca* dicitur similis caeteris, angustioribus tamen foliis, fructu triangulari, decem uncias longo, candido callo, ac nucleis multis & nigris, cicere paulo minoribus mollioribusque & orbicularibus, ex quo platanigenere lintea conficiuntur. *Nascitur* in insulis Philippicis. 2. *Fulvo maculatas colore, fructuque* parvo & tenui, in tres divisas differentias præcipuas, *tologdato goyot* & *bolongon* vocatas, præter alias nonnullas, quas etsi nominibus minime destitutas, nominatim piget recensere; *fructu* odoro, & oris halitum in multas horas commendante, saporis grati, ac nostris apianis malis, si exquisite maturuerint, minime cedente, coloreque extra viridi, ac diversa magnitudine, temperata natura aut paululum frigenti, sed aliquanto humidiores. Flatum & pituitam generat, ventrem emollit, & oris commendat halitum, quin post esum mos est indigenis, ab omni potionis genere, ne ob immodicum humorem putrescant, abstinere,

H. N. Exot.
l. 15. c. 83.

De Ricino.

Rcinus.

I.

Vid.
TABVLA
LXIV.

Ricini sub *κρότωνος* & *κίνι* nomini-
bus ex *Veteribus Dioscorides* &
Theophrastus inter Græcos, *Plinius*
inter Latinos meminere.

Dioscor. M.
M. l. 4.
c. 164.

1. *Dioscoridi* est arbor ficus parvæ
instar, folio platani, at majore, læ-
vior, & nigriore; ramis caudicibus-
que cavis *καλάμης κρότων*: semine in
βότρυνι τραχέσι, quod *λεπτιδέν* animal
repræsentat.

Theophr.
H. P. l. 16.
& de C. P.
l. 2. c. 22.

2. *Theophrastus* de foliis duntaxat
scribit, rotunda recentia, *ἀπογονιστά*
seu in angulos vetustate abire, quasi
istam formam perfectionis suæ de-
mum capessere debeant. Facilior
scilicet res simplex, quam multiformis:
nec potest principium rem dif-
ficilem peragere, quia *ἀδένες*.

Plin. H. N.
l. 15. c. 2.

3. *Plinius* in *Ægypto* copiosam
prodit, ibique non pridem (de suo
tempore accipe) in *Hispania* repen-
te provenisse, altitudine oleæ, caule
ferulaceo, folio vitium, semine uva-
rum gracilium pallidarumque. De
Ufu habe. Folia cum polentæ pol-
line trita, oculorum cedemata inflam-
mationesque lenire. Grana numero
XXX, ut in textu *Dioscoridis* est, (tria
forte) violentissime purgant, & ven-
triculum subvertunt. Ex iisdem fit
oleum. Coquitur in aqua, innatans-
que colligitur: in *Ægypto* sine igne
& aqua sale adperso exprimitur ci-
bis scedum, lucernis utile. Stirpem
illam esse, quam *Deus Jonæ* pro um-
braculo paraverat, *Arias Montanus*,
Danaus, *Lemnii*, *Gvilandinus* &
Bodæus volunt.

Lemn. de
plant. bibli-
cis c. 33.

II. RECENTIORIBVS triplex est,
1. *Vulgaris*. 2. *Ægyptius*. 3. *Ame-
ricanus*, quibus *Adfines* adjici debent.

Bauh. H. P.
l. 34. c. 14.
p. 643.
Rodz. ad
Theophr.
H. P. l. 9.
c. 12. pag.
1089. Ca-
mer. in Epit.
Matthiol.
p. 959.

I. *Ricinus vulgaris* Mesuæo *Gra-
num regium majus*; Arabibus *Kika-
jon* Ionæ, *Alkaroa* & *Kerva*, Italis
Gyrasole, Thuscis *Phaselus Romanus*,
Fragoso Cataputia major, aliis *Pal-
ma Christi*, *Pentadactylus*, Hispanis
Ficus infernalis &c. planta est auctu
celerrima, prout solum nacta est.
Caudex striatus, glaucus arundinis
modo geniculatus & cavus, glaber

ex obscura purpura nitens; candi-
dus, si pulverem, quo farinæ instar
consperfus est, dererferis. Folia am-
pla, octo vel novem segmentorum,
quæ ferrata & acuta, hisque e folii
centro nervus, atrovirentia, & inter-
dum acetabuli instar concava, loco
inprimis, quo segmentorum nervi
coeunt; quo altiora, eo majora, ut
reperias, quæ petasum æquant. Flo-
res longa serie thyrsoidi furculo ra-
cematim insident, e sanguineis cri-
spisque staminibus conflati; quibus
muricata triquetra vascula succedunt,
in quibus semina Ricini animalculi
æmula, foris livida & maculosa, in-
tus candida, quæ per maturitatem
fissis capitulis ac rimas facientibus
cum impetu exsiliunt. Insident ei-
dem thyrsu mucosa glomerata nuca-
menta coloris herbacei, quæ nullo
relieto fructu marcescunt. Passim
jam in hortis & viridariis nascitur.
Vidit hominis crassitudine in Hispa-
nia Clusius. Bellonius in Creta tan-
tos, ut non nisi scalis admotis abscin-
derentur. In Germania annua est,
perficiturque eo, quo sata est, anno.
Semen auctumno, si æstas calida,
maturatur. In calidis regionibus
multos restat annos.

Bellon. ob-
serv. c. 20.

II. *Ricinus Ægyptius* ab Aldino Aldin. Hor-
ti Farnes.
c. 9.
observatus est; semen enim, quod
circulator quidam Romæ vendere
solebat satum, similem quodammo-
do vulgari plantam proculic, sed ma-
jorem & foliis crispioribus rubicun-
dioribusque, nec non semine mayo-
re. Multo hoc vulgari validius, di-
midioque grano sumtum valentissime
purgat, ita propter acredinem dum
sumitur obvolvendum, ne ventricu-
lum attingat. Visus quidam robu-
stus juvenis, qui contra capitis dolo-
rem sumsit, feliciterque purgatus,
inflammato ventriculo, nono die, ni-
hil proficientibus trium Medicorum
subsidiis, occubuit.

III. *Ricinus Americanus* quintu-
plex est, 1. major. 2. minor. 3. scan-
dens.

Ricinus. *dens. 4. foliis Staphis agriæ. 5. fructu racemoso hispido.*

Aldin. l. c.
Monard.
simpl. me.
dic. c. 4.

I. *Ricinus Americanus major* incolis *Curcas*, Camerario *Syriacus*, ab Aldino satus, prima ex semine *folia* produxit subrotunda, vulgari similia, sed decies majora: quæ ea exceperet hederacea & angulosa, non divisa erant. *Semen* nigrum non maculosum. *Siliqua* ipsa triangula, lævis est & cinerei coloris, ut Clusius habet. Elicitur ex *semine* oleum in Nova Hispania, quod *oleum ficus infernalis* vocatur, prout Dioscorides præscripsit: quod in colicis doloribus per clysterem infunditur: hydropicorum ventri inungi potest, nec non psoriasis & capitis ulceribus. Guttis aliquot intus sumtum in vino, status valide discutit, & aquas evacuat. Tumores frigidos dissolvit, morbisque ab ejusmodi humoribus provenientius opitulatur. Ventri puerorum illitum, alvum solvit, & vermes pellit, maxime si una vel altera gutta in lacte vel jure pingui propinetur. *Semen* ipsum dicitur semigrani pondere infra & supra evacuare.

Clus. Exot.
l. 2. c. 21.
& 25.

Nard. Rer.
Medicar.
l. 3. c. 26.

III. *Ricinus Americanus scandens* est duplex, *Hucipochotl* & *Xapeloach quahuatl*. I. *Hucipochotl* arbuscula est vitium instar serpens, quæ apud Huaxenses nascitur, foliis tricuspidibus, floribus coccineis in comam aggregatis; fructu nucis Ponticæ forma & magnitudine, qui ternos Ricini more candicantes nucleos continet. Totoque anno hæc omnia fert. Moderate est frigida. Folia in acetariis colorem nitidum reddunt. *Lacryma* e perfractis germinibus stillans, inflammationem oculorum tollit. Nuclei quini membrana liberati per superiora & inferiora purgant. 2. *Tzapeloach quahuatl*, est stipite cubitali, lento, subalbido, levi & spinifero. Lac dentes firmare, & carnem exhaustam instaurare creditur.

IV. *Ricini Americani folio staphisagriæ* ramum descripsit Bauhinus.

Erat is cubitalis, lignosus, rufescens, & circa foliorum exortum hirsutus, quem *folia* pallide virentia, pediculis oblongis & hirsutæ asperis donata ambiebant: folia inferiora in quinque lacinias, superiora in ternas secantur, crenis acutis per circumferentiam exasperata, & nonnihil pubescentia. Ramulis *flores* quinquefolii ex intensa purpura rubentes insident.

V. *Ricinus Americanus fructu racemoso hispido*, nascitur in Brasilia, & incolis *Nambu guacu* dicitur. Frutex est in multos ramos expansus. Folia, in quorum medio longi pediculi, magna, in octo aut novem lacinias scissa, mollia, tenera & quæ attracta statim flavescent. In ramorum extremitatibus *pediculi*, in quibus alternata ferie spicæ forma, quinque aut sex virides & laeves *globuli*, uvæ instar connexi; qui ubi se aperuere, *flosculos* subtiles, sambucinis similes, ex albo flavescentes in racemum congestis exhibent. His succedit *fructus*, corpora nempe rotunda, viridia, cinnabris umbilicis notata, magnitudine avellanae, erinacei instar, quinquaginta aut sexaginta in unum racemum congesta. *Nigricat* maturus, & diffilit in tres capsulas, quarum unaquæque nucem cineream, nigro maculatam, figura & magnitudine pistaceorum, cuticula fragili obductam continet, cui nucleus oleaginosus. Immaturus si tangatur, cum crepitu in partes diffilit.

Marcgr. H.
P. Brasil. l. 2.
c. 14.

VI. *Adfines Ricini* sunt 1. *Dende Serapionis* seu *Abelmoluch Mauritanorum Imperati*. 2. *Fructus Exoticus Clusii Ricino similis*. 3. *Curcas Cayrensis*.

I. *Dende Serapionis* seu *Abelmoluch Mauritanorum Imperati*, falso Ricinum Americanum creditum Bauhinus noster scribit. Tres ejus recensentur species. 1. *Chinensis*, quæ *semen* fert Pistachiorum, crassitudine & similitudine quæque celebratissima est. 2. *Sabatica*. quæ magnitudine seminis cataputiæ prodit; & quia tarde operatur, statusque in phlegmatico forte corpore, & alia gravissima symptomata gignit, rejicitur.

Bauh. Phy.
top. l. 5.
p. 432.

citur. 3. *Indica*, mediæ inter utramque naturæ. Maximum in iis a cortice extimo & lingulis interioribus periculum, ideo rejici debent. *Fructus*, quem *sub hujus nomine a Paludano Bauhinus* accepit, Ricino Americano majore dimidio minor erat, eique *cortex* cinereus, maculis pulvis hinc inde adpersus, gibbus, altera parte elatior, pauloque planior, tribus interdum elevatis costis conspicuus; *nucleus* bipartitus, pallidus, tenui vestitus cortice, saporis non ingrati, sed fauces diu & multum vellicantis. Adlatus erat ex Creta.

Bauhin. H.
P. l. 34.
c. 14. p. 644.

Clus. Exot.
l. 2. c. 24.

II. *Fructus Exoticus Clusii Ricino similis*, triangularis & in tres cellulas distinctus erat, quarum singu-

lis *semen* inerat rugosum, nigrum; Exterior cortex fuscus & glaber. Pendebat inter quinque foliola, medium tegentia fructum e pediculo semunciali, satis firmo.

Ricinus.

III. *Curcas Cayrensiū*, Cambajenses *Carpata*, Malavares *Chiviquilenga* vocant. Fructus est avellanæ magnitudine cum suo putamine, sed non tam rotundus, candidus, gustu tuberorum coctorum, ex plantæ cujusdam, quæ feritur, ramis dependens; nullius Garzia conscio in Medicina usus. Forte *Habelculcul* Serapionis. *Hab* enim magnum semen notat. Seminis copiam facere, sed & cholicam passionem excitare scribit iste: quæ & Malavares huic fructui tribuunt.

Garz. Hist.
Arom. l. 2.
c. 22.

PUNCTVM V.

De *Sassafras*.

TABVLA
LXV.

Monard.
Simpl. c. 24.
De Lact.
Ind. Occid.
l. 4. c. 15.
Bauhin. H.
P. l. 4. c. 32.

De *Sassafras* nihil in Antiquorum scriptis. Non prius nota arbor, quam novus orbis, & in eo Florida. Monardo & aliis est *Pavane Indorum*; Capivaccio *Indica Sassafragia*; Camerario *Lignum Sassepes*, aliis *lignum Floridum*; Codroncho *Indica radix*, quæ *Sassafras*, Virginienſibus *Winanck*. Arbor est aliquando procera, ita, ut pinum mediocrem æquet. *Radix* summa tellure vagatur, modo crassa, modo gracilis. *Truncus* singularis, nullis adnatis ramosus, radice magis flexilis, cui *cortex* extimus tenuis & cinereus; interior crassiusculus, rufescens, fungosus & nonnihil mollis; *materies* ex albo rufescens, aliqua parte cinerea, mollitie & pectinibus tiliaceis, odore & sapore aromatico, subdulci, & quodammodo anisi. *Folium* Bauhinus sublongum apud fratrem vidit, in tres partes divisum, cum pediculo aromatico. Monardes pyri foliis simile facit, atro-virens, odoratum, vixque ullum angulum ostendere. Perpetuum idem, aliisque marcescentibus, succrescunt alia. *Fructus* secundum eundem oblongus, rugosus, & longissimis pediculis donatus. At qui ex novo Belgio redierat, forma a

baccis lauri non multum differre, minorem tamen, cortice tenero & pene nigro, exterius rugato, dixit; *nucem* intus albam, sapore subamaro in duas partes divisam. *Nascitur* in Florida maritimis temperatisque locis; in portu inprimis S. Helenæ & S. Matthæi: montibus etiam. *Usus* hisce regionibus frequens, ex quo inferri cæpit. Efficacissima ob corticem multum viscidum *radix*, ejusque decoctum odoratius: hinc *cortex*, quia magis aromaticus, cum suo *ligno*, qui ad tertium caliditatis gradum adscendit. Uncia una octo libras potionis gratissimæ exhibet, ad corpora superfluis humoribus liberanda: sed quia vires adſervata amittit & odoris gratiam, melius pro duabus tantum dosibus paratur. Fic & destillatum ex eo, si ramenta aliquandiu sub cineribus calidis macerata fuerint; & cujus minor, quam decocti, dosis. Olim ligni cum suo cortice unc. una semis in tribus aquæ fontanæ libris per horas XII. infusa ad librarum duarum consumptionem decoquebantur. Colaturæ libra dimidia dosis mane. Residentiam in libris XVI. aquæ per tres horas infundere solebant: ad libras duas decoque-

De Lact. in
Ind. Occid.
indice capi-
tum.

Sassafras. coquebant, colatoque per manicam Hippocratis cum saccharo, pro ordinario potu utebantur. Licebat & vinum diluere. Singulare est remedium in lue venerea, ischiade, podagra, veteribus fluxionibus, tertiana notha, capitis doloribus, respiratio- nis difficultate, cum saccharo; flati- bus, urinæ suppressione, & aliis fri- gidis adfectibus. In fœdis virginum coloribus singulari est experimento. Ipsa ligni materies etſi ad opera ſatis inepta, ſuſtinuit tamen in elegan- tium pyxidum torno elaborari. Vi- de de ejus uſu *Neuvillaeum*.

Huc refer *Lignum Anifi* Goro-

pii, ex orbe Atlantico, ut ille vocat, advectum, &, quod Anifi odorem ſpiraret, ita dictum. Habebat *eo- dem nomine* a Thoma Platero Bau- hinus *aliud*, uncias duas latum, ex trunco brachii craſſitudine, nec illo tamen integro exciſum, odore Anifi & quam Sassafras ſuaviori, mitiori- que; *materie* ſolida, ſubſuſca, pe- ctines rectos maculis tranſverſis ac ſplendicantibus intercipientibus, qua- les fere in Fagino ligno videri ſol- lent: facile ſinditur. Flammæ ad- motum, facile adoleſcit, & luculen- tam flammam præbet: ſed odorem gratum non reddit, ſicuti Sassafras.

Gorop.
Hiſp. l. 7.

ARTICVLVS II.

De Bacciferis Indigenis & Exoticis Classis ſecundæ.

PUNCTVM I.

De Berberis.

Vid.
TABVLA
LXV.

Bacciferarum Classis ſecundæ ſunt
1. *Berberis*. 2. *Grossularia*, cui
Ribes adjicitur. 3. *Sambucus*. 4. *Lau-
rus*. 5. *Laureola*. 6. *Chamelæa*.
7. *Thymelæa*. 8. *Cneoron*.

Sectione de
Antidotis
c. 457.

I. *Berberis* inter *Antiquos* nemo meminit. Ex Græcis mediæ ætatis facit ejus mentionem Myreſus, & ſemen oxyacanthæ eſſe putat. Vi- detur equidem c. 27. unam & ean- dem cum branca urſina facere: ſed locum corruptum eſſe certum, & ita legi & interpungi debere, ut *πράντος ἐρσίνα τὴν ἐν ἀκανθῶν* legatur, quod veriſſimum eſt, cum brancam urſinam acanthon Græci vocent. Fer- ri tamen non poteſt, ut cum *Oxya- cantha*, ſive illa ſit *Galenii*, ſive *Dio- ſcoridis*, ſit eadem; tantum abeſt, ut ſit *Theophrasti colytea*. De *Oxya- cantha* *Dioſcoridis* ſuperius ſub *Me- ſpilo* egimus. Cum hoc eadem eſt *Galenii*, ut ex libro 7. ſimpliciter pa- ret. *Pyro ſylveſtri* ſimilem ſcribit, & fructum *ὅμοιον τοῖς μύρτοις ἐρυθρον καὶ ἀραιόν* ferre. *Colytea* *Theophra- ſti* arbor eſt circa *Idam* proveniens. Genus aliud eſt fruticosum, ramo- ſum, *ὄξωδες καὶ πολυμάχαλον*, inven- tu rarum, non crebrum, &c. *Ber-*

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 17.

Theophr.
l. c.

beris pluribus ac diverſis aculeatis ſtolonibus fruticat, qui rariffime arboreſcunt. Trium *ſpinarum* ipſi ad ſingulos nodos perpetua ſeries, adeo, ut trifurcato quaſi ordine pro- dire videantur. albæ hæ, planæ, fra- giles, & admodum pungentes. *Fo- lia* habet parva, oblonga, dilute vi- rentia, ambitu crenata, ſapore acida. *Fructus* racematim uvæ in modum propendet, teres, oblongus, lenta cute, ſucculentam carnem continens. Fiat jam comparatio, & verum eſſe comperietur, quod diximus.

II. *RECENTIORIBUS* eſt triplex
1. *Dumetorum*. 2. *Sine nucleo* ſeu
ἀσπορος & 3. *Alpina Cretica*.

I. *Berberis dumetorum*, *Dodonæo* *ſpina acida*, *Trago oxyacantha*, *Tabernomontano* & *Codro Oxyacantha* *Galenii*, *Ruellio Spini vineta*, *Mat- thiolo Creſpinus*, *Camerario Oxya- canthus Galenii*, *Amirbaris Abenſi- næ*, *Ribes Serapionis* forte *Cæſalpi- no*, ambigit inter arbores frutices, armaturque ſpinis minacibus, qua- rum tres aliquando ex uno trunci puncto emicant. *Radix* multifida, ſub primo cortice egregie flava. *Ma- teriei* albidæ multa ſubeſt *medulla*.

Bauh. H. P.
l. 6. c. 24.

Folia

Folia prima germinatione sinuosa & pungentibus spinis horrida, successu molliores induunt & saporem acidum. *Flores* racemosi, sex foliorum, lutei, cum totidem staminibus, pistillo viridante, odore gravi, mense Aprili & Majo prodeunt. *Bacca* cylindracea, tenues, & per Septembris maturitatem acidæ: *Zairach* quibusdam. Calidas nimis regiones averfatur, ideo in Hispania fructum non emittere, auctor Tragus. Nec Mons-pelii a Bauhino visa. *Crescit* tamen in Italia, Delphinatu, Germania, Polonia &c. Incultis, sylvosis, campis, montanis, ficcis & aquosis delectatur; inprimis in frigidiori climate rivorum ripis ac collibus. De *Ufu* scito, *corticem* flavum pulverizatum, qui officinis *Bugia*, aphtis & faucium ulceribus prodesse: medium, qui inter lignum & corticem, vino albo in lineo panniculo per trihorium maceratum, mirifice purgare. Quomodo croceo ejus colore vernix tingatur, exstat apud *Bauhinum*. Aqua, inquit, quæ macerata colla mucaginosa sit reddita, illiuntur ligna explendis fibrarum & pectinum interstitiis: siccata in fuso, corticem Berberis croceo colore tingunt, tandem nitorem inducta vernice liquida vulgata conciliant. *Folia* viridia ad intinctus parantur: suc-

cus contusorum cum aceto in calidis Berberis ad dentes defluxionibus laudantur. *Bacca* in secundo sunt frigida & sicca, & tenuium aliquatenus partium. Vinum ex illis expressum in fluxionibus, febribus ardentibus, cum julepo violato adhibetur: non tam sumtum, quam inditum, menses movet; & cum aquis graminis vel portulacæ & sacchari tantillo, tineas ventris interimit.

II. De *Berberi sine aculeo* seu *Clas. H. P.* *ἀσπρόω* nihil occurrit. Fruticem ejus *1. c. 85.* Aschafenburgi, magnum Francofurti Clusius vidit.

III. *Berberis Alpina Cretica*, *Bel-* Bellus ad *lo Lycium Creticum* audit. Frutex *Clas.* est quatuor vel quinque cubitorum, *Epist. 1.* totus spinis horridus. *Cortex* ligni *Bauhin. H.* pallidus & asper: *materies* lutea, *P. 1. 6. c. 26.* *folia* parva ad formam buxeorum accedentia, leniter ferrata. *Flores* copiosi, lutei, paliuri instar, sed minores. *Fructus* berberum instar longi, nigri, sapore inter dulcem & acidum medio, in quibus unum vel duo granula continentur. Frequens est & in monte Libano.

Ex EXOTICIS huc refer *Maza-* Nardus R. *xochotl* arborem, cujus rami omnes *M. N. H.* alati, pleni fructu rubro Berberis, *P. 385.* qui longus & dimidium digitum latus est.

PUNCTVM II.

De *Grossularia* & *Ribesio*.

I.

De *Grossularia* & *Ribesio* nihil apud antiquos invenies. Illam nonnulli *ῥοον*, alii *Ceanothum* Theophrasti esse dicunt. At *Grossularia* seu *Uva crispa* spinosa est, *ῥοον* nullæ spinæ. Flos omnis ex herbaceo albidus; fructus per maturitatem flavescit. De *Ceanotho* spina paucissima Theophrastus prodidit. Germinare dicit ut iridem; aquosis gaudere; radicem ei nec arundinosam, nec geniculatam esse, quod ad Uvam crispam vix spectat. Hæc etiam quibusdam *ῥοος*, seu ut alii *οῖος* (æquam Gaza vertit) Theophrasti esse putatur. Æquorum inquit ille alia can-

dida, alia nigra: & flos fructusque utrique pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: nonnulli etiam medii quodammodo sunt, quibus flos in purpura candicans. Nec enim fulvus, nec exalbidus est. Nihil horum convenit *Ribesio*. Sed & *Suidas* *οῖον* salicem dicit; & ex ea quia *ἰμάντρον* crates fieri.

II. RECENTIORIBVS est *Grossularia* duplex, alia *spinosa*, dicta *uva crispa*: alia *non spinosa*, dicta *Ribes*.

I. *Grossularia spinosa* est vel *sylvestris* vel *sativa*.

1. *Grossularia spinosa sylvestris* dicitur plerisque *Uva crispa*, *Lobelio*

Grossularia & Ribes. Cardan. de Variet. rer. l. 6. *Vitis precia Plinii*, Matthiolo *Uva spina*, Cordo *Crispina Uva*, Cardano *Rocella*, *Ceanothus spina*, vel *asper* Gesnero, *Grossularia vulgaris* Clusio.

Frutex est tricubitalis aliquando, spinis acutis & rigidis, binis, ternis, ad foliorum exortum passim horridus, cortice purpurante, materia buxoe pallescente colore. Folia utrinque hirsuta, sapore acido, ex brevibus pediculis propendent. Flosculi, quos in Aprili dat, simul multi ex eodem tuberculo, quo folia prodeunt, nonnihil gravi odore, ex pediculo brevissimo, punicante, hirsuto, nutant; quibus globuli hirsuti subsunt, futurarum baccarum rudimenta. ex foliolis quinque rubentibus, extrorsum reflexis, ut radiatam stellam expriment, quæ totidem adnatas quasi linguas albicantes, intus hirsutas surrigentia, florem reliquum concavum efficiunt. Baccæ mense Majo funduntur, rotundæ, striatæ, granis multis prægnantes, quæ maturæ in Junio & Julio flavescent, aliquando subrubent, dulces, immaturæ acidæ. Dum manducantur, ob membranam crepant. In calidis regionibus raro occurrunt. Circa Basileam copiosissima. Observata & Murani ad Venetias. Usus, Foliorum in urina cienda, si novella comedantur: fructus, in gravidarum pica; in febribus, si jusculis incoquantur; fluxionum restrictione, si immaturus sumatur; in inflammationibus calidis, si adplicetur: in gonorrhoea & fluore albo, si saccharo condiantur. Concinnatur & in placentas, cupedias ac scitamenta. Delectantur eo & aviculæ. Ideo Diepæ circa frondosas arbusculas circumductum rete, inque eo aviculas nutritas vidit Gesnerus.

Gesner. in hortis German.

2. *Grossularia spinosa sativa* duplex est, fructu nempe majore & fructu obscure purpurascente.

Clus. H. Pl. l. 1. c. 85.

1. *Grossularia spinosa sativa fructu majore* cerasi magnitudinem adsequitur, ampliorem foliis, quam Cargilus in hortis nonnullis infirmo samento ridicis sustentato vidit.

2. *Grossularia spinosa sativa fructu obscure purpurascente*, cujus folia ampliora nigrioraque: spinæ modo bre-

ves & infirmiores, modo nullæ. fructus immaturus viret, maturus purpurascit primo, mox atrum ex purpurea colorem contrahit.

II. *Grossularia non spinosa* dicitur Ribes, & est vel hortensis vel sylvestris, cui Ribes Arabum & Ribes Arabum congener planta accedit.

1. *Grossularia non spinosa hortensis*, fructum gerit vel acino simplici eoque cæruleo, vel multiplici; estque 1. rubra vulgaris. 2. majore fructu & monocarpus.

I. *Grossularia non spinosa hortensis acino multiplici rubra vulgaris*, seu Ribes officinarum, Dodonæo *uva ursi*, Gesnero *Ceanothus levis*, Lobelio Ribes Arabum, Lugdunensi *Grossularia rubra*, frutex est notissimus, stolonibus aliquando tricubitalibus, flexilibus & subnigricantibus ramis: cortex spadiceus, materie amplamatrix. Folia uvæ crispæ similia, sinuata, mollia, acidula, inferne canescunt. Flores racematim coherant, quinquefolii, pallide virentes, cujus umbilicum medium, obsoleti coloris, staminula sex sessilia, ambiunt. Baccæ non racemosæ, rubræ, ejusdem fere cum uva crispæ usus. Reprimunt bilis fervorem, putredinem, febres, ventris subversiones, choleeram &c. Paratur ex iis in officinis Syrupus.

Bauh. H. P. l. 15. c. 2. p. 97.

II. *Grossularia non spinosa acino multiplici fructu rubro majore*, Cæspari Bauhino, Ribes flore rubente. Firmior hic frutex vulgari, & sæpe cultura in arbusculam abit. Cortex rubescit, folia hirsuta ad tactum lævia, angulosa, sapore tantillum acido. longi florum racemi, & fere palmares, obsoleti ruboris, quorum fimbria quinquepartita albescit, sapore subacido. Fructus rubet. Clusius amplioribus esse foliis scribit, florem eleganter rubere, & puniceum esse. Visa Florentiæ acinis avellana majoribus, acidissimi saporis.

Clus. H. P. l. 1. c. 85.

III. *Grossularia non spinosa, acino multiplici monocarpus*, fructum singularem ut in uva crispæ profert.

Gesner. in horto.

IV. *Grossularia non spinosa, fructu margaritis simili*, quæ cortice est candidiore, floribus facillime diffusi-

Bauh. l. c.

entibus, baccis albis, pellucidis, unio-
num instar, ejusdem cum vulgaribus
magnitudinis. Incognitum Hungaris
scribit Clusius. [Montbelgardifloruit.

V. *Grossularia non spinosa fructu
dulci*, folia habet candidiora, fructus
minores & rubros.

2. *Grossularia non spinosa sylvestris*
est duplex. 1. *Fructu rubro*. 2. *Fru-
ctu nigro*.

I. *Grossularia non spinosa sylvestris
fructu rubro*, aliis *Ribes sylvestris*,
Gesnero *Ceanothus levis sylvestris*,
Bauhino *Ribes Alpinus dulcis* voca-
tur. Fruticat tenui vimine, cortice
cinereo contecto. *Folia* aliquot ex
alternis tuberculis, cum floret, simul
exerunt, levissime hirsuta, superne
atro virentia, in quorum angulos sin-
gulos nervus satis elatus excurrit, gu-
stu subdulci. *Flores* racemosi, her-
bacei, vulgaris magnitudine multum
cedunt, odore gratissimo, quibus ad
pediculum folium concolor, tenue &
oblongum, adnascitur. *Uvæ* bre-
viores quam vulgari; acini minus
rubri, subdulces, fere insipidi. Oc-
currit circa Basileam & Genevæ in
monte Solere: nec non in Bohemiæ
& Germaniæ sylvis. Visa ab Illu-
stri Barone Schöneichio in pinu.

II. *Grossularia non spinosa sylve-
stris fructu nigro*, Trago *Ribes syl-
vestris* & *Ceanothus ribes acinis ni-
gris*, Dodonæo & Tabern. *Ribes ni-
grum*, Gesnero *Ribes sylvestre aqua-
ricum Sabinæ fere odore*, *Amomum
falsum* & *Pseudo Amomum*; Lug-
danensi *Grossularia nigra*, aliis *Pipe-
rella*, Bauhino *Ribes nigrum*, vulgo
dictum folio olente, frutex est, in Gal-
lia aliquando tricubitalis. *folia* vitigi-
nea, averfa parte pilosa, odore foeti-
do: *flores* ex eodem tuberculo race-
matim digesti, concavi, uvæ crispæ
foliis similes, quinque foliis rubenti-
bus extrorsum reflexis, totidem sur-
rectis pallide virentibus, alternante
cum quinis fibris concoloribus situ,
odore gravi. *Baccæ* oblongæ, nigræ,
acidæ, sapore inter gratum & ingra-
tum medio. Ruellio immaturæ sunt
virides, post nigrescentes, racema-
tim coactæ, gustu piperis, sed miti-
usculo. Hinc *Piper olitores* Galli

vocant. Provenit in hortis Galliæ &
& Italiæ, incipitque principio Fe-
bruarii prorumpere. Tiguri, circa
rivorum quorundam ripas sponte na-
scitur, sed sterilis. Visitur & in Misniæ
montanis circa Annæbergam, ubi fru-
ctui nescio quid venenati in esse cre-
ditur. Sunt, qui foliis cibos condiunt.

III. *Ribes Arabum foliis petasiti-
dis*, Rauwolfio *Ribes Arabum cum
suis capreolis*, Clusio *Ribes legitima
Arabum*, Camerario *Ribes Serapio-
nis*, Cardano *Ribes verum Bellonii in
Libano*. *Radicem* habet apud Clu-
sium purpurascentem, rugosam, fle-
xuosam; *caules* cubitales, pollicari
crassitie, hirsutos, virides, inferne
purpurascentes. *Folium* lapathi acu-
ti vel petasitidis, ad papyrum acce-
dens. Septena ut plurimum a radi-
ce adsurgunt, in eorumque semi me-
dio baccæ veluti racematim depen-
dent. Bellonio *Spicæ Celticæ* na-
scendi modo aliquo modo naturam
refert, perpetuoque sub nive degit.
Rauwolfio mense Septembri sine
flore & semine, duobus tantum fo-
liis visa. *Nascitur* in Libano, si a
cedris paulo altius ad montis cacu-
men adscenderis. *Folia & caules* suc-
cum acidum, turbidum, lactis albe-
dine fundunt, qui si insoletur, cla-
rescit. Eadem forte cum ea vel ad-
finis *Ribes Arabum Serapionis folio
Oxylapathi*. Arborem esse scribit
rotundis foliis & capreolos habere.
Frigida & sicca ordine secundo. Ex
capreolis exprimitur succus, qui co-
ctione spissescit. Paratur ex eo Rob
de Ribes Alepi, mittiturque etiam ad
Turcicum Imperatorem, earundem
cum nostro Ribes virium.

IV. *Ribes Rauwolfii congener plan-
ta*, a Clusio ex Coolmanni foliis de-
scribitur. Reperta enim hæc cum
suprema caulis parte inter chartas
ejusdem. Non adeo sphaerica figu-
ræ erant, mucronata enim, sed vel
hederæ folium angulorum expers,
vel convolvuli majoris quodammodo
referebant. viridis supernæ parti co-
lor; prona ex albo pallefcebat. Gra-
tia a nervis. Summi caulis abrupta
pars, teretes & oblongos folliculos
proferebat, eosque inanes & siccos.

D

EX.

Bauh. H. P.
l. 15. c. 2.
p. 99. Rau-
wolf. iti-
ner. l. 2.
c. 12. Clus.
H. P.

Bellon. apud
Bauh. l. c.

Dodon. in
Pemptad.

Vid.
TAB.
LXVI.
Clus. Exot.
l. 4. c. 21.

E X O T I C A.

Grossula- Ex EXOTICIS huc referri pos-
ria & Ri- sunt. 1. *Unni Chilensium*. 2. *Gu-*
bes. *vavirap Brasiliensium*. 3. *Mureci*
Pernambucensium. 4. *Curoiri Bra-*
silianorum. 5. *Frutex innominatus*
eorundem primus. 6. *Hiutztomat-*
zin novæ Hispaniæ. 7. *Ravvoco-*
menes Virginianorum.

De Laet
Ind. Occid.
l. 12. 2.

I. *Unni Chilensium*, Hispanis *Mur-*
tilla, quæ fructus fert uvarum in mo-
dum racematim collectos, pisorum
magnitudine, granorum mali grana-
ti forma & colore, sapore inter sua-
vem & acrem medio. Exprimitur
ex eo liquor clarus, ad vinum quam
proxime accedens, qui facies sua spon-
te egerit. fit & laudatissimum ace-
tum.

De Laet
Ind. Occid.
l. 16. 11.

II. *Guvavirap Brasiliensium*, ar-
bor procera & vasta, frondibus per-
exiguus, floribus rubicundis, fructu
uvam crispam referente.

III. *Mureci Paranambucensium*,
duo sunt genera, *Muropitinga*, &
Mureci guacu, quarum illa minus syl-

Marcgr. H.
P. l. 3. 10.
Piso de fa-
cult. medic.
l. 4. 32.

vestris. Arbores sunt cortice cine-
reo, ligno fragili, folia in frondes ple-
rumque congeruntur, longa, rufa,
& hirsuta dum juniora, lanugine fo-
liorum verbasci adultiora; flosculi
spicatum sunt congesti, lutei, quin-
quefolii, figura auriscalpii, cum ma-
nubrio rubro; fructus baccae figura,
magnitudine & sapore uvæ crispæ
similis. stuporem aliquando denti-
bus inferunt, ideo bene condiri so-
lent. Cortice retia & coria tingun-
tur: fiunt & potiones ad purgan-
dam alvum. Uvæ in cibos abeunt.

Marcgr. H.
P. l. 3. 9.

IV. *Curoiri Brasiliensium*, statim
prope terram in plurimos ramos se
explicat. flosculos fert tres aut qua-

tuor juxta se positos. Fructus ma-
gnitudine uvæ crispæ, rotundus, lu-
teus, cuticula & umbilico instructus,
saporis acidi, cui unum aut duo la-
pides seminis cannabis magnitudine.
Edulis est.

V. *Frutex innominatus eorundem* Marcgr. H.
primus Marcgravii, e radice lignosa, P. l. 2. 15.

filamentosa, & alba caulem protrudit
trium pedum altitudine, spinulis acu-
tis, quæ & in ramis visuntur, arma-
tum; folia vomeris, sed obtusi figura,
dilute viridia, mollia, & ad nervum
postica parte aculeata. flosculi ex vi-
ridi ad luteum inclinantes, quinque-
folii ad ipsos ramulos proveniunt.
Fructus mespili magnitudine, rotun-
dus, e viride albicans, maturus fla-
vescens, ex folliculo & pulpa com-
positus, cui semina orbicularia, com-
pressa, flavescentia, lentis figura, sa-
poris ut uvæ crispæ grati. Ad sola-
rium quidam referunt. Iconem ex
femine enata de Laet dedit, & sola-
ni spinosi speciem arbitratur.

VI. *Hiutztomatzin novæ Hi-* Marcgr. H.
spaniæ, frutex est radice grossa & P. l. 2. 15.

furculosa; trunci spinosi, ulnam alti;
folia spinauliæ quodammodo æmula,
parte inferiore villosa & incana. Flos
ei purpureus cum quibusdam stami-
nibus. Fructus albis cerasis similis.
Radix calet in gradu tertio, amara,
acuta. Cortex contusus & semun-
ciæ pondere haustus ex aqua, quos-
vis humores per inferiora purgat.
Admirabile contra febrem, asthma
& hydropem remedium.

VII. *Ravvocomenes Virginiano-* De Laet
rum acinorum species est, nostris Ind. Occid.
l. 3. c. 15.

uvis crispis, forma, colore, & sa-
pore plane similis. Tam crudis quam
coctis vescuntur.

De Sambuco.

PUNCTVM III.

TABULA
LXVI.

Duo Sambuci apud Antiquos ge-
nera. Unum procerius *Δενδρῶ-*
δες, quod in arborem adscendit; alte-
rum humilius.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 13.

I. *Sambucus procerior*, fruticosa
est, virgis, quæ anniculæ *μέχρι τῆς*
φυλλορροίας in longitudinem crescunt;

ut senorum cubitorum attingant, inde
in crassitudinem funduntur. Radices
μετέωροι nec multæ, nec grandes; τῶν γε-
ραοδένων crassitudo ὅσον περιεφαιάας.
Cortex enodis, lævis, (ramulorum sci-
licet) tenuis, spissus. Materia in ramis,
nempe junioribus, fungosa, surculi ὑπό-
κοιλοι

Theophr.
H. P. l. 1.
c. 9.

κοιλοι, καλαμοειδεις, υπόλευκοι, in caudice tam parum ejus, ut Theophrastus medullam habere neget. Levis eadem ubi inaruit; nec sentit verustatem, etiamsi aquis madescat, &

Dioscor. M.
M. l. 4.
c. 175.

cortice nudata sit. Germinare ante favonium incipit. *Folia* Dioscoridi καρύα βασιλική ὁμοία, ἐκ διασημάτων circa virgas exeunt. Theophrasto singulatim exit molle, oblongum, veluti lauri latifoliae, sed majus πλατύτερον καὶ περιφερέστερον ἐν μέσῃ κατώθεν, τὸ δὲ ἄκρον εἰς ὀξύ μᾶλλον συνήκον, κύκλῳ δὲ ἔχον χάραγμα, &c. *Flos* albus, multis parvis, candidis constans, κηρώδης, lilii odore insidet. Dioscorides ἐπὶ ἄκρων τῶν κλάδων ἢ τῶν καυλίων σκιαδια περιφερῇ ἔχειν, dixit. *Fructus* racemosus, τερμινθῶ ἰοειδής, ervi magnitudine, pediculo crasso, qui immaturus μελαίνει, maturus πολύχυλος est

Plin. H. N.

l. 16. c. 18.

Theophr.

H. P. l. 3.

c. 13. Plin.

H. N. l. 16.

c. 39. & 40.

& οἰνώδης; *semen* intus σεσαμοειδής τὴν ὄψιν. Provenit maxime παρ' ὕδατος καὶ ἐν τοῖς σκιεροῖς. In montibus non temere visitur. De *Uso* occurrit, ex ramis baculos prælevés fieri; scutis faciendis aptissima Plinio, quorum plaga se contrahat protinus eludatque suum vulnus, & ob id contumacius admittat ferrum. Quod interiora ejus firmissima tradit, & venabula, quæ ex eo omnibus præferri, error est, & corno debet adscribi. Idonea & tectis, si bene Theophrastus. *Succus* in summo usu ante inventum minium & excogitatam coloris ejus rationem. Nonnisi rubro colore tincti aras & sacrificia accedebant; eodemque simulacro Jovis facies, & Pan Arcadiæ Deus pingebatur. Dioscorides μελαίνειν τὰς τρίχας ἐγγράμμενον dixit, vel falso, quia futuro colore rubet; vel late nigrioris sumto vocabulo, quod capilli ex nigro rubescant.

Theophr.
H. P. l. 5.
c. 4.

Columella
l. 10.

II. *Sambucus humilior*, dicitur *Ebulus*, & ideo Dioscoridi χαμάντης & βοτανωδεύρα. Radice est oblonga, digitalis crassitudinis, minime lignosa: caule quadrangulo, multis geniculis distincto: foliis ἐκ διασημάτων περὶ ἑκάστων γόνυ τεταρσώμενοις, iisque amygdalinis. In cacumine est σκιαδιον flore & fructu sambuci: baccae rutilæ Columellæ, in quibus se-

mina nigra. Nascitur in opacis aquo-Sambusisque. Jus radices in vino decoctum potui hydropicis apud Æginetam datur, προπυτίζειν jubet.

II. RECENTIORIBVS in triplici Sambucus est differentia. Est enim 1. *Vulgaris*. 2. *Humilis*. 3. *Aquatica*.

1. *Sambucus vulgaris* est quadruplex. 1. *Fructu in umbella nigro*. 2. *Fructu in umbella viridi* vel potius albo. 3. *Racemosa rubra*. 4. *Laciniata*.

1. *Sambucus vulgaris fructu in umbella nigro*, Camerario *Sambucus domestica* vel *campestris*, Anguillaræ *Sambucus fructu in umbella* audit.

Bauhin. H.
P. l. 5. c. 23.
p. 544.
Matthiolum.

Rami sunt ex geniculis articulati, medullaque plurima & levissima farciuntur. Cortex duplex: exterior nempe, quasi argenteus, & nuper exeuntium viridans; & medianus totus herbidus, qui inter exteriorem & lignum decurrit. *Folia* ramos patulo oblitu vestiunt, ad costam unam adnexa, atro virentia, quæque nauseosi aliquid habent; gratiosi, si contendantur. Martio protruduntur, Februario alicubi. Flores ante vites prodeunt in patula umbella albi, quinquefolii, umbilico compositi, nec ingrati odoris; qui ex pruina decidunt, & inde ad vites omen. *Baccae* initio virentes, per maturitatem atro purpureæ, quibus grana exigua, plana, terna plerumque. Annotis radicibus fungus adnascitur, effigie auris humanæ, colore pullo: gummi quidam vocant & aures Iudæ. Ex semine sesamæ, eo novi progignuntur frutices, si teratur. Occurrit ubique ad aquas, sepes & macerias. In Italia, Gallia, & calidioribus rarior. In hortis vivit & in arborem proceram evadit. In Java foliis est æqualibus, grandioribus baccis. *Ufus* ejus eximius est, scripsitque de eo integrum librum Blochwitzius, quem consule. Radix usurpatur in hydropie in vino decocta: succus expressus in vomitu & aquæ intercutaneæ depulso, cum vino propinata. Virgultum illius, quæ nunquam sole radiata, inter duo internodia decisum, & de collo suspensum ab erysipellate præservare creditur. Alii in taleolas aliquot sectum, virili

Sambu-
eus.

virili indusio insuunt, factumque in quodam Lipsiæ experimentum. Est & inter amuleta contra impotentiam, & in quod morbi isti transplantari posse creduntur. *Cortex medianus* valet cum theriaca in peste, si decoquatur: in ambustionibus, si ex ea unguentum paratur; (Fit ex eo & oleo aqua sambuci pluries loto, decocto, expresso, colato, donec succus absumatur, cum cera, vernice, thure albo, & duorum ovorum albumine) in hydrope, si aqua ex eo binis cohobis destillata, ter in die, ad unciam unam & semis exhibeatur; in erysipellate, si abrasus parti adfectæ ter de die adplicetur. *Medullæ* usus in ascite & calculo nobilis, si in taleolas subtiles concisa, in spiritu baccarum per dies quatuordecim infundatur, & spiritus fortiter expressi cochlear sumatur. *Gemmularum* in vomitu, si saccharo condiantur. *Stibii* instar purgant. *Folia*, quæ primo germinatu prodeunt, contra podagricos dolores adhibentur, si cum pari radicum plantaginis pondere & vetere axungia suilla subigantur; contra herpes *ἑστωμένους*, si cum aceto contusa, & cum cineribus propriis & pauxillo therebinthinæ mista, bis de die adplicentur. *Flores* contra scorbuticos in plantis pedum & extremitatibus digitorum tumores laudantur, si in vino cum sapone additis decoctis panni imbuti loco dolenti adplicentur: nec non contra scirrhus, si ex iis in oleum redacti, cum ammoniaco aceto sambucino mistis, unguentum fiat. Condiuntur iis casei, confectionumque sunt materia. *Baccis* suus in dysenteria usus, si succus cum pane coquatur, in pulverem abeat, & in vehiculo aliquo propinentur: in sudore, si in rob redactæ propinentur: in uteri suffocationibus, si in tincturam translata, prout Quercetanus præscripsit, ex cochleari propinentur. *Acinorum*, ad vomitum, si ex iis oleum extrahatur: ad purgandum serum, si, in pulverem contriti, ad drachmam unam exhibeantur; ad hydropem, si succus, iussulo gallinæ admixtus, cum decocto petroselini exhibeatur. *Semina* pri-

Gruling.
Floril. p. 28.
c. 16. p. 466.Gruling.
p. 26. c. 3.
p. 421.Quercetan.
in Pharma-
cop. restitu-
ta.

mi anni vomitum movere ait Bovius, secundi minus, tertii adhuc minus, sed pituitam & serum per inferiora purgare. *Fungorum*, in oris & tonsillarum inflammatione, & columella laxiore, si in liquore aliquo paucis horis diluti exhibeantur; in hydrope, si pulverisati propinentur, usus. Amuletum contra Epilepsiam ex sambuco in salice proveniente, videtur apud Hartmannum.

2. *Sambucus fructu in umbella viridi*, Lobelio *Sambucus fructu albo*, Bauhino, *vulgari similis*, Trago *Sambuci aliud genus*, odore ad Ebulum quodammodo accedit, reliquis ad vulgarem. Tragus fructum ex candido luteum dixit, Bauhinus acinos albos ferre. Visa Argentinæ & Basileæ in vinearum sepibus.

3. *Sambucus racemosa rubra*, Trago *Sambucus sylvestris*, Matthiolo, Camerario & aliis *Montana*; Thallio *ἑστωμένους*, Tabern. *Cervina*, Cæsalpino *sambuci secundum genus, in montibus umbellis parvis, baccis rubentibus*, multa cum vulgari communia habet, floribus & baccis differt. *Flores* stellati, ex albido in luteum langventes, in racemum oblongum digeruntur, mense Aprili. *Baccæ* ex rubentibus pediculis frequentes, per maturitatem coccineæ, injuvandi saporis. *Nascitur* in montosis & argentibus; opacis uliginosisque sylvarum, in Hercynia Saxo Thuringica circa Stolbergam: in latomiis circa Norimbergam: In Italiæ monte Veronensi Baldo. In monte Lotharingico Rofsbero circa Maymünster, mense Octobri, cum pulchris acinis coccineis & foliis deciduis videas, quæ ibi Augusto, ut circa Genavam Junio mature leguntur. In Palatinatu cum baccis albis invenitur. *Baccæ* soporiferos reddunt, ideo Solano quidam comparant; a cervis maribus inquiruntur, unde nomen: a foemellis non item, nisi prægnantes fuerint, & cervos in utero gestaverint. Dalechampius *πυγόν* Theophrasti esse suspicatur.

4. *Sambucus laciniata*, folia habet admodum fissa, & laciniosa, baccas primæ simillimas. Vidit Bauhinus Lutetiæ.

Hartman-
nus in Chy-
miatr. Cap.
de Epile-
psia.Faubin. H.
P. l. 5. 23.
Dodon.
Pempt. 6.
l. 4. c. 22.Bauh. H. P.
l. 5. c. 25.
p. 551.Theophr.
H. P. l. 3. c. 4.

Lutetiae. Sed & hortis Belgii familiaris.

II. *Sambucus humilis* est duplex.

1. *Non laciniata*, & 2. *laciniata*.

Bauh. H. p.
l. 5. c. 24.
p. 549.

I. *Sambucus humilis non laciniata*, Dioscoridi *Chamaeacte*, Trago *Heliacte sylvestris euboica*, aliis *Ebulus*, *Ebuli* & *Sambuci* alterum genus, Bauhino *Sambucus herbacea* dicitur. Ambigit inter frutices & herbas, ita tamen, ut magis ad has accedat, quia raro hominis staturam aequat, maxima ex parte sesquicubito non altior. *Radix* longa, non lignosa. *Caulis* striatus, medullosus, hybernis mensibus contabescit. *Folia* e tribus quatuorve conjugationibus ad rachin adnectuntur, odore graviore. *Flosculorum* umbellae albae, quinquepartitae, odoratae, sed nescio quid nucleorum Persicorum magmatis spirantes, ferrugineis apicibus. *Acini* ante maturitatem thorulis multis angulosi & pane trianguli post magis rotundantur: quibus succus rutila purpura, *semina* terna, altera parte gibba, altera angulosa. *Nascitur* in opacis, aquosis & asperis. In Lombardia ad arborum margines Junio & Julio floret, Augusto & Septembri baccas maturat. *Ufus* eximius partium. *Radicum* in intestinorum & coxendicum doloribus a flatu genitis, si in succum redacti, insolati, in pastillos redacti, per clysterem infundantur; in mensibus purgandis, si cum lana foeminarum locis supponantur; in tympanite, si earum aqua cum sambuci destillato per dies triginta adhibeatur. Purgant cum molestia, subvertuntque ventriculum, & exigunt vires. *Foliorum* in cedematibus discutiendis: in hydrope, si cum radicibus in forti lixivio vel aceto decocta ventri & pedibus spongia adhibeantur. In podagra, si unguentum ex succo cum oleo chamamelino paratur. *Acini* & *semina* clementius evacuant, si primo aceto infundantur, ac deinde semine anisi vel aliis aromatibus permisceantur.

Bauh. Phytop.
l. 1. 12.
c. 1. p. 456.

2. *Sambucus humilis laciniata*, nihil a praecedente differt, laciniatum folium si exceperis,

III. *Sambucus aquatica* est etiam *Sambucorum* generum, 1. *Flore simplici*. cus. 2. *Flore globoso pleno*.

1. *Sambucus aquatica flore simplici* Bauhin. H. p. 1. 5. c. 26. p. 552. Ruellio *Opulus*, Angvillaræ *Ace-* ris species, tertia, quæ *Platanus aquatica*; Cæsalpino *Sambucus femina*, Dodonæo *palustris*, Cordo *Lycostaphylon femina*, aliis *Chamaeplatanus clynotrochos*, Theophrasti *Σκῆπτραλος*, quinque aut sex cubitorum est arbutuscula, caudex manum complet; lignum tenerum, candidum, fragile; cui cortex cinereus, medulla fungosa; rami peniculati, ex quibus folia angulosa, rugosa. *Flores* aliquantulum odorati, in umbella candidi, quinquepartiti, circa umbilicum continui, unguem pollicis aliquando aquant. *Acini*, sanguinei, ingrati saporis, quibus semen planum, rubrum, cordis effigie. *Visitur* frequens inter alnos in Germania, Gallia, Italia, Pedemontio & alibi: sed maxime ad umbras amœnasque ripas. Est & in palustribus Pisanis. *Baccæ* judicio Tragi ad vomitiones exhiberi possunt, in eclegmate: succus earum absterforius, & coquitur ad rissim in syrupi consistentiam. Constantinus flores destillatos contra calculum commendat. Solent propter odorem conclavibus inferri.

2. *Sambucus aquatica flore globoso pleno*, Bauhin. H. p. 1. 5. c. 26. p. 553. Cordo *Lycostaphylos mascula*, Gesnero *Sambucus aquatica hortensis*, Bauhino *Sambucus rosea*, Tabernom. *Sambucus aquatica polyanthos*, Lugdunensi *Sambucus aquatica culta, densissima*; praecedenti est similis, flores excipias, qui magni, quinquepartiti, unaque se expandentes, pilæ niveæ instar glomerati, albi communiter, rarius purpurei. Creditur mangonio facta talis. Haud rara in Poloniae & Silesiae hortis. *Corticum* sapor subadstringens est & absterforius.

EXOTICA.

Exoticorum huc istae referantur. Vid.

1. *Xumatl Mexicanorum*. 2. *Jokual-xochitl*. 3. *Enguamba Urapavensium*. 4. *Ibapurunga Brasiliensium*.
E I. Xu-

TABULA
LXVII.

Sambu-
cus.
Nard. rer.
medicar.
l. 3. 81.

I. *Xumatl Mexicanorum* seu *Sambucus*, a Mechoacanensibus *Cumtempta* adpellatur. *Folia* dolorem a causa calida tollunt, si fronti adplicentur; sanguinis fluxum, si fronti & naribus; accessiones tertianæ, si devorentur. Purgant enim, quod & radicibus adscribitur. Tusa & loco adfecto admota dolores gallicos sedat & enixarum tormina.

Nieremb.
H. N. l. 14.
37.

II. *Jokual xochitl*, aliis *Colcaqua-kuhl* seu *flos orbicularis*, quæ sambuci ebulive folia fert. Umbella e *flosculis* orbicularibus & pallentibus interdiu contractis, nocte hiantibus coacervantur. Unde acini racematim dependent, initio virides, dein coccinei, purpurei tandem. *Radix* est resinosi saporis. Dicuntur *folia* imposita pectori, syncopen tollere. Ex aqua epota, sudorem ciere: frixa, expresso prius succo, corpus impinguare; pulverem inspersum ulcera insanabilia curare, & resolutis ac uterino adfectu laborantibus prodesse.

De Laet Ind.
Occid. l. 5.

III. *Enguamba Urapavensium*, quæ arbor mediocris. *Cortice* subruceo,

rubescente; *ligno* fusco; *medulla* pallescente. *Foliis* latis & concavis, nervulis partim flavis, partim rubris distinctis; *floribus* racematim in corymbi formam pendulis & herbaceis, *fructu* nigro, pleno granis, e quo exprimitur oleum flavum, ad humores resolvendos & plagas utile. *Nascitur* in saxosis locis.

c. 24. Nard.
rer. medic.
l. 3. 75.

IV. *Ibapurunga Brasiliensium*, est cortice & ligno sambucino. *Folia* in longis pediculis tria juxta se posita, phaseolorum more, inferius magis hirsuta, ad horum quemlibet *flores* quinquefolii, *fructus* in quolibet pediculo longo tres, quatuor, quinque uvæ spinæ vel nucis avellanæ magnitudine; immaturi, virides, maculis albescentibus signati; maturi obscure purpurei, punctulis albicantibus varii. Cuti caro brunna, interius alba subjacet; in medio *lapis* durus, figura amygdalæ, cui tres albi, & parvi nuclei. Maturescit Februario & comeditur; sapor subdulcis. Possit & alio referri.

Maregr. H.
P. l. 3. 10.

PUNCTVM IV.

De Lauro.

Vid.

T A B.

LXVII.

Theophr.

H. P. l. 5.

c. 4. Theo-

phrast. H. P.

l. 1. c. 8. 9.

13. 15. 19.

& l. 3. c. 4.

Theophr.

H. P. l. 2. c. 3.

Theophr.

H. P. l. 2.

c. 1. l. 3. c. 6.

Theophr.

C. P. l. 1. c. 3.

9. l. 2. c. 15.

l. 5. c. 18.

Theophr.

H. P. l. 4.

c. 6. Theo-

phrast. C. P.

l. 5. c. 4.

Theophr.

H. P. l. 5. c. 8.

I.

De *Lauro* pauca in genere *Veteres*; plura in generibus & differentiis. *Radices* Theophrasto habet *ἀνομάλες*, corpus raru, *nodos* in *caudice* φύσει paucos, *corticem* tenuem, *succum* ἰλαιώδη. *folium* perpetuum, (forte βρύον, quod floris certum genus) nec tamen omnis. *Fructus* caro ἐν πυρῇνι, degeneratque in sata, & ex rubro fit nigrum, ut in Antandro. Observatum eidem, *nasci* ἀπὸ παρασπάδος, εἴαν τις τὸν περιέχοντα φυτεύῃ; *germinare* ante favonium; ramorum *germen* difficulter propter ξηρότητα καὶ πυκνότητα erumpere; ἀδυνέστερον γὰρ καὶ πρὸς τὸ διατηρῆσαι ἐπὶ πλείον τὸ μᾶλλον; difficulter propter eandem causam *augescere*; ob raritatem infirmitatemque, quamvis non sit πολὺ καρπός, facile *perire*; proximum putredini gelu διὰ τὸ θερμὸν resistere. Non durat tamen in frigidis: Visa aliquando prodiisse ex platano, quod ἐκ λαν-

θανώσης ἀρχῆς, propter σῆψιν ἢ ἀλλοίωσιν, accidisse dicendum est. In Olympo multa; in Ponto nulla: sed nec ad Bosphorum Cimmerium, quamvis Mithridate laborante provenire dignata. Subit & montosa. *Uusus* ligni ad baculos; foliorum & fructus ad varia.

Genera & differentia apud Dioscoridem, Theophrastum & Plinium occurrunt.

I. *Dioscoridi* est alia λεπτόφυλλος, Dioscor. M. alia πλατυτέρα, quibus Theophrastus M. l. 1. c. 106. addit *sterilem* καρπύμον & *sylvestrem*. I. λεπτόφυλλος figura sorbis similis est *θερμαντικὴν* sensus ipse facit. *Corticem* radicis calculos rumpere, & partus enecare creditum olim. Celeritate sane prodesse scribit Hippocrates. Ex *ligno* fiebant igniaria. Quin si exsiccata ramus frequentius adfricetur ramo, super adperso sulphuris pulvere, ignis statim exsilit. Minus *folia*

lia baccis calefaciunt. Ex his decoctum vulvis & vesicis convenit, illitaeque vesparum, crabronum & apum venenis resistunt. Fuere olim pro bellariis; sed quia grave quid spirant, inutilis laurea in compositionibus corona habebatur. Supponebantur mustaceis, dum coquebantur. Eadem suffita pituitam, qua gallinae messis tempore laborant, tollunt; boum coriagini decocta opitulatur, si terna foveris; eodem sibi palumbes annum fastidium & aegritudinem purgant; picas a morbis, columbas a fascinationibus, si in nidos congerantur, praeservant: anseribus, equo, asino, si comedantur, lethalia esse dicuntur. *Baccæ* menses trahunt adpositæ, trita vel potæ. Succus cutis pruriginem emendat. Elicitur ex illis oleum, singulari in nervorum resolutione, frigidis morbis, flatulentia, &c. experimento. Pediculos & lentes necat idem. Paratur quoque emplastrum & electuarium sui usus. Nunquam fulmine ici apud Svetonium habetur: ideo Tiberius laurea corona usus est: remediumque creduntur esse adversus tonitrua, quibus viciantur ova, pullique semiformes interimuntur, antequam toti partibus suis consumantur. Quidam ramos in dolia reponunt, ne vina a fulguribus pervertantur. Et hoc quidem vetustati creditum, annus MDXXXIX refellit, quo, testante Lacuna, Romæ in palatio Ducis de Castro laurus fulmine tacta est. Rubiginem segetum *lauri ramis* in arvo defixis abigi, transireque ex arvis in earum folia, Columella prodidit. Vites non minus offendere ac brassicam vehementia odoris; sub pinum feliciter feri, quod simplici & alta radice sit, Theophrasti dictum est. De *Usu* in triumpho inferius agemus.

2. Πλατύτερα folium habet molle & oblongum, sicut Sambucus. Usus cum superiore idem. 3. Άναπρος fert ολον βότρον vel βοτρυδιον (alii βρύον legunt, id est confertos flores similes quercuum & olearum floribus) aliquid uvæ instar; gigartum nonnulli vocant. 4. Κάσπιμος fructifera, quæ gignit, quamvis aliquando non co-

piose. 5. Sylvestris seu *ἀγρία*, Plinio *Tinus*, quam *Laurum sylvestrem* aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem cum carulea bacca. Marcus Cato *lauri sylvatici* nomine intelligere videtur.

2. Plinio plura sunt genera, ex Catoe & aliis. *Delphica* nempe, *Cypria*, *Mustax*, *Regia*, *Baccalia*, *Sterilis*, *Taxa*, *Spadonia*, & *Insana*. 1. *Delphica* æquali colore, viridior, maximis baccis e viridi rubentibus. Coronabantur ea Delphis & Romæ viatores: ex huiusque ramis e Tempe & Penæo Thesaliæ petitis, ac terræ in morem specus defixis, Delphico Apollini templum. 2. *Cypria* folio est brevi, nigro, per margines imbricato, crispa. 3. *Mustaci* folium maximum flaccidum & albicans. 4. *Regia*, quæ cœpit *Augusta* adpellari, amplissima & arbore & folio, baccis gustatu quoque non asperis. Aliqui negant eandem esse, & suum genus *Regiæ* faciunt longioribus foliis latioribusque. 5. *Baccaliam* adpellant, quæ vulgatissima est, baccarumque fertilissima. 6. *Sterilem* earum, quod maxime miror, triumphalem, eaque dicunt triumphantes uti: nisi id a Divo Augusto cœperit, quæ ei missa e cœlo. Minima est altitudine, folio crispo ac brevi, inventu rara. 7. *Taxa* in topiario opere usurpatur, excrecente in medio folio parvulo, veluti lacinia folii. 8. *Spadonia* mira opacitatis patientia: itaque quantalibet sub umbra solum implet. 9. *Insana* Amici Bebrii tumulus in Ponto circa Heracleam a suprema die tegebatur. Si quid de ea decerptum inferebatur navibus, jurgia fiebant, donec abjiceretur. Nota tum antiquis, inquit Plinius, nullum genus lauri in Corsica fuisse: quod nunc factum & ibi provenit. Ipsa pacifera ut quam prætendi etiam inter armatos hostes, quietis sit indicium. Romanis præcipue lætitiæ victoriarumque nuntia additur literis, & militum lanceis, pilisque. Fasces Imperatorum decorat. Ex his in gremio Jovis optimi maximi deponitur, quoties lætitiā nova victoria attulit. Sunt circa Divum Augustum eventa ejus digna

Laurus.
Theophr.
H. P. l. 1.
c. 15. Plin.
H. N. l. 15.
c. 30. Cato
R. R. c. 8.
Plin. l. c.

Pausan. in
Phocicis.

Plin. l. c.

Laurus.

digna memoratu. Namque Liviae Drusillae, quae postea Augusta matrimonii nomen accepit, cum pacta esset illa Caesari, gallinam conspicui candoris sedenti aquila ex alto abiecit in gremium illasam. Intrepideque miranti accessit miraculum, quoniam teneret rostro laureum ramum, onustum suis baccis. Conservari alitem & sobolem iussere aruspices, ramumque eum feri, ac rite custodiri. Quod factum est in villa Caesarum, fluvio Tiberii imposita juxta nonum lapidem Flaminia via, quae ob id vocatur ad gallinas: mireque sylva provenit. Ex ea triumphans postea Caesar, laurum in manu tenuit, coronamque capite gessit: ac deinde Imperatores Caesares cuncti. Traditusque mos est, ramos, quos tenerunt, ferendi, & durant sylvae nominibus suis discretæ, fortassis ideo mutatis triumphalibus. Unius arborum latina lingua nomen imponitur viris. Unius folia distinguuntur appellatione, *Lauream* enim vocamus. Durat & in urbe impositum loco, quando Loretum in Aventino vocatur, ubi sylva lauri fuit.

II. RECENTIORIBUS est Laurus vel domestica vel sylvestris.

I. *Laurus domestica*, est latifolia & tenuifolia.

I. *Laurus domestica latifolia* Plinio regia amplissima, foliis est ad Medicam accedentibus, ut Cæsalpinus prodidit. Frequens in monte Amalno visitur. In Atho ingentes Bellonius scribit, ut solem omni tempore reprimant. *Vires* cum tenuifolia eadem. Est vel *mas*, quæ nullum fructum fert; vel *fœmina*, quæ baccas. In Atho quinque species observantur, inter quas una inodora. Exfurgunt & in Nicaragua & nova Hispania venustæ & editæ.

Bellon. in observ.

Bauhin. H. P. l. 4. c. 1. p. 409.

II. *Laurus domestica tenuifolia*, aliis *Laurus vulgaris*, Dodon. *Lauri altera species*. Altitudo ei in calidioribus iusta, radices inæquales & obliquæ. *Caudex* enodis, cortex tenuis, materia rara. *Folia* oblonga, dura, acuminata, quæ costa per medium

decurrens dividit, & nullius ordinis nervis rigat, ramis viridantibus brevi pediculo perpetuo adherent, sapore aromatico. *Flos* confertus hederaceo similis, major, albus, flavescens Lobelio, multis in medio apicibus. Martio & Aprili protruditur. *Fructus* baccæ oblongæ, cerasiis minoribus pares, virides primum, tandem nigrae, sub quarum tenui cortice nucleus bifidus, callosus, durus, acris, pinguis, & cum acrimonia amarus. Maurantur sub finem auctumni; & nisi decerpantur, per totam hyemem ad ver usque in arbore hærent. Vix paucis annis ad hominis altitudinem crevisse. *Prodit* in calidioribus; quamvis & frigidiora quandoque ferat. In Italia, Gallia, Lexobii inprimis & Neustria, Hispania, obvia. In Creta nemora & montes incolit. Ad lacum Benacum sepes ex ea artificiose concinnantur. Montbelgardi sylvula quasi ex una pullulavit. In Anglia parvæ staturæ est: majoris tamen quam in Germania. Rarius floret. *Vires egregiæ*. Et *radicis cortices* quidem ad partum facilitandum; *Succi* contra venenata animalia. *Ramorum* ad ignem, quem fundunt attriti, si pauculo sulphuris adspargantur; *foliorum* ad ambusta, si iis porcina caro ignita ex alto instilletur, donec in cinerem abierint; unguento pars bis inungatur; *Summitatum*, in aurium gravitate & sonis, si cum Nardo in vino decoquantur, & vapor excipiat. *Baccarum* in colica, si in nodulo in vino macerentur, hoc exhibatur: in facilitando partu, si septem a propediem parturis comedantur: in doloribus capitis, si cum pyris sylvestribus contusæ, fronti & temporibus imponentur: vel cum paucis scammonæ & croci in aceto & oleo rosaceo trito adplicentur: in mensibus, si trita propinentur. *Oleum*, quod ex iis fit, egregie contra vermes & pediculos agit. *Dividitur* in *marem* & *fœminam*, quæ fructum fert; qui aliquando in rotundo modice oblongus est: aliquando oblongus, gracilis, & utrinque ovato mucrone turbinatus. Ad promontorium bonæ spei est *laurus* ab hac hoc solo differens,

Amat. Lust. in Diosc.

Bodæus in Theophr. H. P. p. 333.

rens quod ferrata habeat folia. Ideo *Laurus ferrata*, odora, promontorii bonæ Spei dici potest.

II. *Laurus sylvestris* quadruplex est, 1. foliis corni fœminæ subhirsutis, 2. foliis venosis, 3. foliis minoribus. 4. *Cretica Alpini* & 5. *Laurus Indica Aldini*.

Clus. H. P.
l. 1. c. 32.
Bauh. H. P.
l. 4. c. 2.
p. 419.
Lobel.

I. *Laurus sylvestris foliis corni fœminæ subhirsutis*, dicitur *Tinus primus* Clus. Camer. Tabern. *Lentago* Cæsalpino, *Laurus cœrulea bacca* Lobelio. Frutex est cornus fœminæ magnitudine, virgis oblongis, & quadrangulis, ramosis. Folia ordine distinguuntur, perpetuo gemina inter se, aduersa, lata, quæ nigricant & splendent, odore nullo, amara. Variant aliquando, & superiora sunt inferioribus magis glabra, quæ arbor nunquam exuit. *Florum* quinquifoliorum, candidorum in summitate umbella. *Fructus* myrti baccis longior, planior, angulosus, cœruleus. Lobelio fert corymbaceam umbellam multis conflata terebinthi femibus, aut gigartis uvarum similibus, sed ex argento in cœruleum luridis. *Nascitur* in Lusitaniæ saxosis & lapidosis inter alios frutices, & sepes, circa oppida Montemorho & Tomar, ubi Julio & Augusto floret, Octobri maturatur. Crescit & in maritimis Gallicæ provinciæ, Hetruriæque collibus; in Samnitibus circa Lantzannam, inter cocciferas ilices montis Costic frequens. In Germaniæ hortis fert hyemem, operi topiario commodissima.

Clus. l. c.

II. *Laurus sylvestris foliis venosis*, Clusio *Tinus* 2. Tabern. *Tinus Lusitanica* Clusii, ejusdem est cum priore altitudinis. *Rami* frequentiores & firmiores; *cortex* ex rubro virescit, *folia* venulis pluribus distincta, superioris angustiora & oblongiora, sibi invicem opposita. *Flores* umbellati, purpurascunt, non odorati. *Fructus* superiore plenior, nigrior, minor. Uno duntaxat in Lusitania loco, Monasterio quodam, Peria longa dicto, locis incultis supra Ulyssiponem secundum piscinas observavit Clusius, & in Bæticæ maritimis. *Baccae* gratum sturnis edulium.

III. *Laurus sylvestris foliis minoribus* Clusio est *Tinus tertia*, Bello-
nio *Laurus inodora* & *Lentago Italorum*, Cast. *Laurus regia*, Anguill. *Laurus sylvatica*, Bauhino *Laurus tinus Dalechampii*, sed perperam. Minor superioribus, folio latiore, lævi, nigricante. Flores in umbella ex albo purpurascens, qui hyeme & vere prodeunt, ex cœruleo nigricans, lævis, sed minor.

Laurus.
Clus. l. c.
Bauh. H. P.
l. 4. c. 32.

IV. *Laurus Cretica Alpini* nascitur in montanis Cretæ insulæ pumila, fruticosa, ferens virgas oblongas, graciles, nigro cortice obductas, densis veluti nodulis inæqualiter utrinque, & in medio positis, infectas, ligno albo, duro, fereque gustu insipido præditas, utrinque ramulos producentes breves, virgis plane similes, at graciliores, in quorum cacuminibus spectantur folia *Lauri sylvestris* figura, colore, crassitie, atque duritie, similia, sed paulo minora, in acutumque desinentia, pediculis brevibus inhaerentia, numero quinque, aut sex aut plura etiam simul in ramulorum cymis inordinatim posita, fere omnino inodora, linguam excalefacientia, cum levi adstrictione. Singuli vero ramuli habent unum, aut duos, aut tres brevissimos cauliculos, subtiles, du-
ros, lignosos, tribus, vel quinque pediculis parvissimis præditos, singulis fructum rotundum ferentibus, piperis magnitudine, in tres partes Latyridis modo dissectum, cortice tenui, rufo vestitum, cujus qualibet pars continet semen albicans, oblongum, magnitudine & figura tritico valde simile, substantia fragili, non expers odoris gravis, gustu amarescens, atque linguam excalefaciens. *Fructus* quilibet, tria ex his seminibus continebat, & fructibus latyridis figura & magnitudine non dissimilis erat. Hanc arborem, (quod & virgarum figura, longitudine, gracilitate, coloreque, & foliis, & quadantenus etiam fructibus, cum lauro tino similitudinem haberet) *laurum tinum*, seu *sylvestrem*, merito vocandum duximus: quod nomen retinebimus, quoad verius nobis illuxerit. Nulli usus ad Medicinam in hac ar-
F bore

Alpinus de
plantis exo-
ticis.

Laurus. bore cogniti sunt, fructus tamen & sapore subamarefcente, linguamque excalefaciente, & ex levi adstrictione, erunt calidi atque sicci supra primum excessum, judicandi, habereque ipsos vim roborandi, detergendi, atque meatus ab infarctu, liberandi, non erit dubitandum.

Aldinus
Horti Far-
nes. c. 4.

V. Laurus Indica Aldini ex semibus racematim brevi pediculo coherentibus nata est. *Baccarum* hæc lauri vulgaris formam habebant; verum parum acuminata, parvæ olivæ figura, nigra extus & rugosa. *Folia* lauri inter regiam & vulgarem medii, colore subviridi, quæ hyeme citrinescebant ac rubebant. Mansa mucilaginem fundebant copiosissimam, amariuscula primo, post cum dulcedine pauca.

EXOTICA.

TABULA
LXVIII.

Ex EXOTICIS sequentia ad Laurum spectant. 1. *Quauhtepatli Mexicanorum.* 2. *Itziperequa Mechoacanensium.* 3. *Calamajo Philippicarum insularum.* 4. *Arbor innominata Brasiliensis.* 5. *Camacari Brasiliensium.* 6. *Choyne Americanorum.* 7. *Mongostans Javanensium.* 8. *Pilipoc Philippinarum insularum.* 9. *Arbor laurifolia Guineensis.* 10. *Arbor laurifolia Sinensis.* 11. *Arbor Beretinae insulae.* 12. *Arbor laurifolia Magellanica.* 13. *Quaubayobuactli Guaxacanae* & 14. *Frutex baccis lauri similis.*

DeLaet Ind.
Occid. l. 5.
23.

I. Quauhtepatli Mexicanorum, quæ Mechoacanensibus *Chupire*, seu *planta ignea*. Similis est lauro, ad spectui grata. *folia* amygdalinis majora & latiora. *flores* in modum rosarum compositi. Humidis & riguis gaudet. Abradit natura succus: quidam tamen potum phlegma evacuare dicunt, alii deleteriæ qualitatis. Ad scabiem & impetigines usurpari, *Ximenes* prodidit.

Nard. rer.
medic. l. 3. 7.

II. Itziperequa Mechoacanensium Perfica fere major; *foliis* limonis crassioribus & odoratoribus, *semine* coriandri, paulo majore, viridi primo, demum nigro. *Nascitur* in frigidis Tancitari provinciae Mechoacanensis. *Folia*, quæ calida tertio, carniū ju-

ri incoquantur ad tussim: aquæ duarum drachmarum pondere, contra diarrhæas. illita dolores sistunt.

III. Calamajo Philippicarum insularum, in duplici differentia. *Folia* 72. Nard. rer. medic. l. 3.

utriusque laurinis similia, valde aspera. *Unius* radix extra fusca, intra rubescens, pingui cortice, initio insipida, mox aliquem calorem ostendente. *Alterius* arentis arundinis colore, sapore ligni, quod luteum est. Harum ramenta vapore earundem suffita, & in oleum juglandium injecta, ac illita, hæmorrhoidum dolores demulcent. Emplastri modo imposita tumores discutunt, & vulnera consolidant.

IV. Arbori innominatae Brasiliensis 8. Marcgr. H. P. l. 3. 9. *folia* laurinis similia, oblonga, duo sibi opposita (nonnunquam unum in extremitate ramorum) quasi in frondes congesta. *Fructus* pruni Damasceni figura & magnitudine, primo flavus, post niger, cujus pulpa pruni modo: *lapis*, qui intus dactyli instar lævis ac durus.

V. Camacari Brasiliensium arbor 8. Marcgr. H. P. l. 3. 6. *alta*, ligno flavescente, ex quo cistæ, in quibus saccharum reponitur. *folia* alternatim posita, laurinis similia. *Cortex* incisus stillat lacrymam liquidam, valde glutinosam, paulo rufescentem, nullius odoris, cujus adversus pedum lumbricos usus.

VI. Choyne Americanorum dicitur Clus. ad 8. Garz. *liis* & forma & viriditate lauri, pomis capitis magnitudine, seu ovi struthiocameli. quidam *Maraka* & *Tamaraka* dici putant. Ex eo pocula fiunt; at perforato lapillis aut milio inditis pro crepitaculo, quod *Maraka* & *Tamaraka* nominant, utuntur, deorum se familiaritate frui credentes, ubi pulsavere.

VII. Mangostans Javanensium, 8. Bauhin. H. P. l. 1. c. 35. *Bauhino Laurifolia Javanensium*, est Garz. Simp. l. 2. 12. arbor pusilla, lauri *foliis*, sed majoribus & latioribus, quibus sex aut septem crassiores venæ ex utroque nervi medii latere, intercurfantibus creberrimis subtilissimisque venulis, ut, qua parte attrita erant, tenuissimis filis contexto reti constare viderentur. *Flores* lutei. *Fructus* exigui mali aurei

rei magnitudine, cortice seu cinereo, seu e viridi nigricante, pulpa malorum aureorum simili, sed non adhærente. Dulcissimus est.

Nieremb. H.
E. l. 15. 9.

VIII. *Pilipoc Philippensium insularum*, duo genera. *Mas* scilicet & *Fœmina*. Major ille & amplioribus foliis, interque saxa nascitur. Minor hæc, & in planis. Utriusque *radici* tubercula fusca, pugni magnitudine, innascuntur. *Stipites*, qui fusci, & enodes, transversim si sciendas in pelliculas quasdam membranis caparum similes dividuntur. *Folia* laurinis similia, summa parte impen- se acuminata. *Proveniunt* in hume- tis umbrosisque locis, & arboribus advolvuntur. *Usus* radice in vene- natis moribus & potionibus, sed len- te operatur. *Sagittarum* plagis offi- cere solent.

Clus. H.
Exot. l. 1. 9.
Bauh. H. P.
l. 1. 52.

IX. *Arbor laurifolia Guineensis*, Clusio *arbor peregrina ex Guinea* du- plex. I. *Vna*, quæ juglandis altitu- dinem æquat. *Fructus* in ramis na- scitur, magni mali instar, orbicula- ris fere figuræ, crasso cortice & lævi, viridis initio, post ex flavo spadiceus, interdum nigris maculis conspersus, interna parte fuliginosus, & nihil præter nigrum pollinem continens. II. *Altera*, quæ laurocerasi foliis, sub quorum exortu singulares nascuntur adpendices, summa parte orbiculatæ & deorsum inflexæ, sic quodammo- do fornicatæ. Summo *rami* Clusiani, qui intus cavus, fœna aut plura vascula brevi pediculo innixa, nuce pontica minora membranacea & de- nis nervis distincta, summaque parte in quinque lacinias seu foliola divisas, semine nigro, saporis fervidi plena. Forte *Bravas*.

Clus. Exot.
l. 1. c. 12.

Martin. in
Atlante Si-
nensi.

X. *Arbor laurifolia Sinensis*, ar- bor est procera & magna, foliis lauri similibus. In *ramorum* summitati- bus *racemi* prodeunt, in quibus ut in uvis fructus, sed rarior in longis pedunculis dependet, figura corculi, magnitudine nucis juglandis, nuci pi- neæ parvæ æmulus, squamoso corti- ce, ad membranæ crassitiem acceden- te, cui intus nucleus succulentus albi coloris, saporis ac odoris rosacei. Ma- turus purpurei est coloris. Officu-

lum intra carnem occultitur. Vocant *Laurus* Sinenfes *Lichi*, Lusitani *Lichias*. Na- scitur in Foquien, præcipue in Fo- cheu metropolis territorio copiosus. Circa Chiagua optimus. *Nucleus* ad instar tragematis rosacei congela- ti liquescit in ore. Est & *Altera* ibi- dem, quæ flores *Quei* profert. Ar- bor procera, foliis lauri aut Cinna- momi. *Flos* minimus, flavus, in ra- cemulos dispersus, suavissimi odoris. Apertus in ipsa arbore diu perstat in- teger, nec flaccescit: ubi decidit, in- terjecto mensis spatio, repullulante arbore, rursus novus, auctumnali tempore gignitur. Turcæ limo- num succo maceratum, ad tingendos equorum crines adhibent. Sinis multa bellaria ex eo. Prodit per totam regionem, copiosissimus in Quangsi. Addi hisce potest *Fructus Sinensis Lungyen*, seu *Draconis ocu- lus* dictus, superiore minor, cortice duriore magisque squamoso, ex quo liquor, vinum incolis, exprimitur, sed rarius. Distrahitur per totum imperium: sed succo evanescente, non tam gratus.

XI. *Arbor Beretinae insulae*, Bauhi- no *laurifolia Ternatensis*, Lugdunen- si *Beretinus arbor*, quercu major, est foliis laurinis, crassis, splendentibus non serratis. *Fructus* oblongiuscu- lus, exiguus, iligneis glandibus simi- lis, nisi quod calyce careat, tenui cor- tice, atro vel cinereo; in quo *nucleus* oblongiusculus, candidus. *Nascitur* & in Moluccis, Ternate inprimis. Edulis est, & in farinam teri potest.

XII. *Arbor laurifoliae Magellanicae* Ind. Occid. cortex piperis modo acris, in Pingui- num insula. Forte est *cortex Winte- ranus* a Wilhelmo Wintero, qui Fran- ciscum Dracum ad fretum Magella- nicum comitatus est, inde adlatus. Viliori canellæ tum substantia, tum colore non valde est dissimilis. Ul- mei corticis instar scaber, canulatus; aliquando solidus, aliquando multis rimis hians. Egregiarum est in Scor- buto virium. Bauhinus *Canellam albam* vocat.

XIII. *Quauhayohuactli Guaxaca- næ*, trunco cinereo, foliis lauri, flo- ribus flavis, stellarum in modum ra- cema-

Bauh. H. P.
l. 3. 19.
De Laet
Ind. Occid.
l. 5. 20.

Laureola. cematim pendulis, fructus notissimus.

Bauh. H. P. XIV. Fructus baccis lauri similis, l. 3. 51. majori nempe forma & magnitudine, lævi & nitida superficie, qui ni-

gricat, & ex altero turbinato sine stylo retusum profert; altero, tanquam ab acicula impressum vestigium habet. Durus est, & lapideus, cum sonitu resilit.

PUNCTVM V.

De Laureola.

Vid. TABULA LXIIX. Theophr. H. P. l. 9. 15. Putatur Laureola a Veteribus sub Chamædaphnes & Daphnoidis nominibus describi. Apud Theophrastum quidem invenies, apud Arca-

Dioscor. M. l. 1. 4. c. 148. & 149. das helleborum utrumque, daucum, & daphnoiden croceam nasci, quod etiam a quibusdam ad Daucum restringitur: apud Dioscoridem tamen, Plinium, Galenum & Apulejum quædam occurrunt. Dioscoridi promit

Plin. H. N. l. 15. c. 30. & l. 24. c. 15. & l. 23. c. 8. χαμαιδάφνη virgas μονοκλώνες, πηχυαίες, rectas tenues & læves; folia lauri similitudine, sed læviora, multo tenuiora & viridiora; fructum rotundum, rubentem, τοῖς φύλλοις ἐπιπτε-

Galen. simpl. l. 6. Plinio frutex est sylvestris, unico ramulo, cubitali fere, folio tenui, lauri similitudine, semen rubens. Folia trita inflationibus stomachi succurrunt: succus cum vino menses urinamque ciet. Diversa ab hac chamædaphne Galeni. Ejus enim folia tenera germina dicuntur. Daphnoides Dioscoridi exiguus frutex, cubitalis, cui rami multi, ἱμαντῶδεις, πρὸς τὸ ἄνωθεν ἡμῖσι φυλλοφόροι, cortex viscidus; folia lauri, verum molliora, validiora, ἐν ἑνκλάσῃ, quorum gustatu os adurit; flores candidi; fructus cum maturuit niger; radix ἀχρεῖος. Plinio, sylvestris laurus est, frutex ramosus, crassiore, (graciliore forte) quam laurus folio, cujus gustatu accenditur os atque guttur, baccis e nigro rufis. Eadem fere Apulejus, qui ibidem, ut in Catalogo philologico ostendimus, diversarum plantarum nomina confundit. Nascitur in montosis. De Viribus ita Plinius.

Plin. H. N. l. 23. c. 8. Alvum solvit vel recenti folio, drachmis tribus cum sale in hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium, & vomitum; stomacho inutile. Sic & baccæ quinquæ denaræ purgationis causa sumuntur.

II. RECENTIORIBVS duplex est.

1. Perpetuifolia, flore viridi. 2. Folio deciduo flore purpureo.

I. Laureola perpetuifolia flore viridi, quibusdam Laureolamas, Mesuæ Thymelæa foliis viridibus, Cæsalpino Daphnoides Dioscoridis & Meze-reon Arabum, Bauhino Laureola semper virens, flore luteolo. Bicubitalis est frutex, perpetuo folio. Radix lignosa, multiplex, & quæ difficulter evellitur. Rami lenti, obsequiosi, simplices aliquando, sæpe in aliquot divisi. Folia oblonga, carnosa, laurinis similia, crassa, glabra, nigricantia, splendentia circa ramulorum fastigia, & numerosissima. Flores oblongi, cavi, e virore subcandicantes. Infra folia baccæ primo virides, post nigræ, aliis rubræ, juniperinis pares, nonnihil oblongæ, proxime glomeratim ad ramos coherentes. nucleo intus duro, cannabis semine, medulla candida. Nascitur in umbrosis, incultis & sylvestris montibus. Circa Lacum Lemantum sponte; circa Patavium inter montem Gemulam & di-venda; circa Basileam, in Burgundia, &c. Flores paulo post auctumni æquinoctium prorumpuntur. Fructus Majo & Junio teste Dodonæo ostendit, qui media æstate virent, adventante auctumno maturescunt. Calida & sicca est ad tertium. Subvertit ventriculum, urit fauces & interiora. Ad hanc refert Camerarius plantam, quæ in montibus Silesiæ altissimis versus Moraviam nascitur, caule denso, foliis crassis & duris, baccis nigris.

II. Laureola folio deciduo, flore purpureo, Officinis Laureola fœmina, Trago Chamælæa seu Mezereon, Dodon. Chamælæa germanica, aliis Daphnoides flore purpureo, Gesnero Piper montanum, Cordo Thymelæa, Lobel. & Bauhino

Dodon. Pempt. 2. l. 4. c. 9. Bauhin. H. P. l. 5. c. 34. p. 565.

Camerat. in Epit.

Cord. in Dioscorid. Gesner. in hortis germ. Bauhin. H. P. l. 5. c. 35. Dodon. H. P. pempt. 1. l. 4. c. 8.

Bauhino *Mezereum germanicum*, & *Laurus pusilla*, Lugdun. *Daphnoides crocea*: aliis *Cneorum album Theophrasti*, vel *Daphnoides ejusdem, croci colore*, vel *Chamaedaphne*. Frutex est sæpe tricubitalis. *Radix* in aliquot partes divisa, alba, alte se demittit. *Virgulæ* singulares, tenues, flexiles; quibus *cortex* duplex, exterior cinereus, tenuis, fragilis; interior virens & albicans, & divulsis lanugo quædam bombycina. *Folia* post flores ex tuberculis plerumque exeunt, oblonga, pallide virentia, laureolæ superiori æmula, sed molliora. *Flores* ad ramulorum latera sine pediculo, ex rubello purpurascens, oblongi, odorati, cum *staminulis* in medio croceis. Germinant statim post autumnum, & mox hyeme, si clemens hæc, sin minus,

primo vere panduntur. *Baccæ* ad Laureolæ ramulos rubentes, sed quæ resiccata nigrescunt: interiori nucleo, qui cannabino semini similis, pulpa candida. Maturantur in Augusto. Tota, floribus exceptis, odore est gravi, sapore urentissimo, ut vix ardor potu sedari possit, adeoque cavenda. Sunt tamen, qui exhibent: & notatur obstetrix quædam Noviomagensis, quæ & gravidis scelestæ propinabat. Decoctum *florum* tutius forte esse credit Tragus; nemini tamen auctorem futurum. Ego suaderem, ut in totum talibus *καυσμοῖς* abstineatur, dum benigniora & paris efficaciam præsto sunt. Est vel *Major* vel *Minor*, quæ *Piper Alpinum minus* Gesnero, ex qua *Cordus granum Cnidium*, quod *Coccognidium* adpellatur, colligi voluit.

PUNCTVM VI.

De Chamælaea.

Chamælaea.

Vid.
TABVLA
LXIX.
Dioscor. M.
M. l. 4.
c. 172. Plin.
H. N. l. 15.
c. 7. & l. 24.
c. 15.

I. De Chamælaea apud Veteres pauca occurrunt. Surculosus est frutex, ramis dodrantalibus, seu non palmæ altioribus; foliis oleæ similibus, tenuioribus, densis, amaris, quæ gustum mordent, & arteriam abradunt. Iisdem tritis & melle exceptis sordida & crustosa vulnera purgantur.

II. RECENTIORIBVS est duplex, *Tricoccus* nempe & *Alpina folio inferne incano*.

I. *Chamælaea tricoccus* Mesuæo est *Thymelæa foliis magnis & tenuibus*, Serapioni *latifolia vel alba*, Anguill. *Thymelæa*, Lobel. *Mezereon Arabum*, Camer. *Chamælaea vera*. Pedalis est magnitudinis. *Folia* oblonga, oleæ similia, sed nigriora nec incana, quæ perpetuo virent, gustus initio amari, post linguam vellicantis. *Flores* exigui trifolii, palliduli aut flavi; *fructus* tricocchi, virides primo, mox rubentes, sed qui decerpti nigrescunt, & oleosam pinguitudinem contrahunt. In Italiæ & Narbonensis desertis habetur. Perpetuo viret. Exurit fauces. *Folia* bilem & pitui-

tam detrahunt. Hispanica brevior est & candidior gallica.

II. *Chamælaea Alpina folio inferne incano* Anguill. *Cneorum Galeni*, *Alypias Aetii*, Clus. *Chamælaea altera*. *Rami* lenti; *Cortex* tenax; *folia* conferta & carnosa, incana lanugine inferne vestita. *Flores* congesti, quadrifolii, dilutissime purpurascens, qui ex lanuginosis & argentei coloris calyculis prodeunt. *Fructus* unicus, oblongiusculus, cui membrana tenuis miniata; caro succulenta, nucleus fervidus. Proxima huic, si non eadem *Chamælaea hirsuta Bauhini*, quæ Gal-
lis *Bois gentil*, seu lignum nobile dicitur. Fruticis parvi speciem habet, uti præcedens: Caudex lignosus, rami palmares, nigricantes (in sicca.) *Folia* similia fere cum præcedenti Laureola folio deciduo, breviora tamen, & multo angustiora, in acumen desinentia, nonnihil hirsuta.

Congener Chamælaeæ inter *Exoticas* est suffrutex *Nextalpe*, aliis *Tlanoxitzpatli* dictus. *Radix* illi surculosa. *Caules* teretes & lignosi. *Folia* oleæ, minora tamen; *fructus* ciceribus similis. Calida est in quarto,

G

&

Dodon.
Pempt. II.
l. 2. c. 6.
Clus. H. P.
l. 1. c. 56.

Bauh. H. P.
l. 5. c. 36.
p. 570.

Recens R.
M. N. H.
l. 5. c. 54.

& ideo adurens. Radix drachmæ gare dicitur. Cave canem, quisquis unius pondere, humores omnes pur- es.

PUNCTUM VII.

De Thymelæa.

Thyme-
læa.

Vid.

TABULA
LXIX.

Dioicor. M.

M. l. 4.

c. 173. Plin.

H. N. l. 13.

c. 21.

Sed & de hac non multa ab Anti- quis prodita. *Chamælæam* aut *Cneoron* vocavere aliqui. I. *Diosco- ridi* similis lino sativo, *virgas* edit bi- cubitales, speciosas, numerosas & te- nues. *Folia* *Chamælææ*, sed angu- stiora & pinguiora, *ἐν τῷ διαμασσάδα* glutinosa. *Flores* candidos, ac inter ipsos fructum ceu myrti parvum, ro- tundum, inter initia viridem, tan- dem rubentem, cuius *περιμάστιον* du- rum & nigrum, *τὸ δὲ ἐντὸς* album. *Granum Gnidium* vocant. II. *Pli- nius* similem *Oleastro* facit, foliis an- gustioribus, gummosis, si mordi- centur, fructu myrti magnitudine, similitudine colore & specie farris ad medicinæ usum tantum, quod *cocco- gnidium* & *linum* vocatur. Colore id alibi ex *Theophrasto* facit cocci magnitudine grani piperis majore, vi ardente. Ideo in pane devoratur, ne gulam urat. *Nascitur* in asperis & montosis locis. *Seminis* viginti gra- na bilem & pituitam evacuant, sed fauces adurant. Cum aceto & ni- tro trita, ad sudoris prolestationem inunguntur. *Folia*, quæ *Cneoron* olim adpellabantur, colligere per messes & in umbra ficcare moris erat. Vino diluto adpersis acetabuli modo detrahebantur aquosa; admista lenti coctæ aut oleribus moderatius. Par- tus supposita necant. Ad Thyme- læam refertur a quibusdam & *Em- petrum*.

II. Apud RECENTIORES in septuplici est differentia. Est enim 1. foliis lini. 2. foliis acutis capitulo succisæ. 3. foliis polygalæ glabris. 4. fo- liis *Chamælææ* sub minoribus hirsu- tis. 5. foliis kali lanuginosis, salsis. 6. foliis candicantibus Serici instar mollibus. 7. foliis sedis minoris to- mentosa.

Clus. H. P.

l. i. c. 57.

Bauh. H. P.

l. s. c. 43.

1. *Thymelæa foliis lini*, Mesuæ est *Thymelæa foliis parvis*, Serapioni *Cha- mælæa tenuifolia* & *nigra*, Gesnero

Thymelæa vera, Lobel. *Thymelæa Cocci gnidii*, Bauhino *Thymelæa Mon- speliensis*. Cubitalis frutici altitudo, radix in tenellis plantis raphani mo- do efformatur. *Virgæ* multæ, rectæ, tenues. *folia* lini sed majora, latiora, mucronata, lenra, & gummofum quid, si terantur, habentia. *Flores* in extremis virgis copiosi, quadrifo- lli, oleæ similes, candidi, racematim fere propendent. *Fructus* baccis myrti magnitudine, longior, initio viridis, mox corallini ruboris, carne succi plena, cui semen nigrum, sed quod medullam albam & fervidam habet, involvitur. *Floret* Julio, & toto nonnunquam autumnno. *Pro- dit* in Hispaniæ locis asperis & Nar- bonensi Gallia littoris tractu; in Ita- licis montibus longe a mari Tyrrhe- no diffitis. *Semen* bilem, pituitam & aquas educit, sed fauces adurit. *Radix* Camerario paucis horis perimit. *Cortices* pro ligandis scopis serviunt: *fructu* maturo perdices & aliæ avicu- læ avidè vescuntur: eodem rustici Hispani curvatis virgis & lineis di- spositis illas venantur. Succus pro- pter glutinositatem non nisi repente vino adfuso exprimi potest.

II. *Thymelæa foliis acutis capitulo succisæ*, aliis *Alypum Monspeli- ensium*, Lobel. *Alypum montis Ceti*, sive *herba terribilis Narbonensium*, aliis *Alypum Penæ*, Lugdun. *Empe- tron phacoides*, Clus. *Hippoglossum* p. 198.

Valentinum, suffrutex est, cubitalis aliquando & majore altitudine. *Ra- mi* lignosi, fragiles, nigricantes. *fo- lia* circa hos validos ex tuberculis multa & simul juncta; tenellos, qui rubescunt, rariora, myrti æmula, ex cæruleo nigricantia, carnosa, acuto mucrone, extremæ amaritudinis. In summitate calyces squammatim com- pacti, interioris *florum* scabiosæ or- bis magnitudine, florem lanugino- sum, villosum, in medio ex cæru- leo

Lobel. obs. p. 201. Ad- vers. p. 158. Clus. H. P. l. i. c. 60. Bauh. H. P. l. s. c. 49.

leo candicantem, in ambitu omnino caruleum, continentes, & quia tonsuram orbicularem monachorum referunt, planta *Coronilla de freyses* dicitur. Tota amara est, vehementiore Chamælææ gustu etiam a sexto anno; semperque arida & exsucca videtur. Unde apud Hispanos *siempræ enxutæ* nomen. Nascitur in Baticæ solitudinibus, & apud Narbonenses, ubi in maris litore salsum humorem bibit: in monte Cestio prope Agatham, falsuginositatis expers, os amaritudine insigni vellicat, quod de Empetro Dioscorides habet. Visa in Italiæ hortis majore statura & foliorum amplitudine, Calceolarius pro Ptarmica ostendit. Hispani circumforanei decoctum in lue venerea exhibent, cum successu, ut ajunt.

Bauh. Pro-
dromi l. 12.
c. 1.

III. *Thymelæa foliis polygalæ glabris*, ita ab ipso Bauhino, sub *Sanamunda viridis* seu *glabræ* nomine describitur. Radice crassa, lignosa, fibrosa, alba, cortice crasso, pallido, lento vestita, a qua ramuli plures, tenues, palmares, etiam minores, itaque geniculati prodeunt, foliis oblongis, (rarius subrotundo) Chamælææ vel potius Polygalæ similibus, sed brevioribus, viridibus & glabris, alternatim circa ramulos dispositis: inter quæ flores oblongi, luteoli, in quatuor foliola divisi conspiciuntur: fructum non observavimus. Haec Aprilis florens in Horto Dei collecta fuit. Collegit sub hoc nomine & *Iohannes Bauhinus* in maritimo Narbonæ tractu prope oppidum Agden fruticem, cui ramos lentos, corticem in fila ductilem & flavescensem, folia glabra, myrteis similia, unciali plus minus longitudine, quæ per ramos agminatim conscendunt; flores ex horum sinu oblongos, parvos, ex luteo herbaceos, quatuor foliolis decussatis constantes; granum rotundum singulare adscribit. Sequentem esse putarem, nisi folia glabra obstarent, & icon, quæ a *Sanamunda prima Clusii* aliquanto diversus. Habetur in Hispaniæ Monteferrato, & Cataloniis Aragoniæ finitimis.

Clus. H. P.
l. 1. c. 58.

IV. *Thymelæa foliis Chamælææ minoribus subhirsutis*, Clusio *Sana-*

munda prima. Suffrutex est cubitalibus ramis, flexuosis, radix crassa & lignosa. Cortex exterior nigrescens, interior in tenuia fila se dividit. folia carnosâ, ad Myrtum accedentia, aliquantulum hirsuta, gummosa, adurentia, circa ramulos seriatis distribuuntur. flores oleo similes, quadrifolii, extremis divisi, lutei. Fructus *Thymelææ* nigricans. In apricis vivit, in regno Granatensi. Floret Martio. Purgat vehementer; ideo rusticis hispanis Mierda. Cruz.

V. *Thymelæa foliis kali lanuginosis salsis*, Clus. *Sanamunda secunda*, Anguillaræ *Empetron*, Casal. *Cneoron*. Lugd. *Cneoron nigrum Myconi*, & *Sesamoides minus Dalechampi*, quibusdam *Phacoides Dalechampi Oribasii*, cubitalis est, ramis lentis, quibus cortex carnosus, & interiore membrana, circa radicem inprimis, in fila lini modo diduci potest. Folia in superioribus ramusculis conferta, lanuginosa, & veluti fomento quodam obsita in comam quasi abeunt, falsi nonnihil gustus, acris post & calidi. quibus florum oleæ similium, flavescendum, numerosa soboles. Provenit in maritimis & salebrosis Baticæ locis, montibusque Granatæ vicinis. Circa Calpem fornacibus calefaciendis inservit. Drachmæ pondere cum decocto cicerum per inferiora purgat.

Thymelæa.

VI. *Thymelæa foliis candicantibus*, Bauhino. H. *Serici instar mollibus*, Lobel. Tarton. *raire Massiliensium*, Tabern. *Sesamoides majus Scaligeri*, Lugd. *Sesamoides majus multorum Dalechampi*, Bauhino *Sanamunda prima Clusii*. Cubitalis est, valde ramosa. Radici mire obsequiosus cortex, & in minima stamina non sine floccis, quos lanam dicas carptam, ductilis. Virgæ rectæ, viciæ, triciæ aut plures, cubito longiores, quibus densum, albidum & quasi argenteum tomentum supersternitur. Folia numerosissima, Myrti Tarentinæ magnitudine, nisi quod per extremum, sunt paulo latiora, in acumen tamen obtusius desinentia, undique lanuginosa, & tactu mollia, albida vel argentea, lucida: inter quæ flores exeunt,

Bauhino. H.
P. l. 5. c. 45.
P. 594.
Tabern. H.
P. l. 2.
P. 103. Lo-
bel. Advers.
p. 160.

Thymelæa. Oleæ similes, ait Clus. oblongi, in quatuor foliola per extremum divisi, colore luteo. *Fructus* (quemadmodum ex relatu accepit) Thymelææ fere, sed nigricante colore. *Provenit* in Corsica, Sardinia, & tota Massiliæ Liguriæque ora; inprimis circa collem Montsoud dictum, squalidum, glareosum, plurima. Tam vehementer aquosa, biliosa, pituitosa purgat, ut sæpe sanguinem eliciat, inde nomen. & sumitur in vino aut cicerum vel carniū decocto & jure.

Clus. H. P.
l. 1. c. 58.
Bauh. H. P.
l. 5. c. 47.
P. 595.

VII. *Thymelæa tomentosa foliis sed minoris*, Clusio *Sanamunda tertia*. Pantio *Cneoron*, Lob. *Erica Alexandrina*, Bauhino *Sesamoides parvum Dalechampi*, aliis *Aproxis Plinii*. Excedit magnitudine priores. *Rami* crebri, lignosi, candidiores, inque foliis tenuitatem tandem abeuntes, quos densa, candida, cineracea lanugo obvolvit, sed in majoribus virgis paucior. Extremis qui omnino tomentosi, procumbens coma, & frequentia foliola, carnosa, parva, sempervivo Dioscoridis similia; quæ inferna parte rugosa, virentia, & in sicco nigricantia, glabra; superna vero (qua parte contrahuntur & velut alveo-

lum efficiunt) tomento albedo penitus obducuntur. *Flores* herbacei aliquando, aliquando pallentes. *Invenitur* in tractu toto inter Herculeum fretum & montes Pyrenæos. Earundem est cum superioribus virium. Tusa ac cribrata drachmam nervorum distentione adfecto exhibuit in pituitosa Dalechampi: nec aliter mota alvus, quam si colocynthidem sumisset. *Bauhinus* suspicatur a Lugdunensi etiam sub *Cneori nigri Myconi*, quæ Barcinofensibus *Pala marina*, nomine describi. Frutex est cum multum adolevit bicubitalis. *Radix* crassa, lignosa. *Caulis* rotundus, flexilis, asper, nodosus, ramulis multis brachiatus. *Folia* carnosa, incana, perpetui viroris, minuta, & in summitate cupressis similia, sapore lento, subadstringente, caulem ambiunt. *Flos* in viridi luteus, cujus proventu ab autumno ad Majum usque producit, foliis aliis decidentibus, aliis renascentibus. Totus, cortice inprimis, gravis est odoris, si confricetur; vigente canicula folia attrita Zibethum spirant. *Nascitur* Barcinone locis arenosis & maritimis, Fotu hæmorrhoidum inflammationem sedari ajunt.

PUNCTUM VIII.

De Cneoro.

Cneoron.

I.

TAB.
LXX.

Theophr.
H. P. l. 6.
c. 2. Plin. H.
R. l. 21, c. 9.

Cneoron Veteribus duplex est, Album nempe & Nigrum. Ex his *Albo* folium *δεματῶδες*, oblongum, figura quodammodo oleagineo simile. *μαλλον ἐπιγυειόν ἐστιν*, & exiguum quid olet. *Nigrum* valde odoratum est. Alii pro *ἐνόςμω* legunt *ἀνόςμω* & *ἀνόςμω*, Plinium secuti. Utrique *radix* alta, magna, *folia* carnosa. *rami* multi, crassi, lignosi, fere statim a terra divisi, & admodum lenti; quorum usus ad colligandum modo salicis & vitilium. *Germinant* florentque post æquinoctium autumni & diu. Eodem nomine *Chamaelæa* & *Thymelæa* vocatur, quod & Galenus prodidit.

Galen. l. 9.
de compos.
medic. c. 3.

II. RECENTIORIBUS est duplex
1. *Thymelæa adfinis, facie externa.*

2. *Cneoron album folio oleæ argenteo molli; Cui adde Cneoro albo adfinem.*

I. *Thymelæa adfinis facie externa*, Clus. H. P. l. 1. c. 59. *Matth. Cneorum*, Lugd. *Cneoron alterum Matthioli*, & *Oleander sylvestris Abensina Myconi*; Tabern. *Casia Matthioli Chamaelæa species*, Cordo *Thymelæa minor*. Suffrutex est. *Rami* ab ipsa tellure emergi humi diffunduntur: *folia* confusa, viridia, cutanea, amara, sed nullius acrimoniæ: *flores* in summis furculis pulcherrime conferti, septemfolii, pauciores aliquando ex rubro purpurascens, centaurei minoris florum æmuli, *καρπῶδες*. *Fructus* exiguus, *Thymelæa* non dissimilis, oblongiusculus, candidus, cum semine rotundo, cinereæ membranæ. *Floret* sæpe ter eodem

eodem anno, novis floribus semen semper consequentibus. Provenit copiose in montibus Viennæ vicinis, & in Pannonia. Est & floribus candidis, circa Francofurtum ad Mœnum.

Bauhin. H.
P. l. 5. c. 48.
p. 97.
Clus. ad.
pend. ad H.
P. p. 255.

II. *Cneoron album*, folio oleæ argenteo molli, Imperato & Platero *Dorycnium*, Bauhino *Dorycnium Imperati*, Lugdun. *Cneorum album Dalechampii*, Clusio *Dorycnium verum Plateri*, Cæsalp. *Dorycnium ex Sicilia*, vulgo *Argentina*, Penæ *Dorycnium quorundam*, seu potius *Convulvulus rectus Creticus*. Fruticosa stirps est, dimidii cubiti altitudine. Rami ab eodem radice multi & lignosi, tenellis *Ziziphæ* albæ ramis non dissimiles; folia numerosa, oleæ

figura, argentea lanugine utrinque nitentia, mollitie holosericea, quæ non nec hyeme abjiciuntur, ramos circumdant. In summo vertice coma prædenta, in qua candidi flores calathi effigie (campanulæ instar Imperato) quorum uno marcescente, alter se expandere incipit. Semen nigrum crassum, in folliculo tanquam gluma reconditur. Nascitur in maritimis, lapideis & saxosis locis. Provenit & in horto Montbelgardeni satum semine.

III. *Cneoro albo adfinis*, quid sit, & an huc pertineat, difficile est dictu. Bauhinus *Dorycnium* forte *Dioscoridis Penæ* vocat, cujus & sub jacea mentionem facit,

ARTICVLVS III.

De Arboribus Bacciferis Classis tertiæ.

PUNCTVM I.

De Myrto.

Myrtus.

Vid.
TABVLA
LXX.

Arbores bacciferæ Classis tertiæ sunt 1. *Myrtus*. 2. *Ruscus*. 3. *Vitis Idæa*. 4. *Buxus*. 5. *Olea*. 6. *Vitex*. 7. *Ligustrum*. 8. *Phyllirea*.

I. Meminit quidem Myrti ex *Veteribus* Theophrastus, sed sine descriptione, quam nec apud alios invenies. Hoc habetur, adnasci ei aliquid inæquabile, verrucosum, intumescens & concolor, quod quasi manus myrti caudicem amplectitur, quodque Dioscorides *μυρτίδαρον* vocat. melius germinare & copiosiores ferre fructus, quo pauciores reliqueris; quod tenuia germina celerrime *παρὰ τὸ νόμον* evadant: mutuo cum olea radicum complexu degere, ut Androtion prodidit, ejusque virgas per olearum brachia prorepere. Locum si spectes, nec frigus tenella patitur, nec adulta æstum. Umbrosis semper gaudens, ut illa quibus fructus *πρὸ γυνώδεις*. In fervidis tamen potius nascitur, amatque ita littora, ut & in montes subeat. In Olympo olim nullæ, ut & in Ponto, quanquam summo studio omnique solertia se-

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 156.

Theophr.
de C. P. l. 2.
c. 9. & 10.

Plin. H. N.
l. 15. c. 29.

re conati sunt ad usus religionis. In Europæ citeriore cælo (solo lege) quod a Cerauniis montibus incipit, primum Circeis in Elpenoris tumulo visa traditur: Græcumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse adparet. Fuit, ubi nunc Roma est, jam tum, cum conderetur. Quippe ita traditur: myrtea Verbenæ Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent. depositis armis purgatos in eo loco, qui nunc signa Veneris Cluaciæ habet. Cluere enim antiqui purgare dicebant. Et in ea quoque arbore suffimenti genus habetur. Ideo tum electa, quoniam conjunctioni & huic arbori Venus præest. Haud scio, an prima etiam omnium in locis publicis Romæ sacra sit, fatidico quidem & memorabili augurio. Inter antiquissima namque delubra habetur Quirini, hoc est, ipsius Romuli: in eo sacrae fuere myrti duæ ante ædem ipsam per longum tempus, altera patricia, altera plebeja. Non invita in sepulcris nascitur. De Viribus &

H

Usa

Myrtus.

Ufu nota. Galenum ex contrariis partibus, sed in quibus frigidum terrestre præstet, constituere, quamvis folia, germina, fructus, succus, multum inter se adstrictione differant. *Foliorum* decoctum infessibus & articulorum luxatorum fotui; pulvis cum aqua mistus ulceribus humidis, si illinantur; aridus, paronychiis, pterygiis, alis male olentibus, si inspergatur, prodest. Oleum in emplastris lenibus, quæ liparas vocant, adhibetur. Corona meri vapores inhibet. *Fructus* oris odorem commendat, seu viridis, seu aridus; in cibo; hæmoptoicis datur: in succum redactus, earundem est virium, & urinam ciet; decoctus cum galla, capillum tingit: cum vino subfervefactus τὰ ἐνακρωτηρίοις ἔλκεϊ curat. Coturnicum helleboro pastarum certissimum contra convulsiones, si Didymo credimus, remedium. *Vinum*

Cato c. 125.

myrtites, quod varie paratur, præsumtum crapulam arcet; in desessionibus vulvæ & sedis procidentia utilis. Inest & *Oleo*, quod mirum dictu, quidam vini sapor, simulque pinguis liquor, præcipua vi ad corrigenda vina, faccis ante perfusis. Retinet quippe facem, nec præter purum liquorem transire paritur, datque se comitem præcipua commendatione liquato. *Myrtidanum* adstringit vehementius. Reponitur ad quibusdam tonsum, postea vino subactum, formatur in pastillos. *Genera & differentie* apud Theophrastum, Dioscoridem, Catonem & Plinium occurrunt. Est I. *Sativa*, ea-

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 155.
Plin. H. P.
l. 15. c. 29. &
l. 23. 9.

que vel *candida*, cui baccæ tales, vel *nigra*, cui baccæ nigrae, quæque fructum inefficaciorem habet, sed πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν illa ἀρμόδιότερα. Topiarii ejus apud Plinium tria genera faciunt. *Tarentinam* folio minuto. *Romanam* seu *Nostratem* patulo. *Exoticam* densissimo, senis foliorum versibus. Hæc non est in usu. *Ramosa* utraque alia. *Conjugalem* seu *Conjugalam*, de qua apud Catonem, nostratem dici putat Plinius: aliis albæ & nigrae epithetum, quod ad conubium idonea sit. Ideo Veneri sacra, quæ Conjugii præses; fuitque

Veneri Myrtæ Romæ ad vicum intimum sub monte Aventino ara vetus. M. Varro Murtatam vocabat, Plutarchus Murtiam. II. *Sylvestris*, eaque vel lævis, quæ iterum candida aut nigra, vel spinosa. Oxymyrfinem in sylvestri propriam facit Plinius, & revera Ruscus est. III. *Odorata*, qualis in Ægypto, tenuis, fructu exiguo, nigro. Inodoram loca minus calida proferunt. IV. *Coronaria*, qualis in monte Cyrcæo, cui *ampla* opponitur, ratione fructus scilicet. Inferuit hæc se & bellicis rebus, triumphansque de Sabinis Posthumius Tubertus in Consulatu (qui primus omnium ovans ingressus urbem est, quoniam rem leviter sine cruore gesserat) myrto Veneris Vetricis coronatus incescit, optabilemque arborem etiam hostibus fecit. Hæc postea ovantium corona, excepto M. Crasso, qui de fugitivis & Spartaco laurea coronatus incescit. Massurius auctor est, curru quoque triumphantes myrtea corona usos. L. Piso tradit, Papyrium Massonem, qui prius in monte Albano triumphavit de Corsis, myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum. Avus maternus Africani sequentis hic fuit, Marcus Valerius duabus coronis utebatur, laurea & myrtea: qui & hoc voverat. Ornasse ea & busta Græcos, cum inferias solverent, apud Euripidem in *Electra* videre est. Taceo celebrari myrti coronas apud Athenæum ab Eubulo: & qui olim in conviviiis scholia carmine cantabant, laurum & myrtum manu tenuisse. V. *Montana* in utroque sativæ genere adcommoatur. VI. *Απύρενος*, apud Theophrastum, non tam quæ fructum fert absque semine, quam pauciore & minus duro, arte & mangonio talis. Congerebant spurcicias pellium urinamque, dum germina profilirent. Hinc non mirum, decerpta ab Atheniensibus, sataque ordinato naturæ cursu produxisse species. VII. *Sacra* eaque *patritia* & *plebeja*. *Patritia* multis annis prævaluit, flaccescente plebeja, exuberans ac læta, quamdiu Senarus quoque floruit, illa vicens, plebeja

Theophr.
de C. P. l. 6.
c. 27.

Plin. H. N.
l. 15. c. 29.

Euripid. in
Electra.

retor-

retorrida ac squalida. Quæ posteaquam evaluit, flaccescente patritia Marsico bello, languida auctoritas patrum facta est, ac paulatim in sterilitatem emarcuit majestas. Huc *Træzeniam* refer, Hyppoliti & Phædræ amoribus celebrem, cujus folia prope Veneris delubrum fata, perforata nascebantur; injuriam videlicet ferentia sævientis unguibus & calamistris scæminæ.

II. RECENTIORES Myrtum in 1. *communem Italicam*. 2. *latifoliam*. 3. *angustifoliam* & 4. *sylvestrem* divisere; quibus *Pseudomyrtus Bellonii* addi potest.

1. *Myrtus communis Italica* Matth. & aliis *Myrtus*, folio est buxi, vel lentisco simili, acuminatiore tamen; floribus candidis, numerosis intus capillamentis odoratis; baccis oblongis, agrestes olivas quadantenus referentibus; parvis numerosisque nucleis. Provenit in Italia & alibi. Ostensa Patavii cum baccis mense Decembri; Veronæ cum iisdem Martio: In Plateri myrto mense Aprili, bacca & folia binario numero distributa, sapore adstringente amariuscule, aromatico, odore grato observata. Visa Ferrariæ Liburnicam artificiose referens: sed & Venetiis triremem, cum tribus triremorum ordinibus: ut & Romæ in humanam effigiem artificiose aprata. Degenerat in fruticem, nisi crebro purgetur. Humana vel ovilla urina latatur. Ex baccis, quæ adstringunt, paratur vinum, quod Myrtites vocatur; & oleum, quod efficacius & gustu subamarum est, & syrupus. Compescunt fluxus, muliebres inprimis. Est vel *alba*, quæ in hortis Franciscanorum Venetorum, cujus folia albidiora, oblonga, superne latiuscula, & fructus ex rubro candicans. Vel *nigra*, cujus folia saturatiora, & fructus nigrescit. Frequentissima utraque in regno Neapolitano & Tuscana, vocaturque *Mortella* & *Myrtella*.

II. *Myrtus latifolia* est triplex. 1. *Romana*. 2. *Batica*. 3. *Belgica*.

1. *Myrtus latifolia Romana*, Plinio est *Myrtus nostra*, cum conjugali eadem, aliis *myrtus major*, Cast. *sati-*

va, Lobel. *Myrtus laurea maxima*, Myrtus. Bellon. & Clus. *Myrtus latifolia*. folia gerit Myrti Exoticæ nonnihil latiora, in acumen desinentia, longitudine unciali, quorum bina ex intervallo pene unciali sibi opponuntur. *Nascitur* in monte Atho sterilis & fructifera. Lobelio a folio laurino ita dicitur, Lauro tyno sive regie simili, sed minore & magis acuto, & revirente, nigraque bacca.

2. *Myrtus latifolia Batica* duplex est, 1. *foliis laurinis*. 2. *foliis latis confertim nascentibus*. 1. *Myrtus latifolia Batica foliis laurinis*, Clus. Bauh. & Lobel. est *Batica latifolia domestica*, Hispanis *Arayban Morisco*, seu

myrtus Mauritanica. Rami sunt crassi, folia lauri tenuifoliae amplitudine, duplici serie rarius disposita, dilucius virentia, odorata. Rarius & *floret* & *fructificat*, quod sepibus texendis, quos tondere solent, plerumque adhibeatur. *Visa* a Clusio in monasterio quodam hispali, & lætissimis Granatæ Mauritanorum viridariis, in quibus sepes ex ea piscinas claudabant. 2. *Myrtus latifolia Batica foliis latis, confertim nascentibus*, Clus. *Myrtus Batica latifolia exotica*, altius quam prior fruticat. Folia adeo confertim nascuntur, ut sese pene mutuo contingant petioli, duplici interdum, sæpius triplici serie. Flos candidus, cerasi similis, albis villis plenus, odoratus. Fructus paulo oblongior, primo viridis, mox purpurascens, tandem niger, vinosus, candidis, incurvis granis refferus. Crescit in Complutensis arcis horto, multis fruticibus serie quadam dispositis; nec non Cordubæ in hortis. Ad hanc pertinet *Myrtus Stutgardiana Bauhini* fragrantissima, cui ex certis intervallis folia semper terna. Describitur a Matthiolo sub exoticæ nomine.

3. *Myrtus latifolia Belgica* aliquot habet differentias. *Primæ* folium amplum viride, rariore ordine eoque duplici circa ramos dispositum. *Alteri* folium minus viridius quandoque, pallidius interdum. *Tertiæ* folium densum & magis mucronatum, nunc lætius, nunc pallidius.

H 2

Quartæ,

Pausanias,

Cord. in
Dioscor.
p. 23.

Myrtus.
Bellon. in
Observ.

Lobel. ob-
serv. p. 560.

Lobel. Ob-
serv. p. 559.
Clus. H. P.
l. c. 43.

Clus. l. 6.
Bauh. H.
p. l. s. c. 1.
p. 511.

Bauh. H.
p. l. s. 1.

Bauh. H.
p. l. 15, c. 1.
p. 512.

Myrtus. *Quarta*, folium medium, sylvestri simile, virgultum pallescens, fructus tamen longior. Lobelius *sex* ejus ponit *varietates*. 1. Omnium maxima Laurea dicta a folio laurino, quam descripsimus. Alitur in cultissimo stirpiumque rariorum ditissimo paradiso D. Philippi Deurnagle, Domini de Uroylandt. 2. *Folia* habet paulo minora, superne item mucronata & in acutum fastigiata. 3. *Folio* est oblongo, superne latiusculo, cum superiore fere pari, bacca alba. 4. *Exotica Myrtus* Plin. pluribus foliorum versibus, five Myrtus Mauritanica amatoria Venerique sacra, Arayhan Morisco major Hispanice vocata, foliis non disparibus, sed canulatis & confertim jucundissimo spectaculo stipatis. 5. *Vulgaris* folia promit paulo minora in angustum desinentia. 6. Inter majores *minima* est folio oleæ sylv. five oleastri.

II. *Myrtus angustifolia* est triplex 1. *Batica*. 2. *Foliis minimis & maxime mucronatis*. 3. *Minor vulgaris*.

Bauh. H. P. l. c. p. 511.
Lobel. l. c. p. 561.
Dodon. pempt. 6. l. 2. c. 11.

I. *Myrtus angustifolia Batica*, Dod. *Myrtus tertia*, Matth. & Lugd. *Myrtus exotica*, Lobel. *Myrtus exotica Plinii pluribus foliorum versibus*. Eadem est *foliorum* densitate & serie, qua *Batica latifolia*, sed hujus saturatius virent. Canulata & striata esse addit Lobelius. *Fructus* est major & orbiculatus, qui alba & inflexa grana fert. *Visa* a Clusio in Hieronymitarum monasterio, primo ab urbe Corduba milliari. Datur forte, quæ senos foliorum versus exhibet.

Bellon. in observat. Lobel. l. c. Clus. l. c.

II. *Myrtus angustifolia foliis minimis & maxime mucronatis*, Bellon. *Myrtus albis baccis in Asia*, Clus. *domestica fructu albo*, Dod. *Myrtus prior*, Lobel. *Myrtus nona angustifolia*. Lugd. *Myrtus minima angustifolia*. *Ramos* habet tenellos & densos; *folia* omnium minima, angustiora & magis, quam in ulla myrto, mucronata, saturatius virentia, & odorata. *Flos* par reliquis. *Fructus* primo virescit, post exalbidus manet. *Visa* tum apud Ferdinandum Colinho Lusitanum, cujus hortuli sepes ex ea constabant; tum apud Jaan. Boiscotum,

qui omnium primus ex seminibus aluit. Est & altera hujus species, folio per omnia teneriore, exiliore & angustiore. *Visa* & Lutetia a Bauhino in horto regio angustiore & minore folio, quam Tarentina.

III. *Myrtus minor vulgaris* Matth. Clus. & aliis *Myrtus Tarentina*, Tabern. *Myrtus*. Notior est nostro cælo & solo. *Folia* parva & communitalica minora, robustiora, crebra, duplici triplicique versu disponuntur, hilari virore nitida, fragrantia. *Flores* candidi, quinquefolii, quibus stamina numerosa, odorata, funduntur plerumque auctumno in Belgio, Junio & Julio in Italia. *Baccæ* per maturitatem nigrescunt; quibus semen album, inflexum. Matthiolus pluribus apicibus in summitate coronari, & ex nigro purpurascere scripsit. Rarissime ad maturitatem perveniunt, sed in ipsa planta tota hyeme hærentes, cum rursus sub veris finem aëri exponuntur, inanes & immaturæ decidunt. *Crescit* copiose circa Tarentum. Unde Tarentina nomen; nec non in Belgio & Septentrionalium hortis. In Gallo-provincia maritima non multa vernat. Nos tamen circa Massiliam vidimus, & Monspeili in hortis in majusculam arborem excrescit. Montbelgardi erat duos cubitos alta, stipite pollicari: fructus ab auctumnalibus pluviis interceptus. Propagatur ramis & surculis depaetis, adnasciturque ipsi *Myrtidanium*, quod quibusdam granum kermesinum. Vesiculæ unicum animalculum vivum includitur.

Matthiol. in Dioscor. l. 1. c. 128.
Bauh. H. P. l. 5. c. 1. p. 512.

IV. *Myrtus sylvestris foliis acutissimis*, Eyft. *Myrtus latifolia*, Clus. *Batica sylvestris*, nec dense fruticat, nec multum adsurgit: *rami* tenues & fragiles; *folia* odorata duplici serie circa ramos disponuntur & nigricant. *flos* aliis similis; *fructus* rotundus, ex oblongis pediculis copiosus, primo viridis, mox albus, niger tandem, grati vinosi saporis. *Provenit* in agris & collibus Extremaduræ & Lusitaniæ tam copiose, ut per aliquot miliaria nulli fere alii frutices conspiciantur. *Floret* aliquando Octobri. In convallibus, folium viride est, & amplum;

Clus. H. P. l. 1. c. 43.

plum; in incultis exsuccum, rigens, & pallescens.

Bellon. Ob-
serv. l. 1.

V. De *Pseudomyrto Bellonii* nihil occurrit, nisi in Ciliciæ planitie, in qua Alexander cum Dario prælium commisit, prodire.

EXOTICA.

T A B.
LXXI.

Inter Exotica reponuntur 1. *Avacari Malavarensium*. 2. *Coca Peruvianorum*. 3. *Arbor tristis Malaccensis*. 4. *Cambui Parnambucensium*. 5. *Hoitzxochitl Tototepecensium*. 6. *Flores quidam*.

Garz. H. A.
l. 2. c. 8.

I. *Avacari Malavarensium*, pusilla est arbor, foliis, floribus & fructu myrto perquam similis; nisi quod hic multo adstringentior. Olet trifolium & nascitur in montibus. Cortex ejus tritus & in aqua Oryzæ maceratus, diuturnis dysenteriis ad miraculum prodesse dicitur.

Monard.

Simpl. c. 12.
Acosta H.
N. l. 4. c. 22.

De Laet
Ind. Occid.

l. 10. c. 2.

Benzo Ind.

Occid. l. 3.

c. 20.

Nieremb.

H. N. l. 14.

c. 25.

II. *Coca Peruvianorum*, Fragofo *Coca Occidentalis*, planta est proceritate corporis humani, ulnæ magnitudine Monardi. Ramuli pauci; copiosæ nec inodoræ frondes: folia quoad superficiem & pediculum, arbuti, sed multo teneriora, (Myrti aliis sed paulo majora, quæ veluti aliud folium simili forma in meditullio delineatum habent, mollia eadem & dilutius virentia) quæ ter quaterque quotannis decerpuntur, sed caute, ne novum germen lædatur. Fructus racematim cohæret, rubens primo, post nigricans. Nascitur in convalibus montium Andes dictorum a civitate Guamonga ad eam, quæ Hispanis Plata dicitur. Seritur magna cura, si cum plantatur, duplicetur radix, arefit furculus. Folia alicubi nonnisi virginibus colligere licet. Sole desiccata deponuntur in canistris in usum. In tanto apud eos pretio, ut A. 1548. & aliquot subsequentibus, singularum hæreditatum, in quibus ferebantur pretia, usque ad octoginta Ducatorum millia singulis annis æstimarentur. Utuntur pro pecunia; permutantur alibi vestibus, sale & aliis mercibus. Cum conchyliorum calce in trochiscum formatum folium domi & peregre in ore

versant; sicque famem & sitim le-Myrtus. vant; si extra se rapi & inebriari volunt, tabacum adjiciunt. Pulvis foliorum stabilis ossa contracta, & vulnera tumentia componit.

III. *Arbor tristis Malaccensis*, Malabaribus Mogli, Malaccensibus *Ein-gudi*, Goensibus *Cavizatara*, Arabibus *Guart*, Turcis *Gul*, Decanensibus *Pul* dicta, diversimode describitur. I. *Acosta* pruni fere forma facit. Rami multi, tenues, recta per spatia nodulo distincti; a quo utrinque singularia folia, folii pruni magnitudine, mollia, & averfa parte lanuginosa. E singulorum sede pediculus quinque capitula summa sui parte sustinet, quatuor foliolis subrotundis constantia: e quorum medio quinque flores candidi, elegantes, Auræ mali floribus pares exsiliunt. Fructus magnitudine lupini, virefcens, cordis effigie, secundum longitudinem receptaculo duplici donatus, in qua semen cerasii magnitudine, cordis figura, album, subamarum. II. *Clusius* ex relatione cujusdam Salernitani, ad trium hominum altitudinem aliquando adfurgere scribit. Rami alis concavi; folia myrti quam simillima. flores e foliorum interna sede, copiosi, congesti, candidi, Jasmini figura & magnitudine, odoris ad stuporem fragrantissimi prodeunt; qui noctu explicantur, (hinc *tristis* dicta) mane oriente sole, propter succi sine dubio tenuitatem, decidunt; illis exceptis, quos radii non attingere. manibus contacti, evanidi & inutiles redduntur. Semina in siliquis crassis, cineraceis, quæ stramonæ quodammodo similia. Alii post occasum solis fructus renovare, p. 500.

post occasum solis fructus renovare, p. 500. floribus fulvis egregie ornatam; post ortum ejusdem deicere, totumque marcescere scribunt. Peculiaris est Goæ, adlatamque e Malacca adfirmant. Tam feliciter ibi nascitur, ut quilibet rami, in terram depacti, comprehendant. Adamatam a sole Virginem Parizataco fingunt, quam cum post, amore alterius irretitus dereliquisset, istam sibi vitam ademisse, ex crematæ cineribus enatam arborem, Nunquam in Lusitaniam transferri potuit.

Garz. H. A.
l. 2. c. 1.
Acosta H.
A. l. 37.

Bauhin. H.
P. l. 4. c. 54.

Bauhin. H.
P. l. 4. c. 11.
p. 440.

Myrtus.
Nieremb.
H. N. l. 14.
c. 19.

potuit: nec ex semine tempestive collecto, & vasculis figulinis, vitreis, pyxidibusque ligneis & argenteis translato, nasci. Pediculorum florum, qui lutei, in tingendis cibis usus. Aqua, quæ vitreis organis ex iisdem elicitur fragrantissima, oculis utilis creditur.

Piso de
simpl. fa-
cult. l. 4.
c. 38.

IV. *Cambui Paranambucensium* est duplex; 1. *arborescens* & 2. *fruticescens*. 1. *Cambui Paranambucensium arborescens*, cerasum nigram per omnia externa æmulatur. *folia* & *flores* eximii sunt odoris. *fructus* nigri, admodum saporosi, grate adstringentes, & in foro venales. 2. *Cambui fruticescens* myrtus est rubra. *Folia* ei fragrantia, lacte viridia, oblonga, acuminata, & sibi hinc inde opposita; *flos* semel per annum producit, odoratus, & colore niveo; *fructus* croceus, umbilico rotundo, baccarum magnitudine, succo, si ante ingressum solis in Capricornum avellatur, turgens. Prodest in fomentis, tiliarum ulceribus; in balneis, fluxibus alvi & uteri. Semel per annum *floret*, tempore Brasiliensi verno, sole ad scorpionem accedente.

Nard. rer.
med. l. 11.
17.

V. *Hoitzxochitl Tototepecensium* aliis *Xochipoltic*, *Neuhxichitl* & *Hoatziaxochitl* dicitur. Arbuscula est comata, foliis myrti sed longe majo-

ribus, rigidis mucronatis. *Flos* coccineus, orbicularis modicus, qui filo transfossus globulorum precariorum vices gerit. *fructus* pomo similis. *Provenit* Cuixi & Tototepeci calidis locis. Cortex in luegallica adhibetur. *Flos*, qui calidus & siccus secundo cum insigni adstrictione, subvenit uterinis adfectionibus. *Fructus* nuclei ex aqua resoluti, naribus instillati, dolorem capitis levant.

VI. *Flores ex occasione florum arboris* tristis huc adpono quinque. 1. *Mogori*, flores albi, Gelsemino non absimiles, nisi quod plura habeant folia, arbusculæ parvæ, quæ diligenter custoditur. *floribus* mali aureæ odoratiores, quorum stillatitius liquor eundem apud istos usum obtinet, quem apud Hispanos florum mali aureæ aqua. Nascitur in Chekiang ad kinschoc apud Sinenses. 2. *Champe* odore graviore, quam lilium album. Offerri Regibus solent. 3. *Champaeca Javanorum*, sunt viridiores & aureo colore, forma croci Anglici, odoris rosæ & violæ; crescuntque in arboribus Persicæ mali non absimilibus. 4. *Fullo* flosculorum genus apud Indos ex arbore quadam toto anno durans, suavissimi odoris. 5. *Floribundio* ex arbore, quæ solum flores fert, fructus nunquam. Est li-
Atlas Sinensis p. 118.
Bont. H. N. & M. l. 6.
c. 45.
Bont. l. c.
Acosta H. N. l. 4. c. 27.

PUNCTUM II.

Ruscus.

De Rusco.

Vid.
TABULA
LXXI.
Dioscor. M.
M. l. 4.
c. 146. Plin.
H. N. l. 23.
c. 9.

I. **R**usci descriptionem sub nomine *ἀργίας μυρσίνης* seu myrti sylvestris, & *ὄξυμυρσίνης* apud Dioscoridem habemus, Castor apud Plinium *Ruscum* vocat. *Radix* est gramine similis, gustanti acerba & subamara. *Ramuli* numerosi, vitilium modo, lenti, *δισδραυσοί*, cubitales, foliosi. *Folium* myrti sed latius, *λογχοειδές*, *ὄξυ ἐπὶ ἀκρῇ*. *Fructus* rotundus, medio folio inhærens, *ἐρυθρός ἐν τῷ ἀπεπαινωδαί*, cui intus *ὀσάδες*, Arabes pro cubebis sumunt. *Nascitur ἐν τραχέσι & κρημνωδέσι*: & ut vetus addit *ἐν ἰν-μοίς*. *Usus* ut addamus. *Vimina*

ligandis vitibus inserviebant. *Cauliculi*, qui amari, *νεοθαλεῖς λαχανεῖοι* asparagorum vice comeduntur, *Folia* & *baccæ* in vino potæ, urinas cient, menses movent, & calculos urinæ frangunt. *Radix* decocta bibitur alternis diebus in calculorum valetudine, & tortuosiore urina vel cruenta. Radicem pridie erui oportet, postero mane decoqui: ex ea sextarium vini duobus cyathis miscere. Sunt &, qui crudam radicem tritam ex aqua bibunt; & in totum ad virilia, cauliculis ejus in vino & aceto tritis, nihil utilius putant.

II. RE.

Lobel. Ob.
serv. p. 283.
Bauh. H. P.
l. 5. c. 11.
P. 579.

II. RECENTIORIBVS Ruscus, qui officinis inepte *Bruscus*, Anguill. *Centromyrine Theophrasti & Oxymyrsine*, Turn. *Myrtus Sylvestris*, Lobel. *Myrtacantha*, *murina spina*, aliis *Scopa regia* dicitur, bicubitalis aliquando est. Radices crassæ, obliquæ, implexæ, duriusculæ. Vimina densa, lenta, striata. Folia confertissima, Myrtinis paria, dura, mucrone pungente, amara, nullo pediculo ramis hærent, & dextrorsum sinistrorsumque spectant. Ad horum medium flos minimus (verba sunt Bauhini) perbrevis pediculo hærens, enascitur, qui ubi primum oritur, aciculæ nodulum figura sua exprimit: expansus vero trina latiuscula foliola, inferiore quidem sui aversaque parte, folium, cui quasi stragulo incumbunt, respicientia, lintris in modum excavata, sinuataque ostentat omnia, reliquis interim tribus, quæ trino-rum instar radiorum sunt efformata, in angustum apicem desinentibus. Florem fructus sequitur rotundus, Asparagorum baccis major, subdulcis, sub cujus pellicula bina latent *semina* magna, fulva, altera parte gibbosa, altera plana, insignis duritiei, ita, ut, si in pavementum conijciantur, resultent, & ut ait Lob. vix ulli frangenti ictui cedant. Succrescit

quotannis nova Asparagorum similima propago, aromatica aliquantulum, amara, ut adnotat Lobelius. *Gignitur* sponte in Italia secus aspera itinera & sepes. Vidit in Euganeis montibus Februario cum baccis Bauhinus. Patitur se & in Germania feri, profilitque sata, semine per triennium intra terram delitescente. Prodiit in horto Gesneri, germinavitque vere, & veteribus cauliculis arefcentibus, depromsit novos. Visa florum in mediis foliis hyeme rudimenta; sed fructum ne inchoavit quidem. In horto Camerarii locis subterraneis per brumam adservata, & vere loco collocata umbroso, baccas rubras produxit. *Turionum* egregia in aperiendis obstructionibus vis. Radice in aqua infusa, mane & sero per se vel vino admixto pota, aliisque jusculis adfusa, quinque septimanarum spatio, proleclis octoginta libris aquis, *asciten* in sceminis quibusdam curavit Cabrolus; Bauhinus, adhibitis purgantibus & prohibito omni alio potu, in sexagenario *hydropem*, cui scrotum capitis pueri magnitudinem æquabat. Ex frutice concinnantur in Italia scopæ: frons carnibus & aliis ejusmodi circumligata, mures, glires, & vespertiliones, quia pungit, arcet.

Ruscus.

PUNCTVM III.

De Vite Idæa seu Myrtillo.

I.

Vid.
TABVLA
LXXI.
LXXII.
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 17, Plin.
H. N. l. 14.
c. 3.

De Vite Idæa, quæ Myrtillus & Radix Idæa, ex Veteribus hoc duntaxat scimus, fruticosam esse, virgis cubitalibus pene exporrigi, quibus acini ad latera adhærent nigri, fabæ græcæ magnitudine, dulces, vinaceorum instar aliquid continentes; folium rotundum, individuum, parvum. Nascitur ex parte Idæ, quam vocant Phalacras. Apud Plinium ista habentur. *Alexandrina* adpellatur vitis circa Phalacram brevis, ramis cubitalibus acino nigro fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus, folio parvo & rotundo senis di-

visuris. Hujus generis est Idæa *πίττα* Dioscoridis & *Ἀπτοσάφυλος* Galeni. Illa *oxymyrsine* seu Rusco folia similia habet; juxta quæ capreoli exigui, e quibus flos erumpit: radix præclare adstringit. Hæc planta humilis est & fruticosa, folio arbuti, fructu rubro, rotundo, austero. Nascitur in Ponto. Eadem cum illa. Referunt huc quidam Samolum Plinii, quam herbam in humidis nascentem facit. Sinistra manu legi a jejunis, contra morbos suum boumque; nec respicere legentem, nec alibi quam in canali deponere, ibique contedere poturis.

Vitis
Idæa seu
Myrtillus.

Dioscor. M.
M. l. 4. c. 47.
Galen. l. 6.
de comp.
medic. f. lo-
ca c. 4.

Plin. H. N.
l. 14. c. 3.

I a

II. RE-

Vitis
Idæa.

II. RECENTIORIBVS est *Vitis* Idæa quadruplex, 1. foliis oblongis, 2. foliis subrotundis, foliis carnosiss & veluti punctatis, 4. palustris, cui addenda 5. adfinis polifolia montana.

1. *Vitis* Idæa foliis oblongis est in triplici differentia, 1. foliis crenatis, fructu nigricante, 2. foliis albicantibus, 3. foliis acuminatis, baccis rubris insipidis.

Bauhin. H. P. l. 5. c. 6. p. 520. Tabernom. H. P. l. 3. 95. Dodon. pempt. 6. l. 2. c. 7. 1. *Vitis* Idæa foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante, Matth. Myrtillus, Dodon. & Lobel. *Vaccinia* nigra, Angu. *Radix* Idæa, fructu nigro, Cæsalp. *Bagola* primum genus, Bauh. *Vitis* Idæa angulosa, Tabern. *Vitis* Idæa I. Lugd. Myrtillus germanica. Virgulta aliquando cubitalia habet, angulosa, virentia, fractu contumacia. folia crebra, tenera, unciam longa, acuminata, glabra, denticellis argutis per ambitum crenata, saporis acidi, imo & austeri. flores inter folia urceolum referunt ex albo puniceantes, stylo croceo, qui Majo protruduntur. Baccæ singulares, umbilicatæ, Juniperinis fere pares, violaceæ potius, quam nigrae, acidæ primum, sed post nauseabundi nescio quid post se relinquentes, intra quas grana multa, parva, rubentia, maturescunt aliquando Julio, leguntur Augusto. Radix ex supina etiam parte stolones emittit. Nasceitur in desertis, uliginosis & umbrosis vallibus Gallia, Anglia, Germaniæ, in montibus Tridentinis, monte Fracto, in sylva Hercynia & alibi. De Usu nota, baccas in cibis adhiberi, & cum farina in pultem vel simplicem sapam verti; ita ventriculo æstuanti convenire. Crudas ventriculum debilem offendere, & alvum perturbare. In Medicina adhiberi contra varii genus fluxus possunt, si in vino decoquantur, vel in rob redigantur. Pictores succo ad tincturam violaceam cum alumine & galla utuntur, hac chartam tingunt.

Bauhin. H. P. l. 5. c. 4. p. 518. Clus. H. P. l. 5. c. 40. 2. *Vitis* Idæa foliis oblongis albicantibus Trago est Myrtillus grandis, Clus. *Vitis* Idæa I. Bauhino *Vitis* Idæa magna, Ger. *Vaccinia* Pannonica. Rami humi diffunduntur, flexiles, & qui per terram sparsi simi-

les fibras nonnunquam agunt, multis germinibus vix e musco, quo occultantur, prominentibus. folia Ledi Alpini, nullo ordine digesta, admodum venosa, leniter per oras crenata, mollibus villis hirsuta, de longo pediculo pendent. Baccæ rotundæ, Cerasii aliquando magnitudine, virides, mox rubrae, nigrae tandem, seminibus albis, quinque ut plurimum turgida. Observata in unius Snealben jugi supra Neuburg scopulis; sed sine flore. Tab. Ledi Alpini generibus adscribi posse putat, nisi baccæ & alia quædam prohiberent.

3. *Vitis* Idæa foliis oblongis acuminatis, baccis rubris, insipidis, Camer. *Vitis* Idæa rubra Bavarica. Fruticulus est supinus. Caudex vulgari crassior. folia oblongiora, acuminatiora, angustiora, per auctumnum rubentia. Fructus succo caret. Crescit circa Monacum inter Ericas.

4. *Vitis* Idæa foliis subrotundis est in duplici differentia. Est enim vel foliis subrotundis non crenatis; vel foliis subrotundis exalbidis.

1. *Vitis* Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris, Trago Myrtillus exiguus, Dod. & Lob. *Vaccinia* rubra, Thal. *Rhus* Plinii minor, Clus. *Vitis* Idæa buxeis foliis, Bauhino *Vitis* Idæa semper virens fructu rubro. Suffrutex non magnus. Foliis buxi, acuminatis aliquando, saepe non, interdum levissime, ceu serratis marginibus, quæ nervos subtus ostendunt & amaricant; flosculis in virgularum extremis, lilii convallii similibus, racematim coherentibus, candidis, saepe & blande rubentibus, ex quibus baccæ rubentes ex albo luteove, in summitate ceu corona quadam denticulatæ, sex, quandoque plures racemulo uno, pisi magnitudine dependent, intus granula parva, lutea. Gaudet sylvestris, saxosis & opacis, in Germania, Silesia, Bohemia, circa Wernigerodam in Broccenbere, copiosissima. Bauhinus in cacumine montis Rosberg prope Mesocomium tractus Alsatici observavit pulcre virentem, cum angulosæ folia fere omnia decidissent. Floret Majo & Junio, Septembri maturantur baccæ. Baccæ,

Tabern. H. P. l. 3. p. 802.

Canter. in Hist. Plant.

Clus. H. P. l. 1. c. 40. Bauhin. H. P. l. 5. c. 7. p. 522. Dodon. pempt. 6. l. 2. c. 8. Thal. in sylv. Hercynia.

Baccae, quia minus succulentæ & magis adstringentes, in dysenteria, diarrhœa, & aliis fluxibus contemnendæ non erunt.

fert baccas rubras, & a tinctoribus usurpatur.

Vitis
Idaea.

Clus. H. P.
l. 1. c. 40.

2. *Vitis Idaea foliis subrotundis exalbidis*, Clusio *Vitis Idaea secunda*, Camer. *Vitis Gesneri major*, dicitur. *Virgulae* interdum humi diffunduntur, & *radices* agunt teretes, lentas, aliquando firmas & erectas, cortice modo spadiceo, modo cinereo. *Folia* superiori forma similia, venosa, tenuia, subtus exalbida, gustus acidi. *Flos* vulgari similis, concavus, labris in quinque crenas divisus & extrorsum reflexis, ex candido purpurascens. *Fructui* umbilicus latior, ex cuius medio apex prodit, pediculi longiusculi, granula plurima, minima, & sublutea, sapor subacidus & vinosus. *Nascitur* in montibus desertis & sylvosis, Austriæ, Germaniæ, Burgundiæ, Helvetiæ, &c. Prope Norimbergam in sylva sub pinastris, piceis & abietibus copiose provenit. Hortos plantata dedignatur. Tentavit sæpe frustra Bauhinus. Foliolorum & virgulti apud tinctores usus. *Baccae* vim inebriandi habent, si copiosius devorentur.

Clus. H. P.
l. 1. c. 41.
Bauhin. H.
P. l. 5. c. 8.
P. 523.

3. *Vitis Idaea foliis carnosiss & velut punctatis*, est Caspari Bauhino *Idaea radix Dioscoridis*, *Uva Ursina* Galeni, Johanni, *radix Idaea putata*, & *Uva ursi*. Clusii si sequimur descriptionem, *Ramos* habet pedales, lentos, humi diffusos; corticem rubescentem; *folia* frequentia, carnosissima, Chamælææ Italiæ plane æmula, minime hirsuta, cum adstrictione amaricantia. *Flores* Martio extremis ramulis funduntur ex candido purpurascens, cavi, uvæ modo simul congesti. *fructus* rubens, rotundus, exigui cerasi instar, acidus, qui æstate maturescit. Viret perpetuo. *Visa* arido & aprico sole in regno Gracensi, inter Quadix & Baca. Bauhino est buxi *foliis*, quæ ramis lignosis hærent; *floribus* racemosis, concavis, rubeis; *fructu* racemoso in extremitate ramulorum. *Observata* circa Genavam, & in Viganiis Narbonæ montibus. Circa Curiam Rhetorum

4. *Vitis Idaea palustris*, Dod. & Plin. H. N. l. 24. c. 11. Bauh. H. P. l. 5. c. 11. Lob. *Vaccinia palustris*, Clus. Bauhino, *Oxycoccum*, Gesner. *Acinaria palustris*, & *Serpillum acinarium*. Lugd. *Erica sexta baccifera*. an *Samolus* Plinii? Serpit prælongis, lignosis, viticulis, lentis, ex atro rubentibus. *folia* Serpilli, crebra, dura, subtus ex cinereo rubentia, pinnatim disponuntur. *flores* extremis & capilli instar tenuibus furculis, fere puniceis, veluti exigui Cytini, apiculis flavescens Majore & Junio hirsunt. *Baccae* rotundæ, juxta adnexam cordis instar turbinatæ, candicantes primum, mox puniceæ & contiguas purpureis maculis & punctis respersæ, intus vero in candido modice rubentes, una cum cauliculis humi procumbunt nonnunquam, in musco sæpe latent: & quatuor exiguis cavitatibus parva & veluti abortiva semina claudunt. Autumno *maturantur*, & tota hyeme sub nive incorruptæ latitant. *Nascitur* incultis, maris, humidis, putridis, uliginosis. Vere ineunte odit apricum & tabescit. Frequens in muscosis montium Sudetorum sylvis, cacumine montis Balon paludoso loco; apud Hollandos, prope Wittebergam, & fontes acidos Griesbachianos. *Fructus* stringit & refrigerat; coquiturque cum saccharo in pastam.

5. *Viti Idææ adfinis polifolia montana* Bauhini, Polii est facie. Bauh. H. P. l. 5. c. 10. *Virgulta* lignosa, ex nigro rubentia, *folia* polii acutiora, congesta, nervosa, prona parte cinerea, nervo per longum elatiore. Extremis *ramorum* petiolis, *calyculi* hærent perexigui, foliosi, rubentes. unde angulosa pyramis exsilit conchylata, baccæ alicujus rudimentum prominens. Pro *radicibus* capilli instar tenues fibræ ex ramis nascuntur, quæ terram morsu comprehendunt. *Provenit* in uliginosis & muscosis, in sylva Hercyniæ montibus inter vallem Griesbachianam & Ribelsawen. Collecta in monte Pilati.

K

Ex

Ex EXOTICIS huc pertinet *Fru-* re, quæ fructus est non arboris, sed
tilla in Chile, cerasorum fere sapo- plantæ, coloris mori non satis maturi.

PUNCTVM IV.

Buxus.

De Buxo.

TAB.
LXXII.

Visum & hanc huc referre. Quamvis enim baccas proprie dictas non ferat; simile tamen quid, & foliis ad præcedentem quam proxime accedit.

Theophr.

H. P. l. 1.

c. 8. l. 15.

l. 2. c. 4. l. 3.

c. 6. l. 1. 4.

c. 6. l. 5.

c. 4. s. 6. 8.

Theophr.

de C. P. l. 2.

c. 4.

Plin. H. N.

l. 16. c. 16.

1. *Buxum* & Dioscorides & Plinius breviter describere ex *Antiquis*. Non excellit magnitudine, sed facilis æstu, & ex sylvestribus topiario operi arbor. *Radix* est aliquando crispans: *materies* gravis, quia densa, nec ideo exposita vermibus, paucissimis *nodis* constans, quam medulla carere quidam olim existimabant. Lenem quietem habere dixit Plinius, silentio quodam & duritie ac pallore commendabilem. *Folium* myrto simile, & perpetuo virens. Plinius & *semen* suum & granum, quod Cratægum vocant, & a Septentrione viscum, a meridie hyphear, producere falso scribit. Fructum ob hyemem amittere verum. Difficillime calidis locis *prodit*; quia frigidis delectatur & asperis. Ideo in Cytoriiis montibus & in Berecynthio tractu plurima: in Olympo etiam quamquam non magna. Maxima pulcherrimaque in Corsica. Proceræ enim crassitudineque longe aliis præstantior. Tria ejus genera. 1. *Gallicum*, quod in metas emittitur, amplitudinemque proceriorem. 2. *Oleastrum* (sylvestre forte) in omni usu damnatum, gravem præfert odorem. 3. Tercium genus *Nostrate* vocant, inquit Plinius: sylvestre, ut credo, mitigatum satum; diffusius & densitate parietum, virens semper ac tonsile. *Flos* non spernendus, sed causa amaritudinis mellis, præsertim in Corsica. *Semen* illius cunctis animantibus invisum. Ex *materia* axes plaustrorum & bures aratrorum fiunt. In igni duritia, quæ ferro, nec flamma nec carbone utili.

II. RECENTIORIBVS est duplex,

1. *arborescens* nempe & 2. *humilis*.

I. *Buxus arborescens* seu *Buxus* Bauh. H. P. l. 4. c. 50. *vulgaris*, arbor est æterni viroris, cui p. 496. *radix* magna ex parte nodosa, emi- Bodæus ad H. P. nens, crispa & elegans. densa ramo- Theophr. rum brachia. *Cortex* scaber & al- l. 3. c. 15. bus; *materies* durissima, flava, ἀμύ- P. 232. λος, ponderosa, ut aquæ injecta recta fidat; nec in iis sentiat cariem. *folia* ortu adverso erumpunt, perpetuo virentia, splendentia, Myrteis obrusiora, interdum concava, tergo ita duplici, ut cultello a se invicem separari possint, ingrati & odoris & saporis. Ex horum ramis, secundum ramulos globuli racematim cohærent, qui mox in *flosculos* stamineos flavescen- tes explicantur, quos vascula, urceolis similia, viridia, myrti baccis paulo majora, superiore parte umbilicata, & tribus vel quatuor veluti cusulis donata excipiunt; in quibus *semen* lucidum, Fraxinellæ simile, diu cum fructu arbori adhæsurum, nisi avellatur. *Provenit* alsiosis & clivosis ad Septentriones locis, in Germania, Gallia, Sabaudia & Helvetiæ montibus: sed & hortis, ubi ad topiaria adhibetur. Labyrinthus Patavii ex eo; Veronæ & alibi variorum animalium species. Genevæ florum rudimenta Decembri observata. Facile ramis feritur; sed & clavis & avulsione. de semine incertum. Aprilis nova germina promuntur: sed si magis flavum cupis, lignum secari consultum. *Usus ligni & radicum* in torno frequentissimus, ob varias maculas & linearum discursus. Vidimus ex iis Carcassonæ parari pectines, cultellorum manubria, cochlearia, latrunculos, doliorum fistulas, & alia. In hoc ob lævorem & plantarum imagines sculpuntur: sed cave sectum corticem exuas, nam findi periculum est. Turcarum liberos per buxeos tubulos mingere, ne linæamina conspurcent, Bellonius observavit. Remittit & vivacissimos carbones,

bones, si bene exsiccentur. Folio cum materie scobina & lixivio rufatur capillus. Umbra cerebro propter odorem infesta est. In Medicina paratur ex ligno decoctum, quod luem veneream sudore proleto feliciter profligare dicitur, & minus quam Guajacum fervet. Sanatam eo ab hoc morbo pauperulam Anglam, Lobelius auctor est. Sed alii pro ἀντιβαλλόμενον non agnoscunt. Nec Amati Lusitani testimonio utar, qui a Guajaco solo duntaxat natali, (sed fallitur) differre putat. Scobo in aqua decocta, fluxus alvi sistuntur. Cum vino in doloribus dentium a causa frigida aliquando profuit. Elicitur ex ligno & oleum secreti in doloribus iisdem usus; nec non acidulus liquor, qui primo prolicitur, & margaritas coralliaque solvere creditur.

Hartman.
Prax. Chy-
miatr. de
dolor. den-
tium.

II. *Buxus humilis* seu *Chamaebuxus* est duplex, 1. foliis rotundioribus. 2. flore Coluteæ; quibus accenseri potest *Myrtus tenuifolia* Thalii.

Dodon.
Pempt. 6.
l. 2, c. 22.

1. *Buxus humilis foliis rotundioribus*, Tab. *Chamaepyxos*, ad duos vel tres pedes attollitur, in latitudinem diffusus. Ramuli numerosi & tenues admodum. folia rotundiora & dilutius virentia. Ad areolas hortorum muniendas eo utuntur.

Bauhin. H.
P. l. 5. c. 9.
p. 524.

2. *Chamaebuxus flore coluteæ*, est Bauhino *Chamaebuxus* seu *Chamaepyxos* quibusdam, Clus. *Anonymos flore coluteæ*, Camer. *Rhus myrtifolia* Plinii, & *Anonymos Peruvincæ folio*, in Agerii herbario vivo, *Myrtogenista*, Eyst. *Pseudochamaebuxus*. Fruticulus est. Virgulta lenta, tenuia, viridia, spithamum circiter longa, quæ ubi terram attigerunt, fibris demissis radican- tur. Folia per ramos incondita, Myrtina, dura, carnosâ, acuminata, perennia. Flores in ex-

Cord. in
observat.

tremis ramulorum coluteæ scorpioi- dis similes, papilionacei fere. Tribus foliis constant, (verba sunt Bauhini) quorum duo alba sunt, & alarum modo sursum expansa, galeola exalbida illorum exortum integente, tertium folium in oblongum veluti tubulum convolutum est, sursum per lanuginem apertum, per extremitatem braccæ modo efformatum atque luteum & vetustate interdum omnino purpurascens aut rubescens, funduntur Majo & Aprili. Flores excipiunt, latæ & compressæ filiquæ virides, in quibus unum quandoque, bina plerumque grana, ervi magnitudine, ex cinereo nigricantia, hirsuta, & quodammodo animalculum ementita. Perficiuntur Junio. Occurrit in sylvis montanis circa Egeram, in montibus Calenberg, & quæ Badensibus Thermis imminet, & omni resiniferarum arborum genere integuntur inter saxa. Est in eo quædam varietas. Flores enim unius sunt inodori, alterius odoratissimi, & narcissinam quandam fragrantiam æmulantes. Sed & color eorum aliquando variat. Nam bina illa folia alarum instar sursum expansa, cum sua galeola pulcerrime ex purpura rubent: tertium quod in tubulum abit, flavescit, ejusque extrema pars aurea est.

Buxus.

3. *Myrtus tenuifolia* Thalii, fruticulus est lignosus, palmaris, viticulis multis incurvis; foliis oblongiusculis, myrti angustioribus, quorum extrema plerumque in tergum contorquentur. Flosculi in pediculis recurvis parvi, ex albo rubicundiusculi, circa autumnum prodeunt. fructum non observavit. Nas- citur copiose in uligine illa ultra Andersbergam urbem, quæ rotte bruch seu uligo rubra dicitur, & rubro musco plena est.

Thalius in
sylva Her-
cyn.

PUNCTVM V.

De Olea.

I.

LXXIII
TABVLA.

Duo apud Veteres Olearum genera, Sativa nempe & Sylvestris. De utraque apud Dioscoridem, Theo-

phrastum, Plinium, Columellam & alios rei rusticæ scriptores, multa & egregia occurrunt, quæ hinc & inde

Olea. decerpta & in unum cumulum redacta, adferemus.

Theophr. *I. Olea sativa* arbor est perpetui viroris, nec alia major in Batica. *Radicis*, quæ ex medio tendit, parva, ceteræ grandiores, & cancerorum modo velut flexuosæ, inæquales, nodosæ, fimbriatæ, obliquæ, quod non tantum loci ratione, sed natura ipsius evenit. Summæ terræ adhæret. *Caudex* aliquando multiplex; concavus aliquando peculiarem in modum, & gongris scatens: *materies* spissa, obliquitate & durtia fragilis, obque humorem immodicum *πρὸς πύρωσιν* inepta, cariem vetustatemque non sentit; nec rimam fissuramve capit sponte. *Medulla* non omnino conspicua, ideo quidam carere existimabant. *Rami* prægrandes humore non vacant, pinguedinis spissitatisque causa; ideo exsiccari difficiles. *Folia* perpetua, angusta, pediculo brevi, ut quasi infixæ eo hæreant, superne candidiora & minus lævia. *τὰ ὑπὲρ μετὰ τροπὰς ὁρῶντες* vertunt, eoque argumento solstitium confectum intelligunt rustici. Florentibus Punicis germinat. Concipit Vergiliarum exortu. Hoc sydus illarum est. *Flores* foliati sed pusilli, circa fructum ipsum prorumpunt, integro principio & in ambitu diviso, prostrati, *διατετραήμεροι* adparent, idque argumento capitur, an bene arbor defloruerit. Nam si exaruerit aut madefacti sunt, una cum fructibus defluent. *Floret* vero paulo serius, quam vitis, quæ solstitio floret. Deflorescunt omnia septenis diebus, non celerius: quædam tardius, sed nulla pluribus bis septenis. Omnia intra VIII. Idus Julii Etesiarum præcursu. Nec statim sequitur fructus in aliquibus. *Fructum* fert *ἐν τῶν ἔνων*, in Syria *ἀδρόως*, cujus lignoso putamini, moles carnea, tunica prætenui vestita incumbit. Defluit, si deflorenti imber inciderit. Plinius nucleo, oleo, carne & amurca constare dicit. Et suus quidem Oleæ succus *oleum* est, quod ex collecta depromitur. Optima ætas ad decerpendum inter copiam bonitatemque incipiente bacca nigrescere. Ab Arcturi vero exortu XVI.

Calend. Octob. augetur oleum, incrementum potest nucleo & carne. Cum sitienti imbrēs copiosi accessere, vitatur oleum in *amurcam*. Hujus color olivæ cogit nigrescere. Ideoque inopiente nigritia minimum amurcæ, ante eam nihil. Et error hominum falsus, existimantium maturitatis initium, quod est vitii proximum. Deinde quod oleum crescere olivæ carne arbitrantur, cum succus omnis in corpus abeat, lignumque intus grandescat. Ergo tum maxime rigantur. Quod ubi cura multa sine imbribus accidit, oleum absimitur, nisi consecuta serenitate, quæ corpus extenuet. Omnino enim, ut Theophrasto placet, est olei causa calor, quare & in torcularibus & jam in cellis multo igne quæritur. Media olivitas plerumque initium mensis Decembris. Qui medium in collectione temperamentum servant, perticis decutiunt, cum injuria arborum, sequentisque anni damno. Quippe olivantibus lex antiquissima fuit: Oleam ne stringito, neve verberato. Qui cautissime agunt, harundine levi ictu, nec adversos percutiunt ramos. Sic quoque alternare ramus cogitur decussis germinibus. Nec minus si expectetur, ut cadat. Hærendo enim ultra suum tempus, absument venientibus alimentum & detinent locum. Argumentum est, quod nisi ante Favonium collectæ, novas vires resumunt, & difficilius cadunt. Acceleranda *collectio*, antequam glacies congeletur, faciliores enim & copiosiores factus exhibent. Serenum tempus decerptui commodum, humecto germen imbecillius, & facile frangitur. Ideo nec minimarum guttarum casu movendæ arbores. Lecta primo quoque tempore *premitur*, vel minore pressura; vel graviore pondere & fortiore mole, donec ad terationem devenias. In multis vero hoc differentiis. *Pressuram* si attendas. Primum est & nobilissimum oleum, quod sponte vel minore pressuræ vilixivii instar defluit. *Tortivum* seu iterativum, quod ex reliquis fracibus minore nisu premitur, & invalidius.

Dete-

Theophr.
H. P. l. 1.
c. 5. 7. 8. 13.
14. 15. 16.
18. 21. 22.
24. l. 2. c. 1.
3. l. 4. c. 3.
8. 16. l. 5.
c. 4. 10.
Theophr.
de C. P. l. 1.
c. 3.

Plin. H. N.
l. 18. c. 28.

Plin. H. N.
l. 15. c. 3.
Columella
R. R. l. 15.
c. 50.

Deterius, quod tertia pressura fundit. Si *baccas* *ῥιμωρῆς* æstivum & acerbum, quod ex acerbissima & nondum matura ante olivatis tempus elicitur, non satis conducentibus patrisfamilias rationibus, quoniam exiguum fluit, nisi bacca tempestatibus deciderint, & necesse sit eas sublegere. *Omphacinum* ex cruda atque nondum inchoata maturitatis, quod sapore præstantissimum. Olea adhuc alba, *candidum*, ex druppa *deterius* & *viride*. Si *ætatem*, est vel recens, vel *vetustum*, quod fracidum, rancidum, foetens. Adfert enim oleæ tadium vetustas, plurimumque ætatis annuo est. Si *loca* & *alia*, est *Cibarium candidum*, quod certo modo paratur. *Samicum*, quod reliquorum est candidissimum. *Caricum*, quod ex Caria advehebatur. *Thurium*, quod ex Thuriis, excellens; *Sabinum*, quod præ cæteris tenuium partium; *Sycionium* denique, quod candidatum. *Amurca*, sanies est olei amara; seu expressæ olivæ fæx & crassamentum. Fit ex aquis, ideo siccitatibus minima, riguis copiosa; cuius color, ut superius diximus, olivam nigrescere facit. De *Natura* & *ingenio* ipsius est. Nasci posse ex nucleo olivæ sylvestris; & omnibus provenire modis, præterquam *ἀπὸ κλωνός*, quod defixa germen excitare nequeat: diutius suos parturire ocu-
 los: difficilem auctu, seu quod sic-
 cior, seu aliam ob causam; facilius
 annuatim *καρποφορεῖν*, si aut sponte
 decidentes, aut concussi manu fructus
 legantur. Si *ἐν βλαστῶσιν ἀκαρπεῖν*; si
 fructificent, *ἀβλαστῶσιν*, quod utrique
 parti naturam satisfacere impossibile
 sit. Adde his; impediri facile æstu,
 vel frigore lædi, quod radices *ἐπιπο-
 λῶς* terræ adhæreant; terebinthum
 aliquando proferre, cum myrto tan-
 ram amicitiam colere, ut & virgæ
 illius per brachia oleæ dispergantur,
 & fructus ab ea protectus dulcis eva-
 dat: sponte aliquando germen emit-
 tere: lambendo sterilem fieri: fissio-
 nem tolerare *διὰ τὸ συμμεῖν τάχιστα*;
 ideo & difficulter findi, quod *καλλῶδη
 ὑπόσασιν* habeat: firmissimam ad vi-
 vendum, ut quam durare annis CC.

inter auctores conveniat: perire fer-
 tilitate novellas: mutari in oleastros.
 Vifa & amissis foliis fructificasse, quod
 inter ostenta reponitur. In Bæotia
 germinibus omnibus a locustis abra-
 sis, iterum germinavit. Inter *mor-
 bos*, vermes, fungi, seu *λοιπῶδες*, im-
 petigines, araneus, & alia recense-
 tur. Ex *vermibus* crucæ florem in
 Mileto erodunt, ac depastam arbo-
 rem turpi facie relinquunt. Gene-
 rantur in drupis pluviis austrinis, fi-
 untque caducæ. *Fungi*, qui & cla-
 vi, solis est exustio. *Araneus* voca-
 tur, cum veluti telæ involvunt fru-
 ctum, & absument. Nocere tra-
 dit Cato & muscum rubrum.

Quantum ad *locum*, Theophras-
 tus negavit (Plinii sunt verba) nisi
 intra XL. passuum a mari nasci. Fe-
 nestella vero omnino non fuisse in Ita-
 lia, Hispania atque Africa, Tarqui-
 nio Prisco regnante ab annis Populi
 Romani CLXXXIII. quæ nunc per-
 venit trans Alpes quoque & in Gal-
 lias Hispaniasque medias, urbis qui-
 dem anno quingentesimo quinto, Ap-
 pio Claudio Cæci nepore. L. Julio
 Coss. olei libræ duodenæ affibus ve-
 niere. Et mox anno sexcentesimo
 octogesimo, M. Sejus L. F. Ædilis
 curulis olei denas libras singulis affi-
 bus præstitit populo Romano per to-
 tum annum. Minus ea miretur, qui
 sciat post annos XXII. Cn. Pompeii
 IV. Consulatu oleum provinciis Ita-
 liam misisse. Hesiodus quoque in
 primis cultum agrorum docendam
 arbitratus vitam, negavit oleæ fato-
 rem fructum ex ea percepisse quem-
 quam. Tam tarda tunc res erat. At
 nunc etiam in plantariis serunt, trans-
 latarumque altero anno decerpuntur
 bacca. Fabianus negat provenire
 in frigidissimis oleam, neque in cali-
 dissimis. Athenis olim frequentissi-
 ma; lexque apud eos, ne quis oleam
 effoderet, nisi ad templorum Athe-
 nensium structuram, vel ducendum
 funus: sibi quotannis binas licitum
 tollere, qui plures sustulisset, cen-
 tum drachmas pro singulis publico
 ærario pendebat. Notus & Oliveri
 circa Hierosolymam mons. De *Uso*
 apud Dioscoridem & alios quæ oc-
 cur-

Plin. H. N.
 l. 12. c. 27.
 l. 15. c. 2.

Athen. in
 Dipnos.

Theophr.
 de C. P. l. 1.
 c. 6. 18. 26.
 l. 2. c. 3. 4.
 23. 26. l. 3.
 c. 1. 5. 15.
 l. 4. c. 1. 2.
 l. 5. c. 4. 12.
 17. 23.

Olea.
 Plin. H. N.
 l. 17. c. 25.

Plin. H. N.
 l. 17. c. 24.

Plin. H. N.
 l. 15. c. 1.

Demosth.
 contra Ma-
 catartum.

Dioscor.
 M. M.

Olea.
Plin. H. N.
l. 23. c. 3.

currunt, Plinius in compendium redegit. *Fruticis* recentis accensi succus destillans, sanat lichenes, furfures, & manantia ulcera. Ex *materia*, quod minus corruptioni obnoxia, olim statuæ, colorisque subrufi ac varii, quem nervi intorti referunt, easque sudare posse observavit Theophrastus, quod alii inter prodigia retulere. Sed vero aer tepidus illis adhærescens, superficiei aliquod frigus nactus, in lacrymas quasi & sudores cogitur. Stringunt vehementissime *folia*, & si commanducentur, ulceribus imposita medentur. Decocto cum melle profluvium sanguinis e nervosis partibus cohibetur. Succus veteres lacrymationes & genarum erosiones sanat. Exprimitur tusus adfuso vino & aqua cœlesti, siccatusque in pastillos digeritur: sistit & menses, in lana vulvæ admotus. Ejusdem & *flos* effectus. Oleæ honorem Romana majestas magnum præbuit, turmas equitum Idibus Juliis ex ea coronando: item minoribus triumphis ovantes. Athenæ quoque victores olea coronabant: Græci Callistephani ramis Olympiæ. Ex *Fructu*, ut dixi, oleum. Condire eundem mos, adferturque ad nos talis ex locis, ubi nascitur. De *olei utilitate* breviter Plinius. Duo sunt liquores corporibus humanis gratissimi, intus vini, foris olei; arborum e genere præcipui, sed olei necessarius. Et sane Platoni est πόνων ἀγωγή, & secundum Democritum, inoffensa valetudine degit, qui corporis externa oleo, interna melle liniaret. Natura enim ejus tepescere corpus & contra algores munire. Solum humidum Homero, sed quod humidis

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 138.

permisceri contemnit. Pingue idem, calidum, spirituosum, ideo aqua supernatat, & odoris cujuslibet capax. Excellit in hoc genere recens, stomacho propter adstringendi vim comoda, & quæ sudores cohibet, gingivasque firmat, si in ore detineatur. Laxat idem in jussulo datum; subvenitque colicis, si infundatur cum ruta. *Vetus* magis calet, & vehementius discutit; capitis doloribus remedio. *Elutum* minus mordicat. Im-

maturum magis stringit. *Dulce* modici est calor. nec quicquam ejus inunctione olim præstantius, præsertim in balneo vel post. Hinc medicamenta ἀκρωα; & Usus ad luxuriam apud Græcos, vitiorum omnium genitores, qui in gymnasiis publicarunt. Notum est magistratus honoris ejus octogenis festeriis strigmenta olei vendidisse. Paratur & ex furculis, quod si pingue crassum, vetus non turbidum, optimum ex eo genere cenietur. Confert ad lepras nervorumque dolores illitum. *Rancidum* si evadit, vomitui ciendo ob tetrum sâporem & odorem præfertur; sed stomachum vitiosa qualitate vellicat. Nullius apud Ezzos usus: maculari putabatur adpersum eo corpus, detergebaturque sedulo, quod corpore aridos, non molles, fore oporteret. *Sycionio* apud scæminas olim inducendo cuti nitore usus. *Amurcam* super omnia celebravit laudibus Cato. *Dolia* olearia cadosque illa imbui, ne bibat oleum. Amurca subigi areas terendis messibus, ut formicæ rimæque absint. Quin & lutum parietum ac tectoria & pavimenta horreorum frumenti, vestiarius etiam contra teredines ac noxia animalia, amurca adspersi: semina frugum perfundi: morbis quadrupedum, arborum quoque illa medendum. efficaci ad ulcera interiora humani quoque oris. Lora etiam ac coria omnia, & calciamina, axesque, decocta ungi, atque æramenta contra æruginem, colorisque gratia elegantioris: & totam suppellectilem ligneam, ac vasa fictilia, in quibus ficum aridam libeat adservare, aut si folia baccasque in virgis myrti: aliudve id genus simile.

De *diversis* nunc olearum & olivarum generibus dicendum, quæ apud Veteres Dioscoridem, Plinium, Pollucem, Nicandrum, Columellam & alios occurrunt. I. Apud *Pollucem* Pollux l. 6. Colum. R. occurrunt δρυπέταις, αλμάδες, ποτινάδες R. l. 5. c. 7. & θλάσαι. I. De illis, quæ Latinis *Drupæ*, diversæ auctorum sententiæ. Plinius tales vocare videtur, quæ incipiunt nigrescere, priusquam cibo maturæ sint, hæcque optima ad decerpendum ætas. Didymus quæ sua

Plin. H. N.
l. 15. c. 8.

Pollux l. 6.
Colum. R.
R. l. 5. c. 7.
Plin. H. N.
l. 15. c. 3.

sua in arbore maturescunt: Conci-
liari possunt, si illas *δρυπετείς* dixeris,
has *δρυπετείς*; quarum illæ ante ma-
turitatem decerpuntur, & exiguum
corpori alimentum præbent; sed
oleum sapore præstantissimum, adeo
ut ex eo prima unda præli laudatissi-
ma; ac deinde per diminuens, sive
(ut nuper inventum) exiguis regulis
pede incluso; hæ ob maturitatem de-
cidunt, & plus pinguedinis habent,
sed oleum amarum fundunt. 2. *Αλ-
μάδες* quæ & *κορυμβάδες* muria con-
diuntur, iisque Veteres edendi cupi-
ditatem redintegrabant. Ex his *sub-
fulva* καὶ πρόσφατος, δυσκοίλιος & *εὐσό-
μαχος*: nigra seu *πέπειρος*, *εὐδιάφορος*,
& *κακοσώμαχος*, oculis ἀνεπιτήδειος &
κεφαλαλγής: torrefacta nomas sistit, &
carbunculos (*περιρρήττει*) emarginat.
3. *κοτινάδες* cum phauliis eadem, de
quibus postea. 4. *Ἰλάσαι* *confusæ*,
exemtis nucleis condiebantur, exque
illis nigra *εὐσομαχατέραι* credebantur.
II. *Nicander* *πηνυδίνης* Myrtitis &
Ορχάδος meminit; quarum illæ igno-
ræ; hæ inferius dicuntur. III. *Colu-
mella* decem genera observavit. 1. *Pausiam*,
cujus bacca jucundissima, oleum
saporis egregii, dum viride
est; quod de matura intelligendum.
2. *Algianam*, cujus nullus præter
eum mentionem facit, nisi sit Albia-
ris. 3. *Liciniam*, quæ optimum dat
oleum, serique in agro macriore &
frigidiore debet. 4. *Sergiana* seu
Sergia, quæ in agro crasso & calido
optime provenit, & frigus fert opti-
me. 5. *Navia*, de qua eadem, quæ
de Pausia, dicuntur. Nulla ejus apud
Varronem, Catonem aut Plinium
mentio. 6. *Culmina*, quæ post Li-
ciniam & Regiam probatur. 7. *Or-
chites*, quæ melius in escam, quam in
liquorem, stringitur. 8. *Regia*, cu-
jus bacca speciosissima, & escæ quam
oleo idonea. eadem est cum Phaulia.
9. *Circites*, de qua nihil habeo, quod
dicam. 10. *Murtea*, cujus forte ar-
bor myrti similitudine. Vidit ex Per-
sia adlatas Bodæus, parvas admodum,
sed palato gratissimas. IV. *Plinius*
de omnibus his & aliis ita. *Prima*
ab autumno colligitur, vitio operæ,
non naturæ, *pausia*, cui plurimum car-

nis: mox *orchites*, cui olei: post *ra-
dius*. Has enim ocyssime occupatas,
quia sunt tenerrimæ, amurca cogit
decidere. Differuntur vero etiam in
Martium mensem *callosæ*, contra hu-
morem pugnaces, ob idque mini-
mæ, *Licina*, *Cominia*, *Coutia*, *Ser-
gia*, quam Sabini *regiam* vocant, non
ante Favonii adflatum nigrescentes,
hoc est ad VI. Idus Febr. Tunc ar-
bitrantur eas maturescere, & quo-
niam probatissimum ex iis fit oleum,
accedere etiam ratio pravitati vide-
tur. Feruntque frigore sterilitatem
fieri, sicut copiam maturitate: cum
sit illa bonitas non temporis, sed ge-
neris tarde putrescentium in amur-
cam. Similis error collectam ser-
vandi in tabulatis, nec priusquam
sudet, premendi, cum omni mora
oleum decrescat, amurca augeatur.
Itaque vulgo non amplius senas li-
bras singulis modiiis exprimi dicunt.
Amurcæ mensuram nemo agit, quan-
to ea copiosior reperiatur in eodem
genere diebus adjectis. Omnino in
vita error est publicus, tumore oli-
væ crescere oleum existimantium;
præsertim cum magnitudine copiam
olei non constare, judicio sint, quæ
regiæ vocantur, ab aliis *majorinæ*, ab
aliis *phauliæ*, grandissimæ, alioquin
minimo succo. Et in Ægypto car-
nosissimis olei exiguum. Decapoli
vero Syriæ perquam *parvæ*, nec cap-
pari majores, carne tamen commen-
dantur. Quam ob causam Italicis
transmarinæ præferuntur in cibis,
cum oleo vincantur. Et in ipsa Ita-
lia cæteris *Picenæ* & *Sidicinæ*. Sale
illæ primum condiuntur, & ut reli-
quæ amurca sapave. Nec non ali-
quæ oleo suo sine accersita commen-
datione puræ innatant, *colymbades*:
franguntur eadem, herbarumque vi-
ridium sapore condiuntur. Fiunt &
præcoces ferventi aqua perfusæ, quam-
libet immaturæ. Mirumque dul-
cem succum olivas bibere, & alieno
sapore infici. *Purpureæ* sunt & in
iis, ut uvis in nigrum colorem trans-
euntibus, *pausiæ*. Sunt & *superbæ*,
præter jam dicta genera. Sunt &
prædulces, per se tantum siccata, uvis-
que passis dulciores, admodum raræ

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 139.

Cass. Bass.
l. 9. c. 32.

Cato R. R.
c. 6.
Varro R. R.
l. 1. c. 24.

Colum.
l. 12. c. 48.

Bodæus ad
Theophr.
l. 4. c. 3.
p. 325.

Olea. in Africa, & circa Emeritam Lusitaniae. Serapio *aquaticarum*, de quibus nihil habet; *novarum*, colore Smaragdino; & *nigrarum* meminit. V. Adde his, quamvis non omnes in

Pausan. in Atticis. Aristot. de Admir. audit.

censum veniant, 1. *Oleam καλλις-φανον*, quam Aristoteles in Pantheo omnia folia reliquis contraria producere prodit. Non enim superiorem, sed inferiorem (*ὑποτος*) partem viridior (Suidas legit *λευκα*) habent. Ramos mittit quemadmodum myrtus, unde & sumta plantula Hercules in Olympiis Oleam plantavit, athletic coronas suppeditantem. Distat ab Ilisso fluvio stadiis LX. muro circumjecto munita. Ac ne quis tangat, grandi poena cavetur. Hinc & oleæ decerptum furculum, in Olympio campo plantarunt, ut victores inde coronis donarentur. 2. *Indicam*,

Theophr. H. P. l. 4. c. 5.

quæ in montuosis nascitur, verum sterilis, & mediæ inter oleam ac oleastrum naturæ. sed & specie tota distat. Folia enim ejus latiora, quam oleastri; angustiora, quam oleæ. Plinius in ejus descriptione falsus est. 3. *Æthiopicam*, quæ in desertis Arabicis insulis provenit. Fundit lacrymam, Scammonio (Paulus Ammoniaci tenui) quodammodo similem, fulvam, stellis exilibus constantem & mordacem. Inutilis censetur, quæ gummi ammoniaci similitudinem refert, nigricans & mordens. Fiebat ex ea medicamentum *ἑναιμον*, singulari effectu contrahendis vulnerum cicatricibus, ideo Elami quibusdam. Operitur maritimis rubri maris fluctibus & æstu, nec nocetur baccis, cum constet, & in foliis salem relinquere. Ignoram hodie credo. Gummi Elemi aliunde petitur, nec Enemi a sanguine sistendo, ut Hermolaus putat, dicitur. 4. *Oleum lapidis specie*, quæ in sinu Heroo cernitur, ad quem descendunt Ægyptii, parte a mari eminente. Non viridis, similis tamen viridibus, tam foliis, quam germinibus. 5. *Arborem Elæomeli fundentem*, quæ in Palmyreno Syria tractu provenit. Manat ex ejus caudice pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore melleo. Alvum non sine nausea solvit, & bilem præcipue detra-

Dioscor. M. l. 1. c. 37.

hit, duobus cyathis in hemina aquæ datis: qui bibere torpescunt, excitanturque crebro. Potores (forte pugnatores) certaturi præsumunt ex eo cyathum unum. Aurelianus *Oleum Syriacum* vocat, laudatque in paralyti. Ignota Dioscoridi arbor. *Oleam* Plinius dicit. 6. *Elæostaphylon*, quod non solum uvas, sed & olivas parit. *Nasci* dicitur in Lybia, vocarique patrio regionis nomine *Ubolima*; aliis *Uvolea* vel *Oleauva*. Vitis apud Marium Maximum Geoponicorum auctori, qui cum fructum degustasset, exacte utriusque saporem linguæ repræsentare dixit. 7. *Sacras*, quales erant Athenis, *Morias* dicta, cujus Jupiter Morios custos erat. Minervæ in arce ibidem, cum Athenæ Medorum incendio conflagrasset, arsit, sed eodem die ad duorum cubitorum altitudinem repullulavit, si Pausania fides. a Persis incensa repullulavit eadem crasso e stipite virgulto, altero ab incendio die. Apud Milesios etiam, quæ post divitum ac popularium intestina bella sponte exaruit. Fuit denique truncus, ex quo olea & ilex prorupere.

II. *Oleæ sylvestris* (*κότινος* hæc Græcis) *caudex* peculiaribus cavernulis dehiscit; *materies* perpetua, spissa, crispa, in totum oleaginea nodosior. Ex sativæ nucleo nascitur; imo in eam cultura abit. Longior eidem vita, ex communi ratione sylvestrium. Robustior enim, spissior, fructuque infacundior. Nec tineam nec teredinem, & quidem propter amaritudinem sentit: sed valde frigore laborat. Sunt, qui Elæomeli proferre credunt. Æque argillam & calculos amat, ac olea. Eadem, quæ oleæ, vires; & aliquanto efficacior putatur. Stringunt folia, & erysipelata, herpes, epinyctides &c. cohibent. Succus expressus sanguinis eruptionem, fluxum muliebrem, pustulasque sistit, si cum vino ex tuis exprimitur. Oleum acrius & efficacius, tenue & amarius, tantumque ad medicamentum utile. Os quoque colluitur illo ad dentium infirmitatem, & gingivas uligine putrilaborantes. Caput dolentibus rosacei vice

Bauhin. H. P. l. 6. c. 6.

Pausan. in Atticis.

Plin. H. N. l. 16. c. 18. 40. 44. l. 23. c. 4.

ce est, sudores sistit, & defluos capillos inhibet. *Flore* condylomata illinuntur, & epinyctides. Item cum farina hordacea venter: in rheumatismo cum oleo, & ad capitis dolores. Inde olim & in Olympiis coronæ: traditque Plinius Oleastrum Olympiæ, ex quo primus Hercules coronatus est, ad sua usque tempora durasse, religiose: quemadmodum & oleam Athenis, quæ traditur edita in certamine a Minerva. Ad hanc quidam *καλλιέφανον* & *Ethiopicam* referunt, de quibus superius. Facit & Ctesias apud Athenæum *Spuriæ* in Caramania mentionem, ex qua oleum, quo rex utitur, vel ad ciborum condimentum, vel ad illitum corporis.

II. Apud RECENTIORES quoque duplex Olea habetur, 1. *Sativa*. 2. *Sylvestris*.

Bauh. H. P.
l. 6. c. 1.
Cord. in
Dioscor.
p. 21.
Dodon.
pempt. 6. l. 3.
c. 29. Clus.
H. P. l. 1.
c. 27.

I. *Olea sativa*, arbor haud valde patula. *Truncus* magnam partem nodosus, femur humanum non excedit; cui *materies* spissa, alicubi crispa & intorta, colore inter flavum & spadiceum medio, quorum etiam maculis invicem convolutis, ad justam ætatis consistentiam perducta, conspergitur. *Folia* oblonga, salignis similia, sine incisuris & venis manifestis, crassa, rigida, atro virentia, & quæ inferius canescunt; tam brevibus pediculis hærent, ut furculis inserta videantur. *Flores* racemosi, albicantes, e quatuor foliolis fructus rudimentum complexis, contexti, qui Junio mense magna ex parte prorumpunt. *Fructus* figuræ ovalis, magnitudinis variæ, primum virides, postea flavicantes, per maturitatem purpurascens, nigricantes tandem; rarius ex rubro puniceos, carne dura, molli & pingui per maturitatem, quibus intus *officulum* cum nucleo, sapor amarus, & nauseosi nescio quid ferens. *Colligitur* Novembri ac Decembri; in regno Granatensi Februario. Profert *baccas* ex rubro purpurascens, & *viscum*, quod non procul Hispali mense Januario Clusius observavit, quod steriles reddit. De *Elæomeli* sub Manna agemus. Na-

scitur frequens in Italia, Gallia, Hispania, Zacyntho, Syria & alibi. In Lemno paucas reperias: multas prope Roboretum apud Rhætos; prope, sed ultra Alpes Insubriam versus. Habetur & in solo septentrionali, sed fronde flaccidiore, latiore & fere saligno; nec quicquam præter florem, quomodocunque tamen colas, producit. Est & in *Brasilia*, sed fructu odoris insuavis & saporis pejoris. *Olivarum* aliquæ & nunc varietates. 1. *Lusitanicæ*, *Narbonenses* & *Baticæ*, minores olivas producant, sed quibus multum & præstantis olei. 2. *Hispalensibus* crassiores & minores, albæ nonnunquam. 3. *Comenses* oblongæ, atrovirentes, carne dura, nec succulenta, quæque offi firmiter hæret. Nihil conditis sapidius. 4. *Hispanæ* maximæ & sæpe nucis fere magnitudine, succulentæ, sed quibus amurcæ & acerbicatis nimium. In *Hetruria* habentur, 1. *Minores*, rotundiores, plurimum olei habentes, quæ *Olivellæ* vocantur, Cæs. quas Matth. secundo loco recenset, & eas prægrandes arbores juglandium modo ferre, quas *Olivastrahura* Senensia vocitent. 2. *Majusculæ* & oblongæ, oleum parcius sed dulcissimum reddentes, quæ nomine a radiis desumpto, *Raggiariæ* dicuntur, Cæs. hæ primæ sunt Matth. quas oleæ minores proferunt, quibus in cibis utuntur. 3. *Majores* & pulposiores ad condituras tantum quasitæ, quas *Regias* Cæsalp. vocat. 4. Sunt quædam, quarum caro ab osse recedit, cum franguntur, *virides*, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas *Colimbades* Cæsalp. censuit. Sunt & in Virginia tria baccarum genera, glandium forma, ex quibus bonum oleum elicatur. Huc pertinere non dixerim.

II. *Olea sylvestris*, seu *Oleaster* a Bauhin. H. quibusdam spinosa, non spinosa a P. l. 6. c. 2. nonnullis describitur. Adolefcit instar oleæ, illique per omnia fere similis est (verba sunt Clusii) cortice tamen leviori, rarioribus ramis, minus frequentibus, & brevioribus angustioribusque foliis, licet eorum modo circa ramos dispositis. *Flos* ut

Olea.

Benzo Hist.
Amer. l. 1.
c. 28.

Bauh. H.
P. l. 6. c. 2.
p. 21.
Clus. H. P.
l. 1. c.

Olea. ut in olea fativa racematim cohærens; fructus exiguis olivis similis, paucamen carne præditus, mucrone recurvo, e longis petiolis racematim dependens, primum viridis, deinde purpureus, postremo ubi maturuit niger, signo prægnans purpureo, qui gustatus nonnihil linguam vellicat. Tota arbor insigniter amara est. *Amat* calculosa & argillas. Ideo in Narbonensi Gallia, Hetruria, Dalmatia, talibus locis uberi proventu nascitur. In Lusitaniæ desertis inter ingentia laxa visa, ubi non procul a Cerba magnæ ejus sylvæ, sed fructus negligitur. In convallibus montis Athos altæ, solis vigorem umbra reprimunt. Addo, nasci ex fativæ nucleo: ex oliveto jam insito & incenso. provenire: & mansuescere tractatu decisis circa taleis; valde laborare frigore. Lobelius notat, alteram in alteram transmotione, aut inoculatione, aut neglectu abire. Rigidiuscula enim fit Oliva, impexo atque horridiore adpectu: interdum fenticosa, quando in saxosis defitis ejus radix pastinatione non diffiatur, aut nocitura pullulatio, & fenticosa ad caudicem soboles non intercluditur.

Lobel. Ob-
serv. p. 566.
Advers.
p. 422.

EXOTICA

Vid. **EXOTICARVM** quinque tantum huc referri debent, 1. *Apiratibira*. 2. *Tlacatezquipatli Terentii*. 3. *Nanahuauahuatl Hociacotlensum*. 4. *Embira Brasiliensium* & 5. *Xagua Martyris*.

I. Ajuratibira arbustum est, fructum rubrum ferens, e quo barbari oleum ejusdem coloris conficiunt, quo corpora sua illinire solent.

II. Tlacatezquipatli Terentii, ramus duntaxat est, in quo folia oleam quodammodo præsentant.

III. Nanahuauahuatl Hociacotlensum, seu morbi gallici arbor, comata est & excelsa, folia oleæ similia, paulisper odorata, amara. Fructus e trunco enatus racemos oblongos componit, baccae sunt virides, flos in icone non conspicitur. Nascitur temperatis humidisque Hociacotlæ locis.

Reichus R.
M. N. H.
l. 3. c. 32.

Decocti jus matutino liberalius sumtum gallico medetur morbo. Potest & ad Sycomorum referri.

IV. Embira Brasiliensium, dicitur <sup>Piso de fa-
cult. simpl.
h. 4.</sup> & *Pindariba*. Arbor est, quæ in summam altitudinem recta adsurgit. *lignum* est tenue: folia exigua, acuminata, oleæ simillima. *Acini* pluviiis mensibus virent, Decembri & Januario maturi rubent, & decidunt, desiccati nigrescunt. Provenit juxta Olindæ promontorium. Ex corticibus funes ignarii fiunt. *Acini* linguam masticati urunt, & ablato semine nigro, Juniperum redolente, aromaticum quid sapiunt. Reservantur in officinis excocti. Culinis piperis vicem præstant. Jejunis ventriculum roborant, & flatu discutunt. Contusi & adplicati morsibus serpentum medentur.

V. Xagua Martyris ad palmas referri potius debebat. Similis enim <sup>Nieremb.
H. E. l. 14.
c. 36.</sup> iis est. Nec multum differt a Muza, & illis, quæ folio sunt latissimo: sed quia ibi non occurrebat, & fructus est olivæ similis, hic ponere visum. Habet folia tam grandia, ut quodque a pluvia tutetur in caput protentum, hominem totum, ac si laneam penulam tergo injecisset. Mirandum, quod de eo scribitur. Folio, inquit Nierembergius, (arbori nimirum folia inhærent haud secus, ac sua in arbore palma) a radice, qua est arbori compacta, eruto (facile namque per demissam cuspidem caput folium detrahitur ab arbore) in interiore illius tergo philyra, albuminis ovi pelliculæ similis, reperitur candida, ea, ut ex arietis jugulati corpore pellis excoriatur, tolliturque a suo cortice integra, nihilo minor arietina vel caprina membrana, cujus opera utuntur omnes, ac si membranas ipsas adsequerentur, neque minus tenacem esse inquiunt eam philyram: forcipibus tantum scindunt, quantum ad præsentem scribendi necessitatem sufficiat. Fructus porcos pinguefacit, hominibus incommodus. Dicitur & *Pergaminifera*.

De Agno casto seu Vitice.

I.

Vid. LXXIII. **A**gnus castus seu Vitex, Gazæ Ame-
 rina & Æquum, Veteribus fru-
 TABVL. A. tex est cultura in arborem adfurgens.
 Dioscor. M. Virgulta latere gerit διδραυσα, longa;
 M. l. i. (parva Theophrasto) quibus nodi ge-
 c. 135. minati, & invicem congrui, seu ex
 Theophr. H. P. l. i. intervallo sibi respondentēs: folia oli-
 c. 5. 22. v. 3. vā sed teneriora ac majora, (longio-
 c. 17. ra & molliora addit Serapio) Plinius
 Galen. sim- salici similia, sed odore gratiora. flore
 plic. l. 16. differt, qui supra fructum insidet. se-
 men piperis instar. Prodit ad flumi-
 na in campis ἐν ὁδοῖς, τραχέως τὸ ποῖον
 καὶ χαλδαιοῖς. Calida est Galeno &
 sicca in tertio, cum partium tenuita-
 te & subadstringendi vi in foliis &
 semine. Caput tentat vini modo:
 nam & odor similis est: non tamen
 quantum cannabis. Venereos impe-
 tus genituram dissolvendo infringit.
 Hinc matronis δυσμοφορίας εἰσὶν in Ce-
 reris sacro, ut castitatem servarent,
 ex foliis lectos sternere suerum: ex-
 indeque nomen obtinuit. Folia cum
 butyro & foliis vitium testium sol-
 vunt, lactis ubertatem faciunt, &
 menses movent. Semen lichenēs &
 lentigines ex aceto sedat, oris ulcera
 & eruptiones cum melle: rhagades
 fedis cum melle illitum; luxato cum
 sale nitro & cera. Instillatur in oleo
 & aceto decoctum capiti in lethargo
 & phrenesi. Sudores movere, præ-
 gnantibus inimicum esse; & embrya
 pellerē, Nicandri Scholiastes prodi-
 dit. Virgam qui in manu habeant
 aut cincti, negantur intertriginem
 sentire. Duo ejus apud eosdē ge-
 nera. Est Major, quæ in arborem sa-
 licis modo adfurgit: & Minor ramo-
 sa, foliis candidioribus, lanuginosis.
 Prima album florem mittit in purpu-
 reo, quæ & candida vocatur: altera
 Nigra, quæ tantum purpureum.

II. RECENTIORIBVS triplex est
 Vitex. I. Foliis angustioribus canna-

bis modo dispositis. 2. Latiore folio. Agnus
 3. Trifolia minor. caltus.

I. Vitex foliis angustioribus canna-
 bis modo dispositis, Matthiolo est Sa-
 lix Amerina, Lobel. Elæagnon Theo-
 phrasti, Bauhino frutex folio non ser-
 rato; frutex est initio rectus, sed qui
 arborefcens ætate contorquetur. Cau-
 dices lignosi, non crassi. Ramuli ob-
 longi, lenti, flexiles, & frangi con-
 tumaces. Folia ex uno pediculo qui-
 na, oblonga, acuminata, salicis instar,
 sed minora, mollioraque, coloris sub-
 tus cinerei, fusci propemodum supe-
 rius. Flores vel toti, purpurei, vel
 purpurei albo intermixto verticilla-
 tim spicato ordine virgularum fasti-
 gia circumdant. Fructus grana nu-
 merosa, coriandrinis & rotunditate
 & magnitudine fere paria, nec crispa
 tamen nec striata; quæ quia piperis
 instar, ideo cum pipere vero in offi-
 cinis divenduntur. Colitur passim in
 Italiæ & Galliæ hortis celebrioribus.
 Ad Oenum fluvium non procul ab
 Oeniponto provenire tradidit Cordus.
 Visæ Monspelli arbores, quibus Ju-
 nio flos, Septembri semen maturum.
 Montbelgardi Julio & Augusto flo-
 ruit; fructum duntaxat exorsa. Se-
 men ad gonorrhæam cum aqua flo-
 rum nymphææ vel portulacæ com-
 mendatur.

II. Vitex latiore folio, Lobelio Vi-
 tex latiore serrato folio dicitur, visa
 sæpius & Bauhino. Coluit & Basi-
 leæ in suo horto Platerus. Forte est
 naturæ pro temporis, loci, culturæ
 & ætatis ratione lusus. Utraque si
 hyemē in locos subterraneos defera-
 tur, frigore perit, sed semper etiam si
 sævissima hyeme a radice repullulat.

III. De Vitice trifolia minore, cu-
 jus Rauwolffius meminit, nihil est in
 quod dicam, nisi sic ab eo adpellari.

De Ligustro.

Ligu-
strum.
Vid.

TABVLA

LXXIII.

Virgil. Ec-

loga 2.

Plin. H. N.

l. 24. c. 10.

l. 12. c. 24.

Dioscor. M.

M. l. 1.

c. 124.

Columella

R. R. l. 10.

I.

Fit *Ligustri* apud *Veteres* Poetas mentio, quod quia cum lacte multo florem fert, jatione forte est. Plinius eandem arborem cum illa, quæ in Oriente *Cyprus*, esse dicit: alii *Cyprum* eandem cum illa, quæ in Italia *Ligustrum*, quod sine dubio de vulgari, ut ex descriptionum collatione colligi poterit, sumendum non est. Est autem *Cyprus* foliis circa virgulta oleæ similibus, *Ziziphi* Plinio, sed latioribus, mollioribus & viridioribus. *Flos* est candidus, muscosus, odoratus. *Semen* *Coriandri* Plinio; *Dioscoridi* nigrum, *Sambuci* fructui simile. *Columella* *Nigrum* vocat, quod folia ex virore ad nigredinem vergant; seu quod cum grato quodam virore viridia conspiciantur. Optima nascitur in *Ascalone* & *Canope*. *Florem* inter coronarias retulit *Columella*. Unguenti ex eo facit mentionem *Plinius*. Coquitur enim in oleo, premiturque postea & *Cyprus* (*cyprum* forte) vocatur. Pretium ei in libras quinque. Optimum *Canope* in ripis *Nili* natum habetur, secundum *Ascalone* in *Judæa*, tertium *Cypro* insula odoris suavitate. Excalescit & molliat nervos. *Folia* digerens quiddam cum aquea substantia modice calida habent, ex terrena frigiditate tenellam & aliquid stridorium. Capillos trita & illita ξανθίζει, postquam in struthii succo mature. decoctum πυρκαύσων κατάντημα. *Flos* ex aceto tritus & fronti inductus κεφαλᾷ γίας πᾶνει.

II. NOSTRIS Botanicis *Ligustrum* est triplex. 1. *Germanicum*. 2. *Italicum*. 3. *Ægyptiacum*.

Theophr.

H. P. l. 3.

p. 178. Gef-

ner. in hort.

germ. Bau-

hin. H. P.

l. 5. c. 15.

Lobel. Ad-

vers. p. 420.

I. *Ligustrum germanicum*, *Trago vulgare*, *Lon. Majus*, *Anguill.* & *Gefn. Phyllirea*, *Lac. Halimus*, *Lobel. Ligustrum Dioscoridis nostras*, *Alpino Italicum*, frutex est arborescens tres aut quatuor cubitos altus: cui *virgæ* lentæ & crebræ, cortex cinereus, materies albida, dura. *Folia*

adverso situ ex intervallis oriuntur, falcis similia, atrovirentia, lævia, gustu acri, quæ ferme hyemis initio decidunt. *Flores* candidi racemosi, quinque, sex & septem folii, apicibus ex luteo herbidis, odorati, qui decerpti flavescent. Durant fere tota æstate, aliis pereuntibus, emergentibus aliis. *Baccæ* racematim in pyramidis figuram adgregantur, *Juniperinis* æquales, per maturitatem nigricantes, quibus intus bina *grana*, hinc gibba, inde compressa, cortice spadiceo, carne exalbida, digitorum leni pressu fragilia, sapore amaro. Maturescunt Septembri, & per totam hyemem durant, aviculis esurentibus solatio. *Frequens* circa veprea & sepes in *Germania*, *Italia*, *Anglia* & *Gallia*. In hortis cingit, quia consilis, areas. Aptissimus ipse frutex sepimentis, propter lenta & flexibilia vimina; ideo & caveæ ad servandas coronas aves ex ea. *E foliis* aqua exulcerationes oris & inflammata removet, carbunculisque & ambustorum pudendis medetur. *E floribus* destillata superfluos stringit menses; ex quibus & oleum vulnorum inflammationi insigne. *Baccæ* turdorum & merularum esca: maturis, rubello vino niger inducitur color, quo magis sit vendibile, pinguntur chartæ luforiæ; & a pueris atramentum, quod in cæruleum quandantenus vergit, conficitur. Notavit *Tragus* & *subluteo flore*, *Ligustrique* aliam speciem nominat; *Lonicerus Majorem* & *Minorem* facit.

II. *Ligustrum Italicum* est duplex, 1. *Myrtifolium*, & 2. *Foliis lacinia-*

1. *Ligustrum Italicum myrtifolium* *Caspar Bauhin. Prodrom. l. 11. c. 8.* ad *Ligustri* vulgaris modum excre-
scit, & in ramos brachiatur. *Rami* sunt rotundi, læves, nonnihil rufescentes, *folia* atrovirentia, vulgaris foliis & latiora & longiora. *Bauhinus* noster *Patavio* habuit.

2. Li-

2. *Ligustrum foliis laciniatis* ita a Bauhino describitur. Et hujus *ramos* pedales habemus, circa quos *folia* atrovirentia, glabra, inferiora quidem subrotunda, alia vero oblonga: hæcque modo integra, modo Jasmini lutei instar divisa, quandoque ab altero solum latere, laciniam unam, quandoque utrinque unam, rarius binas, quandoque ternas, quaternas, inordinatas lacinias obtinent. Accipit sub Ligustri nigri, ex horto Mori Senatoris Veneti, & Syringæ laciniatis foliis ex Contareni, nomine.

III. *Ligustrum Ægyptiacum* duplex Caspar Bauhinus facit, *latifolium*, & *angustifolium*.

Rauwolf, in itiner. p. 1. c. 4. p. 60. Clus. ad Bellon. obs. Bauhin. H. P. l. 5. c. 16. p. 582.

I. *Ligustrum Ægyptiacum latifolium*, aliis *Cyprus Græcorum*, *Arabum canna vel Henne*, Græcis *Schenna*, Bello *Cyprus Plinii*, Clus. *Alcanna Arabum*, Lobel. *Alcanna*, Bauhino *Cyprus Græcorum*, *Elbanne Arabum*, frutex potius, quam arbor. Tota hyeme viret, fertque flores in thyrsos palmum longo & aliquantulum explicato, ut etiam foliola inter folia nascentia conspiciantur, ex luteo pallidos, odore moschi, quibus bacilli concolores. Et quia tarde, Augusto nempe, nova folia protrudit, quidam aqua sapore infecta irrigant, alii calcem radici admovent, ut citius floreat. *Baccas* fert Ligustro vulgari fere pares, sessiles magis, coloris cinerei fere, quæ quatuor impressiones ostendant. His *semen* pulchellum, spadiceum, pyramidale, trigonum eleganter exprimens, basi ita æquali, ut surrectum latrunculi instar ster. Provenit circa Tripolim & in Cairo. A Turcis propter suavem florum odorem in vasis custoditur, & hyeme in calidioribus locis, ne pereat. *Flores* pulverisati cum succo citri miscentur; hocque magmate capilli & ungues pueris, festis diebus tinguntur. Pulvis est Rauwolfio viridis, ex Ægyptoque plenis saccis delatus in instructioribus officinis habetur:

Bellonius ex fusco flavescentem facit. Ex radice urunt suum *spodium* Arabes.

II. *Ligustrum Ægyptiacum angustifolium*, ab Alpino & Weslingio descriptum est. Ille *Tamarhendi* vocari scribit; hic negat. Visa fruticis potius vegetioris quam arboris proceritate adulta, confusa ramorum sylva cultorum negligentia latius implicita. Bellonio in Punici mali magnitudinem excrescit; sed cæsa virgulas duntaxat profert & minum salignorum instar. *Folia* olivæ non assimilia, breviuscula pleraque, sed latiora, & sub grato virore magis tenella. (candidiora quam in ligustro) Nec ternis tantum, quaternisve ordinibus tanquam alis; sed pro virgularum longitudine denis, duodenis, pluribusve ramorum latera stipant: sic tamen, ut inferiora folia ampliora ab his succedentia deinceps ad extremum usque rami, paulatim minora conspiciantur, *μονοφύλλω* circa apicem vix ullo superstiti. *Flos* racematim spargitur, cinericeus, figura sambuci floribus proximus, sed minor, odore admodum acuto. *Fructus* a ligustro vulgari differt. Ille enim baccis juniperi similis; hic nec semina rotunda coriandro imitantia, nigra, parva, multa, folliculo concluduntur, qualia in uvarum granis videre est. Videntur omnino a superiore diversa. Provenit in Ægypto. *Folia* pulverisantur ad flavas tincturas, ex quorum commercio 18000. aureorum ad Turcicum Imperatorem census. *Fœminæ* femora, epigastria, partesque pudendas balneis egressæ ea inficiunt, ornatus gratia. Addito alumine tinguntur tam pueris, quam fœmellis, capilli; equis pili, pedes & muscaria. Ex eodem, qui *Archenda* incolis, cum aqua mulsa emplastrum, quod humidis & fœtentibus pedibus præsentissimo intra horam remedio adponitur. Cujus in oris, gingivarum, pudendorumque ulceribus usus. *Flores* dolorem capitis circumpositi leniunt.

Alpin. de plant. Ægypt. c. 13. Vesling. ad c. 13. Purchaf. Navig. T. 2. p. 913. Bellon. obs. l. 2. c. 74.

Philly-
rea.

PUNCTVM VIII.

De Phillyrea.

I.

Vid. TAB. LXXIV. De Phillyrea hoc solum apud Dioscoridem exstat. Cypri magnitudinem æquare, foliis esse oleæ similibus, sed latioribus & nigrioribus, fructu lentisci (Xivæ) nigro, subdulci & quasi racemato. Putat ejus & apud Theophrastum fieri mentionem Bauhinus, & pro φιλύρεαν legi φιλύρεαν debere. Plinius certe Phillyream a Tilia non distinguit: nec dubium, Paulum Æginetam utrumque confundere. Folia adstringunt, maxime ad oris ulcera commoda, si manducentur, vel decoquantur.

II. Bauhino, quem sequimur, Phillyrea est quadruplex, 1. folio lato. 2. folio leviter serrato. 3. folio ligustri. 4. folio angusto.

I. Phillyrea latifolia est duplex, lævis & spinosa.

Lobel. Adv.
vers. p. 421.
Bauhin. H.
P. l. 5. p. 531.

1. Phillyrea latifolia lævis, Lobel. Phillyrea arbor Galloprovinciæ, Macaleb. Serapionis, Lugd. Philyca Dalechampii, Tabernom. Mahalebium Serapionis, Bauhino Philyrea latiusculo folio, Lugdunensi est Ligustri magnitudine, multum fruticosa, coma perpetua, caudicis cortice cinereo, rugoso: foliis lentisco fere similibus, amplioribus, longioribus, carnosius, obscure virentibus, gustu adstringentibus: fructu racematim congesto, antequam maturescat, anguloso, cum maturuit, rotundo, nigro. Is constat pulpa tenera, succosa, gustu principio dulci, mox amaro, cum acrimoniæ tantillo, ac dum manditur, suave quiddam olente, quod cum baccarum Juniperi odore comparari possit. Pulpæ subjectum est lignosum, sed valde tenerum ac fragile putamen, nucleum continens rotundum, gustu amarum. In Gramontio lūco haud procul a Monspelio, ac in ejus tractus saxosi glareosique sepibus crescit. In adversariis ipsi flos illicis muscosus, albidus, baccæ una acervatæ Therebinthi majoris, nigricantes, herbidae, dulciculæ.

2. Phillyrea latifolia spinosa, Clus. Clus. H. P. prima, Bauhin. folio ilicis, Hispanis l. 1. c. 34. Alebo, majori est ilici congenera. Bauh. H. P. l. 5. p. 541. mi pollicaris magnitudinis. Cortex viridis, candicantibus maculis adpersus. Folia ilicis coccigeræ, majora, viridiora, crassiora, nonnihil in ambitu spinosa, nec ingratis adstringentia. Fructui qui lentiscino similis, niger, e foliorum alis dependet, officulum. Reperitur in Lusitaniæ incultis circa Eboram, in Liguria, agro Florentino; Monspelii in sylva Aigremont, ubi vere floret, baccas Augusto fundit; Ferrariæ in horto Ducis & alibi. Gaudet montosis, saxosis, asperis, & fossis sepibusque agrorum. Johannes Bauhinus forte Philyrinam Cordi putat. Arbuscula est fruticosa, Philyræ adpectu simillima: siquidem ligno, ramulis, corticis colore, & cruciformi ramulorum furculorumque positu, nihil fere, quod adpectu dignosci queat, a Ligustro & Philyra differt. Caudiculis adsurgit pluribus in rectiores virgas divisas. Ramuli item qui in exitu sibi ex intervallo adversantur, concinniori ordine in cruciformem positum digesti sunt. Folia habet Philyræ similia crassitie, colore, nitore, paulo tamen breviora, latiora, in medio antrorsum fastigiata: posteriore vero parte orbiculata, per ambitum leniter serrata, duris & ceu modice aculeatis, & asperis incisurarum eminentibus angulis, hyeme non decidua, sed Philyræ modo contra hyemis injurias contumacia, gustu adstringentia cum amaritudine & aliqua acrimonia, quemadmodum Philyra, Ligustrum, atque Oleaster. Radicibus hæret qualibus Philyra.

II. Phillyrea folio leviter serrato, Lobel. Adv. Clus. Philyrea secunda, Bauh. Philyrea folio alaterni, multos habet ramos, quibus cortex candicans. folia Alaterni priori pene similia, firmiora, minus nigricantia, sapore aliquantum ex acredine amaro. Fructus inter

ter folia propendet, granorum piperris magnitudine, rotundus, niger, gustus calidi, cui osseus, candidus & fragilis *nucleus*. Legitur initio Decembris. *Visitur* in multis Lusitaniæ locis, imprimis circa pagum Tomar. Monspelii quædam folia ferrata non sunt, alia mediotenus, quædam per totum fere ambitum, & magis virentia. Habuit & ab Agerio Medico Argentinenſi Bauhinus *ramum sub Alaterni specie*, cujus cortex cinereus fere; folia non ita virentia, bino ordine per caulem procedebant, unciam longa & lata, ferraturæ in ambitu denticellis veluti in aculeos desinentibus.

lia, Lob. *Minor*, Lugd. *Alaternus* *Phillyrea* *Dalechampi*, arboreſcit nonnunquam. *Ramis* cortex niger; folia oleastri angustiora, viridiora, haud sine amaritudine. *Flores* exigui albicantes, oleæ similes, simul congesti, inter foliorum alas circa ramulos nascuntur. *Fructus* maturitate est niger, baccarum myrti magnitudine, cui officulum durum. *Visitur* in Castella locis incultis, non procul a Tago flumine: aliquando & circa sepes in Monspelienſi agro. A *Baubino* aliter describitur. Frutex est secundum hunc cortice cinereo obtectus, materie alba, ramis sibi invicem oppositis, foliis oleæ situ adverso respondentibus, nigrioribus, nec una ut oleæ candicantibus, modo angustis, & olearum foliis angustioribus, nunc mucronatis, alias subrotundis, interdum nonnihil in ambitu ferratis, duris, acrimoniæ cujusdam & amaritudinis nequaquam expertibus: ad quorum exortum flores multi utrinque ramulos coronant ex herbaceo albi. Succedunt baccæ rotundæ, parvæ, caruleæ, vel potius violaceæ, brevissimis pedicellis racematim ramulis adhærescentes, dulces cum aliquo amarore: in quarum unaquaque officulum parvum, in quo nucleus.

Bauh. H. P.
l. 5. p. 532.
Clus. H. P.
l. 1. c. 34.

III. *Phillyrea folio ligustri*, aliis *Philyrea*, Dodon. *Cyprus latiore folio*, Lobel. *Philyrea major Narbonensis*, Clus. *Philyrea tertia*, Camer. *Philyria media*, Lugd. *Alaternus major Dalechampi*, Cæsalp. *Ilattrum*, minor est superioribus. *Rami* ex albedo cortice teguntur, aliquantum rugoso. folia ligustri non ferrata. *Flores* oleæ similes, pusilli ex herbaceo candicantes, confertim inter foliorum exortus nascuntur. *fructus* rotundus. *Provenit* desertis Baticæ locis; nec non in Narbonenſi Gallia. *Ilattrum* vero suum, aliis *Linternum*, Cæsalpinus scribit fruticem in maritimis tractibus frequentissimum veluti oleam quandam parvam, multis ramis fruticantibus; foliis oleæ durioribus ac viridioribus, similiter perpetuis; florere a lateribus in alis foliorum, non oblongo racemulo, ut olea, sed acervatis granulis fructum ferre nigrum ligustro similem: unico intus officulo, tenui putamine, figura olivari.

IV. *Phillyrea angustifolia* est duplex, prima & secunda.

Bauh. H. P.
l. 5. p. 538.

I. *Phillyrea angustifolia prima* Dod. *Cyprus*, Clus. *quarta*, aliis angustifolia,

2. *Phillyrea angustifolia secunda*, Clus. *quinta*, est præcedenti forma & magnitudine similis. *Rami* tenuiores, rariores, minusque conferti. *Virgæ* fractu contumaces. folia ex adverso disposita, oleastrinorum modo firma, saturatius virentia, subacris saporis. *Flore* & *fructu* carere adfirmabant incolæ. *Visa* in desertis veteris Castellæ & Baticæ locis.

Clus. H. P.
l. c.

Ex Exoticis huc pertinet *Amazquil* Terentii. Videtur esse arbor. *stipes* pullus. *Ramis* folia *Phillyreæ* latifoliæ. *Baccæ* sunt virides, brevi adnexæ pediculo.

Reccus R.
M. N. H.
p. 350.

ARTICVLVS IV.

De Arboribus Bacciferis Classis quarta.

PUNCTVM I.

De Philyca.

Philyca.

Vid.

TABVLA
LXXIV.

Theophr.

H. P. l. 1.

c. 15. l. 3.

c. 6. & l. 5.

c. 7.

Plin. H. N.

l. 16. c. 26.

Theophr.

H. P. l. 3. c. 6.

Plin. H. N.

l. 13. c. 22.

Theophr.

H. P. l. 1.

c. 15.

Clus. H. P.

l. 1. c. 33.

Lobel. Ob.

serv. p. 566.

Arbores Bacciferæ Classis quartæ sunt 1. *Philyca*. 2. *Celastrus*. 3. *Rhamnus*. 4. *Lycium*. 5. *Rubus* & 6. *Capparis*.

I. *Philycam* nemo ex *Veteribus*, quantum scio, descripsit. Theophrastus ex sylvestribus perpetuo vivere, ineunte vere germinare; candorem ei *Celastris* modo, & semper fronde insignem prodidit. Eidem *materies* ὑποτάτατος rigidissima, vel potius ἀτομάτατος, obedientissima, ut

Gaza legit & vertit. Plinio *Alaternus* dicitur, qui inter arbores fructum nullum ferentes, hoc est, ne semen quidem, refert; & cui inter ilicem & olivam folia. Huc & *Apharca* pertinet, de quo ita Theophrastus ex Salmasii correctione. Ἀφάρκη καὶ ἀφάρκη τὸ μὲν πρῶτον πεπαινεσθαι ἀμα τῷ βότρῳ περικάζοντι ἢ ἀνδρῶντι. Τὸ δὲ ὑστερον, δόκει γὰρ ταῦτα διμαρτα, ἀρχομένη τε χειμῶνος. *Adrachne* & *Apharca* fructum primum variante se uva aut florecente; alterum, (bis enim istæ ferunt) hyeme maturant. Plinius

incipiente uva pubescere scripsit; id est desinente florere, & fructus ostendente rudimentum. Addit Theophrastus ex sylvestribus perpetuo vivere.

II. RECENTIORIBVS est *Philyca* duplex, *elatiore* & *humiliore*.

I. *Philyca elatiore*, Camer. est *Alaternus*, Bellon. *Eleprinos Cretensum*, Lobel. *Spina cervina quorundam*, *Alaternus Plinii*, & *Bourgespine Monspeliensium*, Lugd. *Apharca Theophrasti*, Cæsalp. *Celastrus mas*, Clus. *Alaternus prima*. Arborefcit interdum, inquit Clusius, longis ramis, non admodum crassis, neque in multas alas divisis, flexilibus deinde virgultis, quæ externo cortice e candido virescente integuntur, latente sub eo membrana quadam flavescen-

te, quæ lignum ambit: ramos vestiunt incondito ordine disposita folia media inter oleæ atque ilicis magnitudine, crassiuscula, leviter per ambitum serrata, ex viridi nigricantia, gustu ingrata, & cum amaritudine paululum mordicantia: ad singulorum foliorum, qui in ramulis nascuntur, exortus, flores oleæ similes, coloris ex herbido pallescentis, racematim ex oblongis pedicellis dependent vere, interdum etiam media hieme. Nullum in eo fructum vidi. Provenit Ulyssiponenfi agro, locisque vicinis. Diversa ab ea *Spina Bourgi* Monspeliensium. Cortex enim huic niger, cerasorum similis: *materies* ex luteo pallida: folia oblonga, subrotunda, nonnihil spinosa; flores parvi, albidii & mense Majo prorumpunt. *Baccæ* nigrae, numerosæ, rotundæ, racemum æmulantes, in quibus semina tria, florent a Septembre ad Aprilem & Majum in arbore. Quam *Apharcam* Theophrasti Lugdunensis credit, est frutex Mali Punicæ magnitudine, radice crassa, caudice ex cinereo albicante; adpectu tristi, foliis ima parte angustis, superna latiusculis, Portulacæ modo, obtusis aliquando, interdum in acutum fastigium terminatis, per ambitum infectis, incisurarum eminentiis rigidiusculis, carnosiss, ilicis, aut Oleæ modo venosis, elata costa per medium divisis: flore albo; baccis racematim coherentibus, cum maturuerint, nigris, gustatu subdulcibus. Provenit in asperis & saxosis oræ maritimæ locis, non procul a Monspeliense urbe, qua Vicum itur, pagum Apiano vino percelebrem.

II. *Philyca humiliore* Cæsalp. est Clus. H. P. *Alaternus folio ad ilicem accedente*, Lugd. *Celastrus scemina Theophrasti*, Clus. *Alaternus alter*, Lobel. *Alaternus al-*

Rauh. H. P. l. 1. c. 21. p. 542.

q. 2. 1.

Lobel. Ob. serv. l. c.

ter

ver humilior, folio lato. Multo priore humilior. *Rami* breviores. *Cortex* ex albo, viridi & purpurascens infectus. *Folia* magis circinata rotundicatis, in ambitu ferrata. *Flores* e longiusculis pediculis, odoris magis herbacei. *Februario & Martio* prodeunt. *Fructus* racemosus, lentiscini magnitudine, viridis initio, hinc nonnihil rubescens, tribus nu-

cleis constare videtur. *Prodit* in Lusitania, regno Granatensi, & Valentino. *Colore* ex cortice in aqua decocto piscatores retia sua tingunt: tinctores vero e fragmentorum ligni, quod pallet, decoctione, nigrescentem e caeruleo colorem conciliant. *Alaternum* autem *Plinii* Philycam Theophrasti esse, ait montis Aethiolicis creditum, prodente Bellonio.

Bellon. Observ. l. 1. c. 42.

PUNCTVM II.

De Celastro.

Vid.

I.

TAB. LXXV.
Theophr. H. P. l. 1. c. 15. l. 3. c. 4.
Theophr. H. P. l. 3. c. 14. l. 5. c. 7. & 8.
Theophr. H. P. l. 1. c. 6.

Celastrum nemo apud *Veteres*, Theophrastum si excipias, mentionem facit. Sed nec is totam ejus dedit descriptionem. Recensetur inter arbores αειφύλλας. Tardissime floret: fructum propter ingruentem hyemem perficere non potest. Summis gelidissimisque locis ita gaudet, ut & in plana descendat. cultum nullum patitur. *Ufus* denique ejus πρὸς μυάγρας καὶ βαντηρίας, ad muscipulas & baculos.

In novellorum ramusculo. *Celastrum* extrema parte inter folia nascuntur uncialis longitudinis petioli, sustinentes quinque aut sex parvos *flosculos*, quatuor plerumque aut quinque foliolis ex flavo virescentibus constantes, suaviter odoratos, racematim lentisci flosculorum modo dispositos, non ut tini aut sambuci, umbellæ instar expansos; qui sero admodum aperiuntur, & nisi extremo autumno, aut hyemis initio, imo etiam, (quando minor aura) veris initio: ut anno Ch. 1606. ex ramis florentibus a Cl. V. D. P. Pauwio, mense Martio ad me missis, observare potui. Eam ob causam fructus maturari non potest: imo si æstas humida & frigida fuerit, qualis hoc anno Christi 1607. vix flores aperientur: etenim flosculorum gemmas duntaxat ostendebat Octobri mense. *Fructum* observavit post Clusium Pavius, cujus verba subjicio. Anno MDCX. mense Junio *fructus rudimentum* ostendere cæpit, produciens brevem pediculum, cui adhærebat bacca, myrti baccis magnitudine similis. Hæc quamdiu in accretione erat, viridem: justam adeptam magnitudinem rubrum exhibebat colorem; qui paulatim ex puniceo corallinus reddebatur, adeo, ut asparagi maturam baccam (de minoribus loquor) te videre dixisses. Arridebat gratissimo hoc colore, ad Augusti usque initium, bacca: tunc enim paulatim corrugari incepit cutis sive exterior superficies, simulque colorem mutare: fuscedinem namque contrahebat, tandemque adustam nigredi-

Clus. in Clus. posterioribus.

II. Ex RECENTIORIBVS descripsit *Celastrum* Clusius, ex arbore, quæ in horto Academiae Lugdunensis, meo adhuc tempore, habebatur. Arbor, inquit, humanam superat altitudinem: firmoque & duro caudice constat, atque in frequentes ramos diviso, qui dum novelli sunt, viridi cortice integuntur, annotini vero fusco. Numerosa habet folia, ex adverso semper nascentia, densaque serie congesta, supina parte satuta viriditate prædita, prona autem dilutiora, perennia, hoc est, quæ non defluunt, nisi novis & recentibus jam natis, ut in arboribus perpetuo virentibus plerumque accidere solet: splendent vero præ livore ea folia, nec Alaterni foliorum magnitudinem superant, imo pleraque sunt illis minora, præsertim annotina, quæ ramulorum infimam partem occupant sive vestiunt, nec in ambitu sunt crenata, præterquam novella, quæ crenarum quandam formam extrema parte habere videntur: attamen vere crenata dici nequeunt; amariusculi sunt sa-

Celastrus. nigredinem. Simul etiam ipse fructus figuram suam mutare, ac ex rotundo oblongus fieri cœpit. Postquam decidisset, repertum intus semen unicum, oblongum, quodammodo triangulare, uvarum vinaceis admodum simile; cujus cortice (durior is erat & quodammodo offeus) diffracto, prodiit granum quoque unicum, rectum membranula crocei coloris, eaque ablata, medulla sive caro durior, albicans, ei similis, quam nux avellana ostendere solet.

PUNCTVM III.

De Rhamno.

I.

Rhamnus.
TABULA
LXXV.
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 17.
Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 119.

Plin. H. N.
l. 24. c. 14.

Rhamnus *Veterum*, quem Plinius inter genera Rubi male refert, in *duplici* est apud Theophrastum & Plinium, in triplici apud Dioscoridem *differentia*. Non potest tamen negari, quæ de secundo genere apud eum dicuntur, in MSS. codice, quo Goupylus usus est, non existisse. *Primum* Rhamni apud Dioscoridem genus, *virgas* gerit rectas, *ὄξείας ἀκάνθας*, Oxyacanthæ modo aculeatas; *folia* *μικρά*, vel potius *μάκρᾱ*, *ὑπομήκᾱ* (aliis *ἐπιμήκᾱ*) *ὑπολίπαρα*, *μάλακα*. Unde forte Nicander *ἐρσόμενον* seu rore madidum dixit. *Nascitur* *περὶ φράγμῃς*. *Alterum* genus est *λευκότερον*, candidum; cujus ut dixi, nulla in quodam Dioscoridis MS. mentio. Deerant enim verba *ἐστὶ δὲ καὶ ἑτέρα παρὰ ταύτην λευκότερα*: sed ponit Theophrastus & cum eo Plinius: Oribasius quoque cum Serapione vel potius ejus interprete legere videtur. Fruticosior ista Plinio, *floret*, ramos spargens rectis aculeis, non ut ceteri aduncis, *foliis* majoribus, illisque perpetuo virentibus. *Tertium* *μελάντερον*, *nigrius*, Plinio *sylvestre*, cui *folia* *πλατυτέρα*, *σὺν τῷ ἔρῃμα ἐρυθράνθησαι*, quadantenus rubentia: *virgulta*, quorum in longitudine cubitorum, spinosiora, sed minus firmis, rigidis & acutis aculeis. *Fructus*, *latus*, *candidus*, *tenuis*, *ὡς θυλακώδης*, quasi *ἰοικὼς σπονδύλῳ* similis verticello. *Ἀσφοδελῶ* alii habent; *σπονδυλῶ* Oribasius, quomodo & Serapionis interpretis legisse videtur. *Usus* si spectes, deficcant & refrigerant omnia.

Galen. *simplic. Medic.*
l. 8.

Ideo Galenus unius tantum Rhamni meminit. *Folia* teneriora inprimis Erysipelatis & herpetibus egregie inunguntur. *Ramos* januis

& fenestris oppositos, veneficia pellere vulgo olim creditum. *Rhamnum tertium* eandem cum *Paliuro* esse, multorum est sententia. *Donæus* ad descriptionem Paliuri, quæ imperfecta & manca sit, pertinere scribit. Notus est apud Dioscoridem frutex *Paliurus*, aculeatus, solidus, cui semen pingue & Lini seminis æmulum, vel potius *λινώδες*, vel *λικοειδές*, sed *λιγνυώδες*, quod non tantum fuscum est, sed & oleosam naturam, qualis ex oleoso aliquo humore digitis deprehenditur, habet. *Theophrasto* frutex est, cui folia cum extremorum lateribus sinuata concidunt. Fructum post occasum Vergiliarum *ἐν λοβῷ τινὶ* reddit *ὑπὲρ τῶν φύλλων*; inque eo terna vel quaterna semina, quibus medici contra tussim, propter quandam *γλυχρότητα* & pinguedinem, contusis utuntur. Habet nonnullas differentias; & omnes fructiferae. Apud Dioscoridem *radix* trita recentia oedemata discutit; *Folia* adstringunt, & contra venena & venenatorum morsus opitulantur. *Semen* potum tussim lenit, vesicæ calculos pellit, & serpentum ictibus medetur. An hæc Rhamno Dioscoridis competant, dubito. Aliud certe est *θυλακώδης* esse; aliud fructum *ἐν λοβῷ* proferre. Paliuri fructus in duro ac rotundo officulo concluditur.

Robert.
Const. ad
Theophr.
H. l. 3. c. 17.
Dodon.
Pempt. 6.
l. 1. c. 16.
Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 121.

Theophr.
H. P. l. 1. c. 8.
l. 3. c. 6. 17.
l. 4. c. 4.

II. RECENTIORIBVS Rhamni differentia, a *floribus*, *foliis*, & *viribus* sumitur.

I. A *floribus* est triplex, 1. *flore candicante*, *spinis oblongis*. 2. *flore purpureo*, *foliis salsis*. 3. *flore herbaceo*, *baccis nigris*.

I. Rha-

Theophr.
H. P. l. c.
Bod. Stapel.
ad H. P.
Theophr.
p. 259.
Lobel. Ob-
serv. p. 598.
Advers.
p. 438.
Clus. H. P.
l. 1. c. 77.

1. *Rhamnus flore candicante, spinis oblongis*, Theophrasto *Rhamnus candida*, Lobel. *Rhamnus alter Dioscoridis*, *Monspeliensium*, Rauwolfio, *Hau-segi* sive *Rhamnus primus*, Bodæo *Rhamnus communis* dicitur. *Radix* ipsa multiplex & crassa: *virgæ* re-
ctæ; candidus & lævis *cortex*; *aculei* validi ac firmi, spinæ in modum hor-
rentes: *folia* plerumque quaterna aut
quina ad singularum spinarum exor-
tus nascuntur subpinguia, mollia,
subalbida, oleæ similia, nisi quod re-
nera sunt & succulenta auctumno,
novis succrescentibus, interdum de-
cidua. *Flores* auctumno longiuscu-
li, candicantes, extremis oris in quin-
que crenas divisi, quibus decidentib-
us, *seminis* quoddam rudimentum,
ut in *Jasmino* relinquitur, quod in
baccam rubentem pisi magnitudine
mutatur. *Floret* Martio & Auctu-
mno. *Nascitur* in Italia, Gallia Nar-
bonensi, & multis Hispaniæ locis.
Bellonius in insula Lemno, in Mace-
donia, circa Sues in planitie Arabiæ,
inter Cairum & Hierosolymam co-
piosum, sterilibus etiam locis obser-
vavit. *Vsus* in sepibus faciendis, &
insolandis ficibus, quæ recentibus
aculeis transfiguntur. *Salamanticæ*
eduntur cum turionibus ex aceto &
oleo primis mensis; inestque quæ-
dam cum acrimonia aciditas, quæ sa-
poris gratiam conciliat. Sunt, qui ex
hac spina *coronam Salvatori* imposi-
tam opinantur: a quibus abeunt illi,
qui ex acacia Indica plexam volunt.
Congener huic ille, si non idem, flo-
ribus demtis, quem Bauhinus *Rha-*
mmum cortice albo Monspeliensem vo-
cat. Spinæ huic in caudice magnæ, in
ramulis minores; grandioresque acu-
lei, qui palmum longi, rigidi, acuti,
alios aculeos parvos, non minus rigi-
dos pungentesque pariunt. *Cortex*
ramis & spinis cinereus; *folia* salicis
terna vel quaterna, fragilia, candi-
cantia, succulenta, nullo insigni sapo-
re: *flores* pauci, laureolæ folio deci-
duo similes, parvi, subcærulei. *fru-*
ctus Bauhino non observatus.

Bauhin. H.
P. l. 6. c. 11.
p. 32.

Clus. l. c.
Dodon.

2. *Rhamnus alter, flore purpureo, foliis salsis*, Clusio *Rhamni prioris al-*

tera species, Columnæ *Rhamni species*, *Rha-*
quæ spina sancta, Dodon. *Rhamnus* mnus.
primus alter, humilior est, & fre-
quentioribus ramis fruticans. *Folia*
minora, superiore carnosiora & can-
didiora, salsoque gustu. *flores* ejus-
dem formæ, sed purpurei. Clusius
juxta Horivelam urbem, quæ Orce-
lis veteribus ad flumen Serabim, nunc
Segura, Valentini regni extremis li-
mitibus, collegit. Eadem est *Bello-*
nii, secundum littus maris rubri vi-
sa, foliis admodum densis, salsis albi-
cantibus; ramis spinis obtusis.

Pemt. 6.
l. 1. c. 16.

Bellon. obs.
l. 2. c. 59.

3. *Rhamnus flore herbaceo, baccis nigris*, Theophrasto *Rhamnus nigra*,
Clusio *Rhamnus tertius*, Lobel. *Rha-*
mmus primæ speciei tertius, frutico-
sus est. *Rami* frequentes; *cortex*
niger; *spinæ* longæ; *folia* ex quibus-
dam tuberculis, multa simul enata,
longa & angusta, carnosæ, viridia,
perennia, & quæ Rhabarbari sapo-
rem utcumque referunt. *Flos* veris
initio, parvus, herbaceus, & confer-
tim juxta folia nascitur. *Fructus*
æstate niger, parvo pruno sylvestri
similis, rotundus, acerbus, Clusio ex
Hispaniis sub nomine *Lycii* missus.
Frequens Murciano & Granatensi re-
gno, locis incultis. *Provenit* & in
Belgio sata. *Fructus decoctum* ad la-
xitates membrorum & podagram in
usu apud incolas.

Clus. H. P.
l. c.
Lobel. Ob-
serv. l. c.

II. *A foliis desumptus Rhamnus est*
triplex, 1. *folio salicis angusto, fru-*
ctu flavescente. 2. *folio subrotundo,*
fructu compresso. 3. *foliis oblongis*
ferratis.

1. *Rhamnus folio salicis angusto*, Clus. H. P.
fructu flavescente, dicitur *Rhamnus* l. c. p. 110.
secundus Matthiolo, Dodon. & Clu-
sio, *Oleaster germanicus* Cordo & Bau-
hino, *Rhamni species* Camer. *Rha-*
mmus primus Dioscoridis Lob. *Hippo-*
phæ Dioscoridis forte Columnæ, to-
tus pulvere respersus videtur. Sex
sape est cubitorum, aliquando pro-
cerior. *Radix* multifida & diffusa.
Caudex intortus; *Cortex* spadiceus;
aculei longi, fescunciales & sex ran-
tales. *Folia* totis ramulis furculisque
adnascuntur, oblonga, oleæ similia,
minora

Bauh. H. P.
l. 6. c. 12.
p. 33. Do-
don. H.
P. l. c.
Matthiol.
ad Dioscor.
l. 1. c. 102.
p. 145.
Lobel. l. c.
Cordus in
observat.
p. 223.

Rhamnus. minora tamen, tenuiora & brevissima, quibus subtus lanugo tenuissima canescens, superius in viridi cinerea, odore nullo. *Flos* olea herbaceus circa ramos frequens. *Fructus* baccæ seu acini rotunditate ac magnitudine myrti in se numerosa congerie racematim compactus, ac ramis per exiguo petioli adpendice adfixus, colore flavescente ac luteo, maturitate crocato; unico intus *nucleo* aut vineo, non lapidoso, sed qui dentibus facile atteri possit. *Cordus semina* baccis esse similia scribit, parva, oblonga, utrimque acuminata, pallenti tunica involuta. *Succo fructus* triplex mixtura; *Oleum* nempe, quod in expresso supernatat, gustu pingue & subacidum; *aqua*, quæ medium supra fraces & infra oleum locum occupat; & *caro*, quæ fundum vasculi perens in fraces acescentes transit. Hanc innuere videtur Theophrastus, cum peculiare racemis quod per caulium latera serpunt, scribit; postremoque caulis racemus omnium maximus propendet. *Floret* Junio: post autumnum demum baccæ maturantur, & subinde tota hærent hyeme. *Provenit* in Germania, Gallia, Italia, Hispaniæ locis maritimis circa fluvios & amnes, solo lapidoso & glareoso; imprimis ad Lycum Vindeliciæ amnem, & ad Danubium ab ejusdem Lyci ostio ad Petreas fauces, per quas Danubius fluit. Circa Rhenum quoque multis tractibus. Circa Curiam Rhetorum, arborefcebat spinis, & adæquabat truncos magnitudine. *Frondebis* adornantur in Belgio autumno cubacula. Siccæ mures adlicere prodidit Cordus. *Fructus* salivam eliciunt; paraturque ex iis Rob vehementer acidum. Duplicem ejus *iconem* damus, Clusii & Bauhini. Huc forte *Rhamni secundi genus Cæsalpini & Ruellii pertinet.* 1) *Rhamnus secundus Cæsalpini* arborefcit ramis rectis, salicis modo, cortice minus candido, *foliis* angustioribus longioribusque (quam *Rhamnus Monspelienfis*) non pulposis, veluti pulvisculo ferrugineo inferne oblitis: juxta folia *folliculos* quosdam tenues

sine flore fert, hordei figura & magnitudine, pulvisculo scintillante oblitos, colore ferrugineo; ii in maturitate parvæ olivæ speciem gerunt, rubentes: succo intus croceo, tenui tunica incluso: maturantur hyeme: *femen* unicum continetur nigrum, aculeos rariores habet acutioresque, sed infirmiores. Peregrina hæc in Hetruria. 2) *De Rhamno Ruellii* hæc habentur, nasci in maris adflatu, frutice nonnunquam arborefcente, prælongis ramulis, qui rigidis armantur *spinis*, aculeis mucrone sævientibus, *foliis* tam æmula facie ligustrum exprimentibus, ut pro illis fallant, *bacca*, folliculari specie, verticillata, primum candida, post maturitatem rubescente, foris flaccida, intus uliginosa, quam pastores pecorum pabulo decutiunt.

2. *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso*, est *Rhamnus tertius Dioscoridis*, Crescentio *Spina Judæica*, Cordo *Rhamnus niger*, Bellon. *Paliurum & Apaliura Græcorum*, Cæsalp. *Jujuba sylvestris*, Marruca, & *Paliurus Africanus Theophrasti*, Dodon. & aliis *Paliurus*. In arboris aliquando magnitudinem excrescit. *Materies* est dura; *Virgæ* rectæ; & ab his *rami* patuli, deorsum inflexi, subrubentes; quos tenues, rigida & mordaces armant *spinæ*. *Folia* jujubinis similia, sed minora, nec ita profunde per oras crenata. *Flores* juxta ea parvi, stellati, orbiculati. *Fructus* lati, per margines membranæ, compressi, prominente utrimque umbone lignoso, cujus medio pediculus inferitur, qui diffracti, in geminis vel ternis loculis totidem ostendunt *semina*, lubrico lævore & colore seminum lini, sed rotundiora, torosiora, pulpa dulci, coloris fere porracei. *Fructus*, (ut describit Cæsalpini), depressus ex tenui pediculo pendet, pulpa quadam fungosa circumducta, officulo intus duro, intra quem tria seminis conceptacula singulis feminibus donata, quæ in suis alveolis tintinnabuli modo sonant. *Floret* Majo & Junio: fructus autumno maturefcit, & tota hyeme arbori

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 18.

Bauhin. H.
P. l. 6. c. 14.
p. 35.
Dodon.
Pempt. 6.
l. 1. c. 17.
Cord. obs.
serv. p. 222.

arbori adhæret. *Crescit* ex vetusto semine, si bene in vasculo muniatur. *Visitur* copiosus in Gallia Narbonensi, inprimis qua Monspelio Lunellam itur, inter sepēs: in Italia, circa Veronam & Bononiam. Norimbergæ potest hyemem, si non nimis acris, ferre. Basileæ in horto Plateri in arborem excrevit. *Semina* contusa ad tussim commendantur. Platerus contra calculum & arenulas utebatur.

Bauhin. H.
P. 1.6. c. 25.
p. 57.

3. *Rhamnus foliis oblongis serratis*, Dalechampio *Rhamnus Bavaricus* vocatur. Superat hominis altitudinem: cortice est purpurascens, spinoso; foliis densis, pallidis, omnibus serratis, sed aliis longioribus & angustioribus, prima scilicet ramorum parte, nec illic dissimilibus, aliis brevioribus & rotundioribus, circa ramorum extrema Rhodis folia utcumque æmulantibus, spinis multis, tenuibus, sed acutissimis, foliosis.

II. A viribus dicitur *Rhamnus catharticus*, isque triplex, 1. vulgaris, 2. folio oleæ, 3. minor.

Clus. H. 1. 1.
c. 79.
Bauh. H. P.
1.6. c. 25.
Cord. H. P.
1.3. c. 4.
p. 175.
Matthiol.
ad Dioscor.
1. 1. c. 102.
p. 144.

1. *Rhamnus catharticus vulgaris*, Clusio & aliis *spina insectoria*, Cordo *Cervi spina*, Lonic. *spina alba*, Castori *spina merlo*, arbutula est ramis ex aduerso sitis, brachiata, duris, rigidis, longis & foliosis aculeis minax: spinis etiam aliis minoribus horrens. Cortex externus niger, cui viridis & luteus subest: materies pallida, dura; interior medulla Hermolao rubet. Folia fere pruni, acuminata, atrovirentia, crenata, nervosa, adstringenti sapore. Flores parvi, herbacei coloris, quatuor apicibus insignes, multi simul juncti, Majo funduntur. Baccæ ad radices spinarum ex longiore pediculo frequentes, per maturitatem nigræ; quibus succus virens, peculiaris odoris, grana tria vel quatuor, triangularia fere, pyrorum granis fere similia, sapor nauseabundus; in auctumno maturitas. Nascitur locis incultis, ad rivulos aquarum & scrobes; in senticetis, sepibus & agrorum limitibus. Ad vias inprimis, unde Germanis *Weg-*

dorn, quasi spina viarum dicitur. In Germania copiosa est: in Pannonia sæpe arborefcit. *Ufus foliorum, corticis & baccarum* egregius. Folia quia frigida & sicca, utiliter serpentibus ulceribus illinuntur. Cortex interior cum modico aluminis aduersus oris ulcera & putredines decoctus, in gargarismo a mulierculis adhibetur, singulari successus experientia. Baccæ messis tempore lectæ, arefactæ, in aqua & alumine maceratæ, luteum seu potius croceum colorem fundunt, quo olim libri pingebantur, nunc chartæ. Auctumno collectæ nigræ, rufæ, si in æreo vase adseruentur, dant pulcre viridem. Circa festum Martini decerptæ, ad puniceum colorem, quo coria inficiuntur, adhibentur. Eadem intus sumtæ, secundum Matthiolum pituitosos, viscidos & biliosos humores; secundum Bauhinum & Medicos Parisienses serofos, tenues, biliosos per secessum deiciunt. Sumuntur in substantia XV. vel XX. decoquuntur a XL. ad LX. decoctum propinatur. pulverisatæ a drachma una ad unam semis, si Dodonaum sequimur: qui addit, vehementer corpus turbare, moto etiam quandoque vomitu. Ideo mollibus & delicatis noxias: robustis duntaxat & juvenibus exhibendas. In syrupo si propines, non est, quod aliquam, etiam in mollioribus molestiam metuas, nisi forte in impuriora incideris corpora. Paratur is ex succi maturarum rite depurati libris quinque, mellis & sacchari ana libra una semis, additis pro unaquaque libra cinnamomi & seminis anisi conquassatorum ana drachmas ij, quæ in petia ligata immerguntur. Cl. Zwelferus, Medicus Cæsareus, aliter parat, & melius. Dosis ab unc. j. ad ij. In Silesia circa Carolathum perillustis Baronis Schöeneichii arcem, arborefcens, nullis fere spinis horridam, observavi. Baccæ decussatim per longitudinem striatæ, partim ex ramulis, partim foliorum alis funduntur, in superioribus copiosiores.

Rhamnus.

2. *Rhamnus catharticus folio oleæ*, Anguillara Anguillaræ Hippophaës, suffrutex est spinis

Zwelfer. in
pharm. Aug.
gust. p. 60.
pr. edit.

Rhamnus.
Bauh. H. P.
l. 11. p. 411.

Spinis durissimis, quique se in comam rotundam, albam, spargit. *Folia* oleæ longiora, angustiora & teneriora. Nec flores visi, nec fructus. *Radix*, quæ palmum longa, lacteum succum fracta fundit, amarissimum, odore gravi. *Prodit* in Peloponnesi maritimis & fabulosis. *Radix* vim purgandi vehementissimam habet. An sit *Hippophæstum* quorundam Dalechampi, difficulter colligas. Missa vero ad hunc erat ex Melita insula, cum hujus nomine, spina candida, diffusis huc illuc ramulis aut potius spinis sparsa, flore exiguo albo, racematim congesto. De succo radice lacteo vel purgatrice vi nihil additum.

Clus. H. P.

3. *Rhamnus catharticus minor*, Ca-

merario, *Rhamni solutivi minor* spe. l. 1. c. 79. *Cies*, Clusio *spina insectoria pumila* Bauhin. H. P. l. 6. c. 25. p. 56. *prior*, bicubitalibus ramis, in multas divisas alas adfurgit. *Cortex* lævis, & vulgari similis, qui superiori membrana demta ex viridi pallescit, sapore amariuscule. *Spinæ* ramulis paucæ, sed ipsi plerumque in spinas desinunt. *Folia* vulgari fere similia, sed minora & angustiora, ad pruni sylvestris folia accedunt, gustu linguam exsiccante. *Flos* congestus ut in vulgari, ex pallido herbaceus, quatuor foliolis constans, minor tamen. *Bauhinus* illi adscribit *folia* ex eodem pediculo plura, acuminata & crenata. *Baccas* terebinthi æmulas, & magnitudine, & turbinata forma in acumen desinente.

PUNCTVM IV.

De Lycio.

Lycium.
Vid.

LXXVI.

TABULA.
Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 132.

I.

Lycium Dioscorides duplex facit. *Vulgare* nempe & *Indicum*. I. *Lycium vulgare*, quod quibusdam *πυζανθα*, arbor est spinosa. *Radices* habet multas, *πλαγίας* (*πλατείας* alii legunt, & Plinius latas scribit) & lignosas; *virgas* trium cubitorum aut etiam longiores, circa quas *folia* buxo similia & densa. *Corticem* pallidum lycio diluto similem. *fructum* piperis instar, nigrum, amarum, densum, lævem. *Plinius* piperis similitudinem ferre dixit, præcipua amaritudine, foliis parvis densisque Cypri modo, ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata lignosaque, buxei coloris. *Nascitur* plurimum in Cappadocia, Lycia, Pelio monte, pluribusque aliis locis, & *τραχία ὄρεα* amat. *Χυλίζεται*, inquit Dioscorides, *τῶν φύλλων* (*ρίζων* legit Oribasius) *σὺν τοῖς θάμνοις*, *θλαδέντων καὶ βραχέντων ἐφ' ἡμετέρας ἡμέρας εἰς εἰσηδέντων*. (Plinius rufos ramos radicesque æneo vase per triduum coqui scribit.) Abiectis lignis coquitur liquor, donec mellis crassitudinem acquirat, Lycium vocant. Adulterat medicamentum asphodeli radix, aut fel bubulum aut absinthium, aut rhus, aut amurca. Quod in amurca

ἀφροδὲς innatat, inter oculorum medicamenta censetur. Similiter e *fructu* expresso & insolato succus elicitur. Optimum esse putatur, quod igni accenditur, & regio morbo medetur. quodque dum restinguitur, rubentem fumum edit, extrinsecus nigrum, intus cum dissecueris, fulvum, minime virosum, cum amaritudine adstringens, colore croceo. *Vires* apud Dioscoridem vide. Galenus diversarum esse partium scribit, digerere & desiccare; usumque ejus ad sugillata, oris & ani ulcerationes, herpes, ulcera contumacia, & aures pure fluentes. Dabatur & tussientibus, sanguinemque exspuentibus, ex aqua. II. *Lycii Indici* historiam confundit cum priore Plinius, ut ex comparatione animadverti potest. Dioscorides fruticem vocat, *Lonchitin* nomine, e spinarum genere, cui *virgæ rectæ*, *τετρήχεις* aut etiam majores, a fundo numerosæ, & crassiores rubo; *folia* oleæ similia; *cortex*, qui *ραγίς ἐνερευθής*, ruptus rubescit. Lycium quod ex eo, optimum. Herba decocta menses ciet.

II. NOBIS Lycium a *foliis* & *locis* differentias sortitur.

I. A

1. *A foliis* est duplex 1. *Buxi folio*. 2. *Latifolium*. 3. *folio Erica*, quo frutex exiguus foliolis confertus spectat.

Dodon.
Pempt. 6.
l. 1. c. 19.
Matthiol.
ad Dioscor.
l. 1. c. 114.

1. *Lycium buxi folio*, Dodon. *Pyxantha*, Lugd. *Lycium alpinum*; superius a Dioscoride descriptum proposuimus. Bellon. etiam in Palæstina reperit. Apud Matthiolum nihil præter iconem occurrit; quæ, ut & Dodonæi pro fictitia habetur. *Succus*, qui pro vero Lycio venditur, periclymeni succus est, calidæ & attenuantis facultatis.

Lobel. Ad-
vers. p. 437.

2. *Lycium latifolium* est *Palmarum alter peregrinus Lobelii*. Oritur in Monspeliensi agro, qua itur ad scaturiginem Lani amnis, secus ripam, & prope vias. *Spinis* horridum, *foliis* oleæ, minoribus, *baccis* nigris, tricoccis, *Smilacis*, gravidis, *lucio fulvo*, tincturæ apto, prægrandibus, *Berberis* modo, granis ternis, sed minoribus, oblongis, gustu subacri. *Bauhinus* monet, *Lobelium* in iconibus titulum habere, sed subjectam figuram non convenire, quæ sub *Rhamno* III. repetatur, & sit *Oxyacanthæ* Dioscoridis.

Garzias H.
Arom. l. 1.
c. 10.

3. *Lycium Erica foliis*, est *Cate Garziæ*. Indis *Hacchis*, & *lignum sempervivum*. Arbor magnitudine fraxini, *folio Erica* vel *Tamaricis* simillimo, perpetui viroris. Multæ illi *spinæ*: *materies* robusta, dura, solida, ponderosa, nec putredinis metuens. *Nascitur* plurimum in *Cam-baya*, præsertim *Baçaim*, *Manora* & *Damam*; nec non in continenti *Goæ*. Inde magna ejus quantitas in *Chinam* & *Malaccam*, ubi eo in masticatoriis cum *Betre* utuntur; minor in *Arabiam* & *Persiam* evehitur. *Extrahitur* nempe ex arbore succus, *Cate* dictus. *Elixantur* minutim concisi rami, contunduntur, & cum farina *Nachani*, (sementis est nigra, & minuta sapore, secalinis panibus conficiendis apta) & ejusdem nigri, lini quod istuc nascitur scobe, pastilli & tabulæ formantur, quæ in umbra ficantur. *Firmat* stringendo gingivas,

& alvi profluvii oculorumque dolore *Lycium*. *Wormii Cate* massa quædam purpurea erat, ad nigrum inclinans, laminatim quasi cohærens, fissilis & friabilis, dura, sed fragilis, adstringens cum levi acrimonia, unciarum duarum ferme pondere. Ex ligno pistilla deglumandæ in mortariis ligneis oryza parantur.

Wormius
in Museo
c. 34. p. 225.

4. *Frutex exiguis foliolis confertus*, est Hispanorum *Tamoxo*, in incultis nascens. Ad surgit is pedali altitudine, frequentibus ramusculis præditus, qui adeo exiguis & confertis foliolis onusti sunt, ut ramusculorum lignum vix conspici possit. Ea ex cinereo virentia sunt, & extremæ amaritudinis. Vix scias, an veteribus fuerit cognitus.

Clus. H. P.
l. 1. c. 78.

II. *A locis* dividitur *Lycium* in 1. *Italicum*. 2. *Hispanicum*. 3. *Gallicum*. 4. *Indicum*. 5. *Creticum*. 6. *Lycio adfinis Aegyptiaca*.

Clus. P. P.
l. 1. c. 79.

1. *Lycium Italicum*, *Clusio* *spina insectoria pumila altera*, *Gerhardo* *Hispanicum*, facie est pruni sylvestris. *Rami* illi cubitales, crassitudine minimi digiti, in acutam spinam desinentes, quibus cortex niger & rugosus. *Folia* pruni sylvestris, sed breviora, minora & viridia, crenata, adstringentis primo, mox amaricantis gustus. *flores* inter folia herbacei, *τатарόφυλλοι*: qui *Majo* & *Julio* funduntur. *Fructus* spinæ insectoriæ non absimilis, binis vel ternis commissuris distinctus, initio viridis, per maturitatem niger. Abunde in monte *Badensis* thermis imminente provenit, locis petrosis & salebrosis. *Cujus* iconem *Stapelius* dedit, recentiores pro vero Lycio exhibent. *Spino*sa est arbor, ramis tres cubitos longis, aliquando etiam longioribus, cortice pallido, foliis densis, spissis, buxeis: fructu instar piperis nigro, amaro, glabro, & denso; radicibus multis, fortibus & lignosis. *Nascitur* in *Lycia*, unde & nomen habet; & in *Cappadocia*, multisque aliis locis. Solum amat asperum; reperitur etiam in Italia.

Bodeus
Stapel. ad
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 17. p. 354.

Lycium. 2. *Lycium Hispanicum* duplex est, folio nempe oblongo & folio buxi. 1.

Lobel. ob- De *Lycio Hispanico folio oblongo*, ita
serv. p. 563. Lobelius. Spinæ Burgundiacæ aut

Phyllyreæ angustifoliæ non ita ab-
similem perelegantem fruticellum, fo-
liis tamen multo angustioribus & ra-
mulis exilioribus studiose alunt in Bel-
gio Joannes Brancionus, Dilphius,
& Georgius Ryensis. Extrema infe-
sta spiculis virgulta; folia Thymelææ
Monspeliacæ exiliora, atrovirentia,
gustanti adstringentia. Apud Belgas
nullum fructum edit. II. *Lycium*

Clus. H.P.
l. 1. c. 78.

Hispanicum folio buxi, Castellanis *Tamujos* sive *Tameaxos*, frutex est spi-
nosus, cui multæ a radice virgæ, cu-
bitales, rectæ, tenues, rubentes, mul-
tis ramulis præditæ, qui in acutam
spinam plerumque desinunt, tametsi
sparsos alios hinc inde aculeos ha-
beant, breves interdum & infirmos.
Folia buxi quodammodo æmula, gu-
stu lenta, & cum aliqua aciditate mor-
dicantia. Nec florem nec fructum
videre potuit Clusius. Prodit prope
Complutum, & aliis Castellæ vete-
ris locis, circa fluentia, & in declivi-
bus. Præbet ibidem scoparum usum;
& compositum in fasciculos, pistori-
bus calefaciendis fornacibus mate-
riam.

Banlin. H.
P. l. 6. c. 26.
p. 58.

3. *Lycium Gallicum*, Lugdunensi
Lycium Dalechampii, spina est tres cu-
bitos alta, cortice in cinereum palle-
scente, radicibus multis, lignosis, acu-
leis foliosis; fructu piperis magnitu-
dine, nigro, adnexo brevi pediculo,
nunc triangulo, nunc quadrangulo,
nunc cordis figura, pro nucleorum
numero; e cujus fastigio pilus du-
plex subtilissimus eminet, gustu ad-
stringente & valde amaro. Baccis ad-
tingendum sericum aureo colore in-
fectores utuntur, easque vocant *Tin-*
etorium granum, Graine a teindre,
aut *Flavum granum*, Graine jaune,
aut *Avenionense granum*, Graine d'
Avignon. Bauhinus spinis rigidissi-
mis horrere scribit. Folia ad pru-
num sylvestrem nonnihil accedunt,
tenuia, nervosa, decidua. Flores cir-
ca spinas multi, parvi, ex brevibus
pediculis, quibus succedunt bacca,
quæ maturæ, sub pellicula continent

semina oblonga, polita, striata, ex-
ficcata, bicocca & tricocca adpa-
rent, valde amaræ. Nasquitur in aspe-
ris & saxosis circa Avenionem & Car-
pentoratam. Non multum a prio-
ris baccis abeunt illæ, quas idem Bau-
hinus a Cortuso cum inscriptione *Ly-*
cii ex monte Baldo accepit; colorem
si exceperis. Purpurascens enim
erant, & fere nigræ. Semina intus
berberis accedentia, lucida, polita,
colore subfusco, aut ex spadiceo in
nigrum vergente, pene triangula, &
quædam sulcata.

4. *Lycium Indicum* est duplex I.

Rauwolfii, frutex pruni facie, qui in
monte Libano, nec non inter Joppen
ac Hierosolymam provenit, & ab in-
colis *Zaron* vocatur. Succum, qui

Rauwolf.
Itiner. 1. 2.
c. 12. & l. 3.
c. 22.

ex eo exprimitur, *Hadkadh* Arabes
adpellant. II. *Lycium Indicum Al-*
pino putatum, quod Ægyptiis *Uzeg*
dicitur. Multis rectissimis, & qui

Alpin. de
plant.
Ægypt.
c. 22.

trium cubitorum altitudinem exce-
dunt ramis adsurgit. Radices ligno-
sæ, oblique descendentes. Spinæ
longæ & acutissimæ; quarum quæ-
dam foliis vestiuntur. Folia olivæ
similia, sed candidiora & angustiora.
Flores Ageahilid similes, parvi, albi,
Hyacinthi orientalis forma & magni-
tudine. Fructus Ebuli fructibus si-
miles, parvi, nigri, læves, gustu ama-
ri & adstringentes. Longe ab Ale-
xandria, supra ripas rami Nili Calig
vocati observavit Alpinus. Veslin-
gus, qui quadragesimo sexto post Al-
pinum anno illos hortos lustravit, fo-
lia buxeorum instar rotunda facit: flo-
res ut minutos sic numerosos, a con-
tractiore tubulo sensim ampliatos;
qui sinum intimum flavedine tingunt,
purpureis aliquot punctis recessu fo-
liorum inscripti; reliquo corpore
Hyacinthi ferruginem violis permi-
scent. Paratur ex eo succus, *Coulau*
dictus, in quibusdam Arabiæ locis, il-
leque durus, niger, viscosus & Aca-
ciæ similis adfertur. Fructus Aloës
est colore, odore obscuro, sapore
subdulci & adstringente, absque ul-
la amaritudine. Maximus ejus in
stringendo usus, in alvi fluxu, Oph-
thalmis (paratur ex eo Collyrium cum
anti-

Vesling. ad
Alpin. de
plant.
Ægypt.
p. 15.

antimonio) hæmoptysi, & uteri profluvio. Illicus partes ab humorum influxu tuetur. Est & in *Java arbor spinosa* foliis fere Sabinæ vel arboris vitæ, sed non tam pinguibus & crassis. Fert *fabas* rotundas punicei coloris, in quibus tres vel quatuor tantæ duritiei nuces, ut dentibus frangi nequeant. E foliis *Cate* exprimitur.

Bont. H. N. & M. l. 6. c. 3.

Alpin. Exotic. l. 1. c. 11.

5. *Lycium Creticum* describitur ab *Alpino*. Hæc arbor, inquit, parva est, hominis altitudine supra terram elata, spinis horrens, foliis buxi, angustioribus tamen, quaternis aut quinis simum ramorum paribus eminentioribus citra pediculos, inhaerentibus. *Caudex* habet utrimque ramos multos, graciles, rotundos, fere rectos, duros, lignosos, habentes quasdam inæqualitates in ipsorum rectitudine, quippe qui habeant brevi intervallo partes quasdam eminentiores, a quibus singulis tres *spinæ* acutæ, nigrae, duræ, simul cum foliis buxeis, sed tenuioribus exeunt; in quibus *flores* duo vel tres a suis pediculis pendent; a quibus deflorescentibus succedunt una, duæ, vel ad summum tres *baccæ*, oblongæ, nigrescentes, piperis magnitudine & rotunditate, sapore stiptico, primo subdulci, post amarescente. *Radices*

non vidit; ideo nec novit, an succus ex iis exprimatur. *Folia & fructus* cum adstrictione amarescunt. Subdulces primo gustui, mox ea resoluta, amari, & quidem modice. Diverfarum sunt partium. Huc refero *fruticem*, cujus sub *Amygdalæ petrææ* nomine, cum qua tamen ipsi nihil commune, Belus in epistola ad Bauhinum mentionem facit. *Fru-* tex est duorum aut trium cubitorum altitudine, densus, spinis obsitus. *folia* parva, firma: *fructus* rotundus ferme, parvus ut piper; & nigricans, *radix* lignosa & maxima. *Judæi* ex baccis luteum colorem conficiunt.

Bauhin. H. P. l. 6. c. 26. p. 61.

6. *Lycio adfinis Ægyptiaca*, incolis *Agiabalid* dicitur. Arbor est magnitudinæ pyri sylvestris, ramis raris, non multis, in rectum æqualiter elatis, ordinatim acutissimis multis spinis obsita, *folia* ferens Buxi proxima, latiora tamen, pauca, rara, singula, bina æqualibus interstitiis adnata. *Flores* habet paucos, albos, Hyacinthi orientalis floribus similes, sed minores, a quibus prodeunt *fructus* nigri Ebuli similes, gustu subamari & adstringentes. Foliorum usus contra lumbricos puerorum in Æthiopia familiarissimus.

Alpin. de plant. Ægypt. c. 21.

PUNCTVM V.

De Rubo.

Vid. TABVLA LXXVII. Theophr. H. P. l. 1. c. 5. l. 2. c. 18. l. 6. c. 1. Theophr. de C. P. l. 6. c. 21.

Athen. Diapnos. l. 2.

I. **R**ubi fruticis quatuor sunt apud Theophrastum, Dioscoridem & Plinium genera. Est namque Rubus I. *Βάτος*, qui ὀρθοφύης καὶ ὕψος ἔχει. *Folia* cum extremo tum laterisinuata concidunt, & spinosa cuncta redduntur; imo etiam *caulis & rami*. *Fructum* racematim gerit; qui non solum sero, sed & particulatim maturescit. Plinius *rubi mora* vocat. Phanas Eresius apud Athenæum *Mori pillulas*, σφαρίον. Ubi maturuit ad instar mori, fructus, σπερματίνες καὶ συναμυγώδες habet γονὰς καὶ διαφύσεις, ὥσπερ ὑφανέσας, quasdam veluti contextas, glabras & succulentas. *Usus* eximium omnes ejus invenere partes.

Summorum ramorum decoctum potu alvum sistit, & fluxus muliebrium nimios. Ex caulibus teneris tuis succus expressus & insolatus, singulari contra oris ulcera, hæmoptysin & alia est solatio; ipsi per se in cibo sumti cymæ modo, aut in vino decocti, hæsitantes dentes firmant. *Foliis* teneris plurimum aqueæ substantiæ, adstrictionis parum. Cohibent herpes & manuum capitisque ulcera. Eadem & *florum* ratio. *Fructus* immaturus vehementer siccatur & stringit, statibus cunctis opportunus: in maturo quia dulcis temperati aliquid invenies. Ideo nec palato ingratus. si quis tamen largius utatur, capi-

Rubus. Dioscor. l. c. Plin. H. N. l. 24. c. 13.

Q

- Rubus. capitis dolores incurrit. *Radici* substantiæ quædam tenuitas: ideo Galenus lapillos renum comminuere credidit. II. Χαμαιβάτος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐνδὺς καὶ τῶ νενευκῶς, qui scilicet prope a terra protinus deorsum versus est, cumque se terræ conjunxerit, radicatur rursus. Fert *uvam* nigram seu
- Theophr. H. P. l. 3. c. 18.
- Plin. H. N. Morum uvæ similem. III. Βάτος l. 16. c. 37. Ἰδαία, *Rubus Idæus*, cujus etiam Plinius meminit. Tenerior est ac minor, rarioribus hamis, (male calamis) innocentioribusque. *Nascitur* sub arborum umbra, & in Ida, copiosissimus. Earundem cum priore rubo *virium*. *Flos* ex melle subactus oculorum inflammationibus illinitur, & erysipelata restinguit. Multi decoctum stomachicis propinant. IV. Κυνόσβατος est medius inter arborem & fruticem rubus. *Folia* ei longe latiora, quam myrtus; robusti circa virgas *aculei*; *flos* candidus; *fructus* oblongus olivæ nucleo similis; qui, dum maturefcit, rufus, & intus ἰσχυρὸς conspicitur. Theophrastus ei *folium* splendidum ἀγλῶδες, secundum alios δεικνῶδες, in vulgatis ἀγνῶδες, tribuit, & rhoi simile. Nonnulli παρὰ πλῆθειον τῶ τῆς ῥόδου legendum putant, & ita ad historiam Cynosbati, ut a Plinio describitur, Rosam eglentiviam quam proxime accedere. Rosam in eo nasci scribit idem. *Folium* vestigio hominis simile habere; pilulam castaneæ, præcipuo remedio calculosis. Ut ut sit, si *Usum* inquirimus, *Radix* rufa & in emplastro admota, infixa corpori extrahit, si Serapionem sequimur. *Folia* medicriter adstringunt: trita & imposita phlegmonas prohibent.
- Dioscor. M. M. l. 4. c. 38.
- Theophr. H. P. l. 3. c. 18. Athen. Dipnos. l. 2. Dioscor. M. M. l. 1. c. 123. Plin. H. N. l. 24. c. 13. 14.
- II. NOSTRIS dividitur Rubus in majorem, & minorem seu humilem vel repentem.
- I. *Rubus major* est triplex, 1. *Vulgaris*. 2. *Idæus*. 3. *Exoticus*.
- Bauh. H. P. l. 14. c. 2. Lobel. Advers. p. 446.
1. *Rubus major vulgaris*, Tabern. *Rubus arvensis*, Lobel. *Rubus Batis*, Gerh. in icone *Idæus*, Bauhino *Rubus major fructu nigro*, audit. Nihil eo vulgatius dumeta norunt. Ex radi-
- ce nodosa, importuna feracitate se propagans, longe lateque senticosis & mordacibus sarmentis, angulosis, rubentibus vagatur. Si vicinis fulciatur, in altum crassiores emittit *virgas*, quæ tamen & ipsæ gracilitate & proceritate nimia in terram retractæ, ac curvatæ defixis in eam capitibus radicanter. Virgæ spinis aduncis & pungentibus *aculeis* vestiuntur, quibus prætereuntium vestibus sese adfigunt, eosque remorantur. *Folia* terna, ferrata, aspera, dorso aculeato, inferiore parte candicante, superiore nigricante, sicco adstringentique sapore prædita: hyeme vix decidentia, nisi altera succrescant. *Flores* albi, vel ex candido rosei, rosulæ instar, apicibus concoloribus: *mora* rubra per maturitatem nigrescunt aristis quibusdam asperiuscula, acinis parvis, gustu quibusdam, ut nobis, grato, dulci; paululum amaro, Trago. *Folia* vere; *flores* æstatis initio colliguntur; *fructus*, cum maturuit, per menses ultima æstate decerpitur. Curvatis gracilitate & simul proceritate nimia, defigit rursus in terram caput, itemque nascitur ex sese, repleturus omnia, nisi resistat cultura. Passim est in sylvis, campis, & ad sepes *obvius*. *Radix* decocta vehementer adstringere creditur, & in vino ad tertias decocta, sedis & oris ulceribus opitulari. Mora tam vehementer refrigerare, ut, si quis aquam superbibat, horrore febrili corripitur, prodidit Tragus; negat Bauhinus.
2. *Rubus Idæus* triplex est. 1. *spinosus*, 2. *lævis*, 3. *leucocarpus*, seu *fructu albo*. 1. *Rubus Idæus spinosus*, Cæsalp. *Rubus III. montibus proprius*, habet *radices* longas, quæ late sparguntur, & quotannis surculos proferunt, ex quibus secundo anno flores & fructus. *Caulibus* spinæ teneriores, & inter omnia rubi genera innocentissimæ, tenellis vero & recentior enatis turionibus nullæ. *Folia*, quæ terram spectant, mollia, tenera, & adeo albicantia, ut farina adpersa videantur. *Flosculi* rotundi ex albo palliduli, Majo & Junio prorumpunt, qui in concava, rubra, dulcia, & ju-
- Bauh. H. P. l. 14. c. 3. p. 59.

& jucundi odoris abeunt mora, rubris ac pilosis pileolis similia, quæ Augusto maturantur. Concipiunt intra paucos dies vermiculos. *Nascitur* passim per Germaniæ & Poloniæ sylvas. *Folia* lixivio decocta, capillos denigrant. Ex *fructu* syrupus paratur, cordi corroborando in febribus excellentissimus. Aqua ex eodem, calculosis est levamento, si cochleari unius dosi, cum quatuor vini cochlearibus sumatur. Potest & vinum exprimi. II. *Rubus Idæus* *lævis*, duplex est, 1. *gallicus* Tabern. *Rubus hircinus*, Cordo *Rubus tertius*, Trago *Rubus Idæus alter*, qui in monte la Motte dicto, Gratianopoli vicino, provenit. *Caulibus* multis sesquipedalibus, & foliosis; *folio* rubo Idæo vulgari simili, averfa parte candicante & lanuginosa; *fructu* rubro & ex granis sic coagmentato, ut in metæ modum fastigietur, fragi magnitudine, & acido, cum maturuit, sapore. 2. *Valentinus*, qui Clusio *Rubus Idæus Placæ*, Bauhino *rubus sine spinis Valentinus*. *Folia* huic molliora, sarmenta per terram longa, *spinæ* nullæ; *fructus* vulgari minor. Ostendit Clusio non longe a Valentia in monasterio D. Virginis Placa Medicus. Facit ejus & latinus Dioscoridis codex mentionem; sed præter Græci fidem. III. *Rubus Idæus leucocarpos*, in eo solum a superiore differt, quod fructum candidum profert.

Lobel. Ad.
vers. p. 452.

3. *Rubus exoticus*, est Lobelio *Rubi facie senticosa planta*, cujus truncum & bacillum exprimi curavit. Carpi crassitie est, longam hastam æquans, & *cortice* nigro, denso vestitus, tuberculis crassis, senticosis, creberrimis, in clavæ modum muricato, folio & gravi, præduro ligno.

II. *Rubus minor*, seu *humilis* & *repens*, Græcis *Chamærubus* est duplex, 1. *spinosus fructu cæruleo*, 2. *non spinosus*.

Clus. l. c.
Bauh. H.
P. l. 14. c. 2.
p. 59.

1. *Chamærubus spinosus fructu cæruleo*, Theophrasto *Chamæbatos*, Gazæ *Humirubus*, Clusio *humilis*

Belgicus, sarmentis longe lateque diffusis serpit, & tenuissimis aculeatisque flagellis aliquando se attollit; ita tamen, ut protinus deorsum vergat. *Folia* lupulo pene respondent, nisi quod magis nigricent, & spinis asperioribus horreant. *Flores* Trago ex candido rosei, stellati, qui Majo mense prorumpunt. *Fructus*, qui minor, primo exortu viridis, paulo post ruber, per maturitatem cæruleus vel cæsius, & pilosus: radix nodosa. *Gaudet* ripis fluviorum nec non humectis & incultis agris.

Rubus.

2. *Chamærubus seu Rubus minor non spinosus* est triplex, 1. *saxatilis*, 2. *foliis Ribes*, 3. *foliis Vitis*. I. *Chamærubus saxatilis* Gesnero & Bauhino *Rubus Alpinus humilis*, Clus. *Rubus petræus* sive *Alpinus*, Thallio *Rubus minimus*. Pedalis est altitudinis. *Viticuli* teretes, subrubentes & hirsuti, *folia* in illis terna, Rubo Idæo pene similia, rugosa; *flores* in supremis viticulorum alis. *Mora* punicea ex longo pediculo in ramorum extremitate plura, capitulo ceu ruborum, sæpe uno acino vel duobus constant, interdum tribus, rarius quatuor, sapore grato, acido: *granum* unum singulis acinis mediocriter durum, sublongum, rugosum, majus, quam semina rubi Idæi. II. *Chamærubus foliis Ribes* est duplex, *Norvegicus* & *Anglicus*.

1. *Chamærubus foliis Ribes Norvegicus*, Bauhino *Chamæmorus Norvegica*, Clusio ab Hojero transmissa est. Erant, inquit ille, *virgæ* tenues digitalis longitudinis, fusci coloris *cortice* obductæ, quibus inhærebant uncialibus petiolis *folia*, vulgaris Ribes foliis non valde dissimilia, sed paulo magis orbiculata, in breves aliquot lacinias divisa, tribusque eminentioribus nervis averfa parte prædita, e quibus multæ venæ ad circumferentiam sparguntur, in ambitu dentata: e summis virgis exeunt oblongiores tenuioresque petioli sustinentes singularem *caliculum*, e quo *flos* emergit candidus, nunc quaternis, modo quinis foliolis constans, umbilicum occupantibus multis exilibus staminibus albis, cum flavis apicibus:

Gesn. in
hortis
germ.
Bauh. H.
P. l. 14. c. 4.
p. 61.
Thal. in
sylva her-
cyn.

Clus. H. P.
l. 1. c. 85.

Rubus. cibus: flori *fructus* succedit, fragi eunt. *Flos* in summo caule, unicu-
 magnitude, rubens aut pallidus, cu- quinquefolius, ex nigro purpura-
 jus interior pulpa mollis, humida, scens, in Junio vel Julii initio pro-
 mucilaginosa, exilium acinulorum rumpit. *Fructus* fructui Rubi vul-
 plena, gustu non insuavis, qui mensi- garis simillimus, sed paulo minor,
 bus Junio, Quintili & Sextili matu- primo albicans & acerbus, postea ru-
 ratur, & ab incolis *Voltebeeren* di- ber, mense Augusto maturatur. *A-*
 citur. *Prodit* paludosis & humectis mat nivosa & aperta: in monte En-
 locis. Ex fructu *Electuarium* para- gleborow, omnium in Anglia altissi-
 tur, præsentissimum contra scorbu- mo, inter Ericeta frequens. III. *Cha-*
 tum remedium. *Æstate* comeditur *mærubus foliis vitis*, Clus. *Chamæ-*
 crudus, mittunturque tum in rube- *moros Norvegica altera*, dodrantalis
 Clus. H. P. ta ægri, ut eo vescantur. I. *Cha-* est, *cortice* petiolorum nigricante,
 l. 1. c. 84. *mærubus foliis Ribes Anglica*, Bauhi-
 no *Rubo Idæo adfinis Chamæmoros*,
 Clusio *Chamæmoros*, Anglis *Knot-*
berries, seu *bacca nodosa*, dicitur. Do-
 drantales huic *viticulæ*, in quibus al-
 ternatim, tria, quatuor, aut quinque
folia, scabra, ferrata, quæ ex binis
 alis, cauliculum amplectentibus, ex-

PUNCTUM VI.

De Cappari.

Cappa-
ris.

I.

Vid. *Capparis* Dioscoridi est frutex acu-
 TABULA leatus, (πτορδάκαντος Theophra-
 LXXVIII. sto), & firmioris ligni addit Plini-
 Theophr. us, per terram in orbem stratus
 H. P. l. 6. (ἐπιγυϊόκαυλος) spinas aduncas ut Ru-
 c. 1. 3. 5. bus habet. *Folia* rotunda, (ἐπακαν-
 Dioscor. M. διζοντα) malo cydonio similia; *fru-*
 M. l. 2. ctus ut olea, qui cum dehiscit, al-
 c. 104. bum florem promit; quo delapso,
 quiddam glandis oblongæ figura re-
 peritur, quod apertum grana tan-
 quam Punica exigua, rubentia, ex-
 hibet. Hinc Theophrastus balani
 unguentariæ fructui comparat. *Ra-*
dices lignosæ, numerosæ & magnæ.
 (Theophrastus μονόρριζον dixit). In-
 ter *δερνάει καὶ τῇ ἀνθήσει καὶ τῇ βλάσει*
 Theophr. numeratur: nec credidit Theophrastus
 H. P. l. 4. γεωργίας προσδεχέσθαι, sed & deterio-
 c. 2. Theo- rem eadem, ut natura sylvestrem di-
 phr. H. P. xeris; de quo in sequentibus. *Floret*
 l. 7. c. 10. æstate: viret usque in Vergiliarum
 l. 3. c. 3. l. 1. occasum. *Nascitur* in sabulosis. Ideo
 c. 6. iis Plinius familiarissimum dixit. Ideo
 Plin. H. N. & siccis *seritur*, maxime area in de-
 l. 19. c. 8. fossu cavata, ripisque undique cir-
 cumstructis lapide: alias evagatur
 per agros, & cogit solum sterile sce-
 re. *Nascitur* & plurimis provinciis

sua sponte novalibus, in insulis do-
 morumque areis. *Usus* ejus in *cibis* Columella
 & *Medicina*. *Caulis* & *fructus* τὰρι- R. R. l. 2.
 χέεται εἰς βρώσιν: sed quia tenuium c. 3. Gal. l.
 partium, minimum alimenti sugge- de Alim. fas
 rit. *Radicis* cortex amarus est, acris, cult.
 acerbus. Ideo propter amaritudi-
 nem abstergit, purgat, incidit; pro-
 pter acrimoniam, excalefacit, dige-
 rit; propter acerbitem, contrahit, Galen. l. 7.
 densat & stringit. Laudatissimus simplic.
 contra lienes induratos, siue extra im- Plin. H. N.
 ponatur; siue adhibeatur intra. Qua- l. 13. 23.
 draginta dierum spatio ex vino potus
 lienem τὰριον dicitur. Quin & men-
 ses promovet, & ulceribus cataplas-
 matis instar adhibetur; dentiumque
 dolores in aceto vel vino potus sedare
 solet. Eadem *foliis* & *fructui*
 virtus, non tamen tanta. Illis quan-
 doque paucis diebus duritiem Chæ-
 radis naturam referentem Galenus
 sustulit. E succo fructus clysteres
 Serapioni ad Sciaticam, instillatus au-
 ribus, occidit vermes. Dioscorides
 turbare alvum dixit, stomachoque in-
 commodum, & sitim inducere; com-
 modiores coctum. *Quatuor* ejus
 sunt genera. I. *Africana*, quæ apud
 Mar-

Marmaridas (falso *μαργαρίτας* habent quidam codices) nascitur, & vulvis infesta, & vehementer inflat. II. *Apula*, quæ in Apulia provenit, vomitum facit, stomachumque & alvum exsolvit, quod forte de recente sumendum. Nam ferunt, *inquit idem Plinius*, qui quotidie capparim Italicam edunt, paralyti non periclitari, nec lienis doloribus. *Radix*, addit, vitilignes albas tollit, si trita in sole fricentur: bibiturque in lumborum doloribus. III. *Arabica*, quæ e rubro mari & Arabia deferretur, quia in calidis provenit, multo est nostrate *δευμνότερα*, adeo, ut in ore pustulas excitet, & ossa *ἀχρε γυνώσκει* exedat. Ideo Plinio pestilens.

II. Apud RECENTIORES est Capparidis quadruplex, I. *spinosa*, 2. *non spinosa*, 3. *arborescens fructu juglandis magnitudine*, 4. *portulacæ folio*.

I. *Capparis spinosa* est iterum duplex, 1. *fructu minore, folio rotundo*, 2. *folio acuto*.

1. *Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo*, Cæsalp. est *Italica*, Lobel. *retuso folio*, Tabern. *secunda*, aculeatus frutex est. *Ramuli* aduncis hamis horridi, per terram orbiculariter sternuntur, nisi pedamentis fulciantur. *Folia* circa hos lata, veluti mali cotoneæ, sed rotundiora, saporis perquam amari. E sinu tenues pediculi, quibus capitula rotunda, viridantia. *Flos*, hæc ubi dehiscunt, æstate insequitur candidus, rosæ aut mali cotoneæ similis, cujus medium infiniti fibrarum cirri infedere. *Fructus* oblongi, olivarum æmuli, in quibus semina parva albida, pericarpio oblongo inclusa, ex rufo milio non dissimilia. *Visa* Lugduni Novembri florere. Ex Alexandria optimæ Venetias deferuntur. In Apulia Ægyptiis deteriores proveniunt. *Visa* & Romæ in collapsis rudibus circa Pacis templum; Senis quoque, cujus fructus Apulæ sapore non cedat. Sed & in ora Tyrrhenici maris fruticat. De hujus *Uso* sumendum, quod superius ex Veteribus diximus. In *cibis* meliores putantur: ideo sexies pluris emuntur, quam

maiores. *Radix* masticatam multam pituitam trahere, tradidit Montanus. Denigrat capillos, si in lacte asinina ad tertias cocta inungatur. Cortex radice in obstructionibus lienis passim adhibetur. Fiunt ex eo & tabellæ cum croco Martis.

Capparidis. Lobel. Advers. p. 281. Bayetus in praxi. Hartm. in chymiatr.

2. *De Cappari spinosa folio acuto* Plin. H. N. l. 19. c. 8. nihil occurrit, quod dicatur, nisi folium diversum habere; laudatissimam Veteribus in Caria, proximam in Phrygia. De *cultura* ejus ita *Quinquernus*. Quin & capparum messibus, non alia ditiore plaga, feruntur in vetustis parietibus, nulla muri injuria. Nam quæ per solum repunt, quamvis siccum, asperum atque saxosum, multo ignobiliores comperæ sunt. Hujus rei ratio perficitur in hunc modum; contunduntur veterum murorum camenta; his probe tulsis miscentur capparorum semina ex nigro rubescentia, magnitudine milii, oblongiora; hujus mixtionis tantillum injicitur in arundinem utrimque foratam, & ubicunque foramina sunt in muro, aut grandiores rimæ, flatu injicitur, id juvante cælo per se radicitur, mox ineunte ætate ex ea radice truncus emergit, qui digitis duobus per rimam caput exerit; ex eo capite numerosæ sagittæ emicant, rectæ, leves, bipedali proceritate; quæ veluti e centro ad circumferentiam tendentes orbem efficiunt, multiplici decussu stellatum. Rursum hæ sagittæ utrimque folia habent pyri palmari intervallo, e quorum sinu pediculi exsiliunt acuminati, acumine ipso capperem gestantes; tum colligi cappares oportet. quippe longiore mora ex ipsis capparum volgis flos emergit, qui inutiles ad condituram reddit: sublata vindemia folia decidunt, & totæ propagines quandantenus exsiccantur, putanturque vitium ritu, ita, ut dejecta universa coma, glabrum caput relinquatur, ad parem spem sequentis anni. optima ratio auctumno, ut & cæli adspectus in orientem.

Quinquernus. l. 2. de laudib. provinciarum.

II. *Capparis non spinosa fructu majore*, nihil diversi a præcedentibus habet,

Alpin. de plant.

Stapel. ad Theophr. H. P. l. 6. c. 5. p. 639. Bauhin. H. P. l. 14. c. 7. p. 63. Dodon. H. P. pempt. 6. l. 1. c. 6.

Capparis. *bet*, præter ab aculeis immunitatem. Cappares autem Alexandriae majores esse, quam alibi, quas *Cappar* adpellant, *Alpinus* auctor est.

Bellon. obs.
l. 2. c. 60.

III. *Capparis arborescens fructu juglandis magnitudine* observata in Arabia a Bellonio. Aequat pumilarum ficuum altitudinem. *Fructus* ovi galinacei magnitudine, cui semina intus piperis instar calida. Cappares ipsæ juglandi quantitate non cedunt. *Semina* vino commiscere solent incolæ, ut conserventur. Notatæ ab eodem cappares in Tauri montis fissuris, plurimum ab his, quæ in arbores adulescunt, & quæ in Græcia proveniunt, differentes.

Lobel. Obs.
p. 511. Do-
don. H. P.
Pempt. 6.
l. 1. c. 7.
Bauhini. H.
P. l. 14. c. 8.
p. 66.

IV. *Capparis portulacæ folio*, Lobel. & Tabern. *Capparis leguminosa*, Dodon. *Capparis fabago*, Camer. *sylvestris* seu *fabaginea*, Syrorum *Morgsani*, Rhafis *Andiriana*, Abensinæ *Ardefrigi*, Lugdunensi *Fabago Belgarum*, Columnæ *Telephium Dioscoridis* & *Plinii*, Bauhino *Peplios Luteianorum*, dicitur. Longi, lenti, glabri, striati & ramosi caules. Ad horum genicula duo ex adverso pediculi, quibus in cacumine bina folia, pingui, ex rotundo oblonga, portulacæ quodammodo similia. Flos unicus, miniatus, ex pediculis dependet, extra eum longa, rubentia stamina, cum apicibus concoloribus promi-

nent; extrinsecus a foliolis oblongis, viridantibus, exhibetur. *Siliqua* semisimilis, oblonga, angulosa, quatuor veluti ex thecis composita; in qua semina plura, lata, ex rotunditate in acumen desinentia. Universa planta gustu salicis amara est. Visa florere Augusto in horto regio. Romæ sponte inter rudera nasci prodidit Camerarius. Ignotam Veteribus quidam censent: alii *Cepæam Dioscoridis* esse opinantur. Halepi ingrattissimi est odoris, & ideo frequentis contra lumbricos usus.

Camer. in
epitome.

Rauwolf.
in itiner.

EX EXOTICIS huc tria pertinent. Bauh. H. P. l. 14. c. 9.
I. *Albaut Theveti*, herba in insula Succhen, Æthiopico littori adjacente, in rupibus sese late diffundens. Folia fere Capparis, cujus fructus germina seu capitula rotunda. Foliis, radicibus, fructu incolæ ad colicos & stomachi dolores utuntur, suntque suavissima. II. *Sacquenumener* seu baccæ plantæ, quæ in Virginia, in stagnantibus aquis reperitur. III. *Ocouchtanims* seu acini, qui ibidem in riguis convallibus capparum instar crescunt. Incocti malignæ sunt qualitatis. Forte cum præcedentibus baccis iidem. IV. *Herba sinus S. Augustini fructu cappari simili*, foliis rotundis, viridibus, & crassis. Incolæ *Essac* vocant, & in acetariis adhibent.

Ind. Occid.
p. 1.

De Laet
Ind. occid.
l. 3. c. 15.

Purchaf.
Navig. To-
mo 1. p. 415.

ARTICVLVS V.

De Arboribus Bacciferis Classis quinta.

PUNCTVM I.

De Sabina.

Sabina.

Vid.

TABULA
LXXVIII.

Ad Classẽ quintam bacciferarum, *Sabinam*, *Cedrum*, *Juniperum*, *Thujam*, *Brutam*, *Asparagum* & *Corrudam* refero.

Dioscor. M.
M. l. I.
c. 104.

I. *Sabina Veteribus* in duplici est differentia. I. *Alia* est *Cupressi folio*, *Cupressus Cretica* nonnullis. Spinfior hæc coactæ brevitatis, καὶ εἰς πλάτος μάλλον χρομένη, βαρυσμὸς, acris,

πρωτική, & perpetui viroris. Multi eandem cum arbore Bruta, vel potius Brathy, de qua sub Thuja, sed male, credunt. Quidam Paradyfi arborem opinantur. Magis Cupressi aromaticam Galenus dixit, non quod odoratu gravem non agnosceret: nec enim aromaticis plantis semper sapore grato, vel odore jucundo opus est: sed quod in thymiamate non

Galen. de
alim. facult.
l. 2. c. 37.

non ultimum locum habuerit. Nisi de gustu aromatico potius sumere velis. Idem enim Citrium *ἐν ὁδοῖς καὶ ἀρωματίζον*, & κατὰ τὴν ὁσμὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν γεύσιν dixit. II. *Alia* est folio *Tamaricis*, de qua nihil occurrit. Quoad *Vsum*, ex fortiter siccantibus utraque Galeno: ideo putredinis averrunca. Dioscoridi folia contra nomas & phlegmonas adhibentur: carbunculos cum melle circumquaque rumpunt: cum vino sanguinem tenuitate sua per urinas educunt & partum expellunt, seu pota seu adposita, seu suffita, quod & apud Galenum occurrit. Plinius in medicamentis duplicato pondere eosdem effectus, quos Cinnamomum, habere tradit; gallinaceique generis pituitas fumo ejus sanari.

II. MODERNIS duplex quoque est, 1. folio *Tamarisci Dioscoridis*, & 2. folio *cupressi*.

Matth. in
Dioscor.
l. 1. c. 88.
Cordus ad
Dioscor.
l. c.
Tabernom.
H. P. l. 3. c. 8.
p. 38. edit.
A. 1625.

I. *Sabina folio Tamarisci Dioscoridis*, Camerario dicitur *vulgaris*, Matthiolo *sterilis*, Cordo *miti folio*, Tabernom. *mas*. Arbor est perpetui viroris, in latum magis, quam altum, proficiens. *Caudex* satis crassus. *Cortex* subrufus. *Rami* flexiles, circa quos verno tempore squamosum quid ac fungosum undique cingitur, colore ex pallido rubente vel subluteo rubro, facie auriculæ Judæ, sive fungi, qui ad Sambucum nascitur. *Folia*, cum oriuntur, cupresso sunt similia, mox in foliorum *Tamarisci* formam abeunt, duriora, aliquantulum spinosa, graviter olentia, fervido gustu. *Flosculi* medio fere Maii prodeunt exigui, quadranduli, ex albedo lutei. *Fructus* novellæ nullus; nec antiquæ, si furculo non semine lata.

II. *Sabina folio cupressi* est duplex, prima & altera.

Tabern. H. P. l. 3. c. 8. p. 671.
Lobel. Obs. p. 626.
I. *Sabina folio Cupressi prima*, Matthiolo *baccifera*, Dodon. *altera*, Gesnero *major*, Lobel. *genuina baccifera atrovubra*, Tabern. *scemina minor*,

vulgatæ sterili *Sabinæ* ortu totaque *Sabinæ* facie est simillima. *Materies* subrubra: folia paulo minus acuta, minusque rigida. *bacca* sine grano, ad ramulos viridis primo; ubi maturuit cærulea. *Visa* in monte Ceto prope Monspelium; nec non in Belgii viridariis.

2. *Sabina folio cupressi altera*, Lobel. *Obs. baccata alia*, Tabernom. *scemina major*, ramulorum exilitate & foliorum tenuitate duntaxat a superiore diversa, inter *Sabinas* & *Cedros phæniceas* media. *Baccas* fert prima majores. *Nascitur* in Calabria & Apuliæ montosis. *Bauhinus* flores minimos, luteos, veluti julos in extremitatibus se observasse, & baccas utramque *Juniperinis* æquales ferre scripsit, quas virentes ex albedo cæruleo quodam colore tinctas, tubercula quædam obsident. In summo, addit, aliquando pediculo opposito apex modo unus, modo duo prominent, semine intus contento. Tandem etiam maturæ atrocæruleæ fiunt. Has baccas nulli præcedunt flores, sed duntaxat baccarum rudimenta, incurvis pediculis insidentia, ex tribus, quatuor, aut quinque exiguis tuberculis, instar *Myrmeciae verrucæ* parvæ composita. *E foliis* destillatur aqua, maculas faciei abstergens; & qua venatores ad curandam canum scabiem utuntur. *Nota* vero. Dari in *Sabina* aliquas pro ratione soli, factionis, & cultus varietates. *Novellæ*, ut dixi, nullum ferunt fructum: nec antiquæ aliquem, nisi semine prodeant. Sed nec hoc perpetuum. In horto quidem Montbelgardeni nullos fructus tulit: sed alibi plantata, plurimas baccas proferre visa est. *Visa* & in Burgundia & in Castello Beveuge, a Bauhino, foliis non spinosis; Basileæ aliquando baccifera; *Tubingæ*, quæ sponte provenerat, foliis partim spinosis, partim non spinosis. Gesnero baccas Septembri profert. Non est ergo mirum, diversa de illa ab auctoribus prodi.

Lobel. Obs. p. 626.

Bauh. H. P. l. 9. c. 21. p. 288.

PUNCTVM II.

De Cedro baccifera.

Cedrus
baccifera.

Vid.

LXXIX.

TABVLA.
Dioscor. M.
M. l. i.
c. 105.
Theophr.
H. P. l. i.
c. 15. & 16.

I.

Duplex Veteribus Cedrus, Conife-
ra nempe & Baccifera. Nos hic
de ista, de illa inferius agemus. Par-
va est, folia perpetui viroris, rara,
& extremitate pungente. Ideo spi-
nosam Juniperi modo Dioscorides
dixit. De generibus ambigitur. Duas
quidam apud Theophrastum adfir-
mant, Lyciam nempe & φοινικην; pu-
nicam alii simplicem dicunt, inter quos
qui Idam montem incolunt, Junipero
hic non dissimilis, sed folio maxime
distat, utpote quod durum, acutum,
spinosumque, excelsior nasci videtur.
Alii nominibus minime dividunt, sed
ambas Cedros adpellant, Cedrum ta-
men cum adpendice Oxycedrum. No-
dosæ ambæ, πολυμάχαι, καὶ ἐπι-
στραμμένα ἔχοντες τὰ ξύλα. Cedro τὸ
πλείστον ἑνὸς καρδίου καὶ ἀσπῆς, adde ἐρυ-
θρον & ἑωδῆς. Fructus, qui Galeno
κέρως, eidem ξανθὸς ex rubedine fla-
vescit, myrti magnitudine, odoratus
& ἰδιὸς ἐσθιέσθαι. Unicam hinc Ce-
dram bacciferam, quæ Oxycedrus
juniperoque similis, colligas, cui &
Geoponicorum auctor Juniperum si-
mitem fecit. Plinius Cedri, Oxyce-
dri & Juniperi historiam confudisse
videtur. Cum enim unum sit Ce-
dri apud Idæos genus, ille facit Ly-
ciam & Phœniciam, quarum utra-
que Myrti magnitudine fructum fert,
dulcem sapore; altera odore præstat.
Usus si spectes, calidæ sunt & sic-
cæ in tertio Cedrides. Si liberalius
iis utare, dolorem capitis inferunt, ar-
doremque ventriculi. Tussim de cæ-
tero sanant, urinam cient, alvum fi-
stunt; ruptis convulsis, spasticis, &
stranguriæ utiles.

Galen. l. 7.
simplic.
medicam.

II. NOBIS unicum quoque est Ce-
dri bacciferae genus, quod folio cu-
pressi, sed magnitudine distinctum.
Est enim Cedrus, 1. major fructu fla-
vescente, 2. media majoribus baccis.
3. minor.

I. Cedrus folio cupressi major, fru-
ctu flavesciente, est Cupressus sylvestris

Dioscoridis, in codice Hermolai, Ce-
drus phœnicea Plinii, Cedrus Lycia, Matthiol. Cedrus pumila foliis obtu-
sis phœnicea Bellon. Oxycedrus Lycia
Dodon. Juniperus major Clus. Oxy-
cedrus folio cupressi, aut Sabina major
Monspelienis, & phœnicea media
Lobel. Cedrus phœnicea secunda Ta-
bernom. Lugdunensi Thuja genus
quartum, aliis primum, Bauhino Ce-
drus Lycia retusa Bellonio dicta. fru-
tex est, qui humanam altitudinem
raro superat. Caudex contortus &
ramosus, cortice scabro, exterius
fulvo, interius rubente, vestitus. fo-
lia adultæ cupressi carnosæ, ex conti-
nua quatuor foliorum connexorum
serie concinnata, quæ trita gratum
odorem spirant. flores flavi, extremis
foliolis insident, & vere producun-
tur. Fructus baccarum myrti magni-
tudine, rotundus, viridis primum,
mox ad phœniceum tendens, seu, ut
Dodonæus, per maturitatem flavus,
ad ruborem inclinans, cui tria aut
quatuor oblonga & striata, quæque
albam, oryzæ similem & πρηνέωδην me-
dullam continent, grana, ab Oxyce-
drinis solo linearum triquetrarum de-
fectu distincta, mollescit maturitate.
Nota vero, teneri & recentis folia,
juniperi folia æmulari, nisi paulo bre-
viora & molliora essent: inferiores
ramos pungentibus & acutis foliis:
summos obtusis & rotundis inter-
dum vestiri. Nasitur ad Tyrrhe-
num mare, inter Calpen & Malac-
cam; nec non maritimis Gallia Nar-
bonensis oris, in Illyrico & Epiro.

II. Cedrus folio cupressi media ma-
joribus baccis, Bellon. Cedrus Lycia, Lobel. Ad-
Lugdunensi Thuja Massiliensis, ram-
mis & foliis est habitioribus, & bac-
cis per totos ramos quadruplo majo-
ribus, resinosis, phœniceis, nucem
ponticam æquantibus.

III. Cedrus cupressi foliis minor, Lobel. l. c.
est Cedrus phœnicea minor, vel tertia
Lobelii. Eodem modo cum media
seu

feu illa quam majorem diximus fructicat, ramis & foliis tenuioribus, granis phoeniceis. Calidioribus montosis

maritimisque gaudet Gallia Narbonensis & Apuleja.

Cedrus baccifera.

PUNCTVM III.

De Junipero.

I.

Juniperus arbor Theophrasto auctu est facillima, & cedro minore excellentior. Radix rara & inter ἐπιπολάσις. Caudex nodosus, πολυμάχαλος & tortuosus. Materies non spissa, ideo cæsa brevi putrescens. Foliolum cedro bacciferæ mollius, idemque perpetuo virens. Flovere Macedones non arbitrabantur. Fructus, qui ἀρκυθίς, niger, gustuque austerrus, καὶ ὡς περ ἀβρωτός. Tardissime perficitur, ἐνιαύσιον enim habet, περικαταλαμβάνει ὁ νέος τὸν περυσίον. Unde Plinius dixit, anniferam haberi, novumque fructum in hac cum annotino pendere. Quidam nec maturari dicunt. Ideo decerpitur & ad tempus reservatur: quod si in arbore relinquatur ἀποξηραίνεται. Theophrastus διαμένειν εἰς ἐνιαύσιον alibi scribit. ὅταν ἄλλος ἐπιφυῇ ὁ περυσινὸς ἀποπίπτει. At Arcades, fructus simul retinere ternos volunt. Unum περυσινὸν ἔπος πέποινα; alterum προπερυσινὸν, ἥδη πέποινα καὶ ἐδωδιμόν. tertium τὸν νέον, quod incertum. Humor in lacrymæ modum spargitur. Nasctur montosis, περὶ τὰς κορυφὰς, τὰ πτερωδὴ καὶ χειμέρα, sed non in excelsum. Nasci in planis circa Macedoniam respuit. Usus εἰς τεκτονίαν, siue ὑπαίθρια, siue κατὰ γῆς κατορυπτόμενα respicias, & quidem διὰ τὸ ἀσάπης. Nec cariem nec vetustatem sentit, exque ea in templo Ephesino trabes. Genera apud eosdem Veteres, duo. Alia enim major, vulgo cognita, cupressso secundum Auctuarii auctorem ἐμφερές, cujus fructus nunc Ponticæ magnitudine reperitur, quæque ἐν τράχησι καὶ παραθαλασσίῳ plerumque prorumpit. Alia minor, cujus fructus κύαμον, (male καρύον) græcam nempe & rotundam æquat. Odoratus idem, dulcis in mandendo ac subamarus. Cedro utramque adsimilem Plinius dixit perperam. Sy-

riaca Cedrus & minor Juniperus, Juniperus plane dissimiles; majori pro fructu bacca, cedro conus. Minorem cedrum & majorem juniperum folio differre, superius dictum. Quidam olim, aliam florere nec ferre; aliam vero, quæ non floreat, ferre protinus baccis subnascentibus, quæ benicio hæreant, dixerunt. Adde his majorem, quam vastam Hispania fert, maximæque bæccæ ejus. Usum & vires si attendas, excelsa ex illis utraque & urinas ciens; accensa-que serpentes fugat. Arceuthis moderate calefacit & adstringit, stomachi, pectoris & lateris doloribus utilis. Inflationes algoresque discutit, & tusses concoquit. Folia, quæ acria viperarum morsibus opponuntur, vel ipsorum succus. Ramenta ligni pota interficere, inter Dioscoridis notha legitur; refellitque experientia. Posunt tamen nocere & suffocare aliquando, quia propter summam siccitatem adhærent. Sic multum pinfi & cribrari Colocynthis debet, ne intestinis adfixa exulceret. Umbra Virgilio noxia propter blandam odoris eluvium, si scilicet justo diutius sub ea moreris.

II. RECENTIORIBVS tria summa Juniperi genera, 1. vulgaris, 2. minor montana folio latiore fructuque longiore, & 3. major.

I. Juniperus vulgaris est etiam duplex 1. fruticosa. 2. arbor.

I. Juniperus vulgaris, Gesnero humilis. Cordo minor, Tabernom. baccifera, Camerar. nostras, Bauhin. vulgaris baccis parvis purpureis, densa ramorum stipatu fructicat. Radices multifidæ, cortice puniceo vestitæ. Cortex scaber, deciduus & rubens: materies rubescens, odore resinoso. Folia in ramulis perpetui virentis,

Vid. T. A. B. LXXIX. Theophr. H. P. l. 3. c. 7. c. 12. l. 1. c. 15. l. 3. c. 4. Theophr. H. P. l. 3. c. 6.

Theophr. H. P. l. 3. c. 12.

Theophr. H. P. l. 9. c. 1.

Theophr. l. 3. c. 4. & 12.

Theophr. H. P. l. 5. c. 8. Plin. H. N. l. 24. c. 8. Plutarch. de Iside & Osiride.

Theophr. H. P. l. 3. c. 6. Plin. H. N. l. 16. c. 20. & c. 39. Dioscor. M. l. 1. c. 109.

Virgil. Eclog. ultima.

Clas. H. P. Gesner. in horto. Bauhin. H. P. l. 9. c. 23. p. 293.

Juniperus.

roris, oblonga, rigida, aculeata, valde angusta. *Baccæ* exiguae, rotundæ, numerosæ. Umbilicus ipsis in tres radices, totidem seminum loculos ostendentes, distinctus, magnitudo ad grana piperis dupla; in singulis grana tria oblonga, triangula, pulpa nonnihil rufa, sapore acri, resinoso, cum quadam dulcedine, tactu, ubi inveteravere, oleoso. Virescunt primo, per maturitatem nigrae aut atrocæruleæ: hicque iis altero demum anno, autumno adpetente, color. Gesnerus cultioribus locis autumno ferre scribit. Sudat & mense Majo, si pluviosa tempestas, *lacrymam*, quæ fungi instar, magna in copia arbori adhæret. *Provenit* limosis & lapidosis locis, in Italia, Germania, Anglia, Hispania &c. *Variat* ratione floris. *Alia* enim pro flore in tribus foliolis minutissimis futura baccæ rudimentum habet, tam exiguum, ut vix conspici possit. *Alia*, quæ *fœmina* forte dici posset, flores producit mense Majo plurimos, confertos. *Conorum* exiguorum hi instar, purpura cum croceo mixta pisti, ex plurimis corpusculis rotundis, papaveris semine minoribus, pulvisculo farinaceo fæctis compinguntur, intercedentibus raris quibusdam viridantibus acuminatis foliolis, squammatim corpuscula illa obtegentibus. Cum dehiscunt effigiem capituli equiferi florentis, repræsentant, adnatis unicuique squammulæ apicibus rufis. Cæsalpinus *flosculos* amentaceos exiles vocat, Bauhinus instar nucamentorum minimorum, ut vix adpareant, dicit. Sed nec in his inter Botanicos convenit. Nam quidam abeunte in auras pulvisculo, & baccarum spem eludi, nec ullum fructum insequi scribunt. At Tragus, mense quidem Majo tenuissimum ac luteum pulverem e Juniperis in auras avolare, sed post baccas prorumpere reliquit. Utut sit, magni est in *Medicina* usus. *Ramis* & *virgultis* accensis aër pestilens emendatur. Cinis ex iisdem & baccis nucis juglandis magnitudine in vino suspensus, multum hydropicis prodest. *Radix* decocto Afri Medici in lue ve-

nerea utuntur. E *baccis* fit *decoctum* cum aceto, quo dentes dolentes colluuntur: cum vino generoso, addito colaturæ croci momento, quo menses cientur; *Aqua*, quæ fœtum quodque mortuum extrahit. *Spiritus*, qui insequente semicupio cum Malva & Chamæmelo incocta, duorum cochlearium pondere, calculosis propinatur; *Oleum*, cujus guttula pani adpersa urinas violarum odore imbuat, convenienter sumpta, calculosis & urinæ difficultate laborantibus propinatur; *succus*, qui ad duodecim annos durare potest, & vere Theriaca germanorum dici potest, tum quod contra venena efficax, tum quod corporibus ipsorum convenientissima; *Sal* denique, quod inter egregia sudorifera computari debet. Nullum ligni genus carbonem præbet, qui diutius ignem conservet.

2. *Juniperus vulgaris arbor*, sola Clas. l. c. Bauh. l. c. magnitudine a priore differt. Non tum in Hispania, ut Plinius & Clusius notarunt, sed & alibi nascitur. In Castella nova supra Segobiam frequens, exque ea trabes & contignationes ab incolis parantur. In Belgio cultioribus hortis, justam quoque arboris magnitudinem attingit. In monte la Chaux, circa Vandacourt & Blaumont, altitudinem duorum hominum excedit, crasso nucis caudice, ut inde scyphi tormentur. In Hertruria denique agro Senensi, cujus fructus sylvestris, crassior & dulcior. Vidit & Patavii in horto Nobilis Bembi mense Januario Bauhinus.

II. *Juniperus montana minor*, Gesner. in horto. Clas. H. P. l. 1. c. 25. folio latiore, fructuque longiore, dicitur Gesnero *minima*, Clusio *Alpina*. Cubitalem altitudinem non excedit, sed quasi humi spargitur. *Rami* sunt vulgari multo crassiores & breviores, lenti & contorti. Tenellos *folia* terna, æqualiter semper nascentia, breviora, crassiora, pungentia ambiunt, quibus color exterius viridis, interius ex cæruleo candicans, *fructus* vulgari similis, sed paulo longior, per maturitatem niger, & ejusdem saporis. *Conspecta* in scopulis Dürrenstein & Etscher. *Ramulus* Bauhin. H. Bauhino

P. l. 9. c. 25. *Bauhino ex Delphinatu missus*, rugoso erat & nigricante cortice, multis adnatis furculis fissus, denso foliorum agmine, ut ramuli vix potuerint conspici.

III. *Juniperus major* est triplex
1. *bacca cærulea*, 2. *bacca rufescente*.
3. *fructu nucis magnitudine*.

Lobel. Ad. vers. p. 448. observ. p. 629. 1. *Juniperus major bacca cærulea* est *Juniperus maximus Illyricus* Lobelii, Bauhini & Tabernomontani, de qua ita Lobelius. Juniperi ex Istria quasdam habuimus plantas, non dispares fronde & figura Oxyarceuthidi, sive acutæ Junipero, sed fructus erat teres, oblongior, mediocris olivæ par. *Bacca* erat cærulea.

Clas. H. P. l. 1. c. 26. Matthiol. ad Dioscor. l. 1. c. 89. Lobel. Ad. vers. p. 448. Cordus ad Dioscor. l. 1. c. 106. 2. *Juniperus major bacca rufescente*, Bauhino *Oxycedrus Theophrasti* & Galeni, Matthiolo & Tabernom, *Cedrus phænicea*, Clusio *Oxycedrus*, Cordo *Cedrus magna* seu *Juniperus peregrina*, Lobelio *Oxyarceuthis* seu *Juniperus acuta*, aliis *Cedrus Lycia Theophrasti*. *Caudex* magnam partem contortus; *cortex* tenuis & rufescens, *folia* pungentia, vulgari longiora & rariora, terna semper circa ramulos. *Fructus* initio viridis, dein flavescent, tandem punicei coloris, sæpe avellanæ magnitudine, squammarum veluti rudimentis obsitus. Huic *nuclei* tres aut quatuor inæquales, majores, medulla intus alba. In Italia apud Montignosam, Lucensium castrum, non procul a mari, fructus avellanis non cedunt. *Provenit* plerisque Hispaniæ & Galliæ Narbonensis locis asperis. Nusquam major Clusio, quam supra Segobiam & Guadaram, visa. Arboris magnitudinem æquabat; truncus humani corporis crassitiem. *Ædium* contignationes & trabes ex eo. Observata in ejusdem mense Octobri *ramis plantula*, digiti longitudine, visci instar, ramosa, geniculata, viridis, flavescent interdum, ramulis myricæ recenter enatis, quam nonnulli *Salicorniam*, Monspelianam *Sempervivum marinum*

vocant, sed paulo minoribus. Ex *Juniperus* tremis interdum veluti fructus inhæret, Musci, qui in arboribus aut saxis nascitur, persimilis. Acidi est saporis, & valde adstringit. Ex *baccis* vino remollitis exprimitur liquor, qui saccharo exceptus, ex pulmone & pectore putulenta educit; ac tempore pestis inter præservativa censetur. *Adfinis* ei, si non eadem, quam Scaliger Afris *Ettalche*, Arabibus *Harar* dici scribit. *Æmulatur* maxime *Cedrum*. Leo magnam esse, spinosam, foliis Juniperi scribit. *Medulla* in Numidia candida, in Æthiopia nigra, in Lybia purpurea vel violacea, cujus scobe vice Guajaci Medici in curando morbo Neapolitano utuntur. *Fundit & gummi*, quo Afri, quia mastichen odore & colore redolet, mastichen adulterare solent. Videtur ejus Thevetus sub nomine *Elabeben* meminisse, quæ in insula Cicone provenit, spinosa, & Junipero valde similis. Eadem etiam forte est cum illa, quam Hermolaus *Capida* vocat, Junipero simili, & quam a Catone ita dictam invenit, ad lotium movendum.

3. *Juniperus major fructu nucis magnitudine*, describitur a Bellonio, quod in Cedri altitudinem adsurgat, fructu sit dulci, Gallæ quodammodo simili, eduli, nucleo nucleorum in olivis æmulo.

Ex Exoticis huc pertinet *Arbor Americana Oxyacanthæ* similis. Clas. Exot. l. 1. c. 6. Bauhin. H. P. l. 9. c. 29. p. 302. Adsurgit ad octo pedum altitudinem, & late se in multos ramos spinosos spargit. *Folia* instar foliorum spinæ adpendicis dissecta, magis tamen virentia, & ad rutæ accedentia colorem. *Lignum* ab ea resectum, quod Garetus ad Clusium misit, pedalis erat longitudinis, crassum, contortum, cui *cortex* lævis, sed qui totus resinæ cujusdam subflavi coloris grumis quasi tessellatim dispositis erat obsitus, odore mastichis, quando ad ignem admovebatur. *Ligni materies* gravis, dura & candicans.

Thuja &
Bruta.

PUNCTUM IV.

De Thuja seu Thyia & Bruta.

I.

Theophr.
H. P. l. 5.
c. 5.

Plin. H. N.
l. 5. c. 1.

Theophr.
H. P. l. 4. c. 1.

Plin. H. N.
l. 13. c. 15.

Thuja seu Thyium arbor describitur a Theophrasto, Plinioque Citrus Atlantica dicitur. Radice nihil crispus, seu ἐλότερον: forma cupresso similis, ramis, foliis, caudice & fructu; vel potius ceu cupressus sylvestris. Fabæ hic magnitudine, θυώδες-eros, vel θεωδές-eros, cum Gaza si mavis. Nascitur apud Ammonis fanum, atque in Cyrenensi agro: copiosaque vel ubi urbs tempore Theophrasti erat. Provenit & in Atlante. Suetonius Paulinus (quem Consulem vidimus) primus Romanorum ducum transgressus quoque Atlantem aliquot milliarius spatio, prodidit de excelsitate quidem ejus, quæ cæteri imas radices densis altisque repletas sylvis incognito genere arborum, proceritatem spectabilem esse enodi nitore, frondes cupressis similes, præterque gravitatem odoris, tenui eas obduci lanugine: quibus addita arte, posse, quales e bombyce, vestes confici. Anchorarius mons citerioris Mauritaniæ laudatissimos dabat, tempore Plinii jam exhaustus. Theophrastus *locis argentibus* in altum enasci reliquit. Ex ligno contignationes vetustissimæ memorabantur, ἀσπαρὲς γὰρ ὅλον τὸ ξύλον. Ex radice σπεδαίστατα τῶν ἔργων, & simulacra sculpere solebant. Ex eodem forte ligno θυώδης Helenæ thalamus; nisi forte θυώδης bonis odoribus repletum esse velis. Huic & mensarum insania debetur, quas *fæminæ* viris contra margaritas regerebant. Exstat, inquit Plinius, hodie M. Ciceronis in illa paupertate, & quod magis mirum est, illo ævo emta H. S. x: memoratur & Galli Asinii H. S. xi. Venundatæ sunt & duæ Juba rege vendente: quarum alteri pretium fuit H. S. xv. alteri paulo minus. Interiit nuper incendio a Cethegis descendens. H. S. xiv. permutata, latifundii taxatione, si quis prædia tanti mercari malit. Magnitudo amplissima adhuc fuit, unius commissæ ex orbibus dimidiatis duobus, a rege Mauritaniæ Pto-

lomæo, quatuor pedum & semipedis per medium ambitum, crassitudine quadrantali. Majusque miraculum in ea est artis, latente junctura, quam potuisset esse natura solidæ. Item a Nomio, Tiberii Cæsaris liberti, cognomen trahentis, tribus sicilicis infra quatuor pedes, totidemque infra semipedem crassitudinis: Qua in re non omittendum videtur: Tiberio principi mensam quatuor pedes sextante & sicilico excedentem, tota vero crassitudine fescunciali, operimento laminæ vestitam fuisse, cum tam opima Nomio liberti ejus esset, cujus materia erat tuber. Hoc est radicis vitium, maximeque in eo laudatum, quod sub terra totum fuerit, & rarius, quam quæ superne, quæque gignuntur etiam in ramis propriæque quod tanti emitur, arborum vitium est, quarum amplitudo ac radices æstimari possunt ex orbibus. Mensis, addit, præcipua dos in venis crispis, vel in vertice variis. Illud oblongo evenit discursu, ideoque tigrinæ adpellantur: hoc intorto, & ideo tales pantherinæ vocantur. Sunt & undatim crispæ, majore gratia, si pavonum caudæ oculos imitentur. Magna vero post has gratia extra prædictas crispis densa, veluti grani congerie, quas ob id a similitudine apiatas vocant. Summa vero omnium in colore. Hic maxime mulsi placet, suis refulgens venis. Post hæc amplitudo est jam totius caudicis. Juvant plura quoque in una mensa vitia: lignum, ita vocatur materia surda, & indigesta simplicitas, aut platani foliorum modo digesta: item ilignæ venæ similitudo, vel coloris: & quibus maxime obnoxias fecere æstus ventique, rimæ, aut capillamenta rimas imitata. Postea muræna nigro transcurrentes limite variisque corticum punctis adprehensus papaverum modo, & in totum atro propior color, maculæve discolores. Virides terra condunt barbari, & illinunt cetera. Artifices vero frumenti acervis im-

imponunt septenis diebus, totidem intermissis: mirumque ponderi quantum ita detrahant. Naufragia docuere nuper, hanc quoque materiam siccata mari, duritie incorrupta spissari, non ullo modo vehementius. Nutriuntur optime, splendescuntque, manu sicca fricata a balineis maxime, nec a vinis læduntur, ut his genitæ. An *Homero cognita* fuerit, quod Plinio visum, dubitatur. Scribit quidem *ῥύς* & cedri odorem cum mandato Jovis antrum Calypsus (non *Circæ*) petiisset, persensisse longe Mercurium: sed id de odoramento potius accipiendum quidam putant, ex quo convolutum in sacris nidorem Græci vetustissimi novere. Ideo & Dionysius Periegetes vocem pro odoramento etiam fumsit, & Avienus de Ladanum intellexit. Vix Thyina ligna aliquid odoris exhibere; nuspiam in Græcia, soli Africæ arborem propriam, quæ Homeri ignota temporibus. Nollem tamen a Plinio abire. Ladanum nemo *ῥύς* vocavit. *Ἐίδος δένδρεος ἐν ὁδοῖς* apud Eustathium *Thyūm*: Periegetes & aromatis & ligni tanquam odorati meminit; Dioscorides Agallochum thyino ligno simile dicit, diserteque Plinius ubi de unguentis ait, Iliacis temporibus non fuisse, nec thure supplicatum. Cedri tantum & Citri suorum fruticum in sacris fumo convolutum nidorem verius quam odorem noverant, jam rosæ succo reperto. Notam tum Egyptiacis & Phœnicibus Africam, unde Homerus habere potuit; Nota & Homero, qui Ulyssē in Lotophagorum insulam apud Syrtēs adpulisse fingit.

Plin. H. N.
l. 15. c. 16.

Homer.
Odyss. 5.

Dionys.
Afer in
Periegesi.

Plin. H. N.
l. 13. c. 1.

Bauhin. H.
P. l. 9. c. 20.
p. 286.
Clus. H. P.
l. 1. c. 24.
p. 36.

II. Bauhino ut & Camerario *Thuya* Theophrasti putatur esse *Arbor vitæ* Bellonii, Clusii, Dodonæi & aliorum, *Arbor filici similis* Oviedi, & *Arbor paradysæa Lutetiana* Lugdunensi, *Cedrus Lycia* Lobelii, *Arbor vitæ* sive *paradysiaca* vulgo dicta odorata ad *sabinam accedens* Bauhini. Hæc autem etiam in nostro solo ad justæ arboris proceritatem excrevit. *Caudex* est rectus nodosus; *cortex* cinereus aut rubens; *materies* abiegna resinosa.

Ramis perpetua coma virentibus, & *Tauja* & alarum modo expansis, qui in ramulos planos alternatim e latere succrescentes divisi, abeunt denuo in multa, oblonga *folia*, numerosis foliolis compressis, quaterna medium gibbosum complectentia ex ramulorum extremis, aut paulo citra. Vere oriuntur *flores* pusilli, flavescentes, quorum nonnulli deinde in *conos* parvos sublongos, Pinei nuclei magnitudine efformantur, & sex tenellis squamulis compactos, initio virides, deinde pallecentes, postremo ubi plane maturuerunt nigricantes, qui in quatuor carinas dehiscentes, semina ostentant sublonga, quaterna, plerumque paleacea, medio paululum extuberante, in quo medulla acris & amariusculi saporis. Coni hi non nisi detracti fere, aut tabidi pediculo excidunt. Odor plantæ etiam siccatae gravis, adeo fixus, ut folium si contriveris, difficulter eluas. Adlata est sub isto titulo Francisci I. Regis Gallorum tempore ex Canada Septentrionalis Americæ insula: primumque a Clusio in horto regio Fontebellaqueo visa. Nunc in plerisque Germaniæ hortis colitur. Rami depacti radices facile agunt, si umbroso & fertili solo concrederis. *Nascitur* & semine: sed tenella, priusquam in ramos explicetur. Juniperum majorem æmulatur. Patientissima eadem frigoris: folia tamen fuliginosum colorem hyeme contrahunt, qui novo vere pristino virori restituitur. Extrahitur scilicet sensim solis calore crassum humidum, quo viror perit; hybernis pluviis receptum, non citius ad folia deferretur, quod lignum & corticem conclusa teneat, quam verno tempore aperiantur. *Usus* si spectes, digere & abstergere creditur. Rami contusi & naribus impositi sanguinem valido odore eliciunt. Aqua & oleum chymice educta, podagricis doloribus opitulantur. An *Thujæ* Theophrasti respondeat, dubitari potest. Equidem folia ex foliolis cupressi modo ex tenellis squammulis compacta sunt: plana tamen eadem, non rotunda. Fructus cupresso larignis

Thuja & rignis conis adsimilis, crassior tamen Bruta. & compactior: Arbori vitæ exiguus nuclei pinei magnitudine. Cupressus ramos sursum attollit; arbor vitæ in planas veluti alas expansos, in latum diffundit. Taceo alia.

III. Bruta seu Brathys arbor est cupresso fusæ similis, exalbidis ramis, jucundi odoris accensa, & cum miraculo historiis Claudii Cæsaris prædicata. Folia ejus inspergere positionibus Parthis suetum. Odorem esse proximum Cedro, fumumque ejus contra exitialia (male contra ligna alia) remedio. Nascitur ultra Pasitigrim, in finibus oppidi Sitacæ, monte Zagro. Petitur in Elymæos.

Bellon. de coniteris.

IV. Bruta Sabinam suam alteram, quæ in montis Amani, & Olympi Phrygiæ cacuminibus provenit, comparat Bellonius, eidemque Arboris Vitæ nomen imponit. Arbor est procera, amygdali altitudinem petens. Caudex sinuosus, crassus, quandoque adeo, ut hominis ulna comprehendendi nequeat. Cortex vitis modo

crassus, rufus; Materies indiluti ruboris, qui in nigredinem degenerat. Rami junipero majore latiores, magisque divulsi, adnatis multis adpendicibus, perpetuo comosi. Folia cupressinis similia, frequentiora tamen, amara, & resinofum quid præ se ferentia. Flos nullus, sed statim seminis rudimentum. Baccæ vix cecidibus crassiores, in extremis ramulorum surculis oriuntur. Perpetuo singuli suam ferunt, deceduntque anniculæ, cum aliæ jam ad maturitatem pervenere. Virent initio, per maturitatem ex cyaneo nigricant, & os leviter excalescunt; merulis & turdis gratissimus cibus. Resina in caudice, quæ commanducata, tota pulverulenta in os diffunditur, nec amplius cogitur. Expetitur arbor a Turcis ad testudines, quod nunquam in rimas dehiscat. Thujam non esse vides. Brutam esse vix ausim dicere. cum cortex huic sit rufus; in illa nulla fructus mentio. Sed nec Arborem vitæ, quam descripsimus, esse posse ex floribus, fructu longo, & resina in caudice colliges.

PUNCTVM V.

De Asparago & Corruda.

I.

Asparagus & Corruda.

Vid. TABULA LXXX.

Dioscor. M. M. l. 2. c. 152.

Colum. R. R. l. 11. c. 3.

Plin. H. N. l. 12. c. 18.

Tria ni fallor Asparagi plantæ apud Veteres occurrunt genera, hortensis, sylvestris & palustris. I. Hortensis κήπειος vel κήπευτος seu altilis, sativus, frutex est πολύκλαδος, multicaulis, foliis numerosis, longis, sceniculo proximis; radice rotunda, grandi, & κόνδυλον habente. Eximia magnitudine crescere apud Athenæum; spinosum esse apud Columellam videre est, qui cum spinam fecerit, scorpiones perurendos in suo loco esse docet. Nihil hi aliud, quam rami spinosi, quibus olim in tormentis utebantur. Putabatur ex tufis & defossis arietum carnibus nasci, quod Dioscoridi ἀπό θανόν. Imo apud Cassianum Bassum occurrit, δόκλυρα si perforentur & pungantur, asparagum productura. Nec deest circa Goam nostris temporibus exemplum, quod fidem veteribus conciliare pos-

set. Nullum vero gratius eis tempore Plinii solum, quam Ravennatium hortorum. Usus ejus haud spernendus. Nam cauliculi ex vino albo triti renum dolores sedant: radix in aceto aut vino decocta σέμεντα curat. cum ficibus vel ciceribus σραγγυρίαν levat. Amuleti ratione vel in decocto ἀτόκιον facere, quod & Chrysippus apud Plinium prodidit, vix credibile; cum Simeon Sethi προσιθῆναι τῇ γονῇ dicat, celeriusque in sanguinem abire, & Plinius ipse Venerem promovere testetur. II. Sylvestris asparagus, qui & πετραίος & Corruda Plinio, vulgaris est Dioscoridi notæ. Tales enim natura fecerat, ut quisque demeteret passim. Ex toto aculeatam facit Theophrastus, altissime Plinius. Radice est alta, numerosa & tam crebra, ut pars earum superna tora connexa & continua

Plin. H. N. l. 20. c. 10.

Theophr.

H. P. l. 6.

c. 1. & 3.

Plin. H. N.

l. 19. c. 4. 8.

tinua reddatur, ex qua vel ipforum caulium proventus facitatur. *Caulis* exit ἐκ τῆς ἀσφαργίας vere, ciboque idoneus est, (ἀσπάραγον κατ' ἐξοχὴν vocant) deinde durescit, καὶ ἐξανθείται προίσις τῆς ὥρας. *Flos* ex hoc solum (expunge ἐκ) καὶ ἐκ ἑξ ἄλλων τῶν προτέρων. Nullum παρὰ τὰς ἀκανθὰς aculeum gerit; sed καρυώδες τι μικρὸν, seu *fastigium clavæ simile*, in quo florem habet parvum. Ideo *Plinius* scripsit, virere thyrsō primo emicante, qui caulem educens. *Flos* ex ipso tempore ipso fastigiatus in thoros strietur. *Fru-*

ctum proferre dulcissimum apud *Plutarchum* habetur; qui vel ideo in Bœotia sponsam velantes asparago coronasse scribit, quod ἡδυστος κέρπος ἐκ τραχυτάτης ἀκάνθης prodiret. *Nascitur* in petrosis & aliis, postque autumni æquinoctium floret. In *Lybia*, *Getulia* maximus. Instar arundinis *Cypriæ* fama est apud *Athenæum* crassescere, adfurgere ad cubitos circiter XX. At in montosis καὶ παρακειανίτιδι crassitie μεγάλων καρθῶνων, proceritate XX. cubitorum esse. Qui in *Neside* *Campaniæ* insula sponte nascitur, optimus est. *Cauliculi*

leviter decocti in emollienda alvo & cienda urina, in usu & olim. *Radicum* contra nephritidem, ischiadem, & morbum regium; præstantioremque ad omnes interaneorum morbos sativo, *Athenæus* credidit. *Galenus* inter temperata refert; radices deobstruere, & dentium dolores siccando sanare. Creditum etiam canes, si asparagorum decoctum hausissent, emori. III. *Palustris* ἑλειος, spinosus quoque est, & ab antiquis colebatur. *Bassus* enim *Octobri* purgare jubet. *Acriora* ex eodem medicamenta apud *Ætium*, ubi pro ἑλειον corrupte ἑλιον scribitur. *Βασιλικός*, cujus apud *Galenum* mentio, ex prioribus generibus erit. *Altilis* certe. Est tamen & aliud genus *Plinio* incultius asparago, mitius corruda, passim etiam in montibus nascens, refertis superioris *Germaniæ* campis, non infaceto *Tiberii* *Cæsaris* dicto, herbam ibi quandam nasci, simillimam asparago.

II. *Bauhinus* ex *MODERNIS*, duplicem in genere *Asparagum* facit,

molli folio, 2. *acuto folio*, qui *Corruda* dicitur. Ille vix notus veteribus. *Asparagus* & *Corruda*. Ubique enim acuti folii meminere: & expressissime *Simeon Sethi* non fuisse ante se cognitum scribit, sed eos tantum, qui *Elæodaphni* asparagi amari. Nunc inquit μετακομίζεται κατὰ τὸν τῆ ἔαρος καιρὸν, καὶ παρὰ τινῶν διαγνώσκεται.

I. *Asparagus molli folio* est quadruplex, 1. *sativus*, 2. *sylvestris tenuissimo folio*, 3. *maritimus crassiore folio*.

I. *Asparagus molli folio sativus*, duplex, *vulgaris* nempe & *platycaulis*. I. *Asparagus molli folio sativus vulgaris*, aliis *altilis*, *domesticus* & *hortensis* est. *Radices* habet crassas, longas, teretes, molles, numerosas, ab uno transversō, aspero & villosō dorso utrinque in obliquum descendentes, sapore glutinoso & dulci. *Caules* primo vere teneros, longos, teretes, virides, glabros & sine foliis, ab uno cespite plures, qui paulatim, nisi rescindantur, in altitudinem adfurgunt, fiuntque bicubitales aut altiores, crassi, duri, rotundi, in multos diffusi ramos, qui foliolis convestiantur mollibus, virentibus, copiosis quidem, sed exiguis, & capillamenti instar tenuibus, cum fœniculo quandam similitudinem habentibus. *Flosculi* secundum ramulos exeunt copiosi, minuti & pallidi. Succedunt *baccæ* pisi vulgaris magnitudine, aut majores, rotundæ, initio virides, per maturitatem coralli similitudine rubentes, intus carne sua duo aut tria nigra & corneæ soliditatis semina claudentes. *Floret* *Julio*, *Augusto* & *Septembri* *baccæ* maturescunt. *Seritur* in hortis solo pingui, humido & bene subactō. Cum vero in pratis *Alfatia* *Basileæ* vicinis, & ad *Danubium* sitis, nec non in *Burgundia* circa *Vesuntium* proveniat, a *Plinio* tangi eum in superioris *Germaniæ* campis provenire scribit, & a *Clusio* mitiorem sponte nascentem vocari, opinatur *Bauhinus*. *Nascitur* & apud *Hollandos* in tumulorum arenosorum ad *Oceani* littora convallibus, subindeque sativo crassior est.

Plutarch. 1.
de præcept.
sponsal.

Athen. Di-
pnos. 1. 2.

Æt. 1. 6.
c. 10.

Lobel. ob-
serv. p. 458.
Bauhin. H.
P. 136. c. 24.
p. 721.
Stapel. in
Theophr.
1. 6. c. 3.
p. 603.

Bauh. Phy-
top. 1. 12.

Aspara-
gus &
Corruda.
Matthiol. in
Diosc. l. 2.
p. 118.
c. 375.

Abensina
Ferult. l. 4.

Schenck.
observ. l. 1.
obs. 424.

Bauh. H. P.
l. 36. c. 24.
p. 741.

Bauh. Phy-
top. l. 12. l. 6.
n. 490.

Bauhin. H.
P. l. 36.
c. 24. p. 721.

Clus. H. P.
l. 5. c. 60.
p. 179.

Clus. H. P.
l. 5. c. 60.
p. 177.

Nascuntur & totius anni decursu, si ubi fructum legeris, radices, quæ summo cespite vagantur, circumfoderis ac aperueris. Laudatur in cibo Sethi, qui πάντων λαχάνων τροφιμώτατον vocat. καὶ τὴν φύσιν τιθέναι ἐν μετεγμῳ (lege μεταγμῳ) τε τῶν λαχάνων καὶ κρεῶν ἑστίας. Recentia germina cum vino, butyro, pipere & aceto cocta, alvum emollire, urinam ciere, & genituram minuere, si excessus accedat. Fœtida ab eis urina Abensina; corpori odor conciliatur. Radices inter deobstruentia: dentes eradicare dicuntur absque dolore, si iis siccatæ infigantur. II. *Asparagus molli folio sativus platycaulis* apud Bauhinum habetur. Caulis ei tricubitalis, unciam latus, compressus, striatus, ex quo ramuli temere & nullo ordine prodeunt, ut in asparago vulgari: cui etiam foliis, floribus & fructu respondet. In horto Comitum a Leiningen in Palatinatu quotannis tali forma prodire solebat.

2. *Asparagus sylvestris molli & tenuissimo folio*, Cæsalp. palatinum leporis vocatur, & sativo in omnibus similis, sola transplantatione & cultura ab eo differt.

3. *Asparagus maritimus molli & crassiore folio* est Galeno *Asparagus ἑλαίος*, Cæsalp. *Asparagi alterum genus*. Asparagi ei gustu gratiores, utpote qui sapore quodam fungos prunulos, ut Cæsalp. ait, imitantur. Caules breviores, per se stantes; ramuli longiores; foliola crassiora, firmiora, ex cæruleo virentia. Flosculi longiore pediculo pendentes; baccae majores, sativæ, nec adeo intense corallii instar rubentes, inque eis semina ad summum sex nigra. Floret vere & hortorum umbrosa amat. Colligi & in pratis ad Danubium Viennæ vicinis potest. Magna enim ejus ibi copia, crassiora & teneriora germina.

II. *Asparagus acuto folio*, *Corruda dictus*, 1. *petræus*, 2. *tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum*, 3. *spinis horridus*.

1. *Asparagus acuto folio petræus*, Dioscoridi & Galeno *petræus*, Plinio

Corruda & sylvestris asparagus, Clusio *Corruda prior*, *Asparagi prima species* Cæsalp. fruticosa planta est. Virgæ duæ, tres aut plures, candidæ, lignosæ, ramosæ; quina aut sena foliola circa ea, breviora, rigidiuscula, pungentia. Flosculi lutei e senis foliolis inter folia sub alis, violæ Martiæ odore, in Augusto prorumpunt. Baccae initio virides, mox cinereæ, quibus semen nigrum, durum. Septembri maturefcit. Radices capitatae, multæ, crassæ. Provenit in agro Salmanticensi locis petrosis; in regno Granatenfi & Castellæ in sepibus & arvis cultis. In Belgio nullum fructum producit.

2. *Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum*, Dodon. *Asparagus sylvestris alter*, Clus. *Corruda altera*; Cæsalp. *Asparagi quartum genus*, tres aut quatuor spinas, ab eodem exortu hinc inde sparsas, virides, in ramis viridibus & mollioribus, pro foliis gerit. Flos non visus Clusio. Baccae frequentes, rotundæ, initio virides, per maturitatem mense Novembri nigricantes, succo virente & semine unico plerumque, eoque duro gravidæ. Occurrit frequens ad Tagum in Lusitania, solo petroso, in collibus & sepibus. Passus est se & in Belgio feri.

3. *Asparagus aculeatus spinis horridus*, Bellonio *Polytricha*, Dodon. *Sylvestris tertia*, Clus. *Corruda tertia*, cubitales & lignosæ virgas ostentat. Spinæ candicantes deorsum flexæ: quina aut sena folia ex eodem capite, larici similia, subdulcia & gummosa. Flos inter folia ex longo petiolo ex alarum sinu, ex viridi pallescens. Fructus rotundus, tricoccus adspectu, sed cui nisi unicum granum, bina aliquando, color initio subviridis & carnosus, pulpa lenta & viscida. Fort initio veris aliquot turiones, qui tum aliorum instar mandisolent. Prodit supra Ulyssiponem salebrosis locis, juxta vias, & quidem copiosissime. Observatus & in Creta Bellonio, sub *Polytrichæ* nomine.

Clus. l. c.
Dodon. H.
P. Petr. 5.
l. 4. c. 13.

Dodon. l. c.
Clus. H. P.
l. c.
Bellon. observ.
l. 1. c. 18.

De Arboribus Bacciferis Classis sexta.

PUNCTVM I.

De Taxo.

I.

Vid.
TAB.
LXXX.
Dioscor. M.
M. l. 4. c. 80.
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 6. & 10.

Abieti quidem *Taxus* & foliis & magnitudine apud Dioscoridem similis; volui tamen tanquam bacciferam cum *Dracone* huc referre. Unius est Theophrasto generis, ex quo describere placet, ὀρθοφυῆς καὶ ἐνανθής, similisque abieti, nisi quod non tam excelsa, magisque πολυμάχalos, seu alis sinuata. *Folium* (germinat tardissime) perpetui viroris, abieti simile, sed λιπαρώτερον. *Lignum* μαλακώτερον. In Arcadia nigrum est, est & puniceum: in Ida flavum & Cedro simile. Unde fraudulenter pro cedro venditur. Fraus detegitur, si accenderis. Olet hoc egregie, foetet illud. Idem totum cor, si ὁ φλοιὸς περιαιρεθῇ; qui cedro tum scabritie, tum colore similis. *Radices* breves, graciles, & quæ in superficie. Rara circa Idam. At in Macedonia, Arcadiaque fructum abunde cum abiete profert, rotundum, faba, græca nempe, paulo maiorem, rufum, tactu mollem. Plinius minus virentem gracilem, tristem ac duram facit; nullo succo, ex omnibus solam bacciferam. De venenositate in diversa abeunt Veteres. Theophrastus a foliis λόφρα (male κολόφρα. λόφρα sunt animalia, quæ caudam & jubam habent; illa, quæ non habent. hic jumenta intelliguntur) ἀποθνήσκειν; τὰ δὲ μηρυκάζοντα, ruminantia, εἰδὲν πᾶσαι dixit, si sumssissent. mandi ab hominibus, esseque suavem & innoxiam, prodidisse id Græcos. In Italia nec jumentis nocere, apud Plinium habemus. Eidem mas noxio fructu. Lethale quippe baccis in Hispania præcipue venenum inest; vasa etiam victoria vinis facta in Gallia mortifera fuisse compertum est. Dioscorides, baccis noxiam in Italia, hominesque in alvi profluvium incidere. Umbra in Narbonensi homines lædi, mori aliquando, scripsit. Sestius

apud Plinium in Arcadia tam pestilentis veneni esse, ut, qui obdormiant sub ea, cibumve adsumant, moriantur. Sunt, qui toxica venena quondam *taxica* ab hac arbore adpellata scribunt, quibus sagittæ tingantur; repertumque innoxiam fieri, si in ipsam arborem ferreus clavus adigatur. Plutarchus tempore incipientis ἀνθήσεως nocere prodidit, hinc & Lucretius flores odore necare cecinit, quod tum succo sit maxime prægnans. Nicander quod isthmia & angustam laryngis viam intercipiat: meracoque succurri. Utut sit, lethalem omnibus compertum, & potum frigiditatem totius nec non πνίγμον inducere. Eburonum Rex se taxo exanimavit. Fumus mures necat. Aviculæ, quæ baccas comedere, in Italia, nigrescunt. Corona ex eo inter lugubria. Mariæ παρακολληµατα κνέστοις καὶ ὑποβάττοις suppeditat.

II. RECENTIORIBVS est *Taxus*, quæ Cordo *Milax arbor*, Castori *Smilax*, arbor procera, sed quæ ab abiete vincatur. *Radix* brevis, & per summa cespitum repit. *Truncus* mediocris crassitudinis, circa verticem ramosus, reliqua parte enodis. *Cortex* squamosus, rimosus, scaber, exalbidus. *Materies* e nigro rufescit, multis intercurrentibus venis. Bauhinus partim rubere, partim ex albo flavescere scribit. *Rami* in latus effunduntur, in complures virgas & alas distributi. *Folia* abieti & piceæ quidem similia, sed ab utrisque distincta. Ab istis, quod non sunt teretia, sed culmum lata: ab illis, quod sint infirmiora, minusque rigida, nec explicata agmina servant, sed eodem vergentia fere coincidunt. Quod si singularia spectes, (verba sunt Bauhini) Taxi folia, sunt ea ab ieguīs acutiore mucrone donata, su-

Plutarch. l. 4. quaest. sympol. quaest. 1.

Nicand. in alexipharmacis.

Theophr. H. P. l. 5. c. 8.

Theophr. H. P. l. 5. c. 8.

Plin. H. N. l. 16. c. 10.

Cord. in Dioscorid. Stapel. in Theophr. l. 3. c. 10. Bauhin. H. P. l. 9. c. 3. p. 215.

Bauhin. l. c. p. 242.

Taxus. perne atro virore splendentia, inferne nitore destituta, unicolia tamen & viridantia, nervo secundum longitudinem decurrente, cum abiegna elatiorem averſa parte habeant coſtam, coloreque glauco ſint prædita, guſtu amaricante: porro autem in extremis ramulis circumquaque inter folia oriuntur perpufilla, ſed copioſa capitella, ſublonga, ſquammata, ex quibus veluti floſculi emicant Juniperinis fere ſimiles, & virore pallescentes, qui deinde in meros & muſcoſos apices fatiſcunt: circa menſem Auguſtum, uti obſervavimus, fert baccas ex calyce ita emergentes, ut ſimile quid habere videantur cum glande: poſtquam vero maturuere, quod fit menſe Novembri, nihil plane ſimile habent cum glande, ſed figura quodammodo referunt florem Vitis Idææ, quippe parvo virente atque ſquammato calyculo, brevi pediculo adnato fructus inhaeret, grano Juniperino major, ſuperne apertus atque hians, velut ex carnoſa cute conſtans, colore pulcerrimo & ſplendente coccineo conſpicuus, intus cavus, ſucco præditus viſcido ac dulci, in quo *granum* latitat, pipere minus, nec exacte rotundum, ſed leviter compreſſum, colore inter pulchrum & ſpadiceum medio, cortice duriuſculo, medullam continens ſaporis non ingrati. Hoc granum fructus capacitatem non adimplet, ſed undique fere intactum a fructus pellicula in medio ſitum eſt, baccæ imo adhærens, haud ſecus ac ipſa ex pediculo enatum. *Nāſcitur* in Italia, Gallia, Anglia, Germania, locis umbroſis, ſaxoſis & præruptis. Tiguri duas eadem proceritate vigere, quæ ſe puero erant, jam fere per XL annos, ſcripſit Geſnerus, raroque fructificare. In horto Montbelgardenſi fruſtra plantata. Supra lacum Acronium in pago zu Bauru columna ex eo ſub dio, ut ajunt, ad quam maleſci adligantur. Tardiſſime *germinat*; fructum Septembre abſolvit. Quantum ad *Uſum*. *Materia* concinnandis menſis, haſtis & arcubus expetita. Pulcri hi & puniceo colore; quales ab ulmo fruſtra exſpectes, niſi tinctura acceſſerit. In Episcopatu Salisburgenſi ſcyphi, cucurbitulæ & epiſtomia ex ea; quæ tuta vix exiſtimarem, niſi prius in vino vel aceto macerentur. De *baccarum* venenofitate nec inter modernos convenit. In Italia & apud Norimbergenſes nigreſcere paſtu earum aviculas, & concidere attonitas, faciliusque capi, Stapelio & Camerario debemus. Orni baccis delectantur, fallunturque ſimilitudine. Earundem eſu in Tridentinis febribus & dyſenteria corripit homines, Matthiolus prodidit. Vaccas, cortice in montibus Burgundicis ſublatas, aſinum alibi deguſtata Taxo, Turturem album cum torque nigra, abſumtis baccis, Bauhino a fide dignis relatum. At Pena innoxie a puerulis in Anglia eſitari, ſequæ ſub hyemem guſtaſſe, non ingrato ſapore, ſed fatuo vel ſubamaro, porcosque velut glande veſci, reliquit. Nulli ſane Angliæ angulo deeſſe hanc, ubi ſemper virente, umbroſa, denſaque ramorum fronde & latiffima, ſimiliter Abietis, pennatis & longis quaſi pectinum radiis, ex atro virentibus comofa, ac in ſepulcretis & areis pro templorum foribus pangi, ad arcendos ſolis æſtus a concione, plebe ſub tegmine taxi conventus agere ſolita, nullo percepto inde vel tantillo incommodo. Camerarius quoque innoxiam ſcribit, ſed ſcobem venenatam adfirmari. Qui morbos ſimulant, pulvere taxi adeo cutim exulcerant, ut deplorati adpareant, quod, ni fallor, a Rhalego Anglo factum. De *generibus* nihil occurrit, hoc unico excepto, miſſum taxi a Cortuſo ad Caſparem Bauhinum ramum glandibus onuſtum, quem in montibus circa Vincentiam menſibus Octobri & Novembri legiſſet. Viſam & a Johanne Lutetia, quæ ſimilem glandibus fructum geſſiſſet: ſed & obſervatam in Ducatu Wirtembergico, quæ nihil habuit, quod glandem exprimeret, licet nec a gallica nec a Vincentina Taxo abiret. Ratio differentia in deſcriptione poſita.

De Dracone arbore.

Vid.

LXXXI.

TABVLA.

Duo sub hoc puncto occurrunt, *Draco arbor*, & ipsius aliquot *adfinēs*.

Clus. H. P.

l. 1. c. 1.

Cadamu-

stus navi-

gat. l. 1. c. 4.

I. *Draco* describente Clusio, pro-
cera est arbor Pinum procul intuen-
tibus referens, adeo æquales semper-
que virentes sunt *rami*. Huic *trun-*
cus crassus, octo aut novem bicubi-
tales ramos, æquales & nudos susti-
nens: hi rursus in summo finduntur,
& in alios ternos aut quaternos ra-
mos cubitales aut paulo ampliores,
brachialisque crassitudinis desinunt,
nudos item & sine foliis: qui in sum-
mo gestant capita plena cubitalium
foliorum, majusculi pollicis latitudi-
ne, sensim in mucronem desinentium,
in medio densiorum, & eminentiore
costa, ut in Iridis foliis, tenuium &
rubentium in lateribus. Mucronem
plane repræsentant ea *folia*, semper-
que virent, & Aloës & Iridis modo,
invicem amplexando nascuntur. Bau-
hinus ad palmæ *folia* aliquo modo
accedere scribit. Striata eidem, vi-
rescentia, & membraneis veluti alis
utrinque donata, colore lucido ad
luteum tendente. *Fructus* exit men-
se Martio racematim compacteque,
exiguicerasi magnitudine, flavesceus,
(veneris aliis) subacidus, quem in
summis capitibus nasci verisimile est.
Tenui pelle contegitur, quo sublato
osseus nucleus, qualis in fructu Rusci
conspicitur. *Monardes* sublata, qua

Monard. H.

Simpl. c. 38.

integritur, pelle, illico *Dracunculum*
adparere prodit, tanto artificio a na-
tura fabricatum, ut a peritissimo ar-
tifice sculptus videatur, collo oblon-
go, ore hiantē, spina aculeis horrida,
cauda oblonga & pedibus conspicuis;
quod fabulosum esse putaveris. Ad-
didi tamen iconem, ut videres. Ex
trunco, qui vehementer scaber, mul-
tis ramis dehiscit, humor per cani-
culæ æstus funditur, qui in rubram
lacrymam densatus, sub *sanguinis*
Draconis nomine venit. Pulcros
ejus grumos servabat Bauhinus, gle-
bis thuri æquales, rotundos ut plu-
rimum, alios inæquales, foris ferru-

Bauhin. H.

P. 1. 3. c. 211.

p. 402.

gineos, fractos pellucidos, coccineos,
concretionē Vernicis duræ, dentibus
fragiles, saporis expertes, salivam
statim & affatim rubore tingentes,
qui candelæ admoti flammam conci-
piunt liquescuntque resinarum instar.
Admixtæ reperiuntur *glebæ*, quæ co-
lorem præcedentis Resinæ egregie
mentiuntur, cæterum concretionē
gummi arabici: non enim accendun-
tur candelæ flammæ admotæ, sed
bullas agunt, crepitantque, in aqua
solvuntur, quam & mucilaginosam
reddunt, dentibusque lentore suo val-
de adhærescunt: & vix leviter sali-
vam rubore tingunt. Agemus de
eo in succis. *Provenit* in insulis Ma-
dera & Canariis, olim Fortunatis di-
ctis, magna ex parte. Cadamustus
ei insulam quandam parvam in Ocea-
no Atlantico prope Maderam adsi-
gnat, quam Lusitani portum sanctum
dixere. Clusius etiam Ulyssipone in
Monasterio D. Virgini sacro, cui no-
men a Gratia, vidit. Lobelius in
Coldenbergii horto Antverpiæ, ex
Hispania delatum, crevisse prodit.
Reccus Pisis in horto Magni Ducis
existare putat. Vis *lacrymæ*, quam
fundit, adstrictoria, & ad muliebres
fluxiones opportuna, de qua proli-
xius inter succos. *Arborem Gaden-*
sem Posidonii apud Strabonem vix di-
xero. Lustravit loca Clusius: nec
ibi quicquam præter salices & unam
alteramque siliquam, obrutis fabur-
ra navium arenacea viridariis, quæ
olim latissima ibi fuere.

II. *Adfinēs Draconi* sunt, 1. *Ez-*
quakuitl Recci. 2. *Yecotli Terentii*.
3. *Tacori folia*. 4. *Prægrande fo-*
lium ex Indiis delatum.

I. *Ezquakuitl* est duplex. *Prima* ^{Reccus R.}
folia fert verbasci, ampla & angu- ^{M. N. H.}
losa. ^{l. 3. c. 22.} *Provenit* Quahuchinanci, Fri- & 23.
gida est & adstringens. Corroborat ^{De Laet}
dentes, & sistit fluxiones, & omnia ^{Ind. occid.}
illa præstat, qua sanguis Draconis. ^{l. 5. c. 22.} *Al-*
tera est huic persimilis, *foliis* tamen
U 2 orbi-

Draco. orbiculatis, hirsutis & asperis; crasso cortice; radice furculosa. *Nascitur* apud Quauhuchuacenses, juxta aquas. Adstringens est, odorata, amara, & quodammodo calefaciens. Liqueor, qui scarificata arbore copiose profluit, oculis inflammatis mire profuit.

Reccus R.
M. N. H.
p. 443.

II. Yecotli Terentii, venas habet foliorum nigras, *florem*. Nerii luteum vasculum bursæ pastoris simile, ejusque divisio in duo vascula adparet. Inter Rhododendri species non male etiam referretur.

Clus. Exot.
l. 2. c. 21.

III. Tacori folia Draconis foliis valde similia sunt, cubitalis & ultra longitudinis, latitudinis uncialis infima parte, deinde paulatim in mucronem gracilescentia. *Nascuntur* in Kajana & Wiapoek. Incolæ dicebantur macerare, contundere, & in tenuia stamina diducere, lini aut feri-

ci instar. Quin & funes ad cigna colliganda ex illis torquebantur.

IV. De folio prægrandi ex Indiis adlato, ita Lobelius. Debemus etiam occiduis Indiis istud coriaceum folium, cui simile aut par latitudine aut crassitie nullum novimus. E Palmæ congeneri arbore evulsum videtur, quin ipsa tota textura asserem bicubitum latum, aut potius tegetem, quaternos aut quinos cubitos longum refert, tegulæ modo fornicatum, & media secundum longitudinem costa semidigitum crassa carinatum, superna ora quasi præsectum esset, margine digitali tenuiore, duriori, clauditur. Universum folium a summo ad imum in villos, iis quadrantenus similes, qui obducunt Nuce[m] indicam aut capillitium texendis funibus aptum, discerpitur, quemadmodum totum est tectoriis ædium & storeis adcommo-
& storeis adcommo-

ARTICVLVS VII.

De Arboribus Bacciferis Classis septima.

PUNCTVM I.

De Fraxino.

Fraxinus. In Classe ultima sunt istæ quatuor.
Vid. I. *Fraxinus*. 2. *Rhus*. 3. *Coccinilea*. 4. *Azedaraeth*.
T A B.
LXXXI.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 11. Plin.
H. N. l. 16.
c. 13.

I. Fraxinus Dioscoridi nota arbor est: duoque ejus apud Veteres genera, *excelsum* nempe & *humile*. 1. *Fraxinus excelsa*, Macedonibus *Bumelia* seu *Fraxinus bubula*, Plinio longa & enodis, quibusdam etiam *lævis* dicitur. *Radix* ei crebra, crassa & μετώρος. *Lignum* candidum εὔκρινον, μαλακώτερον, ἀνοζότερον καὶ ἐλότερον. *Cortex* lævis, spissus, tenuis, & τὴν χροῖαν πυρρόν. *Folia* lauri latifolia, sed εἰς ὀξύτερον συνηγμένα, ambitu ferrata, ἐπακτανθίζοντα, nisi ἐπιματίζοντα velis, ut Gaza legit, quod subsident & pendendant. *Ramulum* totum ceu folio unico constare dixeris, propter τὸ ἅμα φυλλοφορεῖν ἀφ' ἐνὸς μίσχου, & quod per modica versuum intervalla, tan-

quam per genicula, continenter ordineque pendeant, perinde ut in Sorbo. Angustiora eadem, & τῇ χροῖᾳ πρασῳδῇ, seu ποῳδῇ: latioribus etiam internodiis & longis pluribusque conjugationibus. Plinius pennatam folio fecit. *Florere* Idæi negant, adfirmant & ἀκάρπον. Fert tamen in *siliqua* fructum minutum, καρτερὸν, qualis amygdalo, gustu subamarum. βρύα quoque adstringentia gustum, singulaque per se in orbem circumacta, platani pilorum specie; quarum alia circa fructum, alia ἀπρητημένα παλὺ prodeunt. *Gaudet* montosis locis βαθυσκόις καὶ ἐφύδροις: seu, ut Plinius, tenebrosis & humectis syl-
vis, aliquando lapidosis quibusdam agrorum limitibus. *Usus materie* tantus, ut vel hujus causa naturam copiosissimam generasse scribat Plinius; qui eandem post vindemiam
& Ar-

Plin. H. N.
l. 16. c. 18.

& Arcturum cadendam præcipit. Vitruvio in operibus cum fabricatur lenta est, & sub pondere propter humoris abundantiam, non habet rigorem, sed pandat celeriter & vetustate arida facta, emortuo stante liquore fit durior, & in commissuris & in coagmentationibus ab lentitudine firmas recipit concatenationes. Hastæ olim ex ea. Ideo Plinius Homeri præconio & Achillis hasta nobilitatam dixit: obedientissimum quocunque in opere, hastis corylo meliorem, corno leviolem, sorbo leniorem. Dioscorides ligni *τορνέματα* pota *ἀναγερμα* esse, ex fama scribit. Corticem ustum & ex aqua illicitum lepras remove. Folia ex vino pota vel imposita viperarum moribus opitulari. Plinius ea jumentis mortifera, cæteris ruminantium innocua, a græcis proditum docet: in Italia nec jumentis nocere. Contra serpentes vero succo expresso ad potum, & imposita ulceribus operifera, ac nihil æque, reperiuntur. Tantaque est vis, ut ne matutinas quidem, occidentesve umbras quam sunt longissimæ serpens arboris ejus attingat, adeo ipsam procul fugiat. Experti prodimus: si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quam in fraxinum fugere serpentem. Mira naturæ benignitas, prius quam hi prodeant, florere fraxinum, nec ante conditos folia dimittere. In *campestrum* forte & *montanum* dividitur, quorum illa crispa; hæc spissa Plinio. Ex Theophrasto quo minus aliquid adferam, contradictio facit. Major, *inquit*, & *μακροτέρα*, Bumelia est, & ob id minus crispa. *φύσει* namque *πτερινόν και λείον* τὸ δὲ *δρεινόν και τραχύ*. Et mox. Quæ *ἐν τοῖς ὄρεσι φουμένη εὐχρεος*, robusta lentaque: quæ *ἐν τῷ πεδίῳ* dilutior, rara corpore, lævisque.

H. Fraxino humili lignum scabrius, durius & magis flavum, fuscus Plinio. folia laurina, breviora in illis internodia, paucioresque conjugationes. Provenit locis aridioribus & siccioribus.

III. RECENTIORIBVS tria sunt

Fraxini genera, 1. *excelsus nempe*, Fraxinus. 2. *humilius*, & 3. *rotundiori folio*.

I. Fraxinus excelsior Theophrasto ^{Bauh. H. P. l. 8. c. 12.} prior est *βυμέλια*, Gazæ *bubula* dicitur. Caudex celsus, rectus, crassitudinis haud exigua; materia alba, crispo pectinum discursu undulata. Ramuli teretiores & recentes geniculis nodosi, medulla candida & fungosa; vetustiores lignosi utroque carent. folia sorbi modo pinnata, atrovirentia, quadruplici conjugatione ad costam adnectuntur. fructus inversam avis linguam referens (hinc *ornoglossum*, lingua avis, passeris, anseris, dicitur) peculiariter surculo numerosus dependet, infima parte membranæ, a medio ad pediculum medulla alba & acri factus. De-^{Camerar. ad hist. Matthioli.} generat aliquando in rugosum tuber, ex multis quasi pillulis constans: quod globosus muscos quidam vocant. *Nascitur* in ea & *Manna*, & summis ramis ceu *cornu cervinum*. Cortex ^{Pier. hierogl. l. 7.} amputato ramo, *lacrymam* plorat, quæ visci instar crescit, varieque in latum contorquetur. *Germinat* festinantius & vites maxime alit. *Usum* ^{Casalp.} si spectes, cortex interior aquam cæruleam reddit, si in ea maduerit, adponitur morbidis gallinis. In vino ^{Matthioli.} decoctus creditur splenem absorbere, si bibatur. Aqua destillata, ad calculum & morbum regium facit. Recens vulnere superligatus, ita consolidat, ut futura opus non sit. Ex ligno sunt hastæ, mensæ, utensilia & pocula, ex quibus si quis assidue bibat, lienem attenuari ajunt. Ejus decocto vice Gvajaci feliciter usi Medici. *Humor*, qui ex eo, dum uritur, resudat, cum pari succi scillæ & rutæ pondere mistus, surditatem tollit. In minutas taleolas concisum, si M. ij. pondere in Vini lib. iij. ad tertias decoquatur; per linteum coletur, & decocti, in quo ferraturæ fraxini drachma infusa fuit, cyathus calide octo diebus continuis ebibatur, singulare est contra calculum experimentum. Cinis scabiem illitu profligat. Ex eodem ephippia, farissæ, mensæ, abaci, cochlearia &c. parantur. Folia contra serpentum mor-

Fraxinus, sus laudantur. Sed quæ de umbra Plinius scripsit, experientia comprobare renuit. *Fronibus* oves & capræ hyeme sustentantur. *Lingua avis*, cum nucleis pineis pistaciis & saccharo firmat Venerem. Novembris principio collecta & in furno siccata, renibus contra calculos opitulatur, si pulverisatam cum vino sumseris. Sal sudores movet diureticis mixtus; purgantibus si misceatur, serosa evacuat. Circa *differentias* pauca occurrunt, est vel *montana* vel *campestris*. Fit apud quosdam *maris* & *fœminæ* mentio. *Illam* flosculorum sterilem racemos nigros ferre, qui absque fructu ut Juli decident: apud alios Fago similis & dura, λιδοσέος.

Thalios in
hercynia.

Bauhin. H. P. l. 8. c. 12. p. 177. Bodæus ad Theophr. H. P. l. 3. c. 11. p. 184. **II. Fraxinus humilior**, Bauhino *sylvestris* Columellæ, *Ornus* Bellonio, Rami pluribus tuberculis inæquales. *folia* pinnata, segmentis tenuioribus, acutioribus, ferratis tamen. *Ornum* vix dixeris, cui quidem cortex lævis, sed interior substantia minus crispa; coloratior, sed minus, quam fraxino, dura.

Bauhin. l. c. **III. Fraxinus rotundifolia** est *Ornus* 3. Galli *Brixiani*. *Folia* conjugatim disponuntur, in ambitu ferrata, Pistaciorum *foliis* similia, in quibus medietas interior ad nervi imum brevior, quam exterior, sæpe conspicitur.

EXOTICA.

Ex EXOTICIS tria ad Fraxinum referuntur, *Nimbo* nempe & *Coatlis*, seu *lignum Nephriticum*, & *Arbor Javanensis foliis fraxini*.

I. Nimbo Malabris *Bepolo*, fraxino Acofta hist. arom. c. 39. Garz. ab horto H. P. l. 11. c. 2. est persimilis. *foliis* multis & mucronatis, *floribus* albis, trifolii odorati odore. *Fructus* ex ramulorum alis nascitur, olivæ similis, subluteus, cortice tenui. *Folia* trita, cum succo limonum vulnera miraculose sanant: succus, cum vino vel jusculo sumtus, vel umbilico impositus, lumbricos necat. *Oleum* ex fructu nervorum dolores, contracturas &c. sanat.

II. Coatlis, quem alii *Tlapalezpatli* seu *medicinam sanguinis coccineam* Nard. rer. medic. l. 4. c. 25. vocant, suffrutex est magnus & arborescens, stipite crasso, & enode, *materia* pyri, *foliis* ciceris vel rutaceis: flore luteo in spicas composito. Provenit in Mexicana. *Lignum* ejus, quod *lignum Nephriticum* vocatur, Kircher. in arre magna lucis & umbræ.

assulatim concisum, aquam, injectum, cæruleam reddit, quæ acrimoniæ urinæ, nephritidi & colicæ mirifice opitulatur; & quidem validius, si radices *Metl* accesserint. Exolescit post quindecim dies virtus. Mirum vero, quod saporem aquæ non mutet. Eadem phialæ infusa & luci exposita, cæruleum colorem amittit: quod si umbrato loco obvertatur, viridis, si umbratiori, subrubens, si alii alia evadit. In tenebris & opacis resumit cæruleum. Huic simile, si non idem, Bauh. H. P. l. 4. c. 43. *lignum Bezoardicum Cherleri*, materie dura, pectinibus rectis, saturatius Santalo rubens, de quo imposturam recenset.

III. Arbor Javanensis foliis fraxini, Bont. H. N. & M. l. 6. c. 13. est patula & trunco nodoso. *fructus* nucibus avellanis par, & edulis. *Folia* ulceribus imposita mundant & consolidant. Succus vermes pellit, cochlearis mensura.

PUNCTVM II.

De Rhoe.

Rhus.

Vid.

TABVLA
LXXXI.

Dioscor. M.

M. l. 1.

c. 147. Plin.

H. N. l. 24.

c. 11.

Theophr.

H. P. l. 13.

I.

Rhus apud *Veteres* arbuscula est, διπληχός, duorum cubitorum Dio. scoridi, cubitalis Plinio: *virgis* nec longis nec crassis. *Folium* ulmo simile, sed oblongius, subrubens, (ideo Plinio frutex subrutilus) τὴν περιφέρειαν ἐστὶν ἡμικύκλιον, προνοειδῶς, seu *ilicis modo*

incisum, & ἐπίδαρυ pilosum. In ramulis novellis, qui graciles & breves, paribus internodiis conjugatim adhærent, & plane e lateribus ordo versus conspicitur: pediculus quippe semper inter se contrarios habent. *Flos* Theophrasto candidus, racemosus

fus, figura per universum concinnis vel villis floris, vitis modo capillatus: qui ubi defloruit, *fructus* cum uva rubescit, fiuntque ceu lentes tenues, congestæ. *βοτρυδίου* namque est *κοινός*, densus, terebinthi magnitudine, quantenus latus, cuius τὸ περιέχον

Galen. κατὰ φλοιῶδες, εὐχρηστον. Fert & *gummi*. τὸ πᾶς l. 7. c. 2.

Provenit in Oriente, Syria, Pataris; & nascitur in petris. *Usus* in Medicina & aliis. Adspergebatur pro sale obsoniis. *Foliis* novellorum scilicet ramulorum aridis, coriarii ad spissanda perficiendave coria, ut malicorio utebantur, quod Dioscorides χρῆσθαι εἰς τὴν σύψιν τῶν δερμάτων; Theophrastus βάπτειν τὰ λευκὰ δέρματα dixit. *Medici* utuntur ad contusa: item celiacos & sedis ulcera, aut quæ phagedænas vocant, trita cum melle, & illita cum aceto. *Decoctum* instillatur auribus purulentis. *Fructus*, qui secundo gradu refrigerat, exsiccat tertio, linguæ asperitates cum melle abstergit: alba sceminarum profluvia sistit, & hæmorrhoides cum querno carbone intrito impositus sanat. *Gummi* erosorum dentium cavis ad dolores finiendos inditur. Galenus ad uvulæ inflammationem, alvum fluidam & sanguinis eruptiones utilem expertus est.

Differentias ejus varias apud Veteres observare est. I. Theophrastus alium *masculum*, alium *sceminam*, seu alium *sterilem*, alium *frugiferum* facit: quod & apud Plinium habetur, qui & *sylvestrem herbam*, foliis myrti, cauliculis brevibus, quæ venena & tineas pellit, *Rhus* adpellat. II. Apud Galenum etiam ἐπιπαιττόμενος τοῖς ὀφθαλμοῖς; alius πρὸς βυρσοδεψίαν χρῆσιμος dicitur. III. Columella *Rhois Syriaci* (sic lege, quorsum Ros Syriacus vel *Rhus* futorium) meminit. *Marinus* seu Orientalis eidem ut & Marcello minutum est, simili lenticulæ. IV. Damocrates apud Galenum *Sontici* & *Patarici*, a Patara (potius quam Eupatorici ab Eupatoria) meminit. Locis duntaxat distingui credo. *Fructus* obsoniis inserviebat. Unde ποδὲς μαρυγμῶν nomen, qui cum Syriaco apud Ga-

Gal. l. c.

Galen. l. 9.

lenum idem est: folia ad βυρσοδεψίαν *Rhus* inserviebat. Unde *Coriarius*, quem c. 5. κατὰ Galenus a Syriaco distinguit. *Rhus* τὸ πᾶς ergo obsoniorum semen est: coriariorum folia & fruticis ramusculi. *Rhus* rubens semen immaturum, cui major adstringendi facultas.

II. RECENTIORIBVS quadruplex est 1. *folio ulmi*, 2. *angustifolius*, 3. *myrtifolius*, 4. *Virginianus*.

I. *Rhus folio ulmi*, aliis *Rhus culinarius*, vel *obsoniorum*, *Sumach Arabum*, in multas virgulas diffunditur. *Radix* per summa cespitem decurrit. *Foliola* paralella, oblonga, candicantia, & aliquantum pilosa, quæ costa rubea dividit. *Flores* candidi, racemosi, mense Junio funduntur. *Fructus* flore delapso, latus, lentibus similis, confarctus, qui corymbaceis racemis cohæret, & cum labrusca rubescit, autumno maturus. *Nascitur* in montibus, sylvis & desertis locis, in Gallia Narbonensi, Italia & Hispania. In Salmanticensi agro quæstus gratia diligenter colitur. Interferunt vitibus compendii gratia: cadunturque singulis annis enati furculi cubitales ad radicem. *Provenit* & semine; duravitque in Felicis Plateri per aliquot hyemes horto, etiam non repositus. Visitur & Vratislaviæ in Crusii, pharmacopolæ curiosissimi horto. *Usus fructus* adhuc in cibis. Turcæ arietum capita & pedes coctos, aceto & sale adspersos, ex seminis *Sumach* emblemate, cum alliorum succo & pingvedine condiunt. Aqua, in qua semen decoctum spissatur. Dividitur in *marem* & *sceminam*. Visus Monspelii circa novum castellum locis macilentis, Sorbo adeo similis, ut vix etiam ab attentiore dignoscere-tur, Sambuci majoris magnitudine. Solo sterili tricubitalis prodit: lætiore, humanam altitudinem longe superat, inprimis si cultura accesserit: ruderoso, inculto & desito, etiam bicubitalis visitur.

Bellon. in observ.

II. *Rhus angustifolius* Bauhino *Sumach angustifolium* foliis potissimum a vul-

Rhus, a vulgato differt. Hujus enim folia uncias quatuor longa, semiunciam lata sunt, in exquisitum apicem desinunt, & per marginem crenata sunt, quorum duodecim uni costæ, utrinque nimirum sex adhærent, undecimo imparem numerum, constituyente, quæ superne atrovirent, inferne pallida sunt, costa elata per longum excurrente. Hoc in Brasilia apud Tououpinambaultios collectum, & a Burfero communicatum.

III. *Rhus myrtifolius* duplex est, *Monspeliacus* & *Belgicus*.

Bauh. H. P.
l. 5. c. 31.

I. *Rhus myrtifolius Monspeliacus*, Dodonæo & Lobel. *Rhus sylvestris* Plinii, Tabern. *Rhus myrtifolia*, aliis *Driophanon* Plinii, Bauh. *Rhus Plinii* putata, dicitur. *Ramuli* sunt quadranguli, bicubitales. *folia* seriatim & per ordinem funduntur, Jujubarum similia, sed acutiora & multo majora. *Flores* parvi, virides, racematim quasi congesti, cum apicibus multis partim nigricantibus. *Fructus* pisorum magnitudine, pentagoni, cujus semina in angulosis valvulis spiræ & cochleæ modo convolvuntur. *Lugdunensis* ad hominis altitudinem adsurgere scribit, *caule* cavo, sambuci modo paribus intervallis in nodos intumescens, cui *cortex* cinereus, maculosus, membrana rufescente subjecta, *folio* myrti sylvestris venosa, & altera parte rufescentia; *flore* in summis virgis purpureo; *fructu* nigro, aliquantum compresso, velut striis canaliculato, cui *semen* album, rugosum, vinaceis simile. *Nascitur* circa sepem Monspeliensis agri solo pingui, & maxime ad Lani amnis crepidines. *Provenit* & semine fata Montbelgar-

di; & videtur aliarum adstringentium modo facile nasci.

2. *Rhus myrtifolius Belgicus*, Ruel. Clus. H. P. l. 1. c. 12. Dodon. l. 2. c. 20. lio forte *Myrtus nemoralis* & *Dryophanon* Plinii, Bellon. *Elæagnus la-cus Orchomenii Theophrasti*, Dodon. *Chamaelæagnus*, Lobel. *Gagel Germanorum* & *Myrtus Brabantica* vel *Belgarum*, & *Elæagnus Cordi*, Clusio *Rhus herba Plinii*, Lugdunensi *Rhus sylvestris altera*, frutex est cubiti altitudine. *Radix* lenta & dura. *Rami* aliquando nonnulli, *foliola* oblonga, latiuscula, duriora: *flores* e sinu foliorum spicati, exigui, luteoli, Maio & Junio funduntur. *Semen* asperum, cacumine pungens, in racemi exigui formam cohæret, & oleoso succo per maturitatem redundat, & Julio Augustoque perficitur; odoris, ut & tota planta, gravis. *Nascitur* in Britannia, Brabantia, Flandria, incultis, aliquando aquosis & palustribus locis. *Calida* & *secca* est ad tertium. *Addita* cerevisiæ caput tentat. *Frutex* cum fructu aridus tineas pellit, si vestimentis interponatur.

IV. *Rhus Virginianus* sic a Caspa-ro Bauhino describitur. *Arbuscula* est Rhoe vulgari major, *foliis* multo majoribus, acutioribus, mollioribus & viridioribus, quorum qualibet pinna, uncias quinque & sex longa sunt, & sequentis quod ex Tupinambault habemus, longiora, latiora, profundius crenata & viridiora: *folia* vero superiora jasmini albi foliis similia sunt: *rami* ex stipite pullulantes, tenella cervorum cornua, ex cranio modo erumpentia, referunt: similiter enim hirsuti sunt, eundem colorem, eandem figuram habent: *spicam*, Rhoe vulgari multo majorem habet.

Bauh. Phys.
top. p. 522.

PUNCTVM III.

De Cocconilea & Azedaræth.

Cocconileæ.

Vid. TA B.
LXXXI.

LXXXII.

Theophr.

H. P. l. 3.

c. 16. Plin.

H. N. l. 13.

c. 22. &

l. 16. c. 18.

I.

Cocconilea apud Veteres Theophrasto sub nomine κοκκυμείλας (κοκκυμείλας lege) a Plinio sub *Coggygræ* & *Cotini* describitur nomine. Illi est arbor parvo κομάριον & ἀδράχνη fo-

lio similis: & cui proprium ἐμπύπιδαι τὸν καρπὸν. Huic eadem L. XIII. descriptio. Nulli alteri arbori fructum lanugine amittere proprium falsum: quia id Salici, Populo & Nerio

rio contingit. In Apennino visitur, & ad lineamenta modo conchylii colore insignis est. Cortex densat coria.

RECENTIORIBVS est *Cotinus Coriaria* vel Plinii, Turnero *Rhus*, Gesnero forte *Barba Jovis*, Cæsalpino *Scotanium vulgi*. Sane Apennini incolæ Scotano & Scoteno corrupta voce vocant; qui ad radices ejus montis sedent, a colore *Rosalo* & *Rosa*; Sabaudi *du Fustet*; Allobroges *Rhu*. Quinque est aliquando cubitorum. *Radix* dura, raris fibris. *Materies* flava, solida, pectinibus rectis, orbibus externis albicantibus, interius *medulla* multa farta. *Caudices* contorti; ramis rubens vel rufus *cortex*; *folia* ex oblongo rotundata, venosa, glabra, odore lentiscino, sapore stringente, sub finem ætatis rubescunt. In ramorum fastigiis infiniti prope modum Mæandri rigidorum filamentorum late diffunduntur, pilis plumatim obsiti: *flores* ex herbido pallido: *semina* in filamentis compressa, rubentia, vel flavescentia, lenticularia; & ut Cæsalpinus prodidit, triangula quasi, duro putamine, sed ob tenuitatem, ut ille loquitur, impartibili. *Crescit* in montibus & arduis sylvis, circa Badenses thermas, in Histria & Pannoniæ alpibus pumila & vix cubitum attingens, ubi Majo floret, Julio & Augusto fructus maturat. Descendit & ad plana circa Auriacum, inter Camberiacum & Lugdunum, quibus locis copiose prodeuntem vidimus. Circa Mediolanum & in tota Longobardia, raro hominis staturam attingit. *Usus* frequentissimus in tincturis. *Radicibus* panni roseo inficiuntur colore. *Ramis* luteo tingunt, quod & de corticibus Constantino proditum. Sed & in *Medicina* utimur contra faucium & genitalium ulcera, si decocto foliorum eluantur; contra mensium nimium fluxum, si in infessu ponantur.

Nardus R.
M. N. H.
p. 406.

Ex EXOTICIS huc spectant. I. *Quauhxiotl Terentii*, qui ramosus stipites & rubeus: *folium* coccygræ par, rubris venis perfusum. *Fructus* to-

tum ramum occupat, quaterni decussatim ex eodem loco prodeuntes, qui renem rubrum ex viridi referunt.

II. *Charapu* arbor Persici magnitudine, *foliis* lauri, *floribus* exilibus, qui summis ramulis adpendent. *Acini* inde nigri, spondilorum figura & magnitudine, globulis precariis parandis aptissimi. *Nascitur* in calidis Mechuacanæ locis. *Fronibus* acris sapor, pulvere in flumen sparso torpescunt pisces. *fructus* vice sinigmati.

II. AZEDARAETH, seu *Azedarath* & *Azedarach* occurrit apud Abensnam, cui est arbor magna & nota, *fructu* Nabach sive Loto simili, quæ in Reschi arbor myrobalanorum dicitur. Apud RECENTIORES multa sortitur nomina. Bauhino est *arbor fraxini folio*, *flore* cæruleo; fratri ejus *Azedarachne*, Matthiolo, Tabern. Eystetenſi *Pseudosycomorus*, *Astergit* Rhafi, Tripolitanis *Zenzelack*, *Lotus alba* Pelicerio, *Laurus Plinii* & *Myxus alba* Gesnero. *Zizypha candida* Monspel. Lobelio; *Tuber*, *Zizypha Columellæ* forte & Plinii Cæsalpino, Italis *Perlaro*, Hispanis *Arbo Paroyso*, Turcis *Thespice*. Magnitudinis est justæ. *Cortex* aduultior scaber & rimosus. *Folia* fraxini fere ferrata, cubito longiora, ex foliis multis mutuo sibi respondentibus nigricantia, quæ hyeme cum pediculis decidunt. *Flores* copiosi, pentaphyllei racematim cohærent; calyce longiusculo, ex purpureo nigricante, in quo stamina. *Baccæ* succedunt luteæ, virides initio, candicantes quando (quod Augusto fit) maturuere, magnitudine Mespili Aroniæ, cum dulcedine quadam amara, foetidæ, palato ingrata, quibus nuclei pentagoni aliquando, hexagoni sæpe, medulla alba. *Reperitur* in Syria, Italia, Hispania & cæteris locis. Tripolitani ad captandam umbram foveant. Lutetiæ opera Bellonii videri cœpit. Hispali in Palatio regio & Arelati maxima. Nemausi hyemes rigidiusculas tulit. Stutgardia in horto Principis Junio & Julio floruit. Nata & Mombelgardi ex semine; hyemis sævitie enecta. Multa de ejus

Azedaraeth.

Nieremb.
H. N. Exot.
l. 15. c. 24.

Abensius

l. 2. c. 17.

Bauh. Phy-

top. l. 2. c. 4.

p. 415.

Bauh. H.

p. 1. c. 27.

p. 554.

Gesner. in

hortis.

Dodon.

Pemt. 6.

l. 4. c. 25.

Matthiol.

in Dioscor.

l. 6. c. 12.

Azedarath. in *Medicina usu* Abensina. Sed quia rum medicamentorum feracitate, ea venenata adeo, ut nec ab avibus quidem attingatur, attacta canes exanimet, imprudentis esset, in tanta alio-
uti. Aqua foliorum pedunculos enecat.

CAPUT II.

De Arboribus Bacciferis Exoticis tantum.

Arbores
Exoticæ.

Vid.

T A B.

LXXXII.

LXXXIII.

Arbores Bacciferæ, quæ huc referuntur, sunt novem. 1. *Guabiraba*. 2. *Arbor uvifera Tabacensis*. 3. *Caaghiyuyo Brasiliensium*. 4. *Manaca*. 5. *Tangaraca*. 6. *Copalxibuitl Teotihuacanorum*. 7. *Totocapollin Terentii*. 8. *Aninga peri Brasiliensium*. 9. *Hua conex*.

Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 24.

I. *Guabiraba* arbor est vasta, minor in collibus & campis, & vix prunum adæquans, ligno obliquo, multis flexibus tortuoso, durissimo & a putredine immuni. Folia ipsi variæ figuræ; acuminata & pene cordis figura, obtusiora, subaspera, eminentibus nervis, foliorum pyri magnitudine. Flos niveus & odoratus. Fructus globuli rotundi, qui umbilicatum prodeunt, & sub initium hyemis maturi nigrum colorem induunt, & a dulcissimo sapore commendantur. Usus foliorum, qui calidi ad secundum, in balneis: spirant enim trita aromaticum odorem. Pulvis ligni in carbonem redacti oculis inflatus vehementer contra inflammationes confert. Flores ante solis exortum collecti, liquorem per alembicum fragrantissimum fundunt, egregium in ophtalmia refrigerans & mundificans.

De Laet

Ind. occid.

l. 17. c. 28.

II. *Arbor uvifera Tabacensis*, materie est rubra, ligni Brasiliani instar: folia pene orbiculata; fructus uvis haud dissimilis, saporis gratissimi. Nascitur potissimum juxta littora.

Marcgr. H.

P. l. 2. c. 2.

III. *Caaghiyuyo Brasiliensium* subfrutex est, rubi Idæi magnitudine. Caulis est hirsutus & lignosus. Folia quæ hirsuta, leviter ferrata, superius magis, quam infra, viridia; tres eminentes secundum longitudinem nervi, multæ transversim venulæ, superius per totum tuberculi, in-

ferius scrobiculi. Flosculi in pediculis parvis duo, tres quatuor, quinque in racemum sibi adpositi, albi, πενταφύλλοι. Bacca nigra, baccarum Juniperi magnitudine, dulces. Nascitur in pluribus Brasiliæ locis. Foliorum pulvis ulcera ex causa calida orta inspersus sanat. Bacca ab Æthiopibus comeduntur, & Myrtilli succum dant.

IV. *Manaca Brasiliensium*, ita a Marcgr. H. Marcgravio describitur. Frutex est P. l. 2. c. 2.

cortice gryseo, ligno mediocriter duro, sed fragili, qui in multos ramos dispergitur, & hi itidem in ramulos inordinate positos, in quibus sunt folia, pyri junioris foliis similia, dilute viridia, in frondes quasi disposita: nervo secundum longitudinem & venulis transversis vix conspicuis. Fert florem solitarie positum ex longo calice prodeuntem, stufieri Hollandici magnitudine, in quinque folia dissectum, staminulis parvis in medio: flos coloris dilute purpureo carulei, vel etiam albi: nam in uno eodemque frutice albi & caruleopurpurei flores reperiuntur: suavis odoris instar Violarum Martiarum. Fructum fert magnitudine instar uvæ spinæ, viridem, rotundum, cortice gryseo tectum, qui superius quinque fissuras habet, ut fructus per fissuras stel lam quinquangularem repræsentet. Continet in se tria grana seminis magnitudine lentis vel etiam majores, ellipticæ figuræ. Rasura ligni infusa, Esulæ instar purgat.

V. *Tangaraca eorundem* duas habet species. Marcgr. H. P. l. 2. c. 2.

Prima frutex est magnitudine Ribium. Cortex cinerefcit. Folia oblonga, viridia, multis costis transversis intertexta; inferne canescentia, ad tactum hirsutæ molli ob-

obducta. In extremitate ramorum, inquit *Marcgravius*, flos provenit, purpureo brunni coloris, magnitudine clavellarum Indicarum plenus: quatuor folia floris exteriora paulo longiora, quam reliqua; figura vomeris, quibus inferius adstant octo ejusdem figuræ minora, & medium seu totum spatium floris constat foliis parvis purpureis, more florum Scabiosæ: e quorum medio prodit una bacca cærulea, magnitudine myrtillorum, ad visum quasi gemma Turcois flori esset imposita, & flos ut holosericum brunnum. Lusitanis dicitur *Erva do rato*.

Marcgr. l. c. Altera species, frutex est arborecens. Lignum habet, describente eodem *Marcgravia*, lentum & in ramis ramulos oppositos, & duo semper sibi opposita, vel etiam tria sibi adposita foliola oblonga profert, dilute viridia, eminente nervo secundum longitudinem & conspicuis costis secundum latitudinem prædita. In summitate ramorum spica nascitur ex floribus multis umbellatim positis constans, suntque flores oblongiusculi, cylindracei, rubri: pediculi autem florum crocei coloris & longiusculi. Piso uni dat florem saturate purpureum & umbilicatum; alteri primo albescentem, sed qui innox aureo colore nitescat, Præsentissimum est utraque venenum. Nam folia, flores & semina si degustentur, confestim corpus intumescit, mens turbatur, oculi caligant, & animi deliquia oboriuntur. Præsentaneum in radice remedium, quæ contusa in vino vel aliquo alio convenienti liquore propinatur.

Reccus R.
M. N. H.
l. 4. c. 3.

VI. *Copalxihuitl* Teotihuacanorum, seu herba Copalli referens, frutex est describente *Recco*, quatuor dodrantes longus. Multi illi rami: caulis lignosus, paulisper fulvus. Folia O-

cymi sed obrotunda, inferne squal: Arbores lentia, superne viridia, rara & ali. Exotica. quantisper ferrata. Baccæ rubescentes. Spirat odorem, & saporem Thymi præ se fert. Nascitur Teotihuacani, juxta tesqua & saxosa loca. Calidus & siccus est ordine tertio. Succus expressus confert oculis.

VII. *Totocapollin Terentii* vide. Reccus R. M. N. H. p. 432. tur esse arbor. Rami virides, punctis albis adspersi: & in quavis ala videtur latitare quasi bacca viridis.

VIII. *Aninga peri Brasiliensium* Piso de simpl. facult. c. 92. est planta fruticescens. Foliis donatur lanuginosis, ovalis figuræ, triste viridibus quidem, sed adpectu pulcerrimis; ad tactum instar urticæ mortuæ, mollibus & velut lanuginosis, quæque nervis multis & crassis distinguuntur. Flos exiguus albicans, cui pauca uvulæ e cæruleo nigricantes, sambuci baccis similes succedunt. Folia recentia contusa, vel in pulverem redacta, recentibus & inveteratis ulceribus medentur prima intentione, si profunde illorum succus aut pulvis iis immittatur.

IX. *Hua conex* materia firma, nec terra defossa corrumpitur. folia lutea, flos candicans, fructus baccæ lauri similes. Ex cortice confracto, in aqua macerato, insolato, liquor educitur balsami virium. Surculi roborantes: ex quibus olim Indi sagittis mucrones addebant.

X. Accedat Corollarii loco Frutex Indicus Incognitus anonymus, cui folia magna deorsum ex pediculis ligneis pendentia, flos exiguus, succus folior. ulcera mali moris exsiccant, Quid ferat, ignoro.

Bont. H. N. & M. l. 6. c. 51.



HISTORIAE NATURALIS DE ARBORIBVS

Lenti-
fcus.

LIBER VI.

De Arboribus lacrymiferis.

TITVLVS I.

De Arboribus lacrymibacciferis.

CAPVT I.

De Lentisco.

Vid. TABVL. LXXXIV. **B**acciferas simpliciter ita dictas sequuntur Lacrymosæ, quæ lacrymas, id est, gummata, resinas, & succos hisce similes fundunt. Sunt vero in duplici differentia. Aliæ enim præter lacrymas baccas ferunt: Aliæ conos. Illas lacrymibacciferas; has Lacrymi-coniferas dicemus, iisque succos seu humores Arborum subijciemus. Ex illis sunt, 1. Lentiscus. 2. Arbor thurifera. 3. Terebinthus. 4. Balsamum. 5. Arbores quædam Veterum. 6. Arbores nonnullæ Indicæ recentiorum, & 7. Arbores Novæ Hispaniæ Copal dictæ.

I. De Lentisco pauca apud Veteres occurrunt. Dioscorides arborem ut notam non describit: alibi Tragium foliis, semine & ramis simile scribit: ut & glycyrrhizæ folia densa, pingua, tactuque glutinosa. Plinius Italicam dicit, quasi præter Chiam alia novisset genera. Fructus, inquit, initio rubet, post nigrescit, qui & in racemis Sambuci specie dependet. *Χυλιδας* Hippocrates vocat. Folium pistacei sed minus, per extremitatem rubens. In summo siliquæ pisorum, sed corniculi modo intortæ, in quibus resina jucundi odoris continetur. Ter fructum ferre tradit Cassianus Bassus, forte quod tribus distinctis temporibus eundem

perficiat. Plebs rustica cœli & syderum imperita, arandi suorum operum auspicia hinc cognoscit: quod si primus fructus egregie provenit, renitatis. *τὸν πρῶτον σπορὸν καλῶς καρποφορεῖν σημαίνειν.* Id & de aliis intelligendum. Qui de flore sumunt, vehementer errant. Nec ea vel Ciceronis vel Arati mens fuit.

Si gravida egregios, glandis lentiscus acervos

Proferat, hoc largas sperabis ab omine messes.

Et modica modicam, parca prænoscere parcam

Glande potes.

De viribus nota. Dioscoridi est partibus omnibus adstrictior: Galenus ex aquea leviter calida & terrena non pauca frigida qualitate, constare scribit: ita ut secundo gradu desiccet, & calore sit temperato. Feliciter ergo ad sanguinis rejectiones, alvi profluvia, uteri & sedis procidentias, dentes vacillantes & gingivas sanguinolentas adhibetur. Hippocrates foliis in aqua coctis, nec non succo expresso uterum resiccare solebat. Scio, inquit Plinius, *Democratem medicum* in valetudine Causidiæ M. Servilii Consularis filię, omnem curationem austeram recusantis, diu efficaciter usum

Plin. H. N. l. 18. c. 26.
Theophr. de signis se-
renitatis.

Galen. de
simpl. me-
dic. l. 8.

Hippocr. l.
de natura
muliebri.
Plin. H. N.
l. 24. c. 7.

Cass. Bass.
Geopon.
l. 11. c. 13.

Martial. in
Apophore-
tis.

usum lacte caprarum, quas lentisco pascebat. Ulcus pulmonis vel renum, nisi uterinas sanguinis eruptiones dicere malis, forte is morbus fuit. E ligno seu virentibus furculis parabantur & olim denticulipia, quorum præter Dioscoridem & Martialis meminit. Qui frequentius iis utebantur, *κινωτρώγες* seu *κινωτρώνται*, quasi lentisci corrosores dicebantur. *Fructus* Plinius in cados, velut olivas & corna condi dicit, ne quid non hominis ventri natum esse videatur. Fit & ex eodem maturo jam & oleum, cuius apud Dioscoridem parandi modus. Magnopere a Galeno ad defluos capillos cum Ladano mistum commendatur; ab Actuario in gingivarum inflammatione, recens. Contineri moderate calidum in ore debet. Repellit placide, & citra asperitatem & absque morfu discutit. Plinio contra papulas a sudore excitatas laudatur: effecturumque id, quod rosaceum, nisi durius paulo intelligeretur. Inspissatum scabiem canum & jumentorum sanat. Eadem vino lentiscino, quod ex bacciferis ramis paratur, vires. De *Mastiche* suo loco agemus.

Stapel. ad
Theophr.
l. 3. p. 230.
Bauhin. H.
P. l. 3. c. 21.
P. 283.

II. MODERNIS Lentiscus est triplex, *vulgaris* nempe, *Peruana* & *Brasilienfis*.

I. *Lentiscus vulgaris* perpetua semper fronde viret. *Cortex* caudici & ramis, qui brachiati & flexiles, cinereus: *folia* Glycyrrhizæ fere, sed buxeorum soliditate, ex viridi nonnihil rubentia, conjugatim ad costam canaliculata, tam rubescentem connexa, in spinulam plerumque desinunt, saporis acidiusculi, odoris grati, & quæ ori inserta sitim arcent, & faucium humiditatem tuentur. Insident his aliquando *vesiculæ*, corniculi modo intortæ, liquore limpido plenæ, qui veterascens in bestiolas culicibus similes facessit. *Flosculi* ad alæ imum veluti racemuli, rubentes, velex herbaceo pallescentes, Aprili vel Martio funduntur. *Fructus* racemosi dimidio pis minor, in stylum minutum desinentes, rotundi,

rubentes, per maturitatem, in Octobri vel Novembri hoc, nigricantes, acidi. Nucleus eis durus, niger, alba medulla infarctus. Viridem Cordus facit, indeque lentiscum grani viridis arborem nominari. *Nascitur* in regionibus calidis, locis humidis, in Cypro, Chio & aliis Ægei maris insulis, Palæstina, Ægypto, Italia, Hispania, toto tractu ad mare mediterraneum obverso, & Gallia Narbonensis ora maritima, quæ ad Taurinorum juga, & Pyrenæos Alpes protenditur. *Usus* & nunc in Medicina habet. Ex radice, cortice & foliis exprimitur succus, qui inspissatus, strictione sua contra dysenteriam, nimium menstruorum fluxum, ossium fracturas, ulcera, & uteri procidentiam adhibetur, acaciæ & hypocistidis succedaneum. Ex *bacciferis ramis* & *foliis* fit vinum, stomacho gratum, quo fluxiones cohibentur, & ulcera ad cicatricem perducuntur. Ex baccis oleum ad scabiem, defluvium capillorum & linguæ inflammationem utile. Hispani eo chirothecas inficiunt, & *Azeite a Mato* vocant: alii Opobalsamum adulterant. Ex Narbonensi Gallia in peregrinas oras devehitur. Duplex est, *Chia* nempe, & quæ alibi provenit. *Chia* arborescit etiam sine cultu, & Masticen copiose fundit. *Quæ alibi proveniunt*, humiles sunt, nec aliquo grandiore caudice a radicibus sublato, sed virgultis stolonibusque innumeris, Corylorum sylvestrium modo diffiliunt. Visa tamen ad Anam fluvium, ubi non cæditur, in justæ arboris magnitudinem excrevisse. Fundere masticen negant quidam, adfirmant nonnulli: sed nec tam cito, nec tam copiose, & minus laudabilem. *Ægyptia* nigra est. Est & in India spinosus frutex, ex quo Mastiche.

II. *Lentiscus Peruana* dicitur *Molle*, *Mollis*, *Moly* & *Muelle*, quibusdam *arbor ex Peru*. Arbor est procerâ pulcra, ramis patentibus, qui viridi colore in purpureum tendunt: *foliis* oleæ minutis, dum juniores sunt ferratis, semper virentibus, odo-

Lentiscus.

Petr. Cieca
chron. Indi-
ci p. 1.
c. 112.
Marcgr.
hist. plant.
Brasil. l. 3.
c. 15.
Reccus R.
M. N. H.
Tél. 3. c. 15.

Lentiscus.

Ind. occid.
p.9.l.4.c.30.

re fœniculi, quæ ordine utrinque disponuntur, & oblique versus ramos extremos procedunt. Fundunt revulsa lacteum, viscidum & odoratum succum. *Flores* exiles & albi racematim dependent. *Fructus* Oxyacanthæ semini par aut minor, viret primo, mox ex albo rubescit, carne dulci cum quadam amaritudine, cui nucleus durus & osseus. Producit & uvæ quoddam genus, unde Indi vinum premunt. Stillat ab ea *lacryma* candida, fœniculi & lentisci odore, acris, subdulcis & cum quadam amaritudine subadstringens. Sylvestris est & ubique provenire prompta, in convallibus inprimis & locis planis. Visa Madriti in Hispania: nec non Romæ in Columnæ Zagardi Ducis horto. Tenellæ illæ. *Caudex* femoris crassitudine; *cortex* subcineritius fraxini humilioris magnitudine. *Folia* ex pluribus ad unum pediculum coherencia, ex viridi nigricantia, serrata, sub extremum angustiora, quæ ab arboribus decerpta, lacteo succo, lento & vivido turgebant. *Flores* exiles, albi, racematimque dispositi. *Fructus* prout jam descripsimus. Singularis est *Usus*. Ex ligno domorum compluviata, ex ramulis dentiscalpia parantur. *Corticis* decocto crurum tumores & infectiones foventur. pulvis inspersus vulnera glutinat, dentes stabilis. *Folia* decocta œdemata dissolvunt. Ex *fructu* in aquam injecto, sola coquendi diversitate, mel, vinum & acetum paratur. Ex ejusdem unciis octo tufis, drachmæ septem præstantissimi laticis ex atro fulvi haberi possunt, qui si recens, albescit & spumat, nec in laneam vestem fusus, notam post ablutionem relinquit: Idem in aquam injectus & agitatus liquatur, diluitur, & lactis modo albescit. *Gummi* lacte dissolutum, oculorum caliginem abstergit.

Piso de facult. simpl.
l.4.c.21.

III. *Lentiscus Brasiliensis* dicitur Lusitanis *Arceira*. Foliis est Ibirabæ, sed paulo minoribus. *Folia* in ramulis quinque vel septem sibi opposita, quæ trita resinosa spirant odorem. *Flosculi* in ramulis, qui ad cu-

jusque rami exortum, pentaphylli, acuti, ex albo sublutei. *Fructus*, Marogr. H. P.B.J. c.1. qui Julio maturescit, uva baccis plena, magnitudine piperis, initio viridibus, per maturitatem rubris; quæ rubedo in solo tenui cortice est. Granum cortice contextum rotundum est, compressum, oleaginosum, odoris instar fœniculi recentis triti, & in se nucleum parvum continet. *Frequens* est in promontorio Olindæ, & locis arenosis. *Fructus* siccitate & acrimonia recentes carnes a putredine conservant. *Folia* aromaticorum sunt partium. *Gemmae* arboris ex aqua nocturno rori expositæ, tempore paroxysmi a barbaris exhibentur.

EXOTICA.

Ex EXOTICIS aliis huc spectant, Vid. TABULA LXXXVI.
1. *Jumb Amazonum*. 2. *Moringa Acostæ*. 3. *Pavate ejusdem*. 4. *Bonduch Indorum*. 5. *Dux arbores Brasilienses*. 6. *Fructus Indicus Sampa-rantam*.

I. *Jumb* arbor apud Amazones Clus. Exot. l.4.14. provenit. Specimen ejus Clusius habebat bacillos teretes, inæquales, angulosos, rufescentes, in quibus inter binas adpendices alternis nascebantur alata folia; seu verius, alæ tenuissimæ & firmissimæ, quinquaginta & pluribus foliolis singula latera occupantibus prædita. Istis tanquam penicillo incolas ad pingenda varie sua corpora uti dicebant.

II. *Moringa*, Persis *Tame* & Guzarat *Trevida*, Arabibus & Turcis *Moria* & *Moriaben*, Guzaratensibus *Turria* dicitur. Magnitudine & foliis, quæ saturatius virent, lentiscum æmulatur; nodosa, ramis paucis, fragilis. *Fructus* est pedalis, raphani crassitie, octangularis, colore inter viridem & cinereum, intus candidus, medullosus, in certa receptacula distinctus, quibus semina rotunda, Ervo similia virentia, sapore acriore, includuntur. *Provenit* inprimis apud Malabares, juxta flumen Mangate. *Radix* unicornu & lapidis Bezoar vices supplet. In cholera & elephantiasi efficacissima.

III. Pa-

Acosta hist.
arom. c. 14.

III. *Pavate Malabarum*, Brachmanis & Canarinis *Vasa veli*, Lusitanis *Arbor contra las erisipolas*. Frutex est novem pedum altitudinis. Radix alba & insipida: *rami* cinerei. *Folia* rara, mali aureæ similia; *flos* quatuor foliorum, candidus; in cuius medio alba fibra cuspidate viridi insignis, floribus periclymeni odore; *semen* rotundum, lentiscini magnitudine, ex viridi nigricans, & ubi maturuerit, nigrum. Adhibetur contra alvi profluvia. Radix in decocto oryzae macerata erysipelati inungitur, & bibenda in inflammatione hepatis & febribus propinatur: cum succi Tamarindorum momento, vulnerum labiis imponitur, ad cohibendos defluxus.

*mul*i pleni spinulis hepatici coloris, *Lentiscus*. *lignum* autem intus medullosum instar Sambuci. Habet in quolibet ramo multos ramulos directe oppositos; in ramulis porro *folia* itidem opposita a quatuordecim ad viginti in uno ramulo, qui inter quodlibet par foliorum duobus munitur aculeis. Sunt autem folia late viridia, splendens, fere cylindracea, & unum circiter digitum longa. *Flores* fert in spicam congestos luteolos. Hos sequuntur *lobi spinosi*, hirsuti, coloris cum maturuerunt hepatici, in quibus singulis continentur duo globuli durissimi, cinerei coloris, glabri & splendentes, qui quassato lobo strepitum edunt: nucleus interior ex albo flavus, amari saporis instar lupinorum. Lobus autem per maturitatem diffilit & effundit globulos.

Clus. exot.

l. 2. 303. 15.

Bauh. H. P.

l. 12. p. 439.

IV. De *Bonduch Indorum*, quæ aliis *Matis Indorum cineritii coloris*, hoc duntaxat habeo, arborem esse spinosam, foliis lentisci; quæ fert lobos fuscus, subrubentes, frequentibus pinnulis hirsutos, cortice membranaceo, quibus aliquando singuli, aliquando bini fructus, instar magni pisi, coloris ex albo cineritii, parvo hilo fusco, adeo solidi & duri putaminis, ut faxei viderentur. Ex confractis albus *nucleus* amarissimi saporis exsilit. Bauhinus avellanæ magnitudine, splendens, durissimum & cinerei coloris habuit. Quidam *Bonduch*, nonnulli *Milium Indicum* adpellant. Adfertur ex Java, Syria, Brasilia, & Virginia. Marcgravio sub nomine *Inimboy Brasiliensium* ita describitur. In Cynosbathi magnitudinem excrescit; *caudex* & ra-

V. Arbores Brasiliensis sunt *Igcie-De Laet* *ga* & *Igtaiciga*. Illa speciem mastichis odore gratissimo profert: cujus Ind. occid. l. 15. 8. p. 560. cortex contusus liquorem album, & qui condensatus vicem thuris supplet, fundit. *Ista* adeo duram & pellucidam resinam profert, ut vitrum esse videatur. Incrustantur ea fictilia vasa.

VI. *Fructum Indicum Samparantam*, Pena *Lobum Moluccensem echinatum* vocat. Fuscus est, & spinosis subrubentibusque tuberculis undique obsitus. Bini intus phaseoli, seminum Anagyridis forma, prorsus nigri. An radix *Samparanton* Indiae orient. p. 4. c. 8. valida & amara, quæ in Sunda provenit, hujus arboris radix sit, dici nequit.

Bauh. Phytop. l. 11. f. 2. p. 399.

CAPUT II.

De Arbore Thurifera.

Vid.

TAB.

LXXXIV.

Theophr.

H. P. l. 9.

c. 2. 3. 4. &

l. 4. c. 6.

I. De Arbore *Thurifera* diversa longe produnt *Veteres*. *Theophrastum* si sequimur, quinque fere cubitis attollitur, ramosa, folio pyri, sed multo minore, coloris herbacei ut rutæ, cortice lævi, lauri modo. In Arabia, India & Syria nascitur; & tam sponte quam incisura, quæ sub cane fit, fundit lacrymam, quæ Thus

dicitur. Arborum *aliæ* super montem prodeunt: illumque præaltum, nive obrutum, & de quo amnes in plana decurrant. *aliæ* ἐν ταῖς ἰθαῖς γεωργίαις ὑπὸ τὴν ὑπόρριαν. *Aliæ* coluntur, *aliæ* non. *Quidam* lentisco similem prodidere, folio subrutilo fructu lentisci, qui videre apud Theophrastum, folio lauri, lævique. Omnibusque his

Arbor his visum in regione Arabum media, thurifera. circa Saba, Adramita, & Catabana Plin. H. N. provenire. *Plinius*, quæ sit hujus

L. 12. c. 14.

arboris facies, non constare scribit. A nullo enim Latino, quod equidem sciam, (sunt ejus verba) tradita: Græcorum exemplaria variant. Alii folio pyri, minore duntaxat, & herbi di coloris prodire. Alii lentisco similem subrutilo. Quidam therebinthum esse, & hoc visum Antigono regi adlato frutice. Juba rex iis voluminibus, quæ scripsit ad C. Cæsarem Augusti filium ardentem fama Arabiæ, tradit conortii esse caudicis, ramis aceris maxime Pontici. Succum amygdalæ modo emittere, talesque in Carmania adparere, & in Ægypto satas studio Ptolomæorum regnantium. Cortice lauri esse constat: quidam & folium simile dixere. Talis certe fuit arbor Sardibus. Nam & Asiæ reges ferendi curam habuerunt. Qui mea ætate legati ex Arabia venerunt, omnia incertiora fecerunt, quod jure miremur, viris etiam thuris ad nos commeantibus: quibus credi potest matrem quoque teretem enodi fruticare trunco. Nullis vero illæ præter Arabiam, ac nec Arabiæ quidem universæ. Arramitaræ pagus Sabæorum, capite regni Sabota, in monte excelso, a quo octo mansionibus distat regio eorum thurifera, Saba adpellata, quod significare Græci mysterium dicunt: spectat ortus Solis æstivi, undique rupibus invia, & a dextra malis scopulis inaccessa. Id solum e rubro lacteum traditur. Sylvarum longitudo est Schœnorum XX. latitudo dimidium ejus. Schœnus patet Eratosthenis ratione, stadia XL. hoc est pass. quinque M. aliqui XXXII stadia singulis Schœnis dedere. Attolluntur colles alti, decurruntque & in plana arbores sponte natæ. Terram argillosam esse convenit, raris fontibus ac nitosis. Attingunt & Minæi pagus alius, per quos evehitur uno tramite angu-

sto. Hi primi commercium thuris fecere, maximeque exercent: a quibus & *Minæum* dictum est. Nec præterea Arabum alii thuris arborem vident, ac ne horum quidem omnes. Feruntque M. M. M. non amplius esse familiarum, quæ jus per successiones id sibi vindicent. Sacros vocari ob id, ne ullo congressu sceminarum funerumque, cum indicant eas arbores aut metant, pollui: atque ita religione merces augeri. Quidam promiscuum jus iis populis esse tradunt in sylvis: alii per vices annorum dividi. Juba insulis negat nasci. Diodorus Siculus pusillam arborem facit, albæ Ægyptiorum spinæ adspectu similem, foliaque salicis referre; florem aurei coloris. Sed cum hæc potius myrrhiferæ arboris sit descriptio, metuo, ne mendum aliquod irreperit.]

II. Sed nec RECENTIORES in ejus descriptione in totum conveniunt. Garzias humilem esse & folia lentisco similia habere prodidit. Theverus pinus resiniferæ referre scripsit. Major illius auctoritas & ad Veteres accedens descriptio. Fingit sæpe hic, & impudenter mentitur. Duplex vero ista, *montana*, quæ optimum thus profert; & *in planis nascentis*, quæ nigrum & improbum. Cortex ejus est lacryma crustæ conjuncta, ut post dicetur. *Folium thuris*, quod e Florida adlatum est, pediculo fibroso & fungoso, & qua parte a matre avulsum fuit canulato, rubescit nonnihil ex fusco, venulisque rectis striatur. Ab imo pediculo, ad summum usque cuculli verticem duplicatum est, & quasi ex glutinis conflatum tenuibus tunicis, vagina sesquipalmum longa instar infundibuli, quod intra rufum & hirsutum, hiantis histrionis speciem præ se ferentis: superne galeatum videtur. Vidit & Rupellæ Lobelius.

Garz. ab horto l. aromar.

Bauhin. H. P. l. 10. c. 30. p. 307.

Lobel. in Adversar. p. 420.

CAPVT III.

De Terebintho.

Terebin-
thus.

Vid.

TABVLA
LXXXV.

Dioscor. M.

M. l. l. c. 91.

Theophr.

H. P. l. 1.

c. 15. l. 3.

c. 4. 6. 14.

L. 5. c. 4. & 8.

Theophr.

H. P. l. 3.

c. 15.

Plin. H. N.

l. 13. c. 6.

Plin. H. N.

l. 13. c. 6.

Ex Veteribus non descripsit Dioscorides Terebinthum, quia nota. Nec Theophrastus multa de ea in genere. Censetur inter αἰφύλλα. Materies nigra admodum spissaque, quod de Syriaca Terebintho sumit Plinius, cui spissa firmitas. Germinat περιεμισαμένη τῆς ἥρας: Semen vero περι πύρε ἀμυγδόν, seu circa triticeæ messis tempus emittit. Nasceitur & in Syria: circa Macedoniam vero montibus propria est. Nonnisi fructu resinaque utilis. Genera tria apud eosdem inuenies. *Marem*, *fœminam* & *Indicam*. I. *Mas* sine fructu est, ob id sexum maris adepta. II. *Fœminarum* duo quoque genera. *Alia* fructum protinus rubrum (male rufum, ἐρυθρός color rosæ & sanguini, rufus bovi) producit lentis magnitudine, qui non maturefcit. Sic vox ἀπεπτός peculiaris Theophrasto in his, quæ maturantur, vertenda. *Alia* viridem primum, qui deinde ἐρυθραίνει, post αἶμα τῇ ἀμπέλω maturefcit, nigrumque acquirit, magnitudine fabæ, tactuque resinofum, καὶ θυώδες, seu odore iucundum. *Materia* huic lenta; *Radices* validæ, & in profundum abeuntes, in totumque ἀνῶλεθρον τὸ δένδρον. *Flos* oleæ, verum colore rubro. Plinius racemosum oleæ modo facit. *Folium* numerosum ab uno pediculo, δαφνοειδές, κατὰ συζύγιαν, ut in sorbo, in summo impar, verum minus, ἀγωνιότερον quam sorbo, καὶ δαφνοδεςτερον τῷ κύκλῳ, totum pingue cum fructu. Fert & καρυκώδη (sic lege, non καριώδη, vel vt Gaza legit καρυώδη) τινα κοῖλα, ut ulmus; quibus bestiolæ tanquam culices innascuntur. Fit in his aliquid ῥητινώδες; nec tamen inde resina. Nec ejus fructu copia. Sed manibus tantum adharet: & si non lavetur, postquam collectus est, coheret inter se. Cum lavatur, candidus probeque maturus supernatat, niger subsidit. Agemus de ea alibi. Erumpit & cortice. Circa Idam & Macedoniam brevis, δαμνώδης & ἐρεαμένη nasci-

tur. At apud Damascum Syria, magna, copiosa & decora. Montem enim terebinthis refertum referunt, in quo aliud nihil. Provenit & in Judæa, Cypro & Cycladibus insulis. Visa & in Olea. Quantum ad *Usum*, *Materies* ad capulos pugionum accepta, illius inprimis, quæ in Syria. Tornabantur ex ea & pocula Thericlea. Celebratur, inquit Plinius, & Thericles nomine calicis ex terebintho facere solitus torno, (quos a figlinis discernere facile non erat) per quem probatur materies. Omnium hæc sola ungi vult, meliorque oleo fit. Colos mire adulteratur, juglande ac pyro sylvestri tinctis atque in medicamine decoctis. *Fructus*, *folia* & *cortex* adstringendi vi pollent, & secundo ordine excalefaciunt, cortex aridus adeo calidus est, ut a mandentibus protinus percipiatur. Semen in capitis dolore bibitur in vino & contra difficultatem urinæ. Ventrem leviter emollit, & Venerem excitat. III. *Terebinthi Indicæ* Theophrastus meminit; ut & alterius terebintho similis; cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia: fructus amygdalorum æmulus; eorumque magnitudine in Bactris. Pistaciam quidem esse volunt.

II. RECENTIORIBVS duplex est Terebinthus, 1. *vulgaris*, 2. *peregrina*.

I. *Terebinthus vulgaris* est Theophrasti *fœmina* altera, Lobelio *Len-tiscifolia minor*. Fruticat maxima ex parte. Rami longi, rari; cortex cinereus. *Folia* laurinis similia, sed obtusiora, non semper æqualis situs, subrubentia, quibus nervuli obliqui, nec semper perpetuus per hyemem vigor. *Flores*, qui vere funduntur, e ramulorum tuberculis copiosi, in longo racemo meris fibris purpurescentibus contexti. *Fructus* parvi rubentes, resinosi lentoris, quibus nucleus. Extruduntur circa messem. Clusius vere, cum novella fo-

Plin. H. N.

l. 16. c. 40.

Theophr.

H. P. l. 3. c. 4.

Theophr.

H. P. l. 4.

c. 5.

Lobel. Ad-

vers. p. 411.

Stapel. ad

Theophr.

H. P. l. 3.

c. 15. Bau-

hin. H. P. l. 3.

c. 20. p. 279.

Clus. H. P.

l. 1. c. 11.

Terebin-
thus.

lia prorsus fere rubentia extremis ramis germinare incipiunt, nasci florem muscosum, & oleæ florem purpurascens vel phœniceum imitantem, racematimque coherens scribit, qui in fructum transeat lentiscino fere similem, paulo majorem & longiorem, initio viridem, circa vindemias, cum maturuit, virescentem. *Folliculus* sæpe utris instar vindemiarum tempore concavus ut in ulmo, & purpurascens; in extremis ramorum cornicula cartilagineæ substantiæ, digitorum sex, saliva scatentia, in qua alati culices, aliquando & galla nucis magnitudine, intus cava, corniculorum forte primordium. Visa in ea nonnunquam & olea crevisse. Folliculorum alii sunt *longi* depressique, parum cavi, cornibus caprarum simillimi, unde cornu capræ arbori nomen. alii *rotundi*, & ex eis magni & parvi, ut mala: alii oblongi, ut Pruna. Et ex his alii partim albi, partim rubri; alii subcitrini & albi; alii per totum rubri; alii subvirides. De Resina alibi agetur. Provenit in Arabia, Africa, Syria, Creta, Cilicia, Corcyra, Cycladibus insulis, Narbonensi Gallia, Italia, Japidiæ collibus, murorum rudibus, locis siccis, lapidosi, & Soli expositis. Vidit Matthiolus non procul a Tridento prope Athesin, in colle Castel Trento dicto. Inter Sidero-capsam & urbem de la Cavalle non majores Corylis crescunt. In agro Romano circa Virgouanum Castellum Ursinorum visuntur altissimæ & crassissimæ: in Lombardia & Tuscana parvæ & contortæ. Circa Monspelim, ubi in Aprili floret, in sylvis, flores, fructus & colliculos collegit Septembre Bauhinus. In Germania nusquam vel sponte nascitur. *Ufus* ejus nec nunc contemnendus. Impositores pro Ebena phalos ad pedestres lanceas ex ea venditant. Semina in Ci-

licia & Syria hucusque comeduntur. *Gallarum* magnus in tenuissimis sericeis linteis apud Turcas usus. Sex millia librarum quotannis insumuntur. Nisi vere colligerentur, in semipedalem longitudinem ad formam cornu excrescerent. Differentias maris & scemina non potuisse se in hac arbore observare, notat Clusius. Nec insuetum fruticibus inter se similibus, ut alter fructum inanem & rufum; alter interdum ad maturitatem perductum ferat. Sæpe etiam frutici non adulto & umbroso loco provenienti nullus.

II. *Terebinthus peregrina* duplex est, 1. *fructu majore pistaciis simili, eduli*, 2. *fructu minore & cæruleo eduli*.

1. *Terebinthus peregrina fructu majore pistaciis simili, eduli*, Bauh. H. P. l. 3. c. 19. Arabibus *Botn quibir*, Theophrasto *Indica*, Serapioni *Fael*, Tabernom. *latifolia*, Bauhino *Indica major fructu rotundo dicitur*. Aequat nostras juglandes. Folio est oblongiusculo, a pistaciis nuce brevior & rotundior qui ex racemis pendet, & quo inquilini vescuntur. Præter saporem falsum, mediocriter siccus est. Copiose in Persia, Mesopotamia & Armenia provenit.

2. *Terebinthus peregrina fructu minore, cæruleo, eduli*, Arabibus *Botn songier*, Theophrasto *Syriaca*, Bauhino *Indica fructu parvo ad cæruleum accedente*. Potest ad Bel Arabum referri. Nucula cum suo cortice magnitudine majoris pisi sunt, ad Corculum aut Doram accedunt, & propter colorem inter viridem & cæruleum medium; Arabibus *granum viride* adpellantur. Calidæ & siccæ in tertio, & defluxionibus ad nervos & articulos utiles. Vescuntur fructu cum pane Syriæ incolæ.

CAPVT IV.

De Balsamo.

Balsamum.

Vid. TAB.

LXXXV.

Theophr.

l. 9. c. 6.

Plin. H. N.

l. 12. c. 25.

Dioscor. M.

M. l. 1. c. 18.

Strabo

geogr. l. 16.

Pausan. in

Boeotic.

I.

De Balsamo singularia apud Theophrastum, Dioscoridem, Plinium & alios *Veteres* auctores occurrunt: inter quos tamen quædam differentia. Arbor est Viti magis similis quam myrto Plinio, Cytiso & terebintho Straboni, piceis arboribus Justino. Mali Punicæ magnæ proceritas apud Theophrastum, myrti apud Pausaniam, Lycii seu pyxanthæ apud Dioscoridem. *Rami* multi, crassiores quam in myrto, qui scabritie, proceritate & gracilitate differunt, ita, ut, quod in arbore tenue & *τριχώδες* est, *δεριδόν* seu quasi *demesfile* dicatur, quod facile ob gracilitatem demeratur. Dicuntur xylobalsamum, amputabanturque quotannis, seu ut non magna arbor esset, & reliqua validiora; tum emolumenti gratia. *Folium* secundum Pausaniam *ἀμυράνε*, secundum alios rutæ, exalbidum, perpetuo virens, seu *αἰθαλλέστερον*. *Fructus* similis terebintho, magnitudine, figura & colore, vino proximus gustu, admodum odoratus. Subruber idem, tegmine suo scilicet vestitus; flavus est, ut Dioscorides scripsit, vel rufus, ut Plinius, si eo spoliatur: nisi *ξανθόν* e flavo rubrum dicere velis. Nomen *Carpobalsamum*, infima Græcia *κασάμιον* dixit. Adulteratur semine hyperico simili, quod a Petra oppido adfertur; coarguiturque magnitudine, inanitate, longitudine, odoris ignavia, & sapore piperis. Colligi lacrymam in caudice & parte superna tradunt *ἀπὸ ἐκτομῆς*. Inciditur Theophrasto *ὄνυξι* *συνηροῖς ὑπὸ τὸ ἄσρον*, Plinio filice & aliis, vitro, lapide, osseisve cultellis. Ferro lædi vitalia odit & moritur protinus, eadem amputari supervacua patiens. Tacitus pavere arborem habet. Incidentis manus liberatur artifice temperamento, ne quid ultra corticem violet. Singularum arborum vena, tempore Plinii, ter omnibus percutiebatur æstatibus, postea deputabatur. Succus e plaga manat ploratu, sed tenui gutta lanis

colligitur in cornua. Ideo Alexandro M. res ibi gerente, toto die æstivo unam concham (concha tria cochlearia facit) impleri iustum: quod uno die homo plus colligere non posset. Omni vero facunditate e majori horto congios senos, minore singulos. Sex vel septem annuatim collectos prodidit Dioscorides. Opobalsamum dicitur, eximiaque est suavitatis & primæ gratiæ. Ex cornibus novo fictili conditur crassior: similis oleo & in musto candida. Rubescit deinde, simulque durescit & translucido. Addit Theophrastus *ὁσμὴν διαφέρουσαν καὶ πολλήν*, ut subito ingens spatium permeet. Ejus quod in vasculis supernatat, Sethi album & tenue facit: quod in medio, subrubrum; quod tertio loco fecis instat, *συρόμεν* subfuscum. *Probatio* lacrymæ, ut sit pinguis, tenuis, ac modice rufa, & in fricando odorata. Secundo candido color, pejor viridis crassiorque, pessimus niger, quippe ut oleum senescit, falsum hoc. Ex omni incisura maxime probatur, quod ante semen fluxit. Dioscoridi optimus qui *πρόσφατος, τῇ ὁσμῇ ἔυτονος*, sincerus non subacidus, *ἔυδιετος*, vel potius *ἔυδιαντος* aut *ἔυδιάλυτος*, resolvi & penetrare facilis, lævis, adstringens, & linguam modice mordens. *Adulterabatur* jam Theophrasti tempore, pluribus mistionibus; & post modis pluribus. Vitiatur, inquit Plinius, oleo rosæ, cyperi, lentisci, balani, terebinthi, myrti, resina, galbano, cera, prout quæque res fuit. Dioscorides susinum, metopium, mel & ceratum myrtinum aut Cyprinum valde liquidum addit. Nequissime adulteratur gummi, quoniam ipsum quoque inhærescit manu inversa, & in aqua. Et hujus *probatio* gemina est. Debet sincerum & inhærescere: sed hoc & gummi addita fragili crusta evenit. Et gustu deprehenditur. Carbone vero, quod cera resinaque adulteratum est, nigriori flamma. Nam melle mutatum statim con-

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 10.Plin. l. c.
Solin. Polyhistor.
c. 38.

Balsa-
mum.

contrahit muscas. Præterea sinceri densatur in tepida aqua gutta fidens ad ima vasis, adulterata olei modo innatat: & si metopio vitiata est, circulo candido cingitur. Summa probatio est, ut lac coagulet, in veste maculas non faciat. Idem apud Dioscoridem habetur. De viperis, quæ sub eo degere scribit Pausanias, vide eundem. *Locum* si spectes, provenit in valle Syriæ Theophrasto. Uni terrarum Judææ concessum, quondam (Theophrasti temporibus) in duobus tantum hortis, utroque regio, altero jugerum viginti non amplius, altero pauciorum. Ostendere, addit, arbusculam hanc urbi Imperatores Vespasiani. Clarumque dictu a Pompejo M. in triumpho arbores quoque diximus. Justinus vallem continuis montibus velut muro quodam cinctam, ad instar castrorum claudi. Spatium loci ducenta millia jugerum, nomine Hiericho dici prodidit. Idem apud Strabonem habemus, qui & apud Sabæos Arabiæ incolæ nasci tradit; ut Josephus in Judæam a Regina Sabæ tempore Salomonis adlatam. Sethi ἡλὶς πηγῆς, quæ priscis ἡλὶς πόλις in Ægypto meminit, ibique nasci. *Ufus* fere omnium, *ligni* nempe, *fructus* & lacrymæ. *Ligno* minima gratia, sua tamen merces DCCC. seu denariis CCC. Amputatio ipsa surculusque intra quintum demum annum vaniit. Ex hoc sarmento tenui rufum est optimum, si simul Opobalsamum spiret. Coquitur in unguentis, pro succoque ipsi substituere officinæ. Pretium in libras VI. Ex aqua potum cruditatibus & torminibus succurrit, urinas ciet, squammas offisum extrahit, & ἡς τὰ τῶν μύρων σίματα adhibetur. *Fructus*, cui secunda gratia, pleuriticis, ruffientibus, vertiginosis, orthopnoicis subvenit, & ad muliebres suffitus adcommo- datur. Eligi debet flavus, plenus, grandis, ponderosus, gustu mordens, & odoratus. De Adulterio superius dixi. Qualis *Lacryma* esse debeat, præmissum. Millibus denis sextarii emti: vendente fisco trecentis denariis vaneunt. Theophrastus in loco duplo argento pondus rependi pro-

Justin. hist.
l. 36.

Strabo
geogr.
l. 16.
Joseph. An-
tiquit. l. 8.
c. 6.

Plin. l. c.

Dioscor. M.
M. l. c. 18.

dit. Maxime calefacit Dioscoridi, qui forte tenuitate partium deceptus est, menses, secundinas & fœtus extrahit; sordida ulcera purgat; concoctionem adjuvat; ægre spirantes sublevat, &c. De generibus vix aliquid occurrit. *Sylvestre* forte illud, quod in Arabiæ maritimis prodire prodit Strabo. At Theophrastus nullum usquam repertum accepit. Quod vero Plinius tria arbori genera ponit, tenui & capillacea coma, quod vocant Eutheriston; Alterum scabro adspectu, incurvum, fruticosum odoratus, quod Trahy appellant: tertium Eumeces, quia est reliquis procerius, lævi cortice; metuo, ne ex male intellecto de ramis Dioscoride ortum sit. Præstantiorem hic semetipsa scabritia, proceritate & gracilitate scribit: quodque in ea tenue *δέριον* dici. Nec ulla balsamo coma capillacea, si folium rutæ folio, ut ipse prodit Plinius, simile: nec *τριχώδες* de tenuem & capillaceam habente comam sumendum est; sed quod tennes & capillaceos fert surculos. Galenus Sagadini balsami meminit, a loco ita dicti, quod tanto Ægyptio præstantius, quanto vinum falernum eo quod caupones vendunt.

II. Apud RECENTIÖRES OCCUR-
rit, 1. *Balsamum Syriacum rutæ folio*. 2. *Carpobalsamum nigrum Alexandrinum*. 3. *Xylobalsamum officinarum*. 4. *Opobalsamum concretum Lobelii*, & 5. *Opobalsamum solidum Bauhini*.

I. *Balsamum Syriacum rutæ folio*, Alpinus de arbuscula est viticosa, Ligustrum vel Balsamo
Cytisum proceritate non superans. Doring. de
Nam ubicunque nascitur, duorum Balsamo.
vel trium cubitorum altitudinem non Bauhin. H. l.
excedit. *Lignum* ei gummosum le- P. l. 3. c. 36.
neque, colore exterius subrubeo. p. 298.
In horro Meterea prope Cairum pedali
longitudine & pollicari crassitie stites, vix pedalis, qui in multos graciles ramos anserinæ pennæ caule haud crassiores findebatur. *Ramuli* duplici cortice cinguntur, longi, re-
cti, graciles, subrubri & paucis foliolis ordinatim referti. Putantur Bellon. ob-
quotannis vitis modo, ne degene- serv. l. 2.
rent. c. 39.

rent. Folia septena ad summum alae adnascuntur, quorum extremum reliquis majus, rutæ vel potius lentisci simillima, colore viridi, subalbido, perpetuoque virentia. Lobelius tamen mense Decembri deponi, novaque Majo suffici, ex amici relatione prodit. Bellonius pauca in Materea horto in Septembri conspecta meminit. Ex similibus prodeunt bina imprimis folia, bifoliis nascentis vitis maxime similia; quæ post hæc tria quatuor aut quinque prodeunt, amaraci foliolis sunt proxima; tertio producta, ad rutæ folia accedunt. Flores fert parvos, albos, acaciæ proximis, ternos singulis alis adpressos, quasi in umbellæ formam, summe odoratos, sed qui facile evanescit. Ex his *semina* promanant flava, folliculis nigris subrubentibus contenta, valde odorata, intusque humorem flavum, melli persimilem, habentia, sapore subamaro, parumque acri, linguam ferientia, opobalsamumque redolentia, terebinthi fructuum figura, & magnitudinis æmula, extrema, aculeata, & medium crassum obtinentia. *Lacryma*, quæ *Opobalsamum* ex fissuris ramulorum Junio, Julio & Augusto mensibus partim sponte, partim stipite ferro scarificato destillat, vitreisque vasis excipitur, subit varias cum ætate mutationes. *Color albus* recenti, & a stipite excepto, imprimis quod supra enatat; mox subviridis oleosus, post quinquennium aureus, senio confecti melleus, obscurior tamen. *Turbidum* idem per quinquennium, hinc clarescit, ut in decennio limpidum & splendidissimum evadat; tandem iterum turbatur. Idem de levitate & odore intellige. Adeo primo *leve*, ut maxima difficultate in aliquo liquore instillatum confidat, sed continuo in aquæ superficiem feratur, cumque ea cito dissolvatur: medio post se modo habet; tandem *crassescens* subito in aquam projectum subsidit, difficulter superficiem restituitur, & cum aqua coagulatur. Odor infanti validissimus, adultum Thus ac terebinthinam redolet, cum sapore amaro, acri ac adstringente; senescenti re-

missus. *Nigrum* nemo unquam vidit, falliturque Plinius. Probatio præter jam dicta est, si valde nares fragrantia feriat; gutta per totam aquæ superficiem instillatu expandatur, facile coaguletur, lactisque colorem contrahat; & coagulatum stylo eximi possit. Adde vitiatum oleo super aquæ superficiem formis orbiculorum expandi, telamque facere, qua separata oleum in aqua relinquitur: contrectatum nullo lentore vel viscositate digitis adhærere, & gustatum labia non stringere. Quin nec aqua facile congelatur, super quam tela opobalsami; oleo tecta a glacie condensatur. Si corruptela ab unguentis, subsidebunt hæc paulo temporis in fundo: si a cera, turbidum perpetuo videbis: si melle, dulcescet; si resina, carboni instillato, nigrior flamma. *Locum* si attendas, *Alpin.* videtur ejus patria Arabia. In monte quodam arenoso prope Mechem & Medinam vivere adfirmant. Inde in Judæam translatum & in hortis cultum est: hinc forte in Ægyptum: ubi & nunc temporis in Maderea horto Cahiræ vicino colitur. Longitudo hujus passus 200. latitudo 100. terreis aggeribus sine calce circumducitur. Perierat tempore Petri Martyris totum balsametum ibidem: unde quidam plane periisse crediderunt: sed delatis ex Arabia cura Eunuchi Messer Ægypti præfecti restauratum est. Quin & in parte Orientali montis Libani Alexio Græcis imperante tantum Opobalsami collectum, quantum in Ægypto, Theverus ab incolis se accepisse tradit. Adlata ab Alpino & viva, e cujus foliorum dissectis alis Opobalsamum stillare dicitur. Magnus & frequens Opobalsami apud Ægyptios *Usus*. Vulnere graviora, intra unum diem consolidari, experimentis probatum. Ulcera mundare & sanare certum. In febribus putridis movet sudorem: in Chronicis, expedit obstructions, cruditatesque emendat, si scrup. ij. pondere sumatur. Potatur, sufficitur, & supponitur ad sterilitatem tollendam. Faciei in balneo inungitur, ut pulcritudinem servet. Urinam a calculis, frigidityte

Balsa-
mum.

Balsamum, gigitate vel flatu interceptam, movet: & in peste drachm. semis pondere quotidie deglutitur. Thevetus hodie nec ita oleosum, nec tam consolidans colligi, fide Patriarchæ prodit. Seminis & virgarum recentium decocto stomachi imbecillitas, spirandi difficultas, uteri inprimis humiditas tollitur. Paratur ex iisdem & pulvis, qui vel adsumitur vel sufficitur. Quia vero ista difficulter a nostris habentur, Opobalsamo quidam Myrrham stacten, styracis liquorem, oleum e seminibus citri, oleum nucis myristicæ; alii Cinnamomi, garyophyllorum, juniperi candidum vel Terebinthinæ succedaneum esse voluerunt. Carpobalsamo, cubebas, caryophyllos, Leucoii radicem, semen terebinthi vel lentisci. Xylobalsamo Nerion Alpinum, lignum hederæ, acorum verum, macin, agallochum nonnullis substituere visum.

Alpin. de
balsamo.

II. Carpobalsamum nigrum Alexandrinum, forte est semen illud hyperico simile, quo ex Dioscoride & Plinio adulterari superius diximus. Alpinus duplex circumferri scripsit; quorum *unum* est terebinthi magnitudine, atque fere etiam forma, rotundum & oblongum ovo simile, in extremis acutum, flavum, folliculo rubente undique tectum; *alterum* pseudocarpobalsamum, huic admodum magnitudine, figura, & colore simile, oblongius & ex medietate folliculo contectum. Odoratum tamen & aromaticum. Cordus non raro inter Carpobalsamum dictum inveniri adulterinis granis majora, pleno, pingui, & oleoso intus nucleo. Odoris in attritu gratissimi, & quæ gustu ineffabili, odoris, saporisque gratia, oris halitum diu commendent.

Matthiol.
in Dioscor.
l. 1. c. 18.
Bellon. ob-
serv. l. 2.
s. 39.

III. Xylobalsamum Officinarum Myrtum potius quam Balsamum refert Matthiolo. Bellonius ex Arabia devehit, & cum Ægyptio convenire scribit. At Cordus alterius alicujus fruticis virgulas esse; & aliquando inter eas miri odoris & saporis inveniri. Lobelius Lentisci furculos plerumque cariosos, sed si recentes & odorati, minime contemnendos.

IV. Opobalsamum concretum Lobelii, legitimæ terebinthinæ Cypriæ veteris, aut resinaceorum liquorum instar densatum erat, glebæ Benzoini fere concretionem, sapore acri, colore fulvo, mastiganti ut mastiche lentescente.

V. Opobalsamum solidum Bauhini, Duci Würtembergico a Paludano missum erat, pellucidum, digitis ductile, colore rutilo, uniformi, odore Benzoini, cum adolebatur, fragrantiore. Forte cum superiore idem.

Ex EXOTICIS huc referri debent

1. *Xylo novæ Hispaniæ.* 2. *Goacanez Nicaraguae.* 3. *Arbor balsamifera Tolutana.* 4. *Maripenda.* 5. *Frutex Indicus Lavendulæ folio.* 6. *Hoitziloxitl.* 7. *Cabuireba Brasiliensium.* 8. *Capayba eorundem* & 9. *Copeiba.*

Vid.
TABULA
LXXXVI.

I. Xylo, seu ut Gomara Zilo, arbor est Punica malo major, foliis urticæ, dissectis & tenuibus. Dupli-
cem fundit liquorem. *Vnum* inciso cortice tenacem, subalbidum, limpidum, qui Matthiolo *Balsamum Indicum novum*, Lucanæ *Balsamum ex nova Hispania*, aliis *Opobalsamum* vocatur. *Alterum* ex ligno, cortice & foliis exprimitur, aut vi ignis elicatur, pullum, ex rufo ad fuscum vergens, odoris suavissimi, saporis acriusculi, & subamari, Xylobalsamum dictum. Non nisi vase argenteo, stanneo, aut vitreo adservatur, propter insignem penetrandi vim. Tanti primum pretii, ut uncia centum ducatis Romæ venderetur. Sumtum mane asthmaticis prodest, menses ciet, inveteratos ventriculi dolores lenit: flatus dissipat: urinam illitum provocat. In nervorum passionibus & ischiadicis doloribus nulli secundum. Vulnere quævis etiam capitis, ubi cranium non fractum, intra triduum restituit: in febribus chronicis, spinæ paulo ante paroxysmum inunctum, superhaustis aliquot vini guttis, horrorem abigit, sed repetito usu opus est. Norat Heroa quendam Monardes, qui frequenti usu

Monard.
hist. arom.
c. 9.
Bauh. H. P.
l. 3. c. 33.

usu vigorem juvenilem referebat, absque ulla vivens molestia. *Æmulum* huic si non idem *Balsamum Bauhini*, dono a Ducissa Lotharingæ acceptum, odore Styracis, & qui totam domum perfunderet, sapore acri, flammam igni admotum concipiens, & quod aquæ injectum fundum petebat, in qua digitis attritum albescebat.

II. *Goacanez Nicaragua*, Scaligero *Goacomax*, Fumeo *Geaconax*, Clusio *Lobus oblongus aromaticus*, & *Balsami Peruvani fructus* Penæ, Bauhino *Balsamum Americanum*, arbor est vasta, ramosa. *Materies* firma, & quæ defossa diu incorrupta durat, duplici cortice, altero crasso, suberini modo, altero tenui interno vestita: *fructus* pisi magnitudine, amarus, qui alba filiqua digitum longa includitur. Elicitur ex eo quod inter utrumque corticem est spatium, incisione, alba, limpidissima, suavissimi odoris *lacryma*, illa, quæ ex *Xylo* educitur, nobilior; quæ in aqua stillaticia non diffunditur, nec lac cogit, nec fundum petit. *Fructu* se Indi ad capitis dolores & defluxiones suffiunt. *Monardes* exiguum cicerisque grano haud majorem habuit, gustu amaricante, qui in filiquæ digitum longæ, compressæ, albæ & tenuis summo laritabat. *Cæsalpinus* videtur cum *Xylo* confundere. *Fumeus* eam in insulam S. Dominici ponit. Diversa ab ea *Huaconex Recci*, de qua inferius.

III. *Arbor balsamifera Tolutana* pumilas pinos refert, ramosa, cortice tenui, foliis filiquæ, toto anno virentibus. Inciditur tenuis & tenellus cortex ferventissimo sole, & fundit liquorem, qui *Balsamum de Tolu* vocatur, & cochlearibus ex cera nigra, ibi nata, factis excipitur. Erumpit aliquando ex nodis & alis sponte. Noctu ob frigiditatem nihil effluit. Tendit ex rubro ad aureum, dulce est, glutinosum, firmiter inhaerens, odore limonum, & magnarum virtutum. Vulnera enim ita consolidat, ut nihil cicatricis relinquatur, si labra probe juncta fuerint; ideo in faciei vulneribus singulare. Ligatu-

ra quarto die solvitur. Injicitur cum vino albo cuniculosis fistulis, emittiturque post trihorium. Magni quoque est usus in capitis doloribus a frigida causa, si pannus lineus intingatur & fronti adplicetur: in defluxionibus in oculos, si temporibus adponatur: in phthisicis difficulter expectorantibus, si mane aliquot ejus guttæ lambantur: in asthma, si ex vino albo hauriatur: in tertianis diurnis & quartanis.

IV. *Maripendam Hispaniolæ*, Bauh. *Balsamum fructu racemoso ex Hispaniola* vocat. Frutex est, qui aliquando ad duorum hominum proceritatem adsurgit. *Caulis* cinerei: *folia* hastarum mucronibus paria, crassa, lata, superiore parte virentiora, costata crassa per medium divisa, sparsim e rubeo purpurascencia. *fructus* racematim dependet, longus, manus digitatæ instar, ex acinis uvarum similibus e purpureo nigricantibus concinnatus. Foliis *Æthiopes* loco fistularum, ad hauriendum sumum *Yett* utuntur. Ex turionibus & asparagis succus exprimitur, & in aqua ad mellis crassitudinem coquitur. Sanguinem deprimat, & vulnera consolidat. Ex summitatibus aqua destillatur, vulneribus & frigidis adfectibus utilissima.

X. *Fruticis Indici Lavendulæ folio* ramus ita a Clusio describitur. Triumpedum longitudinem non excedebat, crassitudinis diameter circiter duarum unciarum erat, cujus fastigium in nodosum caput nonnihil extuberans desinebat, e quo sesquipediales quinque minores rami profluebant, adeo eleganti serie & ordine dispositi, quasi humana industria fuissent inserti, inferiori ramo facie quidem similes, sed molliores, magis succulenti, qui procul dubio comprehendere & radices agere potuissent, si quis commodo loco telluri committere in animum induxisset. In horum comosis fastigiis *folia* adhuc inhaerebant virentia, forma, magnitudine, & colore lavendulæ folia valde referentia, sed succi plena, aromaticum quidpiam

Ovied. H.
Ind. l. 10.
c. 13.
Clus. exot.
l. 3. c. 18.
Idem in
euris posterio-
ribus
Monard.
hist. simpl.
c. 19.

Fumeus
apud Bauh.
H. P. l. 3.
c. 33. p. 296.

De Laet
Ind. occid.
l. 3. c. 15.
Reccus ref.
medic. no-
væ Hispan.
l. 3. c. 14.
Monard.
simpl. c. 10.

Balsa-
mum.

Nardus R.
M. N. H.
l. 3. c. 13.
Bauh. H. P.
l. 3. c. 33.
De Laet
Ind. occid.
l. 5. c. 23.

Clus. exot.
l. 1. c. 5.

Balsa-
mum.

piam spirantia, medium inter angelicæ sylvestris radicem, gummi, quod vocant Elemi, & Cunigundis herbam, qualibus totum ramum vestitum fuisse, ipsa in ramis vestigia indicium faciebant.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 11.

VI. *Hoitziloxitl Mexicanorum*, Panucenses *Chuate* vocant, Laet *Hutzochitl* habet. Est mali medicæ magnitudine, *foliis* amygdali, sed majoribus & acutioribus. *Flores* loculorum oblongorum primo forma, post foliorum veluti cæteris longiorum, in quorum cavitate semina candicantia, oblonga, paulisper contorta. *Liquor* stillat si definentibus imbribus incideris, e fulvo in nigrum inclinans, acer & odoratus, penetrantissimus, qui renes mundat, & fœtum mortuum extrahit. E semine elicitur oleum, odore & sapore illi quod ex nucleis Persicorum par. Ex surculis quoque decoctis. Non est cum Goacanez eadem.

De Laet
Ind. occid.
l. 15. c. 7.
Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 5.

VII. *Cabureiba Brasiliensium* seu *Capureiba* materies est durissima & ponderosa. *Balsamum*, quod sub cortice cinereo, miniata membrana vestito later, & vulnerato, circa Februar. & Martium luna plena funditur, odoratum est, flavum, compactum, tenax. Cortices a feris, Medicinæ sine dubio gratia deteruntur. Provenit in præfectura S. Vincentii. Contra vulnera & morsus animalium singularem virtutem obtinet.

De Laet
ibid.
Marcgr.
p. 131.

VIII. *Cupayba eorundem* instar ficus, procera, materie inutili. Multum olei limpidissimi, quale ex olivis exprimitur, fundit: quod *Capalyva* vocant,

IX. *Copaibam* duplicem invenio.

Unam *Pisonis*, quam *Copiibam* Marcgravius vocat: alteram *Marcgravii*, ejusdem cum *Pisonis* nomine. 1. *Copaiba Pisonis*, quæ & *Copiiba*, arbor est sylvestris & procera. Superius in ramos diffusa; cortice cinereo: foliis semipedem longis, sibi invicem oppositis, nervo & venis paulo rufescentibus, flore pentaphyllo. Fructus bacca lauri magnitudine & figura, initio viridis, per maturitatem niger, paucissima carne subdulci: qui lapidem ovalem, nucleo albo, farinacei saporis, habet, & mense Aprili maturefcit. Brasilienses exsugunt succum, & exspuant cutem. Abundat pingui & odorifero liquore, quem inciso usque ad medullam cortice, luna plena, spatio trium horarum ad duodecim libras olei fundit. Pollet mundificandi & consolidandi viribus. Colicam frigidam illitum tollit, fluxus ventris mulierum gonorrhæos sistit. 2. *Copeiba Marcgravii* lignum est rubrum, faginea duritie. folia ovalia, lata, in pediculis longis & crassis; flos mediocris, quinquefolius, obrotundus: fructus siliqua obrotunda fusca, nucleum avellanæ nucis magnitudine continens, membrana nigra, pauca, lutea, pisorum contusorum odoris pulpea vestitum, testus, carnis lentæ, coloris aquei, edulis. Dat oleum limpidissimum, Terebinthinæ consistentia & sapore æmulum, odore resinoso: quod vulnere calide impositum, fluxum sanguinis sistit: & tribus vel quatuor guttis in ovo forbili sumtum, fluxus ventris tollit. Calidum & siccum in secundo.

Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 4.
Marcgr. H.
P. B. l. 3.
c. 17.

CAPUT V.

De Arboribus aliquot lacrymiferis Veterum.

EX lacrymiferis Veterum arboribus occurrunt, 1. *Myrrhifera*, 2. *Bdellifera*, 3. *Cancamifera*, 4. *Sarcocolla*: de quibus paucissima dictum occurrunt.

Dioscor. M.
M. l. 1. c. 77.
Theophr.
H. P. l. 9.

I. *Myrrhifera arboris* Theophrastus, Dioscorides & Plinius meminerunt. Est secundum hunc Ægyptiacæ

spinæ similis, nasciturque in Arabia. c. 4. Plin. Ille minorem & fruticosiorem Thunbergii. H. N. l. 15. rifea facit; caudice duro, ουσεραμ- c. 12. μέν ἐπὶ τῆς γῆς παχύτερον ἢ ἀνιμωτάχαι, cortice lævi, portulacæque simili. Folium quibusdam aculeatum, non læve, ulmeo simile, crispum, ἐξ ἀνὰ ἑπανάδιν, extremo spina horridulum,

lum, ilignei modo. *Alii* arborem terebintho similem produnt, sed scabrosiorem, folium paulo rotundius, τῇ δὲ γένει διαμεινόμενοις ὁμοίον τῷ τῆς τερμίνθου. Veteres præstantiores haberi. *Quidam* terebinthum esse volunt: nonnulli myrrham & thus eadem nasci arbore. Secundum Plinium, arbori altitudo ad quinque cubica, nec sine spina. Caudice duro & intorto crassiore quam thuris, & ab radice etiam quam reliqua sui parte. *Folium* olivæ verum crispus & aculeatus. *Cortex* levis aliis similisque Unedoni, scaber aliis spinosusque. Aliqui similem junipero, scabriorem tantum spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore juniperi faciunt. Multis in *Locis* Arabiæ gignitur, ut adparebit in generibus. *Dividitur* in *sativam* & *sylvestrem*, quarum illa præfertur. *Gaudet* rastris & ablaqueationibus, melior radice refrigerata. Inciduntur bis iisdemque temporibus, sed a radice ad ramos qui valent. Regi *Sebanitarum* quartæ ex lacryma partes penduntur. *Cætero* passim a vulgo coemtam in folles confarciunt, ipsique unguentarii digerunt, haud difficulter, odoris aut pinguitudinis argumentis. *Bellonius* fruticis cujusdam, qui in *Palæstinæ* Rama provenit, meminit, quem arborem Myr-

rhæ supicatur. Caudice non contorto, denso, horrentibus spinis obfito, folia *Acaciæ* similia, sed paulo majora. De *Myrrhæ Bæotica* in succis agemus.

II. Bdellifera arbor est, quæ bdellium resinam fert, nigra, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici, naturaque Plinio: *Quidam* myrrhiferæ valde similem faciunt. *Wormius* ramulum duarum unciarum longitudine, crassitie minimi digiti, qui aliorum ramusculorum sibi obversorum fragmenta in medio obtinebat, describit. Inferiori, inquit, parte cortice nudatus est, altera tenui, cinereo dotatur, quem stipant bdellii pellucidi & sinceri fragmenta, iis præsertim in locis, ubi fragmenta e stipite emergunt. Substantia ligni mollis, sapore amariuscule. Ceraso simili cortice vestiri nostrum docet fragmentum, lignum in majori stipite forsan albicat, sed in ramulis minoribus ad purpureum accedit. Provenit in *Scythia Bactriana*, Arabia, India, Media ac Babylone.

III. De Cancamifera hoc solum occurrit, Arabicam arborem esse, cui myrti folia Amatus tribuit.

IV. Nec plura de *Sarcocolla* occurrunt. Serapio eam fruticosam, spinosam, ramis nodosis, arbori impressis facit.

CAPVT VI.

De Arboribus aliquot lacrymiferis Recentiorum.

Arbores
lacrymi-
feræ re-
centio-
rum.

Vid.
TABVLA
LXXXVII.

ApuD RECENTIORES plures occurrunt lacrymiferæ arbores, eæque fere omnes Indicæ, nempe, 1. Arbor Benjuifera. 2. Huitzilxochitl Cuernavacæ. 3. Tlahuillillocan Ximenis. 4. Icariba Brasiliensium. 5. Caopia. 6. Arbor Liquidambar. 7. Tocotugebit. 8. Arbor resinifera Tabascensis. 9. Gonandina. 10. Tecomahaca. 11. Holqua-huitl seu Arbor Chilli. 12. Yztac-quauhxiotl seu arbor galliopifera. 13. Copaltic Texaxacuacensium. 14. Arbor laccifera Huâtepecensium. 15. Jetaiba. 16. Arbores lactiferae Cuma-

na. 17. Ambaigtinga. 18. Arbor sinus S. Augustini.

I. Arbor Benjuifera describente *Garcia H. Aromatum* l. 1. c. 4. est procera & vasta. Rami frequentes, pulcherrimo ordine digesti, in aerem efferuntur. Caudex crassus: materies prædura. Cortex Guajaco similis, sed venosus, rugosus, ad cineraceum inclinans, substantia compacta, colore intus Canelæ. Folia Citri similia, sed minora, nec tam late virentia, sed parte adversa candicantia. Quæ in majoribus ramis nascuntur, ad salicis folia magis

Arbores
lacrymi-
feræ re-
centio-
rum.

Cordus H.
P. l. 4. c. 87.
Scalig. Ex-
erc. 174.

magis accedunt, latiora tamen & mi-
nus longa. Cordus late Terebintho
aut Lauro similia & æqualia facit,
quæ nonnunquam panibus immixta,
una cum lacryma adferuntur. Sca-
liger ex Johannis Valadæ descriptio-
ne Amygdali facie facit, folio longio-
re, furculo molli, lento striato, qua-
lis foliis palmæ arefactis, & qui com-
pressus, lenti succi, quale Benjuinum,
emittat. Fert *siliquas* compressas,
oleo plenas, non semine, ex quo gum-
mi istud conficitur. Provenit in Ori-
entali India copiosissime in Baros &
Speriamen insulæ Sumatræ. Diver-
sa ab hac ei, quæ in Java, prodit fa-
cies, ubi etiam optimum Benjoin
colligitur. Coalescit ex pluribus sar-
mentis Sarfaparillæ instar, nisi quod
hæc brachii crassitudinem aliquando
superent, ita, (*verba sunt Bontii*) ut
hæc in medio, sæpe truncus arboris
continuus satis crassus adpareat, sub-
tus vero ac supra cœlum per sarmen-
ta a se invicem diffita, liceat contem-
plari. Sæpe & alia virgulta specie
diversa hac coalitione includuntur.

Bontius Me-
dic. Indor.
c. 5. p. 11.

Marcgr. H.
P. B. l. 3. c. 4.
De Laet
Ind. occid.
l. 5. c. 2.

II. *Huitzilxochitl Cuernavacæ* di-
citur & *Anetl inan* arbor mediocris,
& illi, quæ Liquidambar profert, si-
milis. *Truncus*, qui lævis & rectus
exterius viret, interius candescit: *fron-
des* serrati & acuti: *flosculi* pallidi ad
oram flavescentes, sapore & odore
Anethi. Exsudat *resinam* odorife-
ram. *Nascitur* e ramulis terræ in-
ditis Cuernavacæ locis calidioribus.
Calida est & sicca in tertio. Folia
emplastri modo imposita pellunt fe-
brium rigores. Corticum decoctum
provocat urinam, sanat quartanam,
moveret menses, dissolvit tumores,
vapor curat morsus scorpionum, Pa-
rum ab *Icicariba* distat.

Marcgr. H.
P. B. l. 3. c. 17.
De Laet
l. c.

III. *Tlakuililocan Ximenis*, id est
Arbor insana, truncus lævis, ruber,
splendens & odoriferus. *folia* oleæ in
crucem disposita. Eliquat *resinam*,
quam Carannam vocamus, de qua in-
ferius. Pulvis trunci & corticis deco-
ctus status discutit, prodestque ven-
triculo frigidiori, & uterinis adfe-
ctionibus. Cortex in aqua macera-
tus roborat cor.

IV. *Icicariba Brasiliensium* ad mo-
dum fagi crescit, *caudex* haud ita
crassus. Cortex glaber & gryseus.
folia instar pergameni crassa, pyri si-
milis, acuminata, late viridia. *flores*
verticillatim congestis ex quatuor fo-
liolis viridibus stellulæ figura, quæ in
ambitu lineola alba coronatur, cum
staminulis flavescentibus in medio.
Fructus forma & magnitudine olivæ.
Cortex incisus fundit plenilunio in-
primis resinam anethi contusi odore,
mannæ consistentia, ex viridi pallide
flavescentem. Lusitani *Almecegam*
vocant. Emplastro stomachali ve-
hementer inservit, & vulnera capitis
etiam gravissima sanat.

Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 7.
Marcgr. H.
P. B. l. 3.
c. 4.

V. *Caopia Lusitanis Pao de Lacra*, Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 9.
arbuscula e quovis terræ genere pro-
germinat. *lignum* est lentum, *cortex*
e cinereo rufescens. *folia* non solida,
inferiori parte ex viridi quasi rufe-
scentia & aspera, superne dilute vi-
ridia & splendentia, in extremitati-
bus ramorum, qui flores sustinent,
duo acuminata brunni coloris, com-
pinguntur invicem, & venabulum
referunt, decerpta ex pediculo hu-
morem croceum emittunt. *Florum*
rudimenta globuli brunni, magnitu-
dine lentis, qui successu temporis flo-
res *πενταφύλλας*, exterius ex viridi
flavescentes, intus tomento vestitos
protrudunt. *Baccæ*, quæ virides,
magnitudine cerasi, rotundæ, disse-
ctæ ex cortice molli, succum elegan-
ter flavum exsudent, & mensibus
Januario & Februario maturescunt.
Intra corticem pulpa alba ex meris
cylindris, inter se coherentibus sta-
bulatur. Cortex arboris quando flo-
rere incipit incisus *lacrymam* ex cro-
ceo rubram fundit, quæ primo mol-
lis, post coagulatur, & gummi Got-
te similis est. Purgat drachm. j. si
per noctem in aqua soluta, impetigo
solvitur.

VI. *Arbor Liquidambar*, Mexicanis De Laet
Xochiocotzolquaxibuitl, alii *Ocosotl* vo-
cant, arbor est admodum vasta. *Cor-
tex* trunci & ramorum partim viridis,
partim rubicundus. *Folia* laricis vel
aceris foliis similia, duobus sinibus in
tres

De Laet
Ind. occid.
l. 5. c. 2.
Recessus R.
M. N. H.
l. 3. c. 18.

res angulos divisa, una parte candi-
cantia, altera obscure virentia & ob-
scure ferrata. *Fructus* rotundus qui-
dem, sed is instar poligoni multas su-
perficies nigras angulosque luteos ha-
bet. Fundit resinam liquidambar
dictam: nec non oleum, quod qui-
dam pro storace liquida adhibent, qui-
dam ex resina soli exposita aut prelo
expressa stillare prodiderunt. *Pro-*
venit campestribus calidisque locis.
Habetur & in temperatis, velut Ho-
cyacocotla, Quahuchinaci, & Xio-
tepece. Calida & sicca est, odore-
que jucundo. Pampini & summita-
tes in fasciculos collecti, odoris gra-
tia vestibis & stragulis inferuntur.

Bauhin. H.
P. l. 9. c. 48.
P. 329.

VII. *Tocotguebit*, id est, *lignum*
desiderii, populo est similis arbor,
materie candida, splendida, leni, quæ
vel ideo ad idola fabricanda summe
expetitur. Producit sub cortice gum-
mi thuri nostro simile, sed candidio-
ribus & minoribus fragmentis.

De Laet
Ind. occid.
l. 17. c. 28.

VIII. De *Arbore resinifera Tab-*
scensi ita de Laetius. Nascitur hic
Arbor mirabilis, quæ copiosam ad-
modum *resinam* fundit vel leviter
vulnerata, crocei coloris; a ramis hu-
jus arboris descendunt certa filamen-
ta, quæ postquam terram attigerint,
radices agunt, & ramos veluti su-
stentant: *folia* habet lata, ante obtru-
sa & crassa lanugine tecta; *fructum*
fert pene instar capitelli papaveris,
qui licet & ipse resina sive gummi
scateat, a psittacis tamen avide man-
ducatur.

Marcgr. H.
P. B. l. 3. c. 7.

IX. *Gonandina Brasiliensium* ita a
Marcgravio describitur. Alta &
procera est arbor, sorbo aucupariæ
ex parte similis, cortice cinereo, cau-
dice in multos ramos disperso. *Li-*
gnum illius incisum fundit de se lu-
teum *succum*, qui sponte effluit ac
postea indurescit, ita ut instar picis
sit fragilis, nullius odoris nec usus,
quod sciam, apud Incolas. Et quia
hæc arbor ripas amnium amat, radi-
ces habet multas, varie extra ripas
super aquas contorte expansas. *Fo-*
lia habet sibi invicem opposita, an-

gusta, acuminata, solida, lævia, vi-
ridia, splendentia: *Flores* fert multos
umbellatim, qui ita proveniunt: pri-
mo elegantissimi miniati coloris, in
singulis pediculis saturate rubentibus,
semidigitum aut plus longis enascun-
tur septemdecim, octodecim, viginti
juxta se in una umbella, rudimenta
floris constantia ex foliolis complica-
tis, ovalis fere figuræ, & magnitudi-
ne pruni sylvestris, eleganter quin-
que lineis obscure rubescentibus se-
cundum longitudinem quasi distin-
cti; hæc paulo post se paudent in flo-
rem quinquefolium elegantissime ru-
brum, constantem quinquefoliis ca-
vis seu semilunaribus, exterius cur-
vatis: in medio exstat stamen satura-
te rubrum, figura plane ut Caryo-
phyllus aromaticus, cui superius ad-
huc quinquangularis stellula rubra
imposita cernitur.

X. *Arbor Tecomahaca* magna est. ^{Reccus R.}
Folia obrotunda, mediocria, & fer- ^{M. N. H.}
rata. ^{l. 3. c. 16.} Linschottanus longa angusta-
que dixit. *Fructus* in postremis ra-
morum flagellis parvus, obrotundus,
fulvus, semine nucleo Persici haud ab-
simili, pruni magnitudine. Fert in-
cisa, vel sponte resinam haud igno-
tam. Ipsa calida & sicca ordine ter-
tio, cum quadam adstrictione acris &
odorata.

XI. *Holquakuntl* seu *Arboris Chil-* ^{Reccus R.}
li duo sunt genera. I. *Alteri* stipes ^{M. N. H.}
magnus, levis, fulvus, cui lenta me- ^{l. 3. c. 10.}
dulla: *folia* maxima, flores candican-
tes. Orbiculi stellati ex pallido ru-
bescentes, stipiti adhærent, & fructu
nucibus ponticis pari, candente lu-
teaque membrana vestito, saporis
amari, turgescunt. Provenit Me-
catlani & Yhualapæ. II. *Alteri* fo-
lia sunt Mali medicæ, sed tamen ma-
jora. Nascitur apud Mehoacanen-
ses, vocaturque Tarantegua. Fun-
dit utraque secta gummi *Holli* di-
ctum. *Cortex* calidus & siccus est in
tertio, & amarus, ejusque decoctum
dysenteriiis mederi, si infundatur, di-
citur. *Folia* sicca & levigata pu-
tantur leones & alia animalia interfi-
cere.

Arbores
lacrymi-
feræ Re-
centio-
rum.
Reccus l. c.
c. 19.

XII. *Yztacquahxiotl* seu *Arbor Galliopifera* duplex est. Una foliis obrotundis, stipitibus & pediculis rubentibus. Altera quæ indis *Tlatlabuic quauhxiotl gummi* rubescens habet. folio in uno ramo septem, eo ordine quo in Lentisco, Aurantii magnitudine. Baccæ rubræ ipsi trunco adnascuntur, adnascuntur, & magnitudine pisum æquant.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 20.

XIII. *Copaltic Texaxacuacensium*, arbor est levis, cortice seu cuticula superne vestita, quæ suapte natura desquamatur, unde nomen. Folia sunt Ocymi, fructus Oxyacanthæ paulo major, primo viridis, tandem coccineus. Resinam fundit modicam, candidam, & paulisper odorem. Nasctur in Texaxahuaci montosis & calidis, suntque qui Ytac Quauhxiotl vocant. Cortex calidus est ordine secundo, odoris & saporis grati. De gummi alibi agetur.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 21.

XIV. *Arbor laccifera Huatepecensium*, Americanis *Tzinacancuitla quahuil*, est incondita & mediocris magnitudinis. Folia, quæ ex utraque parte ramorum serie quadam procedunt & pennas avium imitantur, sunt brevia & tenuia. Acosta & Garzias foliis pruni similia facit. Stipites & rami purpurei gumi stillante, obteguntur, & eisdem veluti tubuli quidam adhærescunt. Nasctur in calidis Huatepecensium & Huahnahuacensium.

Piso de fa-
cult. simpl.
medicam.
l. 1. c. 8.

XV. *Jetaiba* arbor est speciosa & spissa. Lignum durum, album; cortex lentus, punctulis ex albo flavescens variegatus, & hinc inde clypeiformibus maculis, ex albo subflavescens. In ramis, inquit Cl. Piso, continet folia directe opposita, figura parva, sed oblonga, viridia, ad tactum lævia, nervo secundum longitudinem & venulis transversis,

eleganter inferius conspicuis, prædicta. Fabas producit magnas, miniati coloris, quibus farina alba edulis, juxta tria lapidea grana, digitalis longitudinis continetur: e quibus vi fractis prodeunt nuclei molles, oblongi & miniato colore nigrescentes, admodum odoriferi, optimique saporis, amygdalis Europæis minime inferiores. Ex arbore stillat resina, quam Lusitani, *Anime*, vulgo *Canime*, Brasiliiani *Jetaicica* vocant. Provenit in Paraybæ nemoribus. Folia contusa lumbricos enecant, si exhibeantur. Corticis interior substantia ventriculi ventositates pellit, & alvum movet, si aqua in qua rasa macerata erat, propinetur. Fructu animalia & peregrinantes sæpe sustentantur.

XVI. *Arbores lactiferæ Cumanæ* De Laet Ind. occid. l. 18. c. 4. quædam lacteum quendam liquorem fundunt, qui durus instar gummi evadit, & suavem odorem de se fundit: quædam alium instar lactis coagulati, qui in cibis sine noxa usurpatur.

XVII. *Ambaigtinga* arbor est pinis altior, & cupressorum modo recta: in cujus Cacumine vesiculæ quædam magnæ & parvæ enascuntur, quibus disruptis liquor quidam mirabilis destillat, quæ Monardi resina abiegna dicitur. Colligitur ab Indis summo studio, sed tanto cum labore, ut multi intra plures dies vix aliquid colligant. Provenit in Brasilia inter pinorum lucos. Folia contra stomachi imbecillitatem, & inde ortos vomitus commendantur, inuncto inprimis exterius oleo.

XVIII. *Arbor sinus S. Augustini*, Purchaf. navig. T. 1. p. 277. succo pinguißimo turgida. Materies est succosa, ideo facillime viridis ignem concipit, rami & folia flavum humorem fundunt.

De Arboribus gummiferis Novæ Hispaniæ, Copal dictis.

Vid. TAB. LXXXVIII. Suetum Novæ Hispaniæ incolis omne resinarum & gummatum genus *Copal*, arbores, ex quibus stillat *Copal quahuatl*, vocare. Octo autem talium ibidem inveniuntur genera, nempe 1. *Copal quahuatl*. 2. *Copalli quahuatl patlahoac*. 3. *Copalli quauhxiatl*. 4. *Copalli Totopecense*. 5. *Tecopalli quahuatl*. 6. *Cuitlacopalli*. 7. *Tecopal quahuatl pitzahuac*. 8. *Mizqui xochi copalli*, & 9. *Xochicopalli*.

Reccus R. M. N. H. l. 3. c. 1. De Laet Ind. occid. l. 5. c. 2. I. *Copal quahuatl* arbor est procerā, foliis quernis forma & magnitudine similibus. fructu obrotundo purpurascēte, sapore *gummi* candidi & transparentis, quod ab eodem vel sponne fluit, vel scarificatione elicitur. Nascitur in calidis Quahuacensium, & Mechoacanensium planis montosisque, sed humectis locis. Cortex stipitum anethum olet, & adstringentis facultatis esse sentitur.

Reccus l. c. c. 2. II. *Copal quahuatl Patlahoac*, seu *Copalli latifolium*, arbor est mediocris magnitudinis & incondita. Ramis rubent. folia alata, ferrata, Rhoi obsoniorum colore & magnitudine perquam similia, ex compressis in latitudinem virgis oriuntur. *Gummi*, quod exhibet, candidum est. Gaudet locis Quahuacensibus.

Reccus l. c. c. 3. De Laet Ind. occid. l. 5. c. 2. III. *Copal quauhxiatl*, seu arbor leprosa Copalifera, excelsa est, levis, & quæ facile membranā externā exuat. Folia, parva, oblonga, rutacea, sed maiora & longiora. Fructus acinosus racematim dependet. Stillat liquorem resinofum Copali colore & odore similem, sed paucum. Nascitur montosis & asperis apud Texaxahuacenses. Calida est & sicca ordine tertio, adstringens, odoris eximii. Liqueur ex aqua dilutus & Copali admixtus, sistit diarrhœas.

Reccus l. 3. c. 4. IV. *Copal Totopecense*, est arbor magna, foliis mali Medicæ virore tin-

dis exsaturato. *Gummi* stillat Copali persimile, quod in assulas candicantes cogi, & in usibus recondi solet.

V. *Tecopalli quahuatl*, seu *Copal montensis*, mediocris est magnitudinis, foliis fraxini vel unedonis, fructu glandibus simili, strobilino, lubrica & resinosa quadam saliva operto, qui nucleum candidum intra se gerit. Emittere *gummi* Thuri antiquorum simile. Provenit apud Papalotitpacenses, nec non in Philippinis intulis, & quidem copiose.

VI. *Cuitlacopalli* seu *copalis stercus*, Reccus l. 3. c. 6. quod truncus lepra infectus videatur, mediocris etiam est magnitudinis. Folia obrotunda, parva, situ & magnitudine, foliis filiquæ Ceratonix similia. Acini racematim dependent, Oxyacanthæ similes, valde odorati & glutinosi. Crescit apud Yauhtopenses.

VII. *Tecopal quahuatl pitzahuac*, De Laet l. c. id est, arbor subtilibus frondibus, est mediæ magnitudinis, foliis ordine digestis ad alterum ramorum latus, rutæ maioribus, fructu minuto, rubicundo, figura piperi rotundo simili, qui ordine ad singulos ramos digeritur. Fundit speciem thuris, quæ paulo nigrior.

VIII. *Mizqui xochi copalli*, seu *Xochi copal quahuatl*, arbor grandis, foliis aurantiæ mali, trunco notis candidis variegato, floribus exiguis & rubicundis. Exsudat resinā coloris ignei, Animen dictam.

IX. *Xochi copalli*, id est, *Copal floridum*, & *Xarapisca*, arbor modica, foliis menthæ Saracenicæ, quæ terna conjunctim ramis hærent. Truncus valde odoratus est. Exsudat liquorem coloris leonini, qui limones exacte redolet. Dictum de ea, ni fallor, superius.

Cedrus
Conifera.

TITVLVS II.

De Arboribus Lacrymiferis.

CAPVT I.

De Arboribus Coniferis Classis prima.

ARTICVLVS I.

De Cedro Conifera.

Vid.

TABVLA

LXXXIX.

Theophr.

H. P. l. 4.

c. 6. & l. 5.

c. 5. & 9.

Dioscor. M.

M. l. 1.

c. 105. Vi-

truv. Ar-

chet. l. 2.

c. 9.

Plin. H. N.

l. 13. c. 5.

Plin. H. N.

l. 16. c. 40.

Duæ sunt Arborum Coniferarum Classes, quarum prima, 1. *Cedrus Conifera*. 2. *Pinus*. 3. *Larix*. 4. *Abies* & *Picea* continentur.

1. *Cedrus Conifera*, si *Veterum* descriptionem sequamur, arbor est magna, & prodente scriptura altissima. Radices sunt raræ & ἐπιπολάσιαι. Truncus aliquando tam crassus, ut trium hominum ulnis (male quidam legunt τέτταρες) non capiatur, vena detecta humorem natura emittit, ut omnium, quibus oleosus est humor. Fructus ὡς περ κωνιάριος, sic ex Cantacuzeni Codice lege (pessime in Dioscoride ὡς περ ἀγρευδός &c.) sed multo grandior. Errat Serapio, qui μικρότερον pro μακρότερον legit. Dat *picem*, quæ *Cedria* dicitur. Nascitur in Syria, in montibus, Cypro & Ægypto, monte Libano, valle Sittim, Judæa denique ipsa. Usus ligni in structuris. In Syria & Ægypto reges inopia abietis ad classes feruntur usi: maximaque in Cypro traditur, ad undecirem Demetrii succisa, centum triginta pedum, (Theophrastus τρεῖς καὶ δέκα ὀργύων ponit) crassitudinis ad trium hominum complexum; quod tamen apud Theophrastum non legitur. Ex eadem altissima Ninivitarum, Davidis, Salomonis, Jehojakimi, Nebucadnezaris &c. domus: arca fœderis, mala navium Tyri; & capsæ, quibus mercatores in nundinis Tyri negotiabantur, vel merces suas involvebant: templi Dianæ Ephesinæ trabes: & Deorum statuarum. Cedrealis Diana apud Orchomenios, cujus simulacrum in ingenti cedro erectum. Cedrinus Romæ in delubro Apollo Sosianus Seleucia ad-

vectus. Scilicet. Non sentit cariem vetustatemque, nec sponte rimam fissuramque concipit: ut vere Plinius dixerit, Materiæ ipsi æternitas. Adhibebatur & in purgatione a lepra sanati: projiciebaturque in vacca rufæ immolatæ rogum. *Cedria*, quæ Plin. H. N. optima, si crassa, perlucida, gravis^{l. 13. c. 5.} odoris, & guttatim, dum effunditur, non dissipata coit, dentium doloribus utilissima. Frangit enim eos, extrahit, & dolores sedat. Defuncta corpora incorrupta ævis servat, ventia corrumpit: mira differentia, cum vitam auferat spirantibus, defunctis pro vita est. Vestes quoque corrumpit, & animalia necat. Libri in arca Numæ reperti, P. Cornelio, L. F. Cethego, M. Beblio Q. F. Pamphilo Coss. ad quos a regno Numæ DXXXV anni colliguntur, & quidem e charta, Cedrati vel Cedria peruncti fuisse putantur. Curat eadem boum & hominum scabiem: contra ascarides per clysterem adfunditur: sed ulcera irritat, & phlegmonem concitat. Reliqua in Galeno & Hipp. vide. De differentiis nihil occurrit. In hortis pulciores amplioresque reperiuntur: & si non cæduntur, in ingentem molem suo in solo excrescunt.

II. *Cedrus Conifera* RECENTIORVM

Bauhino est *Cedrus conifera foliis laricis*, Matthiolo *major*, Anguilaræ *Hebræorum* & *sacrarum literarum*. Lobel. *Cedrus Libani* & *Palæstinae præcelsa*. Describemus eam Rhauwolfii, Bellonii & Bauhini verbis paulo exactius. Arbor ergo est perpetuo virens, robustis ramis brachiata, orgyias aliquot crassa, ad sum-

mam

Ezech. 27.
v. 24.Plin. H. N.
l. 13. c. 5.Plin. H. N.
l. 13. c. 13.Galen.
simpl. l. 7.Theophr.
H. P. l. 5. c. 9.Bellon. ob-
serv.Bauh. H. P.
l. 9. c. 15.
Rauwolf.
itinerar.

Matthiol.
ad Dioscor.
p. 122.

mam Abietum nostrarum proceritatem adfurgens, quanto autem majores accreverint rami, quorum pondere gravatus caudex se inclinat, tantum de arboris rectitudine decedit: *Rami* (ut & coni magni, rotundi) sursum spectant, longi, tam pulcro ordine dispositi, ac si artificis manus resectos æquatosque adposuisset: sic ut eminus etiam circinatus æqualiter dispositorum orbis egregie adpareat. *Truncos* vix sex aut septem homines interdum amplectuntur. *Lignum* in assamenta formatum, colore est undiquaque rufo, pectinibus rectis fissile, solidum quidem, sed media inter fibras spatia inania, ut lignum quernum ostendens. *Folia* parva, angusta, conferta, in exerto fulcello fusco, clavis Musci terrestris longitudine & crassitie simili: quæ, ut ait Bellonius, ab uno surculo exorsa quadraginta vel quinquaginta simul, serie quadam in ordinem disposita, surculum radiantia, pictoris penicillum referre videntur, odorata, subacida, & cum levi amaritudine adstringentia. *Conos* in cælum tendentes mittit, qui quidem abiegnis similes, crassiores, duriores, ac multo majores, quinum, vel senum digitorum turbinati, compactili squammarum compressarum congerie coagmentati, atque obtusi, ex cinereo fulvi, conis Pini alioqui graciliores, tam firmiter ramo adhærentes, ut a parente divelli non possint, nisi avulsa arboris parte: Coni porro hiantes se pandunt, ac paulatim diffissi roribus & pluviis decidunt, relicto in ramo pediculo firmo & tereti. Idem Bauhino sunt quatuor pollicibus altiores, octonos in ambitu circa basin colligunt, paulatim in obtusum turbinem fastigiati, squammis compacti fescunciam circiter latis, unciam altis, mediocriter crassis, rufis, per extrema exstantia planis, alia alius sinum ita subeunte, ut quot sunt earum circumcirca agmina, totidem zonis præcincti videantur: inferior autem uniuscujusque ex his squammis pars Lamboides mucrone suo hastæ adnascitur, jugo elato medium percurrente, in valles laterales declivi, totidem confimilibus

ex adverso valleculis respondentibus, Cedrus quæ toridem respiciunt nuculas, pomaceis aut pyraceis granis duplo triplove majores, forma non absimili, rutilante quadam resina, dura, sed fragili, vehementer odorata, evidenter acri, farctas, quarum unicuique uncialis triquetra tenuisque membrana adfigitur, papilionis alam egregie referens, ita quidem, ut duæ membranae, uni squammæ majori, averso incubitu, respondeant. Cæterum pediculus coni validus existit, uncialis & sextantalibus longitudinis, crassitudine fere extremi articuli digiti minimi, obliquus, aut incurvus, cortice rugoso, & squammulis exiguis (ut in Pino & Pinastro) subinde lorica-tus. Squammam non prius exuit, quam duos annos excesserit, quem integrum annum fert, antequam mature-scat, quod hyeme potissimum fieri solet. *Semen* habet Abieti simile, non vinaceo majus, dulcis saporis, ad cujus latus oleosum quidpiam & odoratissimum includitur. Duas profert *resinas*, quemadmodum & Abies, alteram in tuberculis albam, nihil prorsus amarulentam, nec gravis odoris: alteram suâ sponte exsudan-tem, quæ cum retorrída sit, naribus admota, Fraga redolet, odorataque gustatu percipitur, sed ita pertinaciter dentibus inhæret, ut nonnisi cum difficultate auferatur. *Crescit* in monte Libano præcipue. Bellonius viginti octo vidit: Rhauwolfius viginti quatuor. Melchior Lussy, neminem quamvis paucæ, numerare exacte posse, tradit. Visa quoque in Amano & Tauro montibus: nec desunt, qui supra Nicæam nasci credunt. In Creta provenire, nemo ex recentioribus prodidit. In regno Congi-tano magna Cedrorum copia, & magnitudo tanta, ut inde naves: in insula Tercera tam frequentes, ut scaphæ, currus, rheda, & hujus generis alia: quod & de Cuba sumendum est. De differentiis & generibus nihil occurrit singulare. I. In Nova Hispania & provincia Verapoz alia est alba; alia rosea & fragrans. II. In regno Granatensi sunt sylvestres, incolis Cariuri, materie dura & co-

Ind. Orient.
p. 1. l. 2. c. 1.
De Laet
Ind. occid.
l. 1. c. 11.
De Laet
Ind. occid.
l. 7. c. 7.
De Laet
Ind. occid.
l. 9. c. 4.
De Laet
Ind. occid.
l. 18. c. 4.

Cedrus acta, ramis multis & patulis. III. In gratum amarorem contrahit. IV. Sunt
 Conifera. Cumana est Cedris adfinis beneolens & in Huiquano provincia Sinenfi Ce-
 Atlas Sinen- arbor, ex qua naves & alia fabrilis. dri, de quibus Atlantem vide.
 sis p. 84. Panis si arcis ex illa includatur, in-

ARTICVLVS II.

De Peuce seu Pinu.

Peuce seu
 Pinus.

I.

Vid. TAB.
 LXXXIIX.

Πεύκην pinum esse, in Catalogo ar-
 borum philologico ostendimus;
 nihil Criticos quosdam morati, qui
 πίτην, pinum dixere. Vulgo nota

Dioscor. M. Dioscoridi arbor, Theophrasto pro-
 M. l. 1. c. 86. cera, sed picea humilior. Radix præ-
 Plin. H. N. grandis una, quæ mediocri in terram
 l. 16. c. 10. descensu, parvas complures promit,
 Theophr. sed quæ nullam protinus sobolem fer-
 H. P. l. 1. c. 8. re possunt. Ideo flatu aliquando ra-
 9. 15. 16. dicitur evertitur arbor. Caudex lon-
 19. 28. gus, nodosus, difficulter solubilis,
 Theophr. picea crassior, lævior & excelsior,
 l. 2. c. 2. l. 3. cui medulla carnosa, & quidem ma-
 c. 1. 2. 8. 10. gis quam aliis δια τὸ ἐνδαδὸς εἶναι, suc-
 l. 4. c. 6. l. 5. cus pinguis & resinofus. Rami plu-
 c. 16. 7. 8. res, spissi, κρατῶδεις, δαδῶδεις, colore
 l. 9. c. 1. flavo. Folia rara, capillata, σπανό-
 Theophr. φυλλα, λιπαρά, βαθέα, (δασέα forte)
 H. P. l. 5. c. 1. κεκλιμένα, extremitate pungentia, &
 perpetui viroris. Plinius capilla-
 menti modo prætenue, longum &
 mucrone aculeatum dixit. Florere
 quidam existimant, alii non, locoque
 floris προαπίπτοντα κύτταρον. Fructus
 κέρυον, conus, strobilus, picea major,
 in quo semen, quod conis adhuc pen-
 dentibus ἐκπεδᾷ, habeturque inter fe-
 rotinas. Nulla tamen arborum avi-
 dius se promittit. Habet enim fru-
 ctum maturescentem, habet proximo
 anno ad maturitatem venturum,
 ac deinde tertio. Quo mense ex ea
 nux decerpitur, eodem maturescit
 alia: & sic dispensatur, ut nullo non
 mense maturescant. Quæ se in ar-
 bore ipsa divisere, Zamia vocantur:
 læduntque cæteras, nisi detrahantur.
 Fert picem copiosam bonique odoris.
 Theophr. De Natura illius est quindecim die-
 H. P. l. 3. c. 6. bus post Vergilias germinare, inter-
 mittere, ter turgere, ternaque ger-
 mina edere: ideo τρεῖς λιπὼν seu arbo-
 rem, quæ terna & tripartita germi-
 natione genitali succo turgescit, dicit.

Prima germinatio, ἱσαμένῃ τῇ θαργελιῶν accidit: quanquam in Ida monte die decimo quinto ejusdem, seu cum Sol primum Tauri signum ingressus est. Altera intermissis triginta vel pluribus diebus accidit. Prodeunt alia germina a summo vertice super germen, quod prius emissum est, (hoc est ἐπιβάλλειν ἄλλης βλαστῆς, non ut Gaza vertit) quædam sursum εἰς πλαγίᾳ, quædam κύκλῳ emittuntur, veluti geniculo facta primi germinis ad capitatæ virgæ modum, (id κορόνη est) idque Sole geminos exeunte. Tertia diebus quindecim circiter intermissis ἐκατον-βασιῶν seu Sole existente in Cancro obvenit, & sex aut septem diebus ad summum absolvitur: quibus peractis, εἰς πᾶχος ἡ αὐξήσις τρέπεται. Plinius quomodo reddat, in abiete dicam. De cætero scito, ex solo semine nasci: auctu propter siccitatem & densitatem, difficilem; nisi imbecillitatem prætere malis: pari sub se satas, myrtum, laurum, & hujusmodi alias, nec vel umbra nocere: cædi debere, cum germinare incipit. Τελείως eadem ἐκ 23.

ρίζων αὐτοετῆς εὐαίνεται cacumine deciso; medulla tota detracta moritur; adustis radicibus nunquam regerminat: αὐτομάτως vero ægritudinem contrahit, quando caudex in tædam faceffit, quod non nisi viginti ætateque majori accidit. Sic enim ubertate largissima strangulatur. Prodit in προσήλοις: sed & frigidis & montosis, quod caloris interni indicium. In Syria multa; in Latino agro præstans; in Corsica telluris cœlique virtute longe egregia & frequens. Ingressi insulam oppidi condendi causa Romani, cum tam vastis arboribus refertam reperirent, condendi intermiscere consilium. Tantum vero ex brevi

Plin. H. N.
 l. 16. c. 26.

Theophr.
 H. P. l. 3. c. 6.

Plin. H. N.
 l. 16. c. 15.
 Theophr.
 H. P. l. 2. c. 2.
 & l. 3. c. 1.
 Theophr.
 C. P. l. 9. c. 1.
 & l. 3. c. 15.
 Theophr.
 H. P. l. 2. c. 8.
 l. 5. c. 15. &
 23.

Theophr.
 H. P. l. 4. c. 6.
 Theophr.
 C. P. l. 1. c. 26.

brevi loco casum materiæ, ut ratem quinquaginta velis ducendam conderent. *Ufus* olim apud *Veteres* in *Medicina*. *Nuces*, quæ calidæ & siccæ in secundo, integræ & recentes confractæ & in passio decoctæ veteri tussi & tabitudini conferunt, si quotidie terni cyathi ex eo bibantur. Aqua faciei rugas delet. *Lignum* ædificiis & navibus commodum, laxitatis & meatuum rectitudinis causa, nec non quod *ἀσπής*. Ponderi cedit, quia nunquam rumpitur: nec findi ullo pacto adfirmant, si glutine muniantur. Cum quercu frustra glutinare pergas, quia altera spissa, altera minus. Carbones quernis infirmiores. Ad flatus respondent commodius, minusque marcescunt & extinguuntur. Fiunt ex ea scandulæ regendis ædificiis.

II. Differentiæ arborem lignum & fructum spectant. 1. *Arbor* alia est *Urbana*, alia *sylvestris* apud Theophrastum & iisdem adfinis. 1. *Pini urbanæ* quædam species perpetuo viret: quædam foliis est deciduis. 2. *Sylvestris* est triplex apud Macedonas. 1. *Fœmina*, quæ & *Idæa* rectior & procerior; *materies* crassior, & operi, quia flectitur, paratior; rami plures; *folia* pinguiora, molliora, & quæ tanquam flaccida ad terram inclinant; *nux* oblongior, viridis, nec tam cito dehiscens; *pix* copiosior. *Gignit* id, quod *Ægidem* & *Cor* ejus adpellant, eo quod minus *ἐυκότερα* unguinosa, minusque *ἐνδαδος*, lævior & *ἐυκτιδονώτερα* (male *ἐυκτιανώτερα*) cursuque venarum & pectine elegantior est. 2. *Mas*, *Maritima* *παράλια* quibusdam, brevior est. *Lignum* *ἰχυρότερον περιμήτριον*, durum, colore nigrius, securi brevius, & in opere fabili *σφερόμενον* contortum. *Cortex* lævior, utilisque ad coria. *Folium* durius. *Nux* rotunda, & cito *διαχάσκων*. Huic quoque id magis inest, quod pinis subnascitur, colore tæda rubidius, odoris gravissimi, nec tædam redolens, nec flagrans, sed ab igne resiliens. 3. De sterili nihil occurrit. *Arcades* nec sterilem nec *Urbanam* adpellant, sed pinum cum picea perperam, ut Theophrastus

ostendit, confundunt. Adde his, *Peuce seu Pinus*, *Pinastrum* nihil aliud esse, quam pinum sylvestrem mira altitudine, a medio ramosum, sicuti pinus in vertice; qui copiosorem dat resinam. *Gignitur* in planis.

II. De *adfini* ita Plinius. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiæ, quos *tibulos* vocant, plerique arbitrantur, sed graciles succinctioresque, & enodes, liburnicarum ad usus, pene sine resina. II. *Ligni* ratione est, 1. *Τετράζοος*, (sic lege, non *τετράζοος*) seu quadrifluvia. (Plinius videtur legisse *τετράροος*) cui ex altero medullæ latere contrariis ex partibus bini venarum cursus prodeunt: atque per utrumque cursum dolatio fit, contrarios inferens ictus utrique cursui, dum in utramque partem medullæ dolatio fit. Probatur vehementer ad opera, quia spissa est. 2. *Δίζοος* (male *διζυος*) bifluvia, quæ unam tantum in utramque medullæ partem *κτιδὼνα* gerit, & has *ἐναντίας ἀλλήλαις*, ita ut *πυλῆκισις* gemina fieri debeat, una *καθ' ἐκατέραν κτιδὼνα*, ictu contrario. Molle hujus lignum, & in opere pessimum, facileque contorquetur. 3. *Μονόζοος*, quæ unum *κτιδὼνα* habet, & ex utraque medullæ parte dolatur, laxioris materiæ & a contorsione liberæ. Sed hæc omnia cum abiete & aliis pino communia.

III. Quantum ad fructum. Nucum pinearum quatuor sunt genera apud Plinium. Grandissimus, *inquit*, fructus pineis nucibus, altissimeque suspensus, intus exiles nucleos lacunatis includit oris, vestitos alia ferruginis tunica, mira naturæ cura, molliter femina collocandi. Harum genus alterum Tarentinæ, digitis fragili putamine, aviumque furto in arbore. *Tertium* sapinæ e picea sativa, nucleorum cute verius quam putamine, adeo molli, ut simul mandatur. *Quartum* pityida vocant e pinastris, singularis remedii adversus tussim. In melle decoctos nucleos Taurini *aquicelos* vocant. Pineæ corona victores apud Isthmum coronabantur.

E c

II. Rē.

Dioscor. M.
M. l. c.Theophr.
H. P. l. 5. c. 7.
& 8.Theophr.
H. P. l. 3.
c. 10.Plin. H. N.
l. 16. c. 19.Theophr.
H. P. l. 5. c. 2.
Plin. H. N.
l. 16. c. 39.Plin. H. N.
l. 15. c. 30.

Peuce seu
Pinus.
Vid.
T A B.
LXXXIX.

Matthiol.
ad Dioscor.
l. 1. c. 74.
p. 97.
Bauhin. H.
p. 1. 9. c. 4.
p. 248.

II. RECENTIORIBVS est quæ
druplex pinus 1. *Sativa*. 2. *Sylve-*
stris. 3. *Maritima*. 4. *Pinaster*,
quorum omnium propter varietate
& adfinitatem obscura historia.

I. *Pinus sativa* Tabern. & Matth.
domestica, Camer. *Italica*, Lobel. *Vul-*
gatissima, aliis simpliciter *Pinus*, Bau-
hin. *Pinus officulis duris*, *foliis lon-*
gis dicitur. Arbor est procera. *Cau-*
dex scaber & subrubens. *Folia* ex
tuberculis in ramorum cortice ex-
stantibus enascuntur, hina fere circa
imum connata, mox ab invicem ab-
scedentia, quæ se mutuo spectant ca-
niculata. Junci marini æmula &
æqualia, duorum triumve palmo-
rum altitudine, mucrone acuto & ri-
gido: Coni magni, crassi, turbinati,
arctissimo squammarum contextu
compactiles, quarum crassa, lignosa,
lucida, capita exstantia, tuberculo-
rum agmine inæquales reddunt co-
nos: singulares squammæ unciam
latæ, duplo longiores, a capite resi-
nam albam odoratam subinde fun-
dentes, lineisque ex umbilico deve-
xis donatæ, paulatim hastam versus
attenuantur, crassæ, sinu suo com-
plexæ unam aut alteram Pityidem
oblongam, fere uncialem, torosam,
pulvisculo atro-purpureo respersam,
osse crasso duro, nucleo candido, pin-
gui, dulci, pellicula rutila obvoluto.
Matthiolus *florere* scribit, in sylvis
Bohemiæ, odorisque haud ingrati &
pinum referentis. Quod falso solo
latissime fructificat; excisa, nullam
ex virgis radicum sobolem emittit,
sed prorsus emoritur; quod exusta
in quercera mutantur, inter admi-
randa recense. *Crescit* in Italia pro-
pe Ravennam non longe ab Adria-
tici maris littore, in Belgio, Anglia,
Gallia, Polonia &c. In Germa-
nia non putatur sponte provenire.
At Tragus in altissimis ejusdem Al-
pibus prope Valesiam gigni prodi-
dit. In horto Montbelgardeni ex
semine natæ periere cito. *Seritur*
Octobri & Novembri calidis & sic-
cis; Februario vel Martio humectis.
Amat loca gracilia, maritima, saxo-
sa, inque his procerior exsurgit. *Usus*
nucleorum, qui temperati, in cibis,

si ex iis cum saccharo pineolatum
formetur: Contra tussim, phthisin &
alia in emulsione. Arantius in di-
stensione penis ex nimia venere, &
præcavendam hujus luem, nucum
decoctum familiare habuit.

II. *Pinus sylvestris montana*, est tri-
plex. 1. *Prima* nempe *Bauhini*, cui
similis est *Pinaster Austriacus major*
Clusii. 2. *Alter*a ejusdem. 3. *Ter-*
tia ejusdem. 4. *Quarta* Genevensis.
5. *Sylvestris tæda Bauhini*, & 6. *Syl-*
vestris Bellonii.

1. *Pinus sylvestris montana prima* Matthiol.
Lobel. & aliis *Pinaster*, Matthiolo pi-
nus sylvestris, Cordo sponte prove-
niens Gerh. in icone *sylvestris Mugo*,
Anguill. φιδότροιος, Lugd. *sylvestris*
fructifera, excelsior est cæteris, &
sativa fere similis. Coma tamen bre-
vior; *folia* rudiora & acutiora, in-
ter quæ subinde fructus rudimen-
tum, nuces minores. Sunt scil. cu-
pressinis paulo majores, longiores,
compactiores, & in acutum desinen-
tes, squammarum congerie per
omnia similes, resinosa, odorata, quæ
quamprimum maturuere, dehiscunt,
& ex arbore decidunt. *Habetur* in
omnibus Bohemiæ, Polonia, Silesiæ,
Lusatia, Borussia &c. sylvis; In agro
Tridentino, Ananienfibus & Flemen-
sibus montibus, reperitur, regioni-
bus omnibus septentrionalibus fre-
quens. Amat enim frigida & mon-
tosa; nec nivibus vel gelu terretur.
In *Brasilia* fructu sunt rotundior &
majore, sed cujus nuclei temperatio-
res nostris. *Pinaster Austriacus ma-*
ior Clusii crescit in Pannonicis & Au-
striacis montanis, fiuntque ex eo af-
feres, scandulæ & vinearum pali. Est
Albus & *Niger*, adeo inter se similes,
ut nonnisi a casoribus discernantur.
Est tamen *Albo* caudex erectior, cor-
tex lævior, conus major. *Nigro* cau-
dex crassior, & aliquando contortus,
sparsis in latum ramis. cortex sca-
brior, folia tenuiora, conus minor.

2. *Pinus sylvestris montana altera*, Matthiol.
Matth. Lobel. Tabern. *Pinus sylve-*
stris Mugo, Dodon. *Pinus sylvestris*
tertia

R. pempt. 8. tertia, Lugd. *Pinus tubulus*. Caudice est nullo, sed ramos a radice humotenus fundit, qui humi perpetuo decem quindecimve cubitorum spatium repunt. *Folia* ex tubulo prodeunt bina, tres digitos longa, una parte carinata, altera plana, quæ postquam cecidere, crebra tubercula post se relinquunt. *Fructus* prædictæ similis, sed paulo vegetior, resinofior, odoris non ingrati. Eminentia pulcræ sursum in eo vergunt, cum dorso eminenti, nullus intus qui mandipossit nucleus. hæret ramis, & facile divellitur. Ananienfes *Mugum* vocant, & ramis, quia longissimi, flexiles & tenaces ad vasa vinaria cingenda utuntur. Nascitur & in Burgundia, in montibus, quos Franche montagne vocant, diciturque *Crein*.

Dodon. l. c. 3. *Pinus sylvestris montana tertia*,
Matthiol. l. c. Brunf. *Tæda*, Matth. Tabern. Lobel.
Bauhin. H. P. l. 9. c. 4. p. 251. *Pinus Cembro*, Bellon. *Pinaster*, Dodon. *Pinus sylvestris altera*, Bauh. *Pinus*, cui officula fragili putamine, arbor est speciosa, etsi primæ proceritate cedat, nec cortice flavescat. *Materies* pulcra, odorata, & venarum serie blandiens. *Folia* frequentia, tenuia, acuminata & canaliculata. *Conus* piceæ crassitudine par, sed brevior, subpurpurascens, resinofus & maxime fragilis. *Nuces* domesticis longe minores, triquetra, turbinata, breves, fractu faciles: nucleus pusillus, dulcis albicans, subrufa membrana contextus, sapore domestici, nisi quod leviculam asperitatem post se relinquat. Forte pinus Tarentina Plinii. Fundit resinam tum albam, tum odoratam. *Provenit* in agro Tridentino, Rhetinorum montibus, Comitatu Tyrolensi prope Oenipontem; vocaturque ab incolis Cembro & Cirmulo. In monte Olympo quæ crescit, in vastitatem diffusa, in insignem altitudinem adsurgit. Ex materia tabulæ sunt ad extruenda ædificia. *Fructu* Rheti rustici vescuntur, & quatuor assibus Gallicis olim quadrantal vendebant. Galli Celtæ Alve vel Elvo vocant. *Valesii Ardtzopffen*.

4. *Pinus sylvestris Genevensis* pa-Peuce seu rum a sequente variat. *Conos* habet *Pinus* parvos, breves non turbinatos, sed rotundiores, brevi & fragili pediculo ramis adhærentes.

5. *Pinus sylvestris tæda Bauhini* *Burgundis Tæda* dicitur. Major est pino sylvestri montana secunda, crassior & vulgarior. *Folia* bina, sed latiora, albidiora. *Rami* non ita abundant foliis, sed disposita sunt per fasciculos. *Conos* ferebat mense Septembri ex pediculo fragili & tenui, longos, turbinatos, virides. *Squammis* in medio elevatis. Fit ex ea pice. *Provenit* in Burgundia circa montem du Pré loco Malsaigne dicto, nec non in Sundgovia locis variis. Crevit & Montbelgardi semine ex Hercynia sylva adlato. Ligni, nucum, conorum & tædæ *Usus* est. *Lignum* pulchrius politur, & elegantius adparet, si vernice obducat. *Nucum* recentium succus vulvam angustiore reddidit infusus, & mammas in virginibus extuberantes cohibet: quod & aqua facit. *Conorum* recentium decocto vesicæ & uteri ulcera sanantur. *Tæda* in aceto decocta dentium dolores sopit; emplastris addita anthracibus pestilentialibus commoda. Faces ex eadem, & fuligo ad atramenti librarii paraturam. Huic similis est *Pinus Basileensis*, quæ circa Basileam & in vicinis agris prodit. Mense Majo & Julio nucamentis parvis plurimis scater, supra quos in summitatum extremitate coni minimi purpurei, qui florum locum tenent, oriuntur. Summitates sunt acidæ, necessent ingrata, nisi resinositate sapor turbaretur. *Gesperus Piceastrum* vocabat.

6. *Pinos sylvestres Bellonii*, quas ille perperam piceas dixit, huc adjicere placuit, quia is quædam singularia de illis notavit. Sunt autem quinque. 1. *Planitiei*. 2. *Corcyrensis*. 3. *Dictæi montis*. 4. *Olympi montis*. 5. *Idæ Troadis*. 1. *Pinus sylvestris planitiei Bellonii*, in triviali illo itinere, quo Lugduno Lutetiam itur, in transitu colliculi Tarræ

Peuce seu raræ enasci, & circa montem sylve-
Pinus. scere conspicitur. Sola latatione eva-
riat. Ubi in arborem in plano extra
sylvas excrevit, *caudicem* fortitur con-
tortum, *corticem* rubrum, rimis hi-
ulcum, atque ubi consenuit fungo-
sum. Ubi in *ramos* diffunditur, si-
nuosi illi, liventes, & perpetua *fron-*
de vestiuntur. Nunquam procera
evadit, mediocris arboris altitudine
contenta. *Coma* in latum exspa-
tians: *materia* mollis, leviter rubens,
cariei obnoxia. *Rami* fragiles, qui
cum crepitu rumpuntur. Enascens
mox a radice brachiatur, cujus si
caudex paulo profundius vulneretur,
largam fundit resinam, per initia li-
quidam, transparentem ut Laricis.
Postremo albescit & dura redditur,
quæ si gustetur, subamara cum ju-
cunda quadam saporis gratia & aro-
matica sentitur. Nullus *flores* ferre
creditur, sed auctor julos, quos hie-
me profert, *florum* loco esse censet.
Coni rudimentum paulatim capeffens
incrementum compactili congerie nu-
camentorum turbinatur, tuncque pe-
diculum, quo arbori inharet, rectum
habet. Is autem postea augescens
reflectitur. 2. *Pinus sylvestris* Bel-
lonii *Corcyrensis* vastior ficu non at-
tollitur. *Radix* ei tanquam palus
humi recte defixa, lignosa, foris ni-
gra, gustu acerba. 3. *Pinus sylve-*
stris Bellonii *Diæti montis*, in vasti-
tatem & altitudinem diffunditur. *Ad-*
dultæ in vertices summos hinc inde
coma lætissima. *folia* perpetuo gema-
na, velut ab uno tubulo ad ima ad-
nexa, gracilia, oblonga & acuta. An-
niculæ scaber *truncus*, senescenti sca-
ber *cortex*. *Coni* impares & turbi-
nati, caudici infirmo pediculo adne-
ctuntur, quorum prima rudimenta
circa Martium, maturitas sequente
demum anno. Ex ræda Cretenses
picem & Cedriam conficiunt. 4. *Pi-*
nus sylvestris Bellonii *Olympi montis*,
in summo montis Olympi cacumine
provenit. Rectitudo abietis, *cortex*
glaber & subalbidus; *rami* serie qua-
dam in caudicis ambitu cruciformes,
ex eodem geniculo stellatim prode-
unt. *Folia* pauciora, gemina, mi-
nora. *Coni* exiles, nec juglande ma-

jores, qui facile decidunt. *Habetur*
in Gallogræcia circa Abonimeriam
& Conticum. Corticis in fagenis lo-
co tuberis usus. 5. *Pinus sylvestris*
Idæ Troadis in Martio breves julos
profert, ut corylus, quo tempore
coni a pinis Olympi montis decidunt.
Quia pediculus, quo coni hærent,
gracillimus, facile ventorum flatu
decutuntur. Prodit in Sciro Cycladum
una, & Illyrico. Ad Olympi
montis pedes observata ab eodem pi-
nus, cujus coni auricularis digiti ex-
tremiorem vix superabant.

III. *Pinus maritima* est duplex,
1. *major*, 2. *minor*.

1. *Pinus Maritima major* est du-
plex, *prima* & *altera*. 1. *Pinus ma-*
ritima major prima Lobel. *Pinus ma-*
ritima Theophrasti Ger. *Sylvestris*
montana, Bauh. *sylvestris maritima*,
conis firmiter ramis adhaerentibus. Li-
gnum habet materie alba, cui resina
sublutea, vehementis odoris. *Folia*
angusta, prælonga, raraque in capil-
lamenti modum protensa, squamosis
undique ramis, pilis sursum spectan-
tibus. *Coni* præ cæteris longiores,
crassiores, præduri, nucamentis in
acutum extuberantibus, in quibus
cassæ nuces. Deorsum nutare, qua-
tuor unciarum ambitu ad basin colli-
gere, nec multum extantibus squam-
mis compingi, addit Bauhinus. Pro-
venit in Italiæ maritimis, agro Pisa-
no, & Senensi; imo & Calabria. In
Florida etiam pinum cassis nucibus
reperias. Lobelio *Pinus maritima*
Theophrasti stipite, ramorum & fo-
liorum facie persimilis videtur pina-
stro montano, sed ramis glabris, cau-
dice nigrioribus. *Conus* phœniceus,
brevior & superne latior. Adfinis
huic, si non eadem *Pinastr*, II. *Hi-*
spanicus vel minor Hispanicus Clusii,
quem Lobel. *Pinum sylvestrem al-*
teram, Tabern. *Pinum montanum*
Theophrasti, Gerh. *Pinum mariti-*
mam majorem vocare videtur. Duo-
rum ei hominum altitudo, *caudex*
inflexus & contractus, plurimum-
que ab imo ramosus. *folia* superiori
similia, breviora & dilute virentia.
Coni minores, oblongi, angustiores
superne

Dodon.
Pemt. 6.
l. 5. c. 12.
Matthiol.
l. c.

Lobel. obs.
serv. p. 632.

Clus. H. P.
l. 1. c. 23.
Lobel. obs.
p. 632. Ad-
vers. p. 449.

superne, turbinati, candicantes, multum resinosi. Nuclei quales in majore, nigra membrana vestiti. Murciano & Valentino regno frequens est.

2. *Pinus maritima major altera*, Lobelio *Pinus Idaea Theophrasti*, Gerh. *sylvestris minor*. Cortex ei scaber: foliorum circa ramos foetura; majores, speciosiores, numerosioresque

Math. l. c.
Clus. H. P.
l. 1. c. 23,

coni. Matthiolus comosiores opacioresque prima facit, sed capillamentis brevioribus. Strobilos, addit, profert majores, longiores, duriores, ac pulciores, prominentibus undiquaque nucamentis, vacuis intus nucibus ac supervacuis. Nasceatur haud longe a mari, iisdem fere ut altera locis. Congener ei *Pinaster Hispanicus* L. seu *major Clusii*, qui in pini altitudinem excrescit, interdum etiam superat, a medio ramosus: folia habet Pini, oblonga, bina semper simul juncta, in viriditate nigricantia, acuminata & pungentia: strobilo paulo minore, quam Pini, alato inter squamas, quibus compactus est, nucleo, molli & nullo putamine incluso, sed tenui cortice duntaxat tecto. Caudex rectus, cortex levior & minus scaber, quam Pini. Plurimam Resinam fundit. Ab Austriaco majore ratione soli distat.

2. *Pinus maritima minor*, Clusio *Pinaster* III. vel *pumilio* alter, raro humanam altitudinem excedit. Rami lenti & obsequiosi, nec in latum diffusi. Cortex non adeo crassus rugosusque. Virgæ graciles, folia exilia, Laricis similia, sed nec mollia, nec decidua. Strobili exigui & graciles, nucleus pusillus, nigricans & ut reliquorum alatus. Non differt, si Lobelium sequimur, a *pinastro* humili Galloprovinciae & Narbonensis collibus ad Lapum montem oriundo. Adfinis huic *Pinastri* alterum genus parvum Cæsalpini in maritimis ortum, lævi cortice aut cinereo, nucem *pinastro* similem ferens, sed multo minorem; folia capillamenti modo tenuissima.

Lobel. ob.
serv. p. 633.

bus aut pallescentibus. 3. *Tenuifolius julo purpurascens.*

3. *Tenuifolius*. Peuce seu Pinus.

1. *Pinaster conis erectis*, est *Camer.* *Pinaster pumilio*, Clusio *Pinaster quartus Austriacus*, hominis altitudine. Rami statim a radice lenti, obsequentes, crassi, qui rugoso & denso cortice teguntur. Folia per singulas squammas bina semper ex eodem tubulo simul prodeunt, saturate virentia, quæ ramos ambiunt. Strobili unciales squammatim compacti, laricis haud majores, sed magis turbinati, pediculo retrorsum non inflexo. Nucleus alatus inter compactiles squammas hæret. Nasceatur in summis Austriæ & Styriæ Alpium superciliis, inter saxa & scopulos ut plurimum.

Clus. l. c.
p. 32.

2. *Pinaster latifolius julis virentibus aut pallescentibus*, est Clusio *pinaster secundus Austriacus*. Tenuia & oblonga eodem describente habet folia, pungentia, bina semper conjunctim ex eodem tubulo prodeuntia, & circa ramos in orbem quasi nascentia. Majo mense in extremis ramis quasi botros sive uvas quasdam fert tenuibus squammis obsitas, qui sponte aperientibus se squammis julos ostendunt virentes aut pallescentes, plenos tenui polline luteo, sive farina, quæ levis auræ adflatu dispergitur. Ex mediis deinde botris nova germina eodem mense prodeunt suis novellis foliis tenui quadam veluti membrana inclusis onusta, quæ extrema parte, antequam folia succrescant & explicentur, fructus rudimentum dant, grandiore jam firmiterque ad germinum basin inhærente superioris Auctumni immaturo fructu viridi, ramorum alas spectante & reflexo. Crescit in montibus Pannonicis & Austriacis.

Clus. l. c.
p. 31.

3. *Pinaster tenuifolius julo purpurascens*, dicitur Clusio *Pinaster tertius Austriacus*, Tabernom. *Tæda*, Gerh. *Tæda* seu *Pseudopinus*. Caudex contortus, rami divaricantur; quorum surculi lentiores longe & tenuiores superioribus: folia longe tenuiora & breviora. Extremis vir-

Tabern.
H. P.
Clus. l. c.
p. 32.

TABULA
XC.

IV. *Pinaster* est triplex, 1. *Conis erectis*. 2. *Latifolius pilis virenti-*

F f

gis

Peuce seu *gis* exiguorum *julorum* veluti nucamentorum tenuiorum squammarum inclusus, qui purpurascunt, & tenuissimum pulverem abeunt. Ex eorum medio nova succrescit *gemma*, novellis foliis membrana vel vesiculis inclusis onusta. Conus minor & obtuso mucrone. Provenit in Austria, in montium crepidine, tenui germine obrita; supra thermas Badenses. Accedit ad Sylvestrem Genevensem.

ceptacula distinctus; in quibus semen album, solidum, rotundum, pineo nucleo par. *Nascitur* in Malabar. Nuclei quatuor interimunt. Duo membrana sua exuti in clysteribus contra ischiadicam & urinæ difficultatem exhibentur: in jusculo gallinæ propinati, pituitosos humores, in asthma inprimis detrudunt. Ex aqua triti impetigines inuncti tollunt. Incolis *pinniores de Maluco*, Canariensibus *Gepalu*.

EXOTICA.

Ex EXOTICIS huc spectant 1. *Pinus Indica* nucleo purgante. 2. *Abate di Panuco*, seu *Ate Panucensis*. 3. *Matzatli*. 4. *Cachi*. 5. *Cibage*. 6. *Arbor Soldariae pini fructu*. 7. *Fructus pineos duos referens*, & 8. *Pinei coni facie, fructus exoticus*.

II. *Abate de Panuco*, seu *Ate Panucensis* aut *Tzypipatlis* arbor fructu apud Mexicanos nobilis. *Folium* aurei pomi, fructus cæruleus, in nigrum tendens, ferro polito similis, rotundus totus, quasi ex glandibus constans Pineæ nucis figura. Ramus coloris castanei.

I. *Pinus Indica* nucleo purgante duplex est, *occidentalis* & *orientalis*.

III. De *Matzatli* ita Nierembergius. Fructum hujus plantæ vocant Hispani, novi orbis coloni, ob similitudinem, pineam. Alumnam dicunt Haitinæ insulæ & Novæ Hispaniæ, & pineis nostratibus magnopere similem, & inde nomen sortitam. Planta ipsa fert iridis folia, sed spinosa; radicem fibratam crassamque, & unicum pomum, germinibus circumcirca exorientibus, ac altero in culmine ipsius pomi. Detractis his, satisque, radices statim aguntur, alterumque producitur pomum similibus stipatum germinibus. Initio hoc adparet rubrum, sed procedente tempore, ac rubescente adhuc germine, pallescit. Sapor est dulcis acidusque; temperies frigida atque sicca, ac succo manans natura. Exhibetur febrilentibus refrigerii gratia, & ad excitandam adpetentiam, retineturque ore, ut sitim mitiget, & linguam humectet, quanquam in bilem facile converti dicatur. Sapor est ejus fructus, quem vulgus malocotoneum vocat, non sine quodam (ut dictum est) acore. Condita aliquando saccharo, atque ita delata in Hispanias, gratissimo succo placuere. *Nascitur* in calidis regionibus montosisque locis. Melius forte ad pomiferas referri posset.

De Last
Incl. occid.
l. 5. c. 3.
Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 56.
Acosta.

1. *Pinus Indica occidentalis* Recco *Quauhajohuatli* dicta, arbor est mediocris, radice ex flavo ad carneum declinante. foliis magnis, lappæ similibus, obrotundis & angulosis, seu crenatis. Fructus quibusdam prunis nucibusve, juglandibus similis, strobilos ternos totidem cavitatibus seceros; pineis nucibus, forma, magnitudine, crusta, & nucleis pares. Columna unius pollicis cum dimidio, colore lutescente esse addit. *Nascitur* apud Tepecuaculcenses, & in aliis calidarum regionum agris. *Usus* nucleorum in purgando. Evacuant per inferiora & superiora, si tosti, & in vino macerati quinque, septem vel novem exhibeantur. Calidi sunt & pingues. Reccus *semen* arboris cucurbitinæ nuclei pinus forma vocat; *Fragosus pineos nucleos Indicos*; Mexicani *purgativa de Santo Domingo*.

Acosta c. 57. 2. *Pinus Indica orientalis* magnitudine est pyri. Folia, quæ tenera & mollia, inferne dilute virescunt, superne saturata, acria si gustes deprehenduntur. Fructus triangularis ayellanae magnitudine, in multa re-

IV. Ca.

Scalig. Ex-
erc. 181.
c. 12.

IV. *Cachi* spinosa est in Malabar arbor, cujus folium non pingunt. Ipsa *Cachi*, ejus fructus *Ciccara* dicitur, longitudine pedali, humanae coxae crassitudine. Pondus fidem superat. *Cortici* color primum viridis: maturescens in luteo fuscescit. *Corpus* firmissimum, compressioni tamen ita cedit, ut frangatur. Temporis quoque suapte natura impatiens. Haud enim ita multo postquam detractus sit, fit rugosum. Totius forma, ut pineae nuci. Intus enim camerulae membranis distinguuntur: ut in *Punica*. Pulpae odor suavissimus. Sapor mistus ex Melone Moschato, Persico, Arantio dulci, & melle. Intus poma ducena quinquagena ad trecenta usque, Ficorum tum specie, tum dulcedine, sine cortice, ut ajunt, membranulis tamen distingui necesse est, quibus segregantur: ut ovorum vitella. In his pomis *fruticulus* est alius, figura *Castaneae*. Qui ad eundem, quo *Castanea* modum, inter coquendum crepirat: esculentusque est. Etiam bobus in pastu datur. Exit e trunco fructus, sicut & *Lumeiz*, id est *Sycomoro*, inter spinas & frondes. Interdum, quod magis mirum est, e radice subtus terram, unde prodit. Hic longe praestantior, regibus dono datur. Legitur mense Decembri. Forte ex pomiferis exoticis.

forma, sed tenerior, videre est apud *Peuce* seu *Camerarium*. *Pinus*.

VI. *Arbor Soldaniae pini fructu* a *Parchaf*. *Dountono* Anglo observata est. *Par*. *Navig.* 1. 3. *c.* 12. *sect.* 1. *Fructu* magnitudine & figura pineae nuci, sed non tam duro cortice, quia fungoso. Nucleus avium cibus.

VII. *Fructus pineos nucleos duos* *Clus. Exot.* *referens*, est *fructus octavus Clusii*. 1. 2. c. 30. Similis strobilis in totum, longior tamen & crassior, putamen durum & idem color.

VIII. *Pinei conii facie fructus exo-* *Bauhin. H.* *ticus*, *Bauhino* a *Caspere* fratre com- *P. l. 9. c. 25* *municatus* est. *Pediculo* minimi digiti fere crassitudine, rufo, duro, atque lignoso, *folia* mutuo incubitu adnascuntur digitum fere longa, firma, substantia lignosa, triquetra, principio angustiore, reliqua parte latiora, & fastigiotenus recurva, numerosisque squammulis foliaceis lucentibus, nigrisque vestita. Haec pars quae recurva, modico inflexu separatur, ita, ut fructum esse squammosum suspicio sit. Folia, quae intus delitescunt, extimis breviora, & densiore dictorum foliorum stipatu oblecta. Per quorum longitudinem extimam costata insignis angulum faciens excurrit, parte interna carinata. Sapor nonnihil amaricat, non sine adstrictione nidulenta, ac si fructus in fumo esset exsiccatus. Partes ex comestione, dentiumque attritu haerent, quod argumento est, substantiam nonnihil esse viscosam.

Bauh. H. P.
l. 9. c. 10.

V. De *Cibage* paucis *Bauhinus*. Ex Orientalibus, inquit, regionibus *Cibages* nomine a *Paludano* delatum esse semen colore nigrum, acumine donatum, ex quo prodierit planta *Pini*

ARTICVLVS III.

De Larice.

Larix:

Vid.
TABVLA
XC.

I. Nulla *Laricis* apud *Theophrastum* mentio. *Plinius* modo *πεύκιν*, modo *πίτυν* ita vertit, quem & *Gaza* perperam sequitur.

Theophr.
H. P. l. 1.
c. 16. 19.

Inter *αείφυλλα* illo; *laricem* deceduo esse folio, experientia testatur; *Ανανθώδες ἐν τῶν ἀκρῶν κατὰ τὸ τῆς πεύκης καὶ πίτυος*: nulli *Laricis* foliis acu-

lei: & ut *πέυκη* inter sylvestria *Theophrasto*, sic *πέυκης τι γένος*, *Pinus* urbana est. Habentur tamen apud *Plin.* *H. N.* *l. 16. c. 30* *nium* & *Vitruvium* quaedam. Ex *Vitruv. Ar-* *chit.* 1. 2. *crecit* in longitudinem, piceaque est altior. Radici singulari innititur, quanquam ad latera dispersis.

Materies praestantior longe reliquis resiniferis, proluxa incorrupta

Larix. vis, emori contumax, rubeus, præterea & odore acrior, quod tamen de pinu potius intelligi debet. *Cortex* levior quam piceo, crassiorque: folium villosius, pinguius & densius, & flexu mollius. Nullo exhilarari flore, nec natales pomorum, recursum annuos versicolori nuntio promittere, dixit Plinius: sed prius falso, ut &, quod coma perpetua vi-reat. De natura ejus nasci ἀπὸ σπέρματος porosi; ustis radicibus non repullulare, nec ardere, nec carbonem facere, nec alio modo ignis vi consumi, quam lapides. Non solum, inquit Vitruvius, ab succi amaritate, a carie aut tinea non nocetur, sed etiam flammam ex igne non recipit, nec ipse potest ardere, nisi ubi saxum in fornace ad calcem coquendam aliis lignis uratur. Nec tamen tum flammam recipit, nec carbonem remittit, sed longo spatio tarde comburitur, quod est minima ignis & aeris e principiis temperatura. Humore autem terreno est, materiespisse solidata, non habens spatia foraminum, qua possit ignis penetrare, rejicitque ejus vim, nec patitur ab eo sibi noceri. Propter pondus ab aqua non sustinetur, sed cum portatur, aut in navibus, aut supra abiernas rates collocatur, &c. *Adfertur* & exemplum. Obsessum circa Alpes munimentum a Julio Cæsare comburi, quod larignum fuisset, non potuisse.

Pallad. mens. Novembri.

Plin. H. N. l. 16. c. 12.
Plin. H. N. l. 16. c. 40.

Ideo & Palladius nec flammam recipere scripsit. At quis credat lignum resina turgidum inustum flammis stare? Ipse Plinius masculam in Macedonia urialicubi dixit: potestque ventorum & frigoris vi densior lapideaque quasi duritiei evadere materia, & ita ignium vi minus obnoxia reddi. Plinius in humore præcipuam dixit.

De *Resina* inferius dicemus; de *Agarico* inter fungos. Amat montana, municipibusque, qui sunt circa ripam fluminis Padi & littora maris Adriatici, nota est. *Plinius* inter *Marem* & *Fœminam* distinxit, dum in Macedonia laricem Masculam uri, Fœminæ radices tantum, dixit; vocabulo πένυς sine dubio pro larice

sumto. Id enim de Pinu Theophrastus prodidit. Ingens olim in magnitudine differentia. Amplissima, inquit *Plinius*, ad hoc ævi existimatur *Plin. H. N. l. 16. c. 40.* Romæ visa, quam propter miraculum Tiberius Cæsar in ponte naumachiario exposuerat, advectam cum reliqua materie; duravitque ad Neronis Principis amphitheatrum. Fuit autem trabs e larice longa CXX pedes, bipedali crassitudine æqualis. Quo intelligebatur vix credibilis reliqua altitudo fastigium ad cacumen æstimantibus. Fuit memoria nostra, & in porticibus septorum a M. Agrippa relicta, æque miraculi causa, quæ diribitoria superfuerat XX pedibus brevior, sesquipedali crassitudine.

II. EX RECENTIORVM descriptione est Larici caudex rectus & procerus, materies durissima, & interius rubescens: Cortex crassus, scaber, fuscus, & in rimas dehiscens; rami longi, graciles, & qui deorsum dependent. Folia e tuberculis umbilicatis, duodecim viginti & plura, penicilli in morem, prodeunt; tenera, comosa, perangusta, leniter odorata, serarum equinarum crassitudine, obtusa, viridantia, quæ non ante hyemem ad stipitis radices decidunt, quam alia veris initio successissent: non defluxisse, sed novæ juventutis habitum induisse posses dicere. *Flosculi* seu potius conorum rudimenta rotunda, in purpuram ardentem rubescencia, comantibus foliolis odoratissima, e tenerrimorum ramulorum summitatibus erumpunt, *Clus. H. P. l. 1. c. 23. p. 74.* Coni ramis pertinaciter hærent, contorto & crassiusculo pediculo, nucis cupressi magnitudine: quibus squammæ latiusculæ, compressæ, obtusæ, tenues, ex rubro purpurascences, & sub iis bini nuclei foliati exigui, alis Cicadarum aut Vespertilionum similes, in quibus semina parva, alata, gemina, nucleo candido, cinericio cortice vestito constantia, sapore dulci, & nucem Pineam æmulante. *Maturantur* autumno. Novella arbor æmulatur Cupressum. *Nascitur* in Italia Alpibus circa Tridentum, Benacum & Padum fluvios; in territorio

Stapel. in Theophr. p. 167.

Bauhin. H. P. l. 2. c. 13. p. 265.

Matthiol. in Dioscor. l. 1. c. 74. p. 101.

rio Ambrinensi, ubi Plaustum vix
asse Gallico constat, Rhetia, Valesia-
nis, Moravia, Silesia &c. In Val-
larica & Briansonæ raro Agaricum
fert. In horto Mombelgardeni una
ex duodecim evasit. *Ufus* ligni apud
Valesianos in excitando igni. In Tri-
dentinis montibus & valle Ananiis
contermina, nullo alio carbone rude
ferri metallum tam cito colliquescit.
In Austria fiunt vinearum pedamen-
ta ex eo, nec non longissimi canales,
tectis ad pluviam supponendi.

Firmum cum sit & solidum, non Larix.
facile solis ardoribus vel aëris injuriis
cedit. Adferuntur Viennam quin-
quaginta pedum longitudine. Com-
mendatur materies a nonnullis contra
lepram & elephantiasin. Caudici
vetustissimæ medullæ vice album
quoddam corio persimile *adnascitur*,
quod in adglutinandis vulneribus, &
compescendo sanguine vehementer
laudatur.

ARTICVLVS IV.

De Pity seu Picea.

I.

Picea.

Vid.

TAVLA
XCI.Bauh. H. P.
l. 9, c. 2.Theophr.
H.P. l. 3, c. 7.Theophr.
H.P. l. 1, c. 9.Theophr.
H. P. l. 1.
c. 16. Theo-
phr. H. P.
l. 3, c. 6.Theophr.
H.P. l. 3, c. 6.Plin. H. N.
l. 16, c. 10.

Plin. H. N.

Quid Veteribus sit Picea, difficile
est dicere. *πίτυν* cum *πέννη* &
Larice confundere Plinium, certum,
& diximus superius. Ex *recentiori-*
bus vero quidam *πίτυν* Theophrasti
non Piceam, sed tædam verti debere
contendunt. At & tædam, quæ Pi-
norum morbus est, pro arbore su-
mere, quod Plinius, & qui ipsum se-
quuntur, faciunt, inconueniens esse
videtur: Pinaster vero nihil antiquis
aliud, quam sylvestris Pinus est. De-
scribitur vero a Theophrasto per
comparisonem ad Pinum Pitys, ar-
bor in se *ἐνυώνης* & protinus fructifi-
cans. *Truncus* ei magis conspicuus
& eminens, lævis, magnus, in ope-
re fabrili utilis, utpote qui crassior,
lævior, procerior, quam Pinus sit.
Materies candidior, abietis æmula,
atque in totum *ἀπενότρεα*; seu mi-
nus unguinosa, medulla carnosâ. *Fo-*
lia pauciora, squalidiora & horri-
diora, in totumque rara. *Flovere*
existimant quidam, quidam minime,
sed *νύτταρον* vel potius *νύτταρον* seu nu-
camentum gignere, quod grossis pro-
portione respondeat. *Fructus* coni &
quidem minores longioresque. Ger-
minatione abietem prævenit diebus
quindecim: sed fructum post Virgi-
lias profert. Pix quam in Pinu notior,
quia pauca & amara, odore nempe.
Aduitis radicibus regerminat, ut in
Lesbo contigit, accenso nemore Pyr-
rhæo, cacumine deciso sterilefcit.
Nascitur in Arcadia pauca, multa in

Elea. Navibus apta est. Sunt, qui
ex ea triremibus Carinam proram.
que levitatis causa, formandam sta-
tuunt: sunt, qui ad aquarum ductus
in tubos cavant. Et hæc quidem
Theophrastus. Ex Plinio hic forte
addi potest: Nucamenta totis pani-
culis, minoribus gravioribusque mi-
nimos ac nigros nucleos habere: pro-
pter quod a Græcis *Phtiophoron* ad-
pellari. Forte dixi. Nec enim in
vulgari Picea tales nuclei; & Phti-
ophoron Pini speciei cuidam rectius
competere, dictum superius. Quan-
tum ad *Differentias*; duo ejus apud
eundem occurrunt genera: *Sativum*
nempe & *Sylvestre*. *Sativæ* nomen
Sapinus vel *Sappinus* (alii Codices
habent Sapius) Plinius Piceam feri-
tate paulum mitigatam satu dixit. Fert
nucem nucleoram cute verius quam
putamine adeo molli, ut simul man-
detur. Regenerascere cæsa materia,
ex Plinio colligas, apud quem, male,
materies cæsarum e genere fiat, pro
materies cæsa regenerescit, vel *rege-*
nerascit, legitur: nunquam cæsam
regerminare Vitruvius prodidit. Pro-
lixior & firmitior in montanis nascitur:
prelumque ex atra (alta legunt alii)
optimum confici apud rei rusticæ
scriptores invenies. *Sylvestris* picea
adpellatur. Sunt, qui Sapium Pi-
nus speciem esse dicunt, quæ cæsa
regerminet. Sappinum vero Pi-
ceam sativam, quæ cæsa non repul-
lulet.

l. 16, c. 42.

Theophr.

H.P. l. 5, c. 8.

Plin. l. 5

Plin. H. N.

l. 16, c. 12.

Vitruv. Ar.

chit. l. 1.

Varro R. R.

l. 1, c. 6.

Plin. H. N.

l. 16, c. 34.

Cato R. R.

c. 31.

Picea. II. RECENTIORIBVS est Picea duplex, 1. *major*, 2. *minor*.

Matthiol.
ad Cluf. Sta-
pel. ad
Theophr.
l. 3. c. 10.
p. 168.

Bauhin. H.
P. l. 9. c. 2.
p. 238.
Casp. Bauh.
Phytop. l.
12. c. 6.

I. *Picea major* Bauhino *Abies rubra*, Trago *Abies prima* & *rubra*, *Picea Plinii* & *Abies mascula* Theophrasti, Cæsalpino *Tæda Plinii*, Donejo *Abies* adpellatur. Arbor est procera, stipite erecto, cortice nigricante, lento & flexili, materie rubra. Rami decussatim in vertice & infratrunci medium ponuntur, plerumque in terram deflexi. Crebrum foliorum agmen, quæ angustiora, Pinifoliis breviora & latiora, quadrata, pungentia, ex oppositis sibi lateribus duobus, frequentia admodum & densa exeunt. *Fuli* qui æstate ineunte prodeunt, pallescente farina referti sunt; iisque postea *Coni* succedunt Cylindracei fere, squammis lævibus, tenuibus, in principio purpurascens, quæ etsi dehiscunt, ramis tamen adhærent compacti, septem vel octo unciarum longitudine. Intus duo *semina* parva, alata, rufa, adstringentia, medulla intus alba & molli. *Resinam* e conis & trunco fundit. Infestatur erucis venenatissimis. Crescit copiose in saltu Vien-

nenfi & vicinis Alpibus; in sylvis Tigurinis & alibi, brevique translata arbusculas adlescere scribit Gesnerus. In horto Mombelgardensi frustra plantata est. *Ufus* materie in structuris non tam laudabilis, ut quæ pro aëris constitutione intumescat & detumescat. Unde subinde in ædificiis crepitat oneribusque cedit. Sylvæ Phitificis optimæ, quod aërem ficcis & resinosis atomis repleant; indeque facilius ulceris in pulmone consolidatio. Vix est *Picea* Theophrasti, ut ex Conis, foliis, & materie colligere licet.

2. *Picea minor*, Clusio & Bauhino *Pumila*, nunquam valde adfurgit, brevioribusque & pallidioribus quam superior foliis obsertur. Nec florem, nec fructum observavit Clusius. *Nucamenta* nucis Ponticæ magnitudine, e squammulis imbricatim compositis, sed in pungens foliolum desinentibus, compinguntur, quæ maturitate dehiscencia, concavas inanitates & veluti cellulas ostendant. A summis nucamentis ramuli nonnuncquam enascuntur, frequentibus, brevibus, & pungentibus foliolis obsiti. Male pro *Pino tubulo* vel *tibulo* accipitur.

ARTICVLVS V.

De Abiete.

Abies.

Vid.

TAB.

XCI.

Theophr.
H. P. l. 1. c. 8.
& l. 4. l. 5.
c. 2. Theophr.
H. P.
l. 5. c. 2.

Theophr.
H. P. l. 1. c. 9.
& l. 3. c. 7.

Plin. H. N.
l. 16. c. 31.

Theophr.

I. *Abies* erecta arbor, ὀρθοφύεσθαι, longo Caudice Veteribus, ac μά-
λιστα εἰς μήκος ἀνζητική. Crescit enim primum in excelsum, ἀχρεὶς & ἀφικνέας τῇ ἡλίσ: neque ramus ullus vel παρα-
βλάστησις, vel crassitudo tum factitatur: post in profundum latumque, ita αἱ τῶν ὄζων ἐκφύσεις καὶ παραβλάστη-
σεις sequuntur: quod ipsi proprium. Pars quæ a terra & enodis, *Sapinus* vel *Sapinea* vocatur; superior nodosa, duriorque, *fusterna*. Radix una nervosa, μετρίως in terram descendit, ideo aliquando radicitus flatu evertitur. Idæi tamen altius quam robur radice descendere volunt, verum simpliciore, & ἐνδυρρίζοις εἶναι. Cor-
tex tunicis multiplex: ideo πολύλο-
πος Theophrasto, quemadmodum κρόμμυον. Materies fissilis: πολυῖνος

καὶ ἀσαρκος, adeo ut ei φλέβας καὶ ἵνας ἐν γένεσιν αὐτῆς Theophrastus adscribat. Eadem modo quadriflua, biflua modo, modo simplex. Medulla li-
gnosa. Rami recti, ὥσπερ ἐμπειρηγότες, duriores, flavi, spissi, cornu similes & δαδῶδεις: qui, si abscindantur, humorem largum plorant, ἐπὶ πολὺν χρόνον. Nodi densissimi, στενέτατοι μόνοι διαφανεῖς, καὶ τῷ χρώματι δαδῶδεις. In cælum tendere, non in latera pronos, dixit Plinius. Folium perpetuo virens, pectinum modo infectum & pungens. Flos crocei coloris & pulcher, quem ante solstitium fundit. Fructum seu nucem protinus profert, semenque post Vergiliarum occasum. Gignit & *Cachrym* & *Alburnum*, λέσσον dictum, ægidi-
αντίστροφον. Spissum hoc, candidum, pulcrum,

pulcrum, & arborum vetustiorum proles. Bonum inventu rarum, vilius copiosum. Arcades *ægidem* vocant, quibus etiam crispa & lævis est. *Humor* in lacrymæ modum; sed inter *ἀδάδα* computatur. *Germinatio* ramorum certa, non solum quæ primæ sit novellæ, sed subinde æqualis & respondens. Nam cum prima germina de caudice seu ramo, fissa atque disparata fuerint, ex illis alia ex æquo funduntur, atque dividuntur; idque assiduo facitatur, post quemque germinationis super-ventum, seu *μετά πάσας τὰς βλαστῆσεις*, Computatur inter *τριλίπας*. De *Natura* ipsius est, e femine tantum ori-ri; e latere nunquam recrefcere, ne-que ab imis plantigeram: Pondus sustinere in transversum positam, nec citius rumpi, quam putrescat vel deficiat: minus a teredine propter siccitatem corrodi; nec tantum vulnere non interire, sed & *φορίδα* & *πολυφόρον* reddi. Decorticatam mate-riam, cum germinat, aquis offendi non possetradunt: patuitque id apud Pheneum Arcadiæ, cum obstructis fontibus Campus in lacum redunda-vit. Tum enim ductis ex Abiete pontibus cum amplius extumesceret aqua, aliis super aliis fabricatis, pos-tea extrusis obturamentis, unda eru-pit discessitque, incorrupta materia. Mirum. Cacuminibus eorum deci-sis moritur, totis vero detruncatis durat: & si infra, quam rami fuere, præcidatur, quod superest, vivit: si vero Cacumen tantum auferatur, to-ta moritur; hoc a Theophrasto & Plinio proditum. At visa Stapelio decacuminata Abies, tertio vel quar-to a decacuminatione anno superstes; nec credibile detruncatam durare. Ramos & brachia, & quicquid est superflui, si detonderis, elegantior adscendet. Peculiare & hoc Abieti, cum præcisa aut demutilata, vel ven-to, vel aliquo modo fuerit, circa læ-rem sui caudicis partem, quiddam *μικρὸν ὑποδέσσειον εἰς ὕψος*, quod non-nulli *ἀμφανῆν*, alii *ἀμφίφωαν* vocant, producere. Colore id nigrum, & duritia excellens. Crassitudo pro ar-boris ratione, & prout illa robusta,

vegeta, & *ἐγχυλότερος*. *Locus* ipsi Abies, montes, nec nascitur *ἐν πεδίοις* in Ma-acedonia. *Ἐν τοῖς παλαιοῖς* pulcerri-*ma*; *τοῖς ἐνυλίοις* non item. Ideo in Arcadia circa Cranam, loco quodam concavo & a ventis silente, quem nunquam *ἥλιον ἐμβάλλειν* dicunt, lon-gitudine & crassitie cæteris præstat. Præstantior Macedonica, quam Par-nassia; in Corsica altissima. Romæ *infernas supernati* præfertur. Cædi-tur illa in Apennini parte mari Thu-sco proxima; hæc in ea parte, quæ Adriatico vicina est. *Usus ligni*, al-burni, & *ἀμφίφωας*. *Ligni*: Navium malis antennisque propter lævitatem præfertur; ideo caudex a Theophras-to navis malo collatus, & malus ex Abiete in navi, qua Telemachus Py-lum navigavit. Ad rectum firmissi-ma, dolanturque ex abrafa rami. Ea-dem valvarum repagulis, & ad quæ-cunque libeat intestina opera, aptissi-ma, sive Græco, sive Campano, sive Siculo fabricæ artis genere, spectabi-lis ramentorum crinibus, pampina-to semper orbe se volvens, ad inci-tatos runcinarum raptus, vel potius ad incitandos runcinarum actus. Ea-dem & curribus (*fabris lege*) maxi-me sociabilis glutino, (*πρὸς τὰς τεκτό-νων χρεῖας* habet Theophrastus) in tantum, ut findatur ante, quam soli-da est, vel sociata est. Theophras-tus enim, ne findi quidem ullo pacto adfirmari dicit, si glutine muniatur. Ima pars, quæ *Sapinen*, cum excisa quadrifluviis disparatur, ejecto foru-lo ex eadem arbore, ad intestina ope-ra comparatur. Ex *alburno* tabulæ pictoriæ & codicilli fiunt. Ex *ἀμφί-φωας* crateres ab Arcadibus conficiun-tur. *Differentia a sexu, loco, & ma-gnitudine*. 1. *Sexu*. Est enim vel *Mas*, vel *Fæmina*. *Mari* facies ad-spectu crispior. *Caudex* variegatior, latior, durior, medulla refertior, & *τὴν ὄψιν* deterior: nuces paucæ in sum-mo. *Fæminæ* caudex rotundior, ma-teria candidior, mollior, procerior, operibusque facilior: *folia* pinnarum modo, quæ avium alas componunt, in breviora folia continuantur, aliis super alia jacentibus, & impositis, ita compacta, ut minora & breviora

Abies. sint posteriora; quæ versus cacumen spectant, *Σολοειδῆ* figura, testudinem referente simillima. *Βατο*rum *καμάραις*. Densa eadem adeo, ut nec nivem, nec imbrem admittant. 2. *Loco*. Datur enim & *Marina*, vel potius ipsi similis, de qua tomo secundo agemus. 3. *Magnitudine*. Admirationis namque præcipuæ visa est in navi, quæ ex *Ægypto* *Caii* Principis jussu, obeliscum in Vaticano Circo statutum, quatuorque truncos lapidis ejusdem ad sustinendum eum adduxit: qua nave nihil admirabilius visum in mari certum est. CXXM. modium lentis pro saburra ei fuere. Longitudo spatium obtinuit magna ex parte Ostiensis portus latere lævo. Ibi namque demensa est a Claudio Principe, cum tribus molibus turrium altitudine in ea exadificatis obiter *Puteolano* pulvere advectisque. Arboris ejus crassitudo quatuor hominum ulnas complectentium implebat. Vulgoque auditur octoginta nummorum & pluris malos venditari ad eos usus; rates vero conventi quadraginta festertiis plerosque.

II. **BAVHINO** est *Abies* duplex:

1. *Conis sursum spectantibus*, sive *Mas*. 2. *Alba sive Fœmina*; quibus ego *Abietem Mexicanam* addo.

Bellon. I. de arbor. coniferis. Dodon. Pent. 6. l. 5. c. 16.

1. *Abies conis sursum spectantibus*, sive *Mas*, est *Abies legitima vel Mas Bellonii*; *Abies altera Dodonæi*, *abies Pilati du Choul* Lugdunensi: Descriptio superius ex Theophrasto adlata: nec plus de ea a Bellonio habemus, præterquam quod Coni sursum spectent. Bauhinus Piceam superius descriptam, quam *Latini* vocat *Abietem*, marem Theophrasti esse opinatur. Clusius & sequenti surrectos aliquantum Conos tribuit.

Dodon. Pent. 6. l. 5. c. 13. Clus. H. P. J. 1. c. 23. Bauhin. H. P. 1. 9. c. 1. p. 231. Stapel. ad Theophr. p. 170.

2. *Abies alba sive Fœmina*, Dodonæo est *Picea*, Clusio *Abies Plinii*, & *fœmina Theophrasti*. Arbor est omnium Coniferarum, Cedro excepta, altissima. *Caudex* rectus, intus albidus, extra cinereus, qui facile, flexus, frangitur. Enodis idem inferius, crescendo in altitudinem progreditur, naturali contractura peræ-

quata ad summum usque. *Rami* circa id, ex eadem caudicis parte quaterni simul, decussantur invicem, tali ad fastigium usque ordine servato. Ab his bini laterales sibi mutuo oppositi, qui deorsum nutant, reliquis sursum magis reclinatis. *Lignum* album, resinofum, odoratum, fibris rectis ita intertextum, ut assulatim per longitudinem facile scindi possit; cui cortex exterior lævis & candidior, quam *Picea*, & multiplex. Inter utrumque in novellis folliculi parvi, resinæ receptaculum, si aperiantur, aliquot guttæ decidunt. *Folia* numeroso agmine rigidula, oblonga, superne viridia, glabra, inferne candicantia, aut cinerea, linea viridi distincta, utrinque pectinatim disponuntur. Bifido mucrone in tenellis conspiciuntur, qui in vetustis magis obtusus est. *Coni* omnium coniferarum maxime fere prolixi, mollibus squammis compacti, ab extremis virgulis deorsum dependent, non facile decidui. Virerent autumni initio, hyeme ineunte maturescunt. *Coccali* in his exigui, nucleo ossis *Cerasi* non majores, adnata una parte membrana, alis apum persimile. Observatione dignum est, adultam circa majorum ramorum extremos quasi turculos, in singulorum foliorum alis, prona parte, exigua quadam nucamenta interdum ferre, e quibus singulares brevesque Juli emergunt, qui deinde in flosculos permutantur, & in alterum nonnunquam annum perdurant. Viscum, quod Plinio *σέλις*, observavit in ea Clusius. *Crescit* in montanis, sed nec plana vel hortos spernit. Nulla olim in Anglia: in Virginia altissima; in Vienneensi saltu copiosa. In Burgundia fungi nigri, pineis nucibus vel favis similes, mense Junio, sub iis reperiuntur. In Bernensi tractu CXXX. pedum longitudinem adsequuntur; unde adminiculo Arolæ in Rhenum deductæ Genuam usque per mare devehuntur. De *Usu* nihil ferre præter dicta occurrit. Cinis in lixivium redactus ad digitorum vulnera commendatur, addita parva radicis *Altheæ* quantitate, si eo fovere voluerit.

Bauh. Phys. top. l. 1. c. 6. p. 195.

volueris. Semine loxiæ aves dele-
stantur. Tigurinos offendi, si quis
urbem transiens Abietis ramum in
pileo gestet, fama olim fuit. Vien-
næ venalis vini indicium.

Reetus R.
M. N. H.
l. 3. c. 66.

3. *Abies Mexicana* incolis *Auenetl*
& *Aboehoetl*, seu *tympanum aqueum*
dicitur: vel quod juxta aquarum flu-
enta nascatur, & ex ea Indi timpana
Uuetl & *Toponoztli* dicta parent;
vel quod juxta aquas ab aëre tacta
fragorem edat. *Materie* est molli,
lenta, & corruptioni obnoxia, ma-
xime si terræ defigatur; intra aquas
enim diutius durat. Nullibi obser-
vata *florere*. *Fructus* Abieti similis,
nec diversa *folia*. Quibusvis regio-
nibus nascitur, facileque circa fluen-
ta stagnantesque aquas, semine, ta-
lea aut viva radice feritur. Toto
anno provenit, & *resinam* fundit. Ar-
boris sapor acris cum quadam ama-
ritudine & suavitate odoris. Tem-
perati caloris & siccam gradu tertio
diceres. *Cortex* usus sanat ambusta
& exesam cutem; ulcera cum lythar-

grio & polline thuris sanat ac eica-
trici obducit, cerato myrtino exce-
ptus. *Folia* tusa & illita crurum sca-
biei & tumoribus medentur; & den-
tium dolores, si cum aceto colluas,
inhibent. De *resina* alibi agemus.
Quatuor ipsius inveniuntur *species*.
Prima candida altissimas pinus longi-
tudine superat, viginti quatuor pe-
des & ultra aliquando crassa. *Alia*,
cui minor magnitudo, materia alba,
cor rubrum, fructus nuces pineæ re-
sina referta, vulgarium olivarum ma-
gnitudine. *Tertia*, cui adhuc minor
statura, materies rubra, coma orbi-
culatior. *Quarta* minima, & vix
malos Medicos superans, cui medul-
la candens, materies rubra. Com-
mune omnibus corticem habere ru-
beum, folia abietina, sed exiliora, ra-
mos depressiores, fastigium acumi-
natus; resinam, quæ si non sponte,
at flammis liquata fluit. Conjiciun-
tur assulæ in vasa fictilia, cooperta-
que eam fundunt. Vires omnibus
eadem,

Abies. }

ARTICVLVS VI.

De Cupresso.

I.

TABVLA
XCII.

Dioscor. M.
M. l. i.

c. 192.
Theophr.

H. P. l. i.
c. 8. 9. 14.

Plin. H. N.
l. 16. c. 40.

Varro R. R.
l. i. c. 40.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Theophr.
H. P. l. 2. c. 2.

Plin. H. N.
l. 14. c. 20.

Cupressus, qui & *Cyparissus*, in al-
tum tantum crescere apta est,
semperque difficillime nascentium
fuit, ut recte morosam dixeris: *Ra-
dices* non multæ, & quæ per terræ
ἐπιπολαία serpunt. *Caudex* longus &
macilentus. *Materies* natura perpe-
tua, odore violento, nec cariem ve-
rustatemque sentit, nec sponte rimam
fissuramque, unde maxime æterna
putatur. *Rami* non frequentes. *Fo-
lium* carnosum & amarum, perpe-
tuo virefcit. *Flores* post laurum. De
fructu in femina dicemus. Plinius
haccam & pillulam vocat, Varro gal-
bulum seu pilam corticeam. *Resina*
sapore acerrima. De *natura* ejus est,
cæteris in locis semine tantum prove-
nire, in Creta etiam trunco, ex cæ-
sura in Tarra, quæ Insulæ illius op-
pidum Apollonio Tarræo celebre;
emori, si novella copiosius rigeretur;
ἀπὸ τῆς τομῆς, modis omnibus præci-
sam a terra, parte media & superna,

radicibus denique, quanquam hoc ra-
ro germinare; detracta denique co-
ma decisoque cacumine interire. *Lo-
ca* eum magis fervida habent, ut Cre-
ta, Lycia, Rhodus. Huic, inquit
Plinius, patria Insula Creta, quum
Cato Tarentinam eam adpelleret, cre-
do, quod primum eo venerit, & in
Ænaria succisa regerminet. Sed in
Tarento, quocunque in loco terram
moverit, quispiam, (serendo scil. Cu-
pressum) si naturalis hæc gignitur,
protinusque emigrat. In illa vero
etiam non adpellato solo e sponso (i.
e. in solo etiam minime naturali, &
quod ex sponso adpellari non possit)
maximeque in Idæis montibus, &
quos albos vocant, summisque jugis
undenives nunquam absunt plurima;
quod miremur alibi, non nisi in te-
pore proveniens, & nutricem ma-
gnopere fastidians. In Cyrenensi opti-
me prodit, plurimumque fit oleum.
In Arcadia apud Psaphidem tantæ

Cupres-
sus.

Theophr.

H. P. l. 4.
c. 19.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

l. 16. c. 33.

Plin. H. N.

H h

pro-

Cupres-
sus.

proceritatis fuere, ut vicinus mons inumbraretur, Alcmaëoni sacra & ideo ferro intacta. Haud spernendus in medicina & alibi *Ufus*. Levis ei acrimonia caliditasque, major amaritudo: nullam tamen caliditatem aut mordicationem in corporibus efficit. Hinc latentes in alto in flaccidis putrescentibusque adfectibus humiditates depascitur. Fuere, qui ad erysipelata cum polenta & aqua adhiberent. Ex eodem structa in Babylonia Alexandro Classis; sceptrum Iovis edolatum, unde Pythagoræorum ab utensilibus. Cupressinis abstinencia: tabulæque in quibus leges publicæ sacrorumque ritus descripti, ex Platonis placito, factæ. Adde his, valvas in templo Dianæ Ephesiæ e Cupresso, & prope quadringentis ad tempora Plinii annis durasse, materiam omnem novæ similem: majorem simulacri Vejovis in arce ætatem, utpote a condita urbe quingentesimo quinquagesimo primo anno dicati: & quia Diti sacra, funebri signo ad domos positam fuisse.

Arrian. l. 7.
de expedit.
Alex.

Rhodig. An-
tiq. lect. l. 2.
c. 25. Plin.
H. N. l. 16.
c. 40.

Theophr.
H. P. l. 1.
c. 13. Plin.
H. N. l. 17.
c. 10. &
l. 16. c. 33.
Plin. H. N.
l. 16. c. 27.

Distinguitur in Marem & Fœminam. 1. *Mas* nodosior est, spargit extra se ramos, deputaturque & accipit vitem; sterilis idem; ideo forte supervacua fructu Plinio. 2. *Fœmina*, quæ meta in fastigium convoluta, spreta diu (male sterilis diu) meta demum adpectu non repudiata. Trifera hæc. Namque baccæ ejus mense Januario & Majo & Septembri colliguntur, ternasque earum gerit magnitudines. *Torvas* dixit Plinius, seu quod gustanti torvam faciem reddant: seu quod maturæ in multas rimas fissæ tales adpareant: seu quod asperæ & indomitæ.

Plin. H. N.
l. 17. c. 10.
Theophr.
de C. P. l. 1.
c. 5.

Minimis granis constat semen, ut vix perspicui quædam possint, non omitendo naturæ miraculo, e tam parvo gigni arbores, tanto majore tritici & hordei grano, ne quis fabam reputet. Pillulæ collectæ dictis mensibus, siccantur sole, ruptæque emittunt semen, formicis mire expetitur, ampliato etiam miraculo, tantuli animalis cibo, absumi natalem tantarum

arborum. De *satione* vide ibidem. *Ufus pillularum* ad sanguinis rejectionem, dysenteriam & alios fluxus in vino, si contundantur. Comprimunt & hernias intestinorum compositæ. Orthopnææ prodesse falsum, quia stringunt. Ipsa distinguendis pinorum ordinibus adhibebatur: post tonsilis facta, in densitate parietum (i. e. parietibus vestiendis) ut Democritus voluit, coercitaque gracilitate perpetuo teres. Trahitur, inquit Plinius, & in picturas operis topiarii (sic lege, non opere historiali) venatus classesque, & imagines rerum tenui folio brevique semper vestiens. Utraque mittitur in perticas afferesque amputatione ramorum, qui XIII annis denariis singulis veniunt, quæstuosissima in satûs ratione sylva; vulgoque *dotem filicæ plantari*, antiqui adpellabant. *Creticæ* materies rara est.

Plin. H. N.
l. 16. c. 33.

II. MODERNIS duplex est: 1. *Vulgaris*. 2. *Novæ Hispaniæ*; quibus addi potest *similis arbor in Syria*.

1. *Cupressus vulgaris*, arbor est procera. *Caudex* rectus crassusque, *Cortex* spadiceus; *rami* complures in orbem circumacti, qui Coni similitudinem effingunt. *Ligni* materies, firma, solida, dura, odorata, undulans nonnihil crispata, micis saturatioribus nunc longis transversisque, nunc parvis, punctorum instar variantibus, pallida aut rubescens. Nec cariem, nec fissuram sponte sentit, odoris tenacissima. *Folia* cedri retusæ, aut Sabinæ imbricatim connexa, oblonga, teretia, carnosæ, perpetuo virentia. *Galbuli* juglandi nuci pulvinato calyce rectæ, æquales, larignis conis fere adsimiles, confragosi, rimas agunt in claveta tubera dehiscences: inter quorum commissuras, semina rufa, sublonga, altera parte rotunda, altera acuminata, semiculmo latiora. *Caudex resinam* fundit modice liquidam, larignæ consistentiæ similem, sapore acerrimam, odore haud ingrato. Cæsalpinus, foliis nullis esse scribit. Sed ipsamet germina tenuiter sceniculi modo scissa. *Folia*, addit, videntur pul-

Bauh. H.
P. l. 9. c. 16.
P. 280.

Stapel. ad
Theophr.
P. 373.
Matthiol.
ad Dioscor.
l. 1. c. 86.

Gesner. in
hort. germ.

Dodon.
pent. 6.
l. 5. c. 7.

pulposa: insunt tamen in nuper nascentibus foliola breviter acutave, sed hæc in adultis degenerant in brevissimas veluti squamas, totos surculos convestientes. *Crescit* sparsim variis montium locis; meridiano tamen sole gaudet. Nascitur & in Leucis montibus Spachia vocatis, & in Ida dicto Psilothri. Monspelii fert autumnus nuces, quæ per hyemem & æstatem durant. Apud Italos in Cæmeteriis colitur. Basileæ licet sæpe ex semine germinarit foliis juniperinis; nunquam tamen ad aliquam altitudinem adscendit. *Uusus* ligni ad struaturas, arcas & alia utensilia. Defossa tempore Selimi in loco uliginoso in Ægypto capsâ, quæ integerrima præterito seculo extracta est. *Cre-tica* infima parte recisa, ex parte radicibus proxima multis repullulat ramis. At eo loco in altum non attollitur, sed in crassum excrescit. Cæsalpinus *fæminam* ramis fastigiatis

esse; *Marem*, ad latera sparsis, re-liquit.

2. *Cupressus Novæ Hispaniæ*, in cælis Tlatzean, id est, *materia fragilis & vitrea* vocatur. *Forma* quæ vulgari Cupresso. *Rami* patuli ad latera diffusi, & terram prospectantes. *Materies* odorator. *Fructus*, quem toto anno fert, parvus, nucis avellanæ magnitudine. Familiaris novæ Hispaniæ, locis temperatis. Seritur viviradice. Jus decocti rigores febrium sedat; pulvis ex aqua potus febres.

3. *De arbore Cupresso simili in Syria*, quæ Camerario forte *Cedrus major Dioscoridis*, Guilandino hæc *Thyia Theophrasti*, & *Abbel*, Rauwolfio *Tæ* arbor Cupresso similis, ex qua gummi *Taxa*, nihil habeo quod dicam, nisi in Syria, Ægypto, & Arabia nasci, & fructum pillularum cupressi magnitudine, colore rufi in nigrum declivi ferre, qui *Abbel* dicitur.

TITVLVS III.

De Arborum succis & humoribus.

CAPVT I.

De Succis arborum inspissatis.

Quod animalibus sanguis, id plantis succus est. Turget hic sæpe, & ideo vel sponte profluit, vel incisione emittitur. Deficit sæpe, & ideo ipsæ plantæ tabescunt. Multæ quidem ejus differentiæ, ut in præparatione dictum est; sed quæ ad *χυλόν* & *ὀπὸν* in genere reduci possunt. Quæ plantæ nutriuntur, & semper tenuior, *χυλός* est proprie; non sponte, sed præmissa expressione, vel aliqua alia convenienti præparatione, elicitur, induraturque, si exsiccans calor supervenerit. Crassior *ὀπός*, & interdum incisione, interdum sponte lacrymæ instar delabitur, inde *lacryma* seu *δακρυόν* nomen; quæ si oleaginosa, *Resina* est: si terrestris & aquea, inque truncis arborum concreta, *Gummi* vocatur. De tribus itaque agemus: *Succis* nempe *inspissatis*, *Gummatibus*, *Resinis* & *Pice*, liquores alios, de quibus sparsim egimus, omitturi.

Succi inspissati sunt: 1. *Ammoniacum*. 2. *Acacia*. 3. *Manna*, quibus succos aliquot exoticos subjicio.

1. *Ammoniacum*, si veteres confulas, in Lybia prope Jovis Ammonis seu Hammonii templum ex sua arbore stillat. Duplex est Dioscoridis & Plinio; Unum *ῥαύσμα*, seu *ῥαύσον*, quasi fragmentum dicas, quod bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris masculi similitudine, sincerum, densum, nulla sorde spurcatum, castorei odore, & gustu amarum. Alterum *Phyrema*, id est, niscella, quod calculorum & terræ particeps est. Sunt, qui Pauli & Galeni Ammoniacum a Dioscoridis diversum putant, quod id inter thymiamata referatur, & Coriandri odorem referat: nisi & talia in thymiamatum compositionibus apud antiquos occurrerent. Ut ut sit, calidum est.

H h 2

Aben-

Succi arborum inspissati.

Dioscor. M. 1. 3. c. 98. Plin. H. N. 1. 12. c. 23. & 1. 24. c. 6.

Bellen. observ. l. 1. c. 17.

Bauhin. ad Matthiol. l. 1. c. 86. p. 117.

Succi arborum in primo, Abenroï in tertii fine calidissimi inspissati, dum. Mollit, calefacit, discutit, dissolvit. Lienem cum aceto drachmæ unius pondere potum absumere creditur; imminuere, si cum aceto & cera Cypria vel rosaceo imponatur. Dispnoicis efficacissime prodest. Tophos & nodos, qui circum articulos occalluere, dissolvere comperit. Alterum *ταράσσειν καὶ ὑπάγειν* Dioscorides prodidit, si hauriatur. *Advehitur* nunc in magnas glebas coactum, grumis magnis constans, unguibus lactei coloris nitentibus aut rufis, per coloris obsoleti & fusci substantiam permistis, odore Galbani virosiore, sapore amaricante. *Elige* sincerum, minime arenosum, purum, majoribus grumis, foris flavis aut croceis, intus candidioribus, quod claram flammam, cum accenditur, alit: in manibus cum lentore tractatum mollescit, repentinoque ictu, propter densitatem aridiorem, in plures splendoras, nitentesque micæ dissilit. Solvitur aqua.

II. *Acacia duplex est: Ægyptiaca nempe & germanica.*

I. *Ægyptiaca* *Acaciæ arboris* ibidem nascentis *ἐγχέλισμα* expressum, & in umbra siccatur. Fructus maturus *nigrum* fundit, immaturus *subflavum*. Sunt, qui & ex foliis simul exprimunt. *Ufus* est in refrigeratione & adstrictione. Refrigerat enim in secundo, exsiccat in tertio. Partes tenues & calidæ, quæ per eam disperguntur, unde & acrimoniæ capax est, lotionem evanescunt. Laudatur in muliebri fluxu & oculorum procidentia veteribus, alvique fluxu. Et torrere supra prunas suspensam, & urere in camino cum ipso fictili fuetum olim. Ulcera sedis insufflata ad cicatricem perducere, notavit Galenus. *Eligenda* modice fulva & odorata. Arabes & hodie ex filiquis immaturis, foliis, floribus & fructibus exprimunt, frequentissimi apud se usus. Comperit enim vehementer prodesse, in dentium vacillatione, si in pulverem redacta cum de-

cocto dentibus adspargatur: in sanguinis sputo, si in liquore conveniente drachmæ unius pondere adsumatur: in fluxu muliebri, si in clysteribus dissoluta adplicetur: in articulorum debilitate, si in fomento adponatur: in podagricis defluxionibus, si cum aceto in linimenti formam redacta, illinatur: vel ejus decocto pedes fomententur; absterfi, linimento ex *Acacia* cum *Opobalsamo* & aceto unguantur. 2. *Acacia germanica* ex prunis sylvestribus coctis exprimitur, insolatur, exsiccat, *Acaciæ veræ* loco adservatur, & tessellatim dividitur. Utimur hodie ea in *Theriaceæ* compositione.

III. *Manna est octuplex: 1. Δροσόμελι. 2. Liquida. 3. Officinarum. 4. Persica. 5. Armeniaca. 6. Amynthæ. 7. Israëlitarum, & 8. Polonica.*

I. *Manna δροσόμελι*, Galeno & *ἀερόμελι* dicitur, Arabibus *Men*, *Siracost*, & *Terniabin*, Serapioni & *Abensinæ* *Thereniabin* & *Trungibin*, Cæsalpino *Mel roscidum*. Venit hæc, si *Veteres* sequimur, ἐκ τῆς αἰθρῆς, maxime syderum exortu, τῶν ἀστέρων ἐπιτολαῖς, præcipueque ipsa Iri impendente, (male forte in Plinio, ipso Syrio splendente, quamvis sub ἐπιτολαῖς comprehendi possit; & expresse Aristoteles, ὅταν κατασκέψη ἡ Ἥρις) nec fit omnino prius *Virgiliarum* exortu, (oriuntur VI Idus Maii, seu X Maii ex nova computatione) sublucanis itaque temporibus cum prima aurora, folia melle rosida inveniuntur: ac si matutino sub dio fuere, unctas liquore vestes, capillumque concretum sentiunt: sive, addit Plinius, ille est cæli sudor, sive quædam syderum saliva, sive purgantis se æris succus. Quamvis vero de quarumlibet plantarum foliis hoc concipi possit: maxime tamen in quercu & tiliæ frondibus, propter illarum πυκνότητα, & quod ἐνίμα sint, reperitur. Inter Arabes convenit de cælo super terras etiam & lapides cadere: in reliquis vehementer variant, & sæpe *Mel æereum* cum *Manna liquida* & *Officinarum* confundunt. Rha-

Dodon.
pemt. 6.
l. 1. c. 15.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 9. & l. de
melle.
Aristot. H.
A. l. 9. c. 22.
Plin. H. N.
l. 11. c. 11.
Cord. H. P.
l. 4. c. 112.

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 133.

Rha. l. 3.
c. 29.
ses

ses supra arborem Malvaviscam cadere scribit; mora albescere, & cito collectam viridem. Calidam eandem alvum solvere & lenire guttur. Habice auctore, melior cui color clarus ad albedinem vergens, quæ non nihil rufescit, & e ligno colligitur. Adstringit ventriculum, confertque aquæ Citrinæ pota & ventri impo-
 sita: quod sane difficulter intelligi potest. Exsiccat catarrhum eidem, si drachmæ unius pondere, in caput-
 purgio usurpetur. Abonsinæ coagulatur sicut mel, siccatur ut gummi, & semper aliquid de arbore, supra quam cadit, participat. Colligitur in Casgram & Buccara. Abenroes ex speciebus antiquæ Mannæ esse, & a partibus superioribus Syriæ & Indiæ provenire prodit, similem saccharo in virtutibus, purgareque choleram debilius. *Duplicem* Mesue facit. *Unam*, quæ lapidibus incubuit, & guttarum aut feminis modo coagulatur; quæ si recens, dulcis, alba, aut subcitrina melior; si antiqua, cœnosa, fusca, illaudabilis. *Alteram*, quæ Plantis, a quibus facultatem fortitur, foliis & floribus permixta. Temperata utraque; guttur, thoracem & ventriculum lenit, bilemque clementer purgat, si a drachmis sex ad quindecim propinetur: servaturque in annum. Foliis sennæ & saccharo adulterata, prodit, si liquefiat, dolum. Exhibetur etiam pueris & gravidis. Non abeunt a Veteribus RECENTIORES. Vaporem terræ succosum & optimum dicunt, qui æstatis calore elevatus, & in aëre in dulcem liquorem excoctus, noctis frigore coactus, roris modo supra arborum & fruticum folia decedit. Diversam a Melle vel exinde colligas, quod raro in calidis etiam regionibus decedat; tempore matutino duntaxat reperiatur: in arboribus concresecat; nec ætatem ferat. Colligitur apud Indos maxime, ubi Persis *Xercoft* & *Xercest*, id est, lac arborum audit. Sapore favi mellis, & in utribus conservatur. Raro in Italia decedit: habetur tamen, nec densatur ita. Visa & in Portu-
 gallia, si Manuelli Ciriio nobili Bel-

gæ credimus, moxque in speciem Sacchari densatur. Felicis anni quando cadit prægium. Sed & in Chile stato tempore ros quidam decedit in quibusdam vallibus, ita spissus, ut coactus frondibus, sacchari instar, adhæreat, suavis, & ejusdem fere cum Manna usus.

2. *Manna liquida*, Hippocrati Mel Cedrium, *Ros Libani* Græcis, & *Ter- niabin* Arabibus ac Turcis Bellonio, *Manna mellis instar liquida* Linschotano, in plantarum quoque foliis provenit, *δμογενὴς τοῖς δένδροις*. Tanta aliquando Galeni tempore, post calidam aëris temperiem frigidamque noctes descendit, ut rustici Jovem melle pluere dicerent. Raro visitur in Græcia, in monte Libano quotannis. Itaque coria super terram extendunt, concussisque arboribus, quod defluit in ollas reconditur. Colligitur & in monte Sinai a Calojeris, & Cairum vanum defertur. Quid si sit potius exudans e Cedris liquor? Non tam bene ros horum foliis, quia admodum tenuia, adhærescit. Et si sit, cur non aliis quoque arboribus insidet? Laricea sole illucens liquefit; quid si eadem hujus fors? Non purgare etiam libræ mediæ pondere sumtam, Bellonio debemus. *Abire* ab ista, quæ in regno Neapolitano *liquidam* & melleæ consistentiæ, roris instar, decedere, Altimarus prodidit, dicere ausim. Tam enim plantis noxia, ut protinus folia earum tabescant. Nec melior segetum fortuna. *Adfinem* illam credo, quæ in Germania, super Laricis, Amygdali, Persici, & Quercus folia demissa, flavescit, iisdemque Syrupi instar insidet. Suidas quoque melle frondibus in India defluere dixit.

3. *Manna Officinarum* est triplex: 1. *Laricea*. 2. *Calabrina*. 3. *Montis Apennini*.

I. *Mannam Officinarum Lariceam* ex Larice habemus. Vidit Bellonius montis latus laricibus consitum ita albere, prout pruina hyeme arbores convestiunt. Quia nihil resinosi recipit,

Abonf. l. 2.
tr. 2. c. 489.

Mesue cap.
de Manna.

Altimar. l.
de Manna.

Bauhin. H.
P. l. 8. c. 11.
p. 184.

Garf. ab
horto H.
A. l. l. c. 11.

Succi ar-
borum
inspissari.
De Laet
Ind. occid.
l. 12. c. 1.

Hippocr.
l. de ulceri-
bus.
Galen. de
aliment. fa-
cult. l. 3.
c. 39.

Bellon. l. de
Coniferis.
Bauhin. H.
P. l. 8. c. 11.
p. 190.

Succi arborum inspissati. Matthiol. in Dioscor. l. 1. c. 73. Lobel. ad. vers. p. 25. Tonner. obs. med. p. 318.

Bellon. l. de arbor. coniferis. Bauhin. H. P. l. 8. c. 11. p. 191.

Lobel. Ad. vers. p. 25.

Apollo rad. 1. supra tripher. Persicam apud l. c.

Akomarus l. d. Manna.

sipit, & in pratis invenitur, Matthio-
lo prodente, vix e Larice exsudare
dixero. Fateor tamen, quæri posse,
cur supra Larices potius, quam alias
herbas concreseat? posseque Elæo-
meli Lobelii opponi. Triplex vero
ista: I. *Germanica*, quæ sæpe in Sty-
ria, agro Goritienfi & Tridentino,
in Ananienfibus montibus colligitur,
granis mastichinis. II. *Gallica*, quæ
vel *Briansona*, vel *Brigantina* vel
Ambrinensis. De hac quidem nihil
occurrit singulare. 2. *Briansonæ* gra-
num est compactile, pingue, dulce;
grumi alii Coriandro pares, rotundi;
alii oblongi majoresque, colore albi-
cante, & cum inveterascit, flave-
scente, consistentia cerea, sed in ore
liquefcente, dulcedine saccharina. *Pro-*
venit ad Gallo provincias & Allobro-
gum Alpes, & colligitur ex Larice,
in altissimis montium summitatibus.
Est per totam Galliam celebris, mo-
do recentioris, purioris, & candidio-
ris grani habeatur delectus, qualem
se effractis e larice furculis copiosam
habuisse Lobelius scribit. Educit e
primis venis & jecore biliosa, e pul-
mone phlegmatica, si ab uncia dimi-
dia ad tres exhibueris. Est vel *secca*,
quæ ante Solis exortum colligitur; in
mediterraneis magno venire solet, in
urbibus ad montium radices quatuor
assibus libra: vix tres a viro colligun-
tur. Vel *liquida*, cui Solis igniculi
vim intulere, deterior, nec tanti ideo
pretii: vel in umbra sub arbore lecta,
post quam imminente Sole fasces ar-
borum securibus in terram decussæ
sunt, quæ post unum & alterum an-
num corrumpitur. 3. *Brigantina* a
Brigantio Cænomanorum oppido no-
men habet. Vel est *candida*, quæ se-
lecta nec vitiata, dulcis est & gustu
jucundissima, minuta, melleam dul-
cedinem representans: vel *livescens*
tenuior, pineis festucis, furculis, her-
bulis & foliolis obvoluta, subductio-
ne aliis ignavior: ad alios usus, ut &
lenitionis opera, vix subdupla effica-
cissima.

II. *Manna Officinarum Calabrina*,
Monachis *Manna arborea*, ex Fraxi-
no & Orno, in Calabria a Samnitibus

& Vestinis, qui Garganum montem
incolunt, colligitur. Multa de illa
singularia occurrunt. In nullis ea
regione arboribus invenitur, Fraxi-
num & Ornum si exceperis: sed nec
his omnibus. Particulares & deter-
minatæ sunt, & tanquam vestigal
singulis pensuræ annis coëmuntur.
Singulis sub Cane & ante Canem die-
bus, quo tempore jam germinare desi-
erunt, in illis reperitur, cum non in aliis
Fraxinis & Ornis, modo vel imbres vel
vehementiores venti non impedian-
t. Pluvia ingruente solvitur & evane-
scit, quod primis Augusti imbribus
observatum est. Majo & Junio, Ca-
niculam antegressis, intra cortices con-
tinetur, paulatimque cocta, acceden-
te ardentis Syrii æstu, arescente cor-
tice & fisso foras extrahitur, ejusque
beneficio iterum in grumos & gum-
matis quasi granula concrevit. Visa
nec incisis corticibus ante Canem ema-
nasse, ex Ornis inprimis, seu protru-
so a natura arboris superfluo, seu a
Solis calore foras evocato, seu ob
utramque causam. Aliquando enim
sponte emittitur, per incisionem ali-
quando & majore copia, imo post
collectam, reliqua exsudare solet. *Mo-*
odus incisionis diversus. *Quidam* fa-
ctis aliquot in caudice incisionibus,
sequenti die colligunt. *Alii* incisis
aliquot ante diebus inferioribus par-
tibus, primam colligunt, alteram ef-
fluere sinunt, ac denuo colligunt.
Nonnulli neglecta quæ per primas
incisuras effluit, superiores arborum
partes findunt, effluitque dulcior &
suavior, quod per primas impurior,
crudior, & amarior humor effluxerit.
Inter observata habetur, a cali-
do condensari liquorem & fieri du-
riorem, ab aqua solvi. Siccio-
rem evadere, si Aquilo modice noctu fla-
viffet: meridie, soleque magis ar-
dente candidiorem reddi; collectam
contracta humiditate soli expositam
albidior & durior evadere. Ad-
de his, adnasci cortici *vesiculas* quas-
dam seu tubercula, quibus disruptis,
liquor primum albus, dulcis, in opti-
mam Mannam conversus, mox mi-
nus albus, liquidior, tenuior, sed
dulcis emanare visus est, qui a super-
venien-

veniente sole coagulatus, & albedi-
ni suæ redditus, similis priori evasit:
sed ubi diu permansisset, nimis ex-
coctus, inutilis redditus est. Et ut
tandem finem faciam, visæ exsugere
cortice perforato lacrymam illam *Ci-
cadæ*, quibus abactis ex iisdem fora-
minibus liquor dulcis profluit, ut a
sole in grana coactus. In *Ornis* fis-
sis & soli expositis reperta haud par-
va Mannæ copia, quæ non ex corti-
ce, sed lignosa ac veluti medullosa
substantia manabat. Ramos magnos
Laricis & *Fraxini* præcisos, & in cel-
lam vinariam, quo æstatis tempore
Manna colligitur, adportatos, Man-
nam postero die, quanquam non per-
inde nitidam, ostentare. Lobelius
auctor est. Sunt denique, qui vide-
re, cum in quadam sylva carbonem
pararentur, ex Orno vicina Mannam
sudasse, & ab ignis calore coagula-
ram. Hinc collige, de calone veni-
at, quod de aërea diximus, an in ipsis
arboribus nascatur. Mirum quod de
Loco *Brasavolus* habet, a Regina Nea-
politana acceptum, statutis in Oeno-
tria locis ab omnibus passim colle-
ctam. Occluso a Regibus Neapolitanis
loco, ne quis sine veltigali colligeret,
nullam comparuisse, rediisse recluso.
Et sic iterum atque iterum factum, do-
nec omnibus colligere permetteretur.
Vires & *usum* si spectes, quia cum
obscurum amarorem dulcis, nec multo
crasso lentoque humore plena, est
moderate calida. Hinc laxandi, mol-
liendi, abstergerendi, & incidendi fa-
cultas. Tutissimum omnibus in pur-
ganda bile medicamentum, corrigi-
turque in febribus ardentibus syrupo
rosarum solutivo. Licet ad quatuor
uncias adscendere: optimeque ex de-
cocto aliquo, prunorum vel galli gal-
linacei iusculo sumitur. Ingreditur
syruporum, conditorum, confectio-
num &c. compositiones. Cum Tar-
tari cremore formatur in tabellas,
sub Mannæ tartarizata titulo. Du-
rat paulo ultra annum. *Diversita-
tem* ab Arboribus, ramis, foliis, in-
cisione, figura, & qualitate sortitur.
Est namque 1. *Fraxinea*, quam folia
magis, rami in ea parte, qua folio-
rum pediculi iisdem adnectuntur, fun-

dnnt. Superflua nempe in *fraxino* Succi ar-
borum humiditas, quæ non tantum per cau-
dicem diffundi & transmitti potest, inspissati.
sed & ad exortum foliorum, ipsa adeo
folia pertingit, perque eorum poros
exsudat, & a sole conficitur. Majo-
re eadem copia, & non nisi meridie
& calidissimis diei locis colligitur. 2.
Ornea, quæ a caudice potius & ra-
mis, quam foliis & surculis, & qui-
dem minore copia funditur. Saxis
enim magis montosisque & ficciori-
bus locis cum gaudeat, non adeo su-
perflua & tenui humiditate turget,
ut ad folia & exiliores ramulos pre-
tendi possit: cum scabrosa eadem,
facile priusquam ad folia aut surcu-
los proveniat, in caudicis crassiorum-
que ramorum cortices absumentur.
Tertia vel quarta ab ortu solis hora
colligitur, quod, quia terrestris, a
remissiore calore coagulatur: aliquan-
do & ante solis ortum, si pridie vel
inclinante sole profluxit, aut flante
per noctem Aquilone coagulata est,
ne aridior, sole superveniente, in pri-
mis si sponte profluxit, evadat. Ama-
rior eadem. 3. *Foliorum* seu *Fron-
dacea*, quæ ex foliis & eorum pedi-
culis colligitur. Aptant rustici folia
& veluti tegete extendunt, plantant-
que latiorum foliorum arbores, ut
aptius colligatur, & parum supra
aliud quid cadat. Sincerior, dilutior,
ac tennior cæteris magisque conco-
cta & dulcior est, & de foliorum vi-
ribus contra serpentum ictus aliquid
participat. 4. *Corporis* seu *ligni* &
trunci, quæ ex ligno & caudice &
ramis, aut sponte aut vulnerato cor-
pore habetur, deterior quidem, sed
crassior & corpulentior. Sponte quæ
emanat, laudabilior cæteris: quæ in-
cisione in ardentibus febribus, alvi
fluxibus, calida aëris constitutione,
temperamento fervidiore caute casti-
ganda. Prima incisio turbidam dat,
nauseosam & cum maiore amaritudi-
ne, calidiorem ideo. Sequentes, pu-
riorem & dulciorem magis. 5. *Ter-
rea*, quæ in terram funditur & pe-
tras. Quia arenulis permiscetur, co-
lore est livente, valde crassa, insipida, Brasavol.
in examine
simplic. & minus sincera. 6. *Granata*, quæ
minoribus granulis constat. 7. *Ma-
stichi-*

Lobel. l. c.

Brasavol.
in examine
simplic.

Succi ar-
borum
inspissati.

stichina, quæ oblongis, translucens, gravis, mastiches in morem lenta primum, mox facile liquefcens, alba & suavis. 8. Optima est quæ pinguis, quadantenus translucida, mastiches quam simillima, sapore suavi & cum dulcedine modice linguam mordente, anno non vetustior, candicans. Arida, cinerei coloris, nauseosa, morsu carens rejicitur. 9. Adulteratur saccharo penidio herbarum foliis circumvoluto, amylo, farina, rebusque similibus. Quidam scammonium addunt. Quæ folia fennæ granis suis amplectitur, factitia est.

3. *Manna montis Apennini*, in Apennino monte quandoque in Canticularibus promiscue in pluribus arboribus, sed præcipue in quercu & salice colligitur, nunc concreta similibus Calabriensi, nunc liquidior mellis similis, ut Cæsalpinus notavit. Vifa & A. 1572. locis amoenioribus æstatis tempore in salicibus, copiosa, albissima, sacchari dulcedine. Erasmus nos, inquit quidam apud Stapelium, per id tempus disciplinæ auditores, intellexeramus tamen a præceptoribus nostris manna esse. Quod diligenter perquirentes, an verum esset, quod ab ipsis & reliquis cum Galeno ferebatur, locum, in quo Manna copiosius habebatur, consideravimus, summo mane Julio mense ad id profecti, invenimus parvarum quarundam apum numerosam congeriem. Non erant quidem apes, sed culices crassi, quos ob officium apes parvas dicebamus: Quibus inerant tria aut quatuor foramina, in partibus corporis, quæ in eisdem prominebant ad parvarum formicarum speciem. Per hæc itaque foramina guttæ quædam parvæ, albissimæ, sudoris modo eliciebantur, quas ros esse dixisses, si copiam guttarum cadentium, ex loco salicis, in quo congestæ apes erant, considerasses. Erat autem non unus earum grex, sed plures quam 50. in sinuulis autem gregibus innumerabiles apes, quæ locum unum non ultra diem aut noctem tenebant, deinde in aliud transvolabant: semper tamen arboribus insidebant, cum quodam bombo

sonitu apum, a quibus sudor guttatim defluens, aut folia arborum, aut subiectos lapides tegebat: quod vero in arenam & sordida loca defidebat, peribat, reliquum colligebatur ad usus. Erat hoc purissimum manna, albedine, dulcedine, consistentia, & efficacia probatum, &c.

4. *Manna Persica* est duplex: 1. Garz. ab *Granis Coriandri*, sed majoribus, calore inter rufum & rubentem medio, forma & sapore Mannæ larignæ simili. Colligitur de spinoso frutice *Agul* & *Albagi*, nec non aliis floribus & foliis, sub nomine *Transchilel* Arabibus, Indis sub *Tiriam jabin* seu *Trumgibin*. Copiose Alepum in utribus fertur, maximusque ejus in Persia & Armuzii usus, quia vulgari præfertur. 2. *Calabrinæ similis* seu *Mannæ tertium genus* Garziæ, quæ magnis glebis, admistis plerumque foliis ex Baccara urbe Persica defertur, plurisque æstimatur. Habetur & Alepi. Nota vero 1. Ex Syria longe candidiorem Italica Mannam adferri, eamque duplicem, *Mastichinam* nempe & *Bombycinam*; quarum *Mastichina* translucida est, *Mastiche* similis, parvis granulis, efficacior; seu ut Apollo habet, in quosdam quasi grandinis callos, niveosque globulos densata habetur Venetiis. *Bombycina* vero minime translucida, crassioribus gossipii micis, cujus floccorum refert effigiem. *Mastichinam* hanc senio exhaustam quidam putant, quæque saccharo multo, farina miliacea aut hordeacea, aliisque miscellis vitiata sit. Liquefcere ad solem & ignem, experimento Altimarus docuit. 2. Advehi & Goam in utribus ex Armuzio melli rancido depurato perfimilem, quæ facile, quod vitreis lagenis non servetur, vitium capit. 3. Habuisse in urbe Cochinchin Brachmanen factitium quoddam Mannæ genus, quod ex amylo purissimo, Mannæ Calabrinæ simili, scammonia, & seminis genere visa dicto, quod ex Bengala defertur, & Lathyridis grano simile est, &c. cum saccharo parabatur, & soli exponebatur.

5. De

Stapel. in
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 9. p. 151

Garz. ab
hort. H. A.
l. 1. c. 11.

Rauwolf.
in itiner.
Linschot.
Ind. orient.
p. 4.

Garz. l. 6.

5. De *Manna Armeniaca* hoc tantum habeo, frustis esse pugni magnitudine, fusci coloris, forte *Manna Albagiezi*, Avicennæ, ut Rauwolfio placet.

mitata fuerit hæc Dei benedictio, cum Succu arborum frumento vescerentur; borum quod denique Man, quod iussus est inspissari. Aaron recondere per ætates adseruandum, non compotruerit.

Rauwolf. in
itiner.
Athen. Di-
gnos. l. 2.

6. De *Manna Amynthæ*, scribit ex ejus libro *περί Ἀσίας σαδμῶν* Athenæus. Componebatur decerpita cum foliis, fingeatur, *εἰς παλάθης συριακῆς τρόπον*. Quidam globos ex ea faciebant, & ubi sumere collubium, defractas ex iis micas, in ligneis poculis, quas *ταβαίτας* vocant, dilutas & colatas bibebant, gustu mellis simili, si non jucundiore. Stapelius vulgarem Mannam esse credit. *Παλάθη συριακή* vel est massa caricarum pinguium, qualis ex Syria adfertur: vel palmularum, quæ in massam olim compingebantur,

7. *Manna Polonica* tenuissimorum & subalborum granorum est, & ex foliis arborum aut herbarum enasci, feri, crescere videtur. Sed cum nullum semen habeat, nullibi plantari possit, & facile ex foliis dejiciatur, ex aëre decidere Poloni credunt. Germani *Schwaden* vocant. Venit in folius alimenti rationes. Est & aliud hujus *genus*, quod ruri prostratum, subtile & saccharo simile, dulciusque, cum butyro modicoque saccharo decoctum, inter delicata fercula referri potest.

Martinus
in Lexico
philos. sub
voce Man-
na.

Exod. 16.
Numer. 11.

6. *Manna Israelitarum*, est Man illud, miraculosum & extraordinarium, seu miraculose & præter naturæ ordinem a Deo creatum, quod in deserto ex aëre & nubibus, noctu cum rore in gratiam Israëlitarum descendebat. Erat tenuissimum & sicut pruina super terram, figura rotundum, quasi semen seu granum Coriandri, colore bdellii Arabici scilicet, ideo album, saporis dulcissimi, & velut epichyti ex melle. Pistillo contusum & in olla coctum, succi pinguis instar erat, unde placenta. Colligebatur mane ante solis exortum. Nam incalescente sole liquebat. Incognitum antea Israëlitis, & extraordinarium vel ex eo colligas, quod non ante adparuerit in deserto, quam ex mandato Dei hora condicta fuisset a Mose; quod nulla aëris mutatio obstiterit, quo minus æquabili tenore stillaret; quod copia, quæ universæ multitudini sufficeret, reperta sit, quum Homer unum acciperent in singula capita; quod die sexto duplicata fuerit copia, ut alterum Homer in cibum sabbathi ponerent; quod si quid fervarent præter justum demensum, putredini obnoxium fuerit, cum sabbatho maneret integra altera portio; quod quocunque profecti semper eos co-

8. *Elæomeli Lobelii* historiam verbis ipsius describemus. *Ex olea, inquit, arbore vulgari perquam amara tota & ingrata cortice, caudice, fructu nondum sale condito, emanare Manna vere melleum, non solum colore, sapore; sed & duratione incorruptum experti sumus. Habemus namque partim jam duodecim abhinc annis collectum a Rondeletio aliquot uncias; partim a nobis quinque abhinc annis in tenellis ramis & stipitibus. Tunc enim rimosis e corticibus, partim scalpello sauciatis, satis excepimus. Verum nonnisi propemodum matura oliva ac nigricante vel purpurascante, quam Novembri & ingruente hyemis seruitia decerpunt, quisquam reperiet Mel istud. Ideo plebecula interdum tantam copiam ramis adgestam se vidisse una & altera die post Catharinæ festum aiebat, ut aviditati explendæ & pueri & mendici certatim eo confluerent. Plurimum ferebatur Lunellæ exstillare præsertim sectis majoribus truncis, e quibus initio melle liquidior latex glutinosus effluebat, postea inibi residens aliquamdiu densior evadebat, atque non tam Mel, quam Manna verum præ se ferebat specie, gustu, sapore, omnium judicio.*

Lobel. Ad-
vers. p. 25.

IV. Succu Exotici sunt tredecim sequentes:

K k

L Succus

Succi ar-
borum
inspissati.
Clus. Exot.
l. 4. c. 8.

Bont. Me-
dic. Indor.
p. 150.

Lorichius
de gummi
gotta.

Hartmann.
piaris chy-
miatr.
p. 150.

Reuden. de
gumm. eo-
dem.

Clus. Exot.
l. 4. c. 7.

1. *Succus laxativus ex flavo rufescens*, qui aliis *Gummi de Goa*, *Gummi Gith*, & *Gemon*: aliis *Chittagemon*, *Cattagauma*, *Chittajaman*: aliis ut Fabricio & Rosenbergero, *Gutta Gambæ*, *succus Gambici*; *Gummi Indicum*: nonnullis, *Gutta gamandré*, *Gutta munda*, *Gutta Gemau* vel *Gemu*: quibusdam *Gummi Peruvianum*, ad *Podagram*, *Gummi gotta* vel *gutta*, vere *gutta Cambodia* vocatur. Lacryma est, quæ ex specie quadam *Tithymalli*, scandente, & maxima copia in *Cambodia* regione *Chinæ* vicina proveniente, effluit. Ideo male quidam *Euphorbii* vel *Rhamni solutivi*, vel *Cataputiæ* succum suspicati sunt. Nec melius, qui aut ex scammonio & thitymallo, aut ex *Chelidoniæ* majoris succo scammonio & Croco compositum putavere. Erraverunt, qui pro *Corticis mediani* frangulæ, vel *ricini Indici* succo expresso & exsiccatō habuerunt. Fulvus est, & saliva vel aqua paulatim tinctus, flavo colore inficit. Nulla ei amaritudo, sed degustatus, magnam in gutture acrimoniam excitat. Vis ei solutiva potens, & ita ventriculum vellicat, ut *ἀνω καὶ κάτω* se exoneret. Rejicitur per os tenax & crassa pituita: per alvum serum biliosum descendit. Ideo in hydrope, arthritide, asthmate, scabie, pruritu, & aliis morbis in usu. Dosis pro ratione ægri variat. Prudenter inter grana duodecim subsistes. Datur in potionibus, pilulis, pulvere, electuariis &c. Corrigitur spiritu Vitrioli: quidam oleo Cinnamomi, feniculi, Macis, uti malunt. Reudenius aquam betulæ laudat. Sunt, qui cum *Cre-more Tartari*, *Tartaro vitriolato*, *Mercurio dulci*, *jalapa*, & aliis miscent. Habetur ex eo & *Magisterium*.

II. *Succus splendens Anethi* odore, cui *Usub* & *Gyp* apud Clusium inscribitur, Ater erat, splendens, non injucundi odoris, sed qui ad anethum quodammodo accederet. Incolis in suffumigiis dum domi cadavera servant in usu: nec non contra ventriculi dolores, inductis eo corticibus.

III. *Succus Aspalatho similis*, qui Clus. Exot. l. 4. c. 8. triplex: 1. *Anethi* odore, Clusio *succus primus ἀσφάλτω* similis, qui ater erat durus & solidus, odore anethino, sapore non ingrato quidem, acrisculo tamen. Manibus emollitus, lentior fiebat; flammæ admotus, resina instar liqueſcebat; ore retentus, cedebat dentibus. Nautis ad fili stamina picis aut ceræ vice inducenda in usu. 2. *Ater*, micis albis adspersis odoratus, cui unguis imprimi poterat. Sapor cum nonnulla acrimonia. Concipiebat & flammam. 3. *Inodorus*, qui in micis potius diffilliebat, quam manibus emolliri posset. Alicujus in mandendo acrimonia.

IV. *Succus colore, flavo, fusco, & albo mixtis, anethi odore*, cui substantia lenta, sapor anetho acrior, & qui linguam vellicaret, & fauces incenderet. Saliva madefactus croceo colore tingeat. Incensus flammam concipiebat, liqueſcebat, sed non ardebat. Clusio *succus quintus*.

V. *Succus Cinericius feniculi odore*, qui resina potius quam succus, & quidem adeo strigosa & retorrída, ut gleba aut lapidis fragmentum potius videretur. Igni admotā ardebat.

VI. *Succus atrorubescens inodorus*, Bauhin. H. Clusio *decimus*, qui tam durus, ut in pollinem potius abiret, quam dentibus cederet. Leviter saliva adspersus rubro colore, terræ *Synopicae* instar tingeat, cum quadam levi flavedine, saporis omnis expertus. Igni admotus nigrescebat, & consumebatur. Terræ potius genus, quam resina.

VII. *Succus flavus albis granis commixtis, gravi odore*, Clusio *quartus*, cui grana friabilia, sapor acris. Flammæ admotus liqueſcebat.

VIII. *Succus visco similis colore vario*, qui ex parte nonnihil candicabat, ex parte cineraceus & nigricans erat. Igni admotus visci instar lentus evadebat. Similis huic, multiplici spira circa bacillum convolutus, extra fuscus, intra candicans, & fra-

ctu

Et adeo contumax, ut lignum potius esse videretur. Nam & ei igni admoto & flammam statim concipiente, idem cum visco lentor.

Clus. Exot.
l. 4. c. 8.

IX. *Succus Mastichinae resinae non absimilis*, qui minus albus, friabilis, resinae instar, manu emollicus haud ingrati odoris, saporis aliquantum aëris. Flammam concipiebat, sed quæ statim exstingueretur. Clusio *sextus*.

X. *Succus succino non absimilis* Clusio *septimus*, qui transparens & lucidus, colore ex albo flavescente, odore non injucundo, sapore primo amariuscule, mox acriuscule. Nil in eum dentes: ad ignem liquebat & ardebat.

XI. *Succus sanguini Draconis adfinis*, Clusio *duodecimus*, qui eleganti & vivido Cinnabaris colore tingebat. Fragmentum erat in planam massam redactum, semiuncialis fere crassitudinis, quod lucernæ adhibitum, li-

quescebat. Forte Draconis arboris purius & defæcatum gummi, Succus arborum inspissati.

XII. *Succus Camphoræ redolens*, Garz. H. A. l. 1. c. 15. qui ex Canellæ vulneratæ radice prodit. Acoſta liquorem e viridi cortice radicum præsertim inciso esse scribit. Sed vetuit Rex vulnerari radices, ne arbores perirent.

XIII. *Succus arboris Brasiliensis*, Pifo de facult. simpl. l. 1. c. 9. Caopia dictæ, qui cortice ejus, quando florere incipit, inciso, & per unum alterumve diem sibi relicto, elicitur.

Mollis est croceo ruber; induratus, Chitrajemu coloris & consistentiæ, e flavo paulo rufior. Tingit colore luteo sive aureo paulo saturatius. Solvitur in spiritu vini. Purgat, in aceto squillitico maceratus noctem, drachmæ unius pondere, si ex vino propinetur; vel quod melius, in pilulas redactus. Olim adfrictu in aqua solutus, tollebat impetigenes. Copiosior effluit, si extructo luculento igne, cortex dehiscat.

CAPVT II.

De Gummatibus.

Gumma-
ta.

Galen.
simpl. l. 7.
Aristot. de
plant. l. 2.

Alterum, quod arbores quædam fundunt, *Gummi* est, seu lacryma, in truncis earum concreta & coagulata. Quæ quia substantiæ magis aqueæ est, facilius aqueis solvitur, & igne crepitat.

Duplex autem hoc, vel magis nempe, vel minus usitatum.

I. *Gummata magis usitata sunt*:

1. *Gummi Arabicum*. 2. *Sarcocolla*. 3. *Cancanum*. 4. *Lacca Officinarum*. 5. *Anime*. 6. *Sanguis Draconis officinarum*. 7. *Camphora officinarum*. 8. *Gummi Juniperi*. 9. *Gummi Cerasorum* & 10. *Gummi Ulmi*.

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 133. Plin.
H. N. l. 13.
c. 1.

1. *Gummi Arabicum*, Dioscoridi κόμμι ἐκ τῆς ἀράβης, Plinio *Gummi ex spina Egyptia*, Celso *Gummi Acanthium*; Galeno *Gummi Thebaicum*, aliis *Babylonicum*, nonnullis *Gummi*

Acaciæ, diversum ab Arabico vulgaris usus, dicitur. Funditur ab Acacia, & Dioscoridi nonnunquam est ῥητινώδες & ῥυπαρόν, quod inutile; aliquando σκληροειδὲς ὑερίζον, διαυγὲς ἄζυλον, quod optimum: aliquando album, quod illi proximum. Plinius pretium in libras XII, denarios tres ponit, & colorem glaucum addit. Vis ei meatus obducendi, medicamentorum acrimoniam leniendi. Illicum cum ovo in ambustis pustulas excitari non finit. Hodie grumis concretum visitur. Nucis ponticæ aut juglandis magnitudine (sex juglandium aliquando) cum adhærente cortice cinereo, globosis, alias contortis, in se convolutam erucam imitantibus, pellucidis ex flavo pallescentibus, aut omnino flavis vel rutilis, extrema parte fere rugosis & veluti corrosis, fragilioribus quam Tragacanthæ, lentescuntibus tamen, sapore dulciusculo, humori, in quo mace-

Bauhin. H.
P. l. 12. c. 8.
p. 431.

Gum-
mata.

maceratur, lentorem viscidum conciliantibus. Sunt, qui nunc non adferri ex Acacia credunt, miscellumque esse, quod in officinis habetur, vel exinde colligi, quod diversa sit grumorum forma, colorque varius. At Alpinus exportari adferit, paucissimum vermiculari forma spectari, nec totum album vel clarum esse. Commiscri aliquando spinas & femina lenticulis & lupinis simillima, Bauhinus Lugduni observavit.

Dioscor. M.
M. l. 3. c. 9.
Plin. H. N.
l. 13. c. 10.
Galen.
Simpl. l. 3.

2. *Sarcocolla* lacryma est arboris in Perside. Dioscorides similem thuri tenui, ὑπόκιστρον, ἐμπικρον τῇ γέυσει facit; Plinius pollini thuris, cum quadam acrimonia dulcem: meliorem quo candidiorem. Vetustate & hanc maxime nigrescere. Huic & Mesue adstipulatur. Videmus & nunc Sarcocollæ grumos albicantes aut ex albo rufos, spongiosos, micis interlucentibus. Globosarum lacrymarum fragmina Pisi aut parvæ nucis avellanæ magnitudine, & tanta fragilitas, ut levissimo concussu frietur. Sapor cum obscura dulcedine subamarus, lentor sub dente. Ad candelam bullit primo, & in spumam attollitur, mox claram flammam concipit, odoris ingrati. Admiscuntur aliquando folia ex candido flavescentia, Tithymalli Myrsinæ foliorum æmula. *Adulteratur* gummi & alterius generis lacrymis. Frausprehenditur, si nulla amaritudo. *Nutritur* lacte asinino, calida est & sicca in secundo, ideo ventriculo bilioso noxia. Fluxiones cum vino tusa sistit, illinitur infantibus, glutinat vulnera, & ophthalmiis, nutrita inprimis, opitulatur. Dicitur & asthmaticis prodesse, pituitamque a nervis & articulis detrahare.

Bauhin. H.
P. l. 9. c. 31.
p. 208.

Worm. Mu.
p. 221.

Stapel. in
Theophr.

3. *Cancamum* Dioscoridi est lacryma Arabicæ arboris, myrrham quodammodo referens, βρομώδες (alii legunt ἐνδές) ἐν τῇ γέυσει. Plinius ex confinio Casiæ Cinnamique invehit scribit. Quid sit, certatur inter auctores. Serapio, Ægineta, Matthiolus, Stapelius Laccam esse dicunt; Garzias, Amatus & Dalechampi *Gummi*, quod *Ani-*

me vocant; alii Beniui. Per collationem detegatur veritas. Nobis adjecisse sufficiat inter thymiamata olim habitum, vestesque eo cum Stryace & myrrha suffitas. Datur lienosis, comitialibus, & suspiriosis, menses cum aqua mulsa pellere, oculorum cicatrices emendare; adversus gingivas humore prægnantes, & dolores dentium efficacissimum. Ex aqua denique & aceto bibitum extenuare obesos.

4. *Lacca Officinarum*, quibusdam *Chermes Arabicum*. Amato formicarum alatarum stercus, Malaiis *Calaculacca*, proprie *Lac* dicitur, quod in Lac seu mellis crassitiem, quando ejus usus est, dissolvatur. Male *Aec*, *Anculsal*, *Sac*, & *Lac* adpellatur. Hæsitabant circa ejus naturam olim Arabes, nuper & Garzias. Quidam Cancamum voluere, quibus & Scalliger accedit. Paulus gummi herbæ simile Myrrhæ, boni odoris; nonnulli *Caraben*. Serapio in ramos forbi e cælo delabi tradidit. Garziæ imposuerunt, qui defluentibus post exundationem in Pegu aquis, baculos in lutum ab incolis injici, inque iis laccam a formicis alatis, coacervari prodebant. Certum, a formicibus alatis, coloris punicei, quæ ex floribus, fruticibus, herbis & arboribus ejus materiam, non secus ac apes, colligunt, & in communes operas conferunt, in arbore sua, (*Bel Aco*sta vocat) elaborari. Pertinaciter bacillis concreione circumnata adhærescit, superficie inæquali, rugosa, & veluti granulata, pellucida, colore rufi, flavo, aut ex rubro nigricante. Cavernosa intus est, & nescio quid nigri, friabilis substantiæ in antris continet. Sapor evidens nullus; sputum colore rubro tingit, qui ad mixta aqua floridior. Prunis imposita bullit primum, levem ardorem resinofum spirans, tandemque flammescit. Vi detracta bacillis, corticem secum rapit, canaliculata adparente, quæ adhæsit. Bacilli duas tres ultra uncias longi, cortice melino ferre & crasso teguntur. Materies ut coryli, sed medulla copiosior. Provenit in Pegu, Balgate & Martavan. Nulla

Serapio
Simpl. c. 181.

Garz. hist.
arom. l. 1.
c. 8.
Scalig. Exercit.

Bauhin. H.
P. l. 6. c. 19.
p. 45.

Nulla in Arabia. Paratur ex ea compositio *Dialacca* officinis dicta; nec non bacilli ad obfigandas literas. Ex eadem in ceram hispanicam redacta, cum conchyliorum splendentium minutissimis fragmentis, incrustantur tabellæ, arcuæ, sclopeta, gladio- rum manubria & similia elegantissi- mo adpectu. Cum urina veteri ma- cerata, & prius contusa, alutas & coria vervecina rubro colore tingit. Duplex habetur, *Naturalis* nempe & *factitia*. Illam, si cum bacillis adfer- tur, *Lac Sumetri*, quia ex Sumatra insula habetur, vocant; si in glebis sine furculis, *Lac Comberti*; optimam *Trec*. Hæc ex facie Brasili & Coc- ci fit, & insectoribus inservit. Aco- sta annotavit resina & cera interdum adulterari. Lotionem apud Matthio- lum vide.

5. *Anime Amato Aniimum*, qui- busdam *legitimum Bdellium*, duplex est: *Oriente* & *Occidentale*. I. *Ani- me Orientale*, ex Æthiopia Arabiae confini in Lusitaniam adfertur, est- que forte non triplex, sed quadru- plex. *Fulvescens* & *pellucidum*, mis- sum Bauhino a Coldenbergio, quod ad vulgare succinum proxime acce- dit, a quo tamen duritie parum vin- citur. Color croceo hilarior, sub dente in grumos minutissimos dissi- lit; candelæ admota, non quidem promte liquefit, sed flammam lu- culentiorum pertinaciorumque con- cipit, cum minutissimarum bullarum ructu.

2. *Album* & *pellucidum*, quod Duci Würtembergico Paluda- nus misit. Succini fere consistentia, sed paulo fragilius, Vernicis solidæ, seu Sandarachæ arborum modo. Al- bicat & pellucet vitri instar, & cum adoleatur, redolet Mastichen. Dissi- lit sub dentibus, nec coit facile. Li- quefit & evanescit, si carboni im- ponatur, crassamentum post se relin- quens. Brisollus Gallus Cancanium esse putabat. Defertur magnis frag- mentis transparentibus. Ideo succi- ni apud quosdam suspicio. Calidum secundo gradu, humidum primo utrumque, jucundique in suffimigio odoris. *Usus* in capitis doloribus &

adfectibus, qui a frigidityte, deflu- Gum- xionibus inprimis, suffiuntur cubi- mata. cula & operimenta capitis; quod si frigidos humores flatusque resolve- re opus est, emplastris & cerotis mi- scetur. Ventriculo imbecilliore & nervosis partibus a phlegmate obfes- sis adponitur, sed diu gestari & re- novari debet. 3. *Nigricans* & *tau- rino glutini seu Colophonice fere simile*. Obscurum ergo hoc, nec visu pene- trabile, unguibusque fere nigricanti- bus respergitur. Gustus austerus, odor acutior & ingrator, flamma prompta & pertinax, reliquorumque more ardendo bullit. Quidam myr- rhæ, quam & Minæam a terra præ- cipue, ubi nascitur, Dioscorides ad- pellat, similem faciunt, indeque de- tortam adpellationem. Ideo mendi apud Galenum libro de Antidotis su- spicio, quod Minæam myrrham in- ter nobiliores collocavit, cum hoc sit ignobilis gummi. 4. *Pallidum, re- torridum* & *resinaceum*, de quo ni- hil aliud occurrit. II. *Occidentale* Brasilianis *Jetaica*, Hispanis etiam *Canime*, ex arbore *Jetaiba* dicta col- ligitur. Nunc albicans est, nunc fla- vens, succino maxime simile colore & duritie. Consumitur facile pru- nis impositum, sed suavissimum præ- bet odorem. Per interiores corticis meatus decidere indicio, quod tellu- re effossa sub arboris trunco & radi- ce occultatum extrahatur, & qui- dem sub finem æstatis mense Februa- rio. Monardes ex vulnerata in no- va Hispania elici scribit, Mastiches aut thuris instar. Calidum est in se- cundo & siccum. Vis in suffitu contra hemicraniam. Aromatica ef- ficacia partibus nervosis illicitum, vel emplastri forma adplicatum prodesse, Cl. Piso expertus est.

6. *Sanguis Draconis officinarum*, Dioscori *zuwāsq*, & *αἷμα δράκοντος*, M. l. 5. Cordo *Cinnabari* seu *sanguis Draco- nis*, Plinio, Solino & Arriæ *Cinna- baris Indica*, sanguis seu sanies dra- conis, elephantum morientium pon- dere elisi, permixto utriusque ani- malis sanguine olim a nonnullis pu- tabatur. Revera lacryma est, quod

Ll

& Ar.

Clus. ad
Garzic.
arom. l. 1.
c. 8.

Matthiol.
in Dioscor.
l. 1. c. 23.
Amat. Enar-
rat. in Dio-
scor. l. 1.
c. 27.

Bauh. H.
P. l. 9. c. 42.
p. 326.

Bauh. H.
P. l. 9. c. 44.
p. 326.

Monard. H.
simpl. c. 1.

Bauh. H. P.
l. 9. c. 45.

Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 8.

Dioscor. M.
l. 5.
c. 109. Plin.
H. N. l. 33.
c. 7. Solin.
Polyhist.
c. 28.

Gum-
mata.

& Arrianus prodidit, quæ ex arboribus in insula Dioscoride colligebatur, nunc illis etiam in locis, ubi Draconem arborem provenire diximus. *Duorum* est in Officinis *generum*. *Unum* licet igni cujusdam rubri asfulis admixtis coedetur; flammam tamen luculentam concipit, liquefcitque glebularum instar minorum præcedentium thuris magnitudine. *Alterum*, quod in offas seu panes compressos ex rubrica & pice colophonia formatur, obscuri & sordidi coloris, nullo modo flammam concipiens, & gummi instar lentescens. Bauhino pulcri sanguinis hujus grumi erant, glebis thuris æquales, rotundi ut plurimum, inæquales alii, foris ferruginei, fractu pellucidi, coccinei, concretione vernicis duræ, dentibus fragiles, saporis expertes, salivam affatim rubore tingentes, qui candelæ admoti flammam concipiebant, liquefciebantque resinarum instar. *Adulteratur* glebis colorem gummi egregie mentientibus, concretione gummi Arabici, quæ nec accenduntur, sed bullas agunt crepitantque, in aqua solvuntur, & mucilaginosam reddunt, vixque salivam rubore tingunt. Earundem apud Dioscoridem cum hæmatite virium, Galeno modice acris. Recentiores in fluxu dysenterico & muliebri, cruentis excreationibus, roborandisque gingivis & dentibus, feliciter adhibent,

ve, cum Camphoræ in rimis vestigiis se vidisse sapius, Abensina scribit. Defluit aliquando in meditullium, indeque extrahitur, aliquando exsudat per rimas: quod Garziæ in mensa, ligno femoris crassitie, & tabula observatum. Solet & in arboris concavum quandoque decidere. Exsudat vero primo candida sine rubentibus aut nigricantibus maculis: nec credendum organis educi, aut ad conciliandum candorem decoqui. Prodit colligendæ gratia quilibet; sed ubi cucurbitam impleverit, a validiore interfici posse impune, pro certo relatum est. Quia tenuissimarum est partium, ideo sæpe ex operculatis etiam capsis evanescit; nec sistitur, nisi in vase marmoreo aut alabastrino, lini vel psillii semine sepeliatur. Sunt, qui pipere commode detineri credunt. De *Temperamento* ambigitur. Veteres frigidam & siccam in tertio posuere, frequensque ejus in morbis calidioribus, erysipelate, inflammationibus, & venere extinguenda usus. Recentioribus, quia tenuium partium, inflammabilis, odorata, calida est; & vel de alio succo locutos antiquos, vel ratione similitudinis, non aliter calidos vapores evocare, quam nix & aqua frigida, quando refrigeratis membris adhibentur. Laudatur in *peste*, si drachmæ unius pondere cum Zedoariæ uncia semis nodulo incluso, vino immersa, bibatur: in *vigiliis*, si gran, iij. vel iiij. syrupo papaveris rhæados admisceatur, & cum aqua lactucæ propinetur: in *lumbricis*, si in aquæ portulacæ cochlearibus tribus, in aqua ardente soluta trium granorum pondere exhibeatur: in *dentium dolore*, si in aceto decoquatur, hoc detineatur in ore. Plures ejus apud auctores differentia. I. Serapioni est quadruplex: 1. de *Panzor* nempe insulis. 2. *Ribach* a rege ejus nominis, quæ sponte sua ex arbore fluxit colore rubeo, quæ sublimatione dealbatur, & censetur optima. 3. *Faussem*, quæ bonitate proxima, & 4. *Carjab*, quæ vilior. II. *Abensina* meminit *Alkansuri*, *Ariagie*, *Alczeit*, & *Aloscek*. III. Indis est duplex. I. De

Bauhin. H.
P. I. 3. c. 211.
P. 404.

Matthiol.
ad Dioscor.
l. I. c. 75.
Bauhin. H.
P. I. 9. c. 54.
P. 338.

Garzias hist.
arom. l. I.
c. 9.

7. *Camphora Officinarum*, Garziæ *Caphur* & *Capur Arabicum*; aliis *Caphura*, vulgo *Alcanfor*, Dioscoridi, Galeno & veteribus Græcis ignota. Aëtius ejus meminit, inter Arabes. Serapio & Abensina. Est gummi-resina in panes ingentes pellucidos & candidos totos, qui pulsu tinnitum argutum reddunt, factitii Nitri instar coacta; substantia ei pinguiscula, quæ facile flammam recipit, & in mediis aquis pertinaciter retinet. Lentescit eadem sub dentibus, & exigua portione os totum veluti inflammatur, odore vehementi. *Colligitur* non ex succo cujusdam herbæ, sed ex arbore superius a nobis descripta, cujus lignum fragile, album, le-

Sennert.
med. pract.
l. I. p. I. c. I.
p. 16.

De Borneo, quæ magnitudine milii, vel drachma major. Non vehebatur tempore Garziæ Goam, tantique una vendebatur libra, quanti centenæ, quæ ex China. Quatuor ejus apud Baneanes & Arabes genera, dividuntque in caput, pectus, crura, & pedes. Ejus, quæ ex capite, pendet libra pardans octoginta. (Monetæ aureæ apud Indos genus est, quod decem regales Castellanos conficit:) quæ ex pectore, aureis viginti: quæ ex cruribus, duodecim: quæ ex pedibus, quatuor aut ad summum quinque. Plerumque minutissima lapidum fragmenta admista habet, aut gummi *Chamdenæ* vocatum. Succino crudo persimile, aut ligni cujusdam scobi. Sæpius ex sordidarum manuum attactu, rubentibus aut nigricantibus maculis conspergitur, cui a lotionem medela, sed pondere immunito. Panno lineo inclusa, in calida aqua addito sapone & limonum succo eluitur, & in umbra siccatur. 2. *De China*, quæ in panes vel orbiculos redacta, quatuor & amplius unciam pondere, ex Chincheo ad nos usque defertur. Compositam ex illius quo ex Burneo parte credunt. Optima crystalli instar splendens, sincera & odora. *Adulteratur* ardenti aqua & Zedoaria, si Matthiolo credendum: probatur, Platteario prodente, si in calidum panem immittatur. Spuria perarescit, legitima madorem concipit. Sic ergo *rudis* alia, nec vim ignis experta; *elaborata* alia, quæ ignis calore excocta albedinem contraxit, habebatur. IV. Gallus quidam apud Bauhinum, quatuor ejus facit species. 1. *Una*, quæ inter ligni fibras similis squammis parvis alicujus metalli. 2. *Altera* extra corticem resinæ instar, gummi modo adhærens, parvis rubris maculis notata, sed quæ postea albescit, & præcedenti purior est. 3. *Tertia* nigrior minoris pretii. 4. *Quarta* magnitudine amygdalæ aut fabæ. Vilissima, quia ligni fragmentis, quibus adhærescit, scatet. Facit & *Capuræ vivæ* apud Matthiolum Qualcebenus mentionem, quam Venerem stimulare, Mercator Persa referebat.

8. *Gummi Juniperi*, Serapioni Gum-Sandarax, Latinis *Vernix* & *Verni-* Bauhin. R. p. 19. c. 24. p. 299. *lago*, lacryma est ejus arboris, quæ in Scirias longas in pallido flavescentes, succini colore & perspicuitate, densatur. Fragiles eadem dentibus friatæ nequaquam denuo coeunt, sapore nullo evidente, odore, ubi adoleatur, resinoso. Plinius ad nihil utile esse scribit, sed falso. Discutit capitis destillationes suffitu, exceptusque excretionem sanguinis supprimit, decantati simul ad dentium dolores usus. Dissolvitur in vino Malvarico, in quo Chalybs restinctus, adfuso vini spiritu. Miscella dens fovetur. Sistit vomitum & alvi profluvium, si cum ovi albumine & thure imponatur. Quidam fronti & temporibus inductum hæmorrhagiæ narium opponunt. Ex eodem & quidem sincero, cum oleo feminis lini expresso fit *liquidus*, cujus ad illustrandas picturas, nitorem ferri conciliandum, & tumores hæmorrhoidum usus. Differt a *Sandaracha* Græcorum & Aristotelis. Fossitia illa, & metallica. Apum hæc dum operantur cibis, qui sæpe in favorum inanitatibus invenitur, amari saporis, vel ceruginosi mellis genus.

9. *Gummi Cerasorum*, notum est Matthiol. in Dioscor. l. 1. c. 129. omnibus. Quia viscosum & mordacitatis expers, ad arterias exasperatas conducit: & proprie calculis vexatos in vino propinatum juvat.

10. *Gummi Ulmi* colligitur ex sua Bauhin. ad arbore. in Dioscor. l. 1. c. 96. arbore. Mense Aprili & Majo si pluviis infestetur, subito solis calore insequente, corrugantur protinus folia, emittuntque vesicas seroti humani magnitudine, quibus humor lentus initio, mox solis vi in gummi crescens, includitur. Dum siccatur, Galen. de compos. medic. fec. gener. l. 2. 7. Cnipes, culices & muliones evolant. Ingreditur Melinum emplastrum, quod Rustico adscribitur: præsentissimumque in vulneribus & ulceribus oculorum remedium, quod ab Heer expertus est.

II. *Gummata minus usitata sunt*, Heer. in observ.
1. *Ex Molle fœniculi odore.* 2. *Ar-*
Ll 2 *boris*

Gum-
mata.

boris Acaju. 3. *Pindobæ.* 4. *Opuntia.* 5. *Tingens.* 6. *Cie Sinenſe.* 7. *Caryophyllorum* ſimilis facultatis cum reſina terebinthina. 8. *Chonidetros.* Taceo gummi *Amygdalarum*, *Pericarum*, *Armeniacarum*, *Acajaiba*, *Gefuph* &c. de quibus ſub arboribus egimus.

4. *Gummi Opuntia* ſuccino flavo Bauhin. H. P. l. 1. c. 81. p. 252. ſubſtantia & colore, ſi lapideſam duritiem eximas, eſt ſimillimum, glebulis concretum, *Tragacanthi* fere in modum vermiculatum, & adeo durum, ut vix dentibus comminui poſſit. *Candelæ* admotum comburitur, nulla odoris fragrantia.

Bauhin. H. P. l. 5. c. 16. p. 522.

1. *Gummi ex Molle ſeniculi* odore, miſſum erat *Duci Württembergico* a *Paludano.* Erat ceræ depuratae inſtar, lentum, alicubi nonnihil friabile, flavescens undique, odore pingui, reſinoſo & aromatico vehementi. In clarum exardeſcebat incendium *candelæ* admorum, liqueſcebatque. Major commanducato lentor, ſapor gratus, & obſcure amarus, albedo exquiſitior. *Marcgravius* acre & ſuave cum quadam amaritudine, lentiscum redolere ſcribit. Calidum & ſiccum pene in tertio.

5. *Gummi tingens* a certa arbore Laet Ind. occid. l. 17. c. 14. in *Orellana* funditur, pannosque eleganti & pertinaci colore flavo tingit.

Marcgr. H. P. l. 1. c. 1.

2. *Gummi arboris Acaju* æſtivistis menſibus ſponte erumpit, pellucido colore, fragranti odore & facultate Arabico vix cedens. Pulverizatum in liquore conveniente propinatur contra menſtruorum obſtructiones.

6. *Gummi Cie Sinenſe*, ex arboribus in *Chekiang* ſub urbe *Niencheu* ſtillat æſtate, lacrymæ terebinthi ſimile. Purgatur a *Sinis*, & quo volunt inficitur colore. Optimum aureo flavescit, proximum nigerrimum, venenatos emittit halitus, antequam ſiccetur, quo vultus intumeſcunt in adſuetis & pallent. Sed facilis curatio. Non liqueſcit ſemel ſiccatum. Incruſtantur eo eleganti opere arculæ.

Piſo de ſimpl. facult. l. 4. c. 6.

3. *Gummi Pindobæ* e ſaſtigio ſuæ arboris fluit, pellucidum, odoratum & pulcerrimum.

7. De *Gummi Caryophyllorum ſimilis facultatis cum reſina terebinthina*, nihil occurrit, præterquam ex atro ruſcens eſſe, & inter *Caryophylla* reperiri.

Piſo de ſimpl. facult. l. 4. c. 10.

8. De *Gummi Chonidetros* & *Chamderros* dicto, ſub *Camphora* actum, Garz. H. A. l. 1. c. 9.

CAPUT III.

De Reſinis.

Reſinæ.

Reſina liquor eſt Oleaginoſus, qui vel ſponte, vel ex vulnerata arbore profluit. Tenuium partium eadem, & quæ in oleoſis & pinguibus promte diſſolvitur, ut in aquoſis gummi. *Diſtinguitur in Liquidam & Siccam.*

1. *Reſinæ liquidæ*, *ſyrai* ſeu humidæ & fluxiles ſunt ſequentes: 1. *Terebinthina vera.* 2. *Reſina laricea.* 3. *Reſina lentiscina* ſeu *maſtiche.* 4. *Thuſ* ſeu *Olibanum officinarum.* 5. *Reſina Cupreſſi.* 6. *Reſina Cedri* ſive *Cedria.* 7. *Myrrha.* 8. *Styrax.* 9. *Liquidambar.* 10. *Bdellium.* 11. *Belzvinum Officinarum.* 12. *Taca-*

mabaca. 13. *Caranna.* 14. *Gummi Elemi* & 15. *quinque Reſinæ novi orbis.*

1. *Terebinthina vera* *Abenſinæ Gluten Albotin*, in variis libris *barbare*, *Ferbentina* ſeu *Ferebintina*, *Trebintina*, *Trementina*, & *Fermentina*, ut *Monachi* apud *Mefuen* notant, vocatur. Sunt, qui *Gluten Alimbat*, *Alimbar*, & *Alimbath* dici ſcribunt. Colligitur ex *Terebinthi* arbore, li-
quida primum, mox paulatim areſcens. Candida eſt, ſubflava, vitrea, *caruleum* colorem adſectans, pellucida interdum, quæ friata primum in plurimas micæ teritur, mox len-
teſcit.

Dioſcor. M. l. 1. c. 91.

Bauhin. H. P. l. 3. c. 20. p. 282.

Theophr.
H. P. l. 9. c. 2.
Matthiol.
ad Dioscor.
l. 1. c. 77.

tescit. Odor acris, suavis, aliquan-
tulum gravis, lariceæ instar, inpri-
mis si manibus tractetur, aut prunis
ardeat. Theophrasto ἐν ὁδοῦσιν καὶ
καρπώσιν τῇ ὁσμῇ, odoris suavissimi &
levissimi, seu qui levissime feratur.

Gustu modice amarescit, dentibus-
que, dum masticatur, adhæret. Pro-
venit in Arabia Petraea, Judæa, Sy-
ria, Cypro, Africa & Cycladibus in-
sulis. Usus in Medicina egregius;
Dioscoridem si sequimur, calefacit,
emollit, discutit, dissipat, expurgat.
In tussi & tabe ex melle in eclegma-
te offertur. Urinam & alvum mo-
vet, emplastrisque malagmatis &
acopis miscetur. Qui refrigerare
volunt, in versione τὸ ψύχειν apud
Dioscoridem errant; vel siccare ver-
tendum est, vel ψύχειν legendum.
Galeno minus quam strobilina calefa-
cit, sed validius abstergit propter
amaritiam, ut non male contra pso-
ras adhibeatur. Recentiores drach-
mar. trium, quatuor, & quinque
pondere in bolo, ovo sorbili, vel de-
cocto cicerum exhibent, abstergendi
gratia, laudatque in calculosis usus est.
Cermisifonus in arthriticis commendat.

Galen. de
compof.
medicam.
materia 789.
l. 3.

Lobel. in
lib. de Bal-
samo.

Lobelio recens in Narbonensi &
Monspelienfi agro conchis excepta,
& adservata, in limpidissimum, re-
nacem, & resinofum laticem abit,
qui dum in musto est in vestem la-
neam fusus, neque maculam facit,
neque si eluatur vestigium relinquit;
senescens, tempore crassescit, nec ab-
luitur, nisi ovi vitellum addideris.
Fundit igne subacta oleum, si bene
lotam, & sacco lineo immisam,
retortæ vino & aqua semiplenæ im-
merferis. Aqua primo limpidissima
exit, mox oleum margaritas referens,
calculosorum & tussientium intra
sumeum solatium: tum mutato re-
cipiente flavum, & tandem rutilum;
quæ quia igneæ naturæ, extra tan-
tum adhibentur. Differentias ex lo-
cis sortitur. Lybicam Andromachus
in Theriaca admisit. Chia inter lau-
datissimas, vincitque odore & sapo-
re reliquas. Cypria cocta primo &
in placentas congesta Venetias adse-
rebatur, seu quod commodius ita
veheretur, seu ut facilius adulteria

admitteret. Nunc liquida frequens. Resinæ.
Sunt tamen, qui ex novellis abietibus
colligi scribunt. Arabica liquida stil-
lat, dein paulum arefcit, & sæpe cum
thure adfertur, & quia suffimigii lo-
co in templis, incensum vocant. O-
ptima, quæ pellucida, candida, vitreo
colore, in cæruleum vergens, ac te-
rebinthum olens.

2. Resina laricea, nonnullis Italis Galen. de
Pargatum, est terebinthina officinarum compos.
Germaniæ, sub ejusque cognomento medic. se-
& olim veniebat, ut pro ea sæpe ven- cund. genera
debatur, nuncque in usum recepta est. l. 2. c. 4.

Liquida semper est, colore flava, non-
nunquam vitrea & transparens, gustu
plusquam amarescens, mediocriter
acris, tenuis & odorata. Provenit
in Gallia, Alpibus Germaniæ, Bo-
hemia, Moravia, Silesia: sed copio-
sissima circa Saltzburgum. Perfo-
ratur ad medullam usque per æsta-
tem Laricis caudex, & inde manans
resina, vasculis e piceo cortice para-
tis excipitur. Splendidiorem juven-
culæ fundunt, turbidiorem annosæ.
Optima, quæ purissima, odoratissi-
ma, aliquantum translucida, & quæ
ab intincto digito contumaciter &
æqualiter diffluit. Inebriat pota,
quod Rhetis lignatoribus familiare. Bauhin. H.
Adhibetur in clysteribus febricitan- P. l. 9. c. 17.
tium cum vitello ovi dissoluta; in pe- P. 262.
ste purgantis loco cum aqua Cardui
benedicti bibita, & pilulis pilularum
Rusi instar. Suppeditat & Oleum
flavum in ulceribus sanandis commo-
dissimum: & Spiritum, qui guttarum
X. pondere in aqua Ononidis calcu-
losos solatur. Suggestit & massam
catapotiorum in aqua decocta, ne adu-
ratur, nec adhæreat gutta, si in lapi-
dem ceciderit: quam levi tritura in
pulverem redigas, quod si in terram
cecidit, vitri instar frangitur.

3. Resina lentiscina seu Mastiche,
hodie Mastix, Arabibus Gluten Ro-
manum, ex lentisco, vulnerato quo-
tannis arboris trunco profluit, & in
terra circumpavita concrefcit. Gru-
mi ejus, qui in officinis Orizæ gra-
num æquant plerumque, superant
aliquando, candidi, pellucidi, fragi-
les,

- Resinæ.** les, qui statim sub dente diffiliunt, mox tamen continua masticatione coeunt, lentescuntque ceræ mollitie, quam iterum, simul ac aërem sentire, exuunt. Prunis injecta promptius fumat, quam flammescit, guttasque affatim destillat, quod thuri negatum. Sapor leviter adstringens cum calore modico. Dioscorides Terebinthinæ proportionem respondere scribit. *Provenit* in Chio, Ægypto, Ponto, Creta, & dumetis Brasiliæ; Amatus Lusitanus in Hispania quoque & Italia provenire addit, sed exigua quantitate. *Usus* in sanguinis rejectione, stomachi imbecillitate, fluxibus & aliis. Faciei illita nitorem conciliat, & commanducata oris halitum commendat, gingivasque contrahit. Plinius breviter, replicandis palpebris, & ad extendendam cutem in facie, & smegmata adhiberi, & sanguinem rejectis, tussi veteri, & ad omnia, quæ Hammoniæ vis, dixit. *Genera* pro varietate locorum fortitur. Est enim alia *Chia*, alia *Ægyptia*, alia *Cretica*, alia *Pontica*, alia *Brasiliensis*. I. *Chia* in Chio insula habetur, alba, cujus pretium tempore Plinii in libras XX. Coluntur ibi lentisci eo sumtu & diligentia, quo vites apud nos. Tributum Turco quotannis exinde JVM. aurei. Quidquid colligitur, debetur Reip. & qui in propriis agris collegere, in commune conferunt: mulctaturque manu selecta, qui in suo vel alieno fundo arborem exciderit. Præstantissima hæc ideo, & copiosissima. *Adulteratur* aliquando Sandaracha, & gummi tragacanthi ammoniacique glebulis, qui fuccus masticatu & igne detegitur. *Præfertur* pellucida, ceræ tyrrenicæ candore similis, densior, vel plana, arida, friabilis & odorata. Calefacit & siccatur in secundo, cum molli adstrictione. Paratur ex ea *Unguentum* & *Oleum* ad omnia naturæ muliebris mala, prominentes circa stomachum scirrhus, & Celiacorum dysentericorumque cruciatus. Parandi modum apud Aëtium, Paulum, Mesuen & modernos vide. Fit & aqua mastichina, quam in Augustano dispensatorio habebis. Sistit dolores ventriculi, si pani tosto trito in pulverem redactæ duas drachmas admiscueris, & sacculo calefactam imposeris. Contra alvi profluvium & hypercatharsin, arctissime cinctus, injecto ex pari mastiches & thuris libramento, prunis pulvere, suffitum ano excipies. In inveteratis coxendicis doloribus, cum æquali parte thuris in oleo Chamæmelino cocta & inuncta, laudatur. II. *Ægyptia* nigra est, magisque desiccatur & adstringit: ideo bono furunculis remedio. III. *Pontica* viridis bituminis similior, & adulteratur gummi. Talis & in Persia prope urbem Schiraz habetur. IV. *Cretica* flava, amara, & *Chia* longe deterior. V. *Brasiliensis* duplex. *Prima* gratissimi odoris, quam arbor Igicga fundit. *Alter*, Igtagocica dicta instar lapidis dura, & adeo pellucida, ut vitrum esse videatur; cujus ad vasa incrustanda apud barbaros usus. Ex liquidis adhuc & lentis fiunt vascula, ventriculi imbecillitati apud potentiores, & quæ infuso potui gratum saporem conciliant. Nota vero, Resinæ huic similem illam, & quidem adeo, ut vix dignosci possit, quæ ex herba quadam spinosa in Asia & Græcia profluit. Radice, hæc folia emittit, & Carduum similem Malo, seminis plenum. *Ixi.* ne sine dubio Theophrasto, Dalecham. *Chamaeleon* albus, seu *Chamaeleon* Dioscoridis. Solebat olim vini condituris admisceri.
4. *Thus* sive *Olibanum officinarum*, thuriferæ arboris, quam superius descripsimus, lacryma est. Sicca hæc, prout hodie habetur, pinguior tamen quam mastiche, statimque in luculentam & pertinacem flammam exardet. Fulvescit ex albo, minusque pellucet quam mastiche colore candicante aut subrufo. Odor imbecillior, & nihil per incendium stillat. Quid de ea Veteres & Recentiores habeant, breviter videbimus.
- I. Et VETERES quidem de vindemia, custodia, evectioe, diversis generibus & usu singularia prodidere. I. De Vindemia. Meti semel in anno solebat,

Dioscor. M.
M.l.1. c.92.
Dioscor. M.
M.l.1. c.89.
Ind. occid.
p. 3. c.12.

Plin. H.N.
l. 14. c. 20.

Bauhin. H.
p. 1. 3. c. 21.
p. 289.

Galen. l. 2.
ad Glaucon.

De Iact
descript.
Pers. p. 44.

De Iact
Ind. occid.
l. 15. c. 8.

Theophr.
H.P.l.6. c.4.

Plin. H. N.
l. 12. c. 17. &
l. 20. c. 23.
Dalechamp.
ad Plin. l. 6.

Bauhin. H.
p. 1. 9. c. 30.
p. 303.

Plin. H. N.
l. 12. c. 15.

solebat, minore occasione vendendi: at tempore Plinii quæstus alteram vindemiam obtulit. Prima illa atque naturalis circa canis ortum flagrantissimo æstu, incidentibus quæ maxime videatur esse prægnans, tenuissimusque tundi cortex. Laxatur hic plaga, non adimitur. Inde profilit spuma pinguis. Hæc concreta densatur, ubi loci natura poscat tegete palmea excipiente, aliubi area circumpavita. Autumno legitur ex æstivo partu. Secunda vindemia est vere, ad eam hyeme incisis corticibus. II. De *Custodia* apud Plinium & Arrianum habebis. Sylva, inquit ille, divisa, certis portionibus, mutua innocentia tuta est. Neque ullas faucias arbores custodit. Nemo furatur alteri. Hic in tumultum congestum, ἀφύλεκτον esse, Diis sua virtute locum illum tutantibus scribit. Οὐτε γὰρ λάθρα, ἔτε φανερώς χωρὶς βασιλικῆς δόσεως εἰς πλοῖον ἐμβλεθῆναι δύναται. καὶν χόνδρον τις ἄρῃ ἔ δύναται πλεῖνσαι τὸ πλοῖον ἀπὸ δαίμονος. Retineri scilicet a Diabolo navem credunt. III. De *Evectione* prodidere iidem. Arrianus enim Sabbotam advehi, tanquam in ἐκδοκίον, Camelis, καὶ σκεδῖαις ἐν τοπίαις δερματίναϊς ἐξ ἀχῶν καὶ πλοῖοις dicit: *Plinii vero verba sunt.* Thus collectum Sabotam Camelis convehitur, porta ad id una patente. Digredi via capitale leges fecere, ibi decimas Deo (ἡλίου Theophrastus) quem vocant Sabin, mensura non pondere sacerdotes capiunt. Nec ante mercari licet; inde impensæ publicæ tolerantur. Nam & benigne certo itinerum numero, Deus hospites patet. Evehi non potest nisi per Gebanitas. Itaque & horum Regi penditur vestigal. Caput eorum Thoma, abest a Gaza nostri littoris in Judæa oppido, LXXX. XXVII milia passuum, quod dividitur in mansiones Camelorum LXII. Sunt & quæ sacerdotibus dantur portiones, Scribisque regum certæ. Sed præter hoc & custodes, satellites, & hostiarii, & ministri populantur. Jam quacunque iter est, aliubi pro aqua, aliubi pro pabulo, aut mansionibus variisque portoriis pendunt, ut sum-

tus in singulos Camelos denarium Resinæ. DCLXXXVIII. ad nostrum littus colligat. Iterumque imperii nostri publicanis penditur. Itaque optimi thuris libra XVI. pretium habet, secunda XV. tertia XIV. IV. De *generibus & differentiis*, Theophrastus, Dioscorides, Arrianus, Plinius & Galenus consulendi sunt. Est 1. *Novellæ arboris*, quod candidius καὶ ἀοδμότερον. 2. *Veterum* seu παραμαζόντων, quod ξανδότερον & odoratius. 3. *Palmea tegete exceptum*, quod purius. 4. *Area circumpavita*, quod minus tale, & ponderosius. 5. *Corticosum*, quod in arbore hæsit, & ferro depectitur, & *candidum*, quod autumno ex æstivo partu legitur, purissimum, & *Carpheoton* a festucacea levitate dicitur. Theophrastus minus odoratum esse credidit. 6. *Rufum*, quod ex secunda vindemia habetur, priori non comparandum: & quia incensam tædam olet, dathiathon dicitur, nisi dadiathon legere malis, quasi a tædæ similitudine, aut unguinis tedacei. 7. *Masculum*, quod ex eo rotunditate guttæ pependit, & a specie testium ita dici putatur. Præstantissimum Galeno, si simul subru- Galen. fum, rotundum, naturaliter leve, fragile, & si pinfatur in miculas minutas, ut sabulum dissipatur, ad ignem cito accenditur, & odorem suavem copiosum emittit. 8. *Σταγόνιας*, quod rotundum & guttatim manans effluit. 9. *Indicum*, quod sub- Dioscor. M. M. l. I. c. 81. fulvum, livido colore, & arte rotundum fieri credidere Veteres. In quadrangulares formas disiectum, tam diu fictilibus versabant, donec formam rotundam contraheret. In- Diodor. Sicul. Bibl. l. 5. sulare Theophrasto, ex eoque quodam adeo magna gleba, ut mole sua manum impleret, pondere vero plus quam tertiam partem minæ æquare posset. Ideo Plinius singula manum implere se invenisse scribit, cum minore diripiendi aviditate lentius nasci liceret. Pulcrius Theophrasto, quod longe absolutiorem arte rotunditatem habuerit, quam Arabicum natura. Nec tamen a natali solo Indicum esse credas. Nullum huc usque ibidem. Insulæ Arabiæ adjacentes

Arrian. in
periplo ma-
ris rubri.

Theophr.
H. P. l. 7. c. 4.

Resinae. tes intelliguntur, quæ tum sub Indo-
rum imperio. Dicitur & ἀτομον,
ἀγώνιστον successu temporis. 10. *Mam-*
mosum, cui præcipua gratia, cum
hærente lacryma priore consecuta
alia miscuit se. 11. *Orobium* ὀροβίως,
quod in Amelo monte nascitur, mi-
nus, κίρροτον, Arabicum & κόπικον
quibusdam. 12. *Αμωμίτες* album
quidem, sed quod, dum mollitur,
velut mastiche remittit. 13. *Adul-*
teratum, quod pinea resina & gum-
mi artificiose incrustatur. Malefi-
cium facile deprehendes. Incensum
gummi flammam non concipit, resi-
na in fumum evanescit, thus ἐξάπτεται.
14. Adjice hisce & *Mannam thuris*
seu friaturam immundiorum ex gru-
morum attritu decussam. *Probat*
alba, pura, & granulosa. Quidam
resina pini cribrata, farina polline,
& cortice thuris adulterant. Ignis
& odor detegent ludibrium. Inæ-
qualiter & dispari vigore ardebit,
fuliginoso vapore emissio; mixtoque
odore nares feriet. V. De *Uso* nota.
Thus ordine secundo calefacere, de-
ficcare primo, cum pusilla & vix ma-
nifesta adstrictione: in quibusdam
ulceribus & naturis pus movere, in
quibusdam producere carnem. Fru-
stra eam in siccioribus subjectis &
præhumidis ulceribus expectes. In
illis si humidiora, in his si modice
talita, facile. Concoquit & pus mo-
vet, si ad probe temperatam natu-
ram respexeris: pinguius inprimis
& magis albicans, quodque mansum
Aloës & Mannæ ritu non comminui-
tur, sed inter se cohæret. Nam quod
magis flavum, validius siccatur. Ulce-
ra cava replere & ad cicatricem per-
ducere, vulnera glutinare, sangui-
nis eruptionem, etiam ex cerebri me-
ningibus cohibere; cum lacte tritum
& linamento exceptum, sedis ulcera
mitigare; ulcera capitis manantia
cum nitro persanare; mammis in-
flammatum cum Cimelia & rosaceo
conferre etiam compertum. In se-
cunda valetudine haustum *μαννίδες*
esse, & largius cum vino sumtum in-
terficere, Dioscorides prodidit. Le-
vioris forte Manna thuris adstrictioni-
nis. Hippocrati tamen in fracturis

& contusione narium in usu. Fuli-
ginem ex eo parare docet Dioscori-
des. Siccior est, calidior, cum ad-
strictione. Ideo ulcera, quæ in oculo
existunt, expurgare & implere,
apud Galenum habemus.

II. Apud RECENTIORES plura
etiam occurrunt genera, quæ in Ara-
bia proveniunt, & Arabibus quidem
Lovan, Abensina Conder dicuntur.
Nonnisi Regis permissu colliguntur,
confluuntque eo ex Aden, Xael, &
aliis locis mercatores, qui de quan-
titate & pretio contrahunt. 1. *Gar-*
zias meminit, *Optimi*, quod ex ar-
boribus ὀροβίως colligitur, *Melato* di-
ctum, & cujus centum libræ duobus
aureis Lusitanicis emuntur. 2. *Ni-*
gri, quod ἐν πεδίοις provenit, im-
probum, cujus cum aliis resinis &
pice permixti, in oblinendis pice
navigiis usus. 3. *Ex optimo & im-*
probo misti, cui nonnunquam corti-
cum fragmenta inhaerent. Defere-
batur in indiam, vilissimique pretii
erat. II. Theveto, *Unum* est can-
dicans purum, nitidum, pellucidum,
quod ὑπὸ κινδύος colligitur: *Alterum*
rubescens, quod vere, & quia mi-
nus a sole excoctum, pondere, pre-
tio & viribus inferius. Addit, re-
periri ex arboribus, quæ vulneratæ
plusquam sexaginta liquoris libras
fundunt. III. *Cordo* quadruplex
est. 1. *Indicum*, quod maximis &
inæqualibus globis constat, lividum,
nigricans & candicantibus aut flavis
maculis varium. 2. *Mammosum*,
quod oblongis grumis mammarum
forma componitur. 3. *Masculum*
parvis, rotundis, candicantibus, aut
flavis grumis, interdum singulis, in-
terdum geminis velut testiculis con-
stans. 4. *Orobæum* minimis gru-
mulis, ervo æqualibus, odore ma-
sculo simile. *Usum* ejus laudat Mat-
thiolus in cute scabiosa, si aceto &
oleo olivarum permixtum post bal-
neum inungatur; in aurium ulcero-
sis doloribus, si cum vino dulci &
calido infundatur: in tenesmo, si in-
jecti in ignem cum pice nigra fu-
mus per inferiora excipiat: in vo-
mitione, si cum mastiche & aloë
æqualibus partibus permixta, cum al-
bumine

Galen.
simpl. med.
1. 7. Galen.
1. 3. c. 7. 1. 5.
c. 4. 1. 13. c. 5.

Dioscor. M.
M. 1. 1. c. 81.

Hippocr. 1.

2. de fractu-
ris.
Dioscor. M.
M. 1. 1. c. 83.
& 84.

Garzias H.
Arom. 1. 1.
c. 6.

Bauhin. H.
Pl. 9. p. 305.

Cordus ad
Dioscor.
1. 1. c. 85. &
H. Plant.
1. 4. c. 23.

humine ovi & rosarum aqua subacta, ventriculo imponatur. Contra lip-
pitudinem portionem thuris albi cu-
spidi cultri impositam ad candelam
incendit; incensam aqua rosacea duo-
rum cochlearium exstinguit, idque
trigesies iterat. Tum cum aquæ ro-
saceæ & lactis muliebris cochleari
permixtum instillat, certo sanitatis
experimento. Inter sarcotica cense-
tur *pulvis*, qui ex thuris, sarcocol-
læ, ireos, sanguinis Draconis, myr-
rhæ, aristolochiæ longæ ana drach-
ma semis paratur. Electuarium con-
tra vomitum & fluxum apud Bauhi-
hinum vide.

Clement. l.
1. de medic.
mat. virib.
& compos.
c. 7.

Dioscor. M. 5. *De Resina Cupressi* hoc tantum
M. l. 1. c. 91. habeo dicere, liquidam esse & sapo-
Matthiol. re acerrimam, ex qua oleum, quod
ad Dioscor. l. 1. c. 86. *Caryinon* vocant, paratur.

6. Resinam Cedri seu Cedriam, in
Capite de Cedro conifero attigimus.
Adde illis. 1. Cedriam modo Ce-
dri picem, modo resinam vocari: Ce-
drium vero, succum e tæda concisa,
qui primus aquæ modo in canali flu-
xerit. Confundi tamen ista, dum
nunc pro resina, nunc pro sudore
tædarum, nunc pro pice, nunc pro
oleo Cedrio accipiuntur. 2. Male
scribere Bellonium, non modo Ce-
drum, sed & piceam, tædam, lari-
cem, cupressum, juniperum & betu-
lam Cedriam fundere. Nihil sane
betulæ pinguedinis; Junipero sua
vernix, quam forte Tacum Celtæ
vocant, a morbo ovium, cui mederi
solet. Substitui tamen illi potest, pro-
pter similitudinem. 3. *Usus ejus*
in conservandis a tineis & carie rebus
Plinio decantatissimum. Cassius, in-
quit, Hemina, vetustissimus Anna-
lium auctor, prodidit Cneum Teren-
tium Scribam agrum suum in Jani-
cula repasdinantem offendisse arcem,
in qua Numa, qui Romæ regnavit,
situs fuisset, atque in eadem libros
ejus repertos, P. Cornelio, L. F. Cel-
tego, M. Belio, Q. F. Pamphilo Cos.
ad quos a regno Numæ colliguntur
anni DXXXV. & hos fuisse e charra,
majore etiam miraculo, quot tot in-
fossi duraverunt annis. Mirabantur

Bellon. de
arborib. co-
nifer. l. 1.
Bellon. de
medicaro
funere l. 3.

Plin. H. N.
l. 13. c. 13.

alii, inquit Hemina, quomodo illi li-
bri durare potuissent: ille tamen ra-
tionem reddebat, dicens, se arbitrarier,
tineas non attigisse, eosque non com-
putruisse, quod libri Cedrati fuissent.

4. *Non contemnendi in Medicina usus* Dioscor. M.
esse. Nam mollem carnem citra do- M. l. 1.
lorem putrefacit, duriusculæ vix po- c. 105.
tens. Sic calor, qui in viventibus vi-
res adauget. Crassiore sui parte mor-
daciore, & majore aperiendi facultate
prædita; tenuiore (pinguissimum id,
& ad unguem oleosum, quod suspen-
sis supra eam lanis dum coquitur, ex-
cipitur) adeo clemens, ut vulnera
ovibus per tonsuram illata reficiat.

7. *Myrrha*, Arabibus *Bola*, lacry- Theophr.
ma est arboris ejusdem nominis, quæ H. P. l. 9.
in Arabia invenitur, & aliquo loco c. 4.

incisa, eandem profundit. Varia ejus
apud auctores VETERES genera.

1. Theophrasto est duplex: 1. *Liqui-
da* σακτὴ, non quæ sponte ex arbore
stillet, ut Plinio visum, sed quæ pu-
ra sit, & qualis ex arbore fluxit. Pro-
batur ἀμείνων τῇ γεύσει, ejusque nor-
ma concolorem accipiunt. 2. Πλασ-
τή, quam fictitiam, depravatam & adul-
terinam dixeris. II. Dioscoridi est

1. *πιδάσιμος* campestris, pinguis, ex
qua recente expressa *Stacte* excipitur.

Fluit extusa cum pauca aqua, minu-
tatimque σάζει, inde nomen. Qui-
dam oleo balanino liquefactam, igne

lento fotam, calida perfundunt, sic
cum oleo εἰς βυθόν, tanquam limus
subsedit: hinc colo defunditur, &
quod subsedit, prelo exprimitur. Fa-
cit unguentum per se sine oleo, pro-
baturque ἀμύνης ἐλαίῳ καὶ ἐν ἐλαχίσῳ
πλειστήν δύναμιν κεκτημένη. Ex sola myr-
rha fieri Athenæo debemus. 2. *Ca-
biræa*, quæ λιπαρωτάτη, ἐν ἐνγείῳ καὶ
λιπαροῖς τόποις γενομένη, multam quo-
que Stactem sudat. 3. Troglodyti-
ca a loco, in quo gignitur, quæ ὑπό-
χλωρος est, διαυγής, super medium
lucida, δεικτική mordax, & primaste-
net. 4. *A Troglodytica secunda*, quæ
λεπτὴ, bdellii modo lentiscens, ὑπό-
βωμος τῇ ὀσμῇ, & locis proveniens
ἡλίοις, λευκὴ forte pro λεπτῇ legendum.

Nam quia est globosa & in offas con-
voluta, tenuis dici non poterit. 5.
Καννα-

Dioscor. M.
M. l. 1. c. 83.

Theophr.
libro de
odorib.

Athen. Di-
nos. l. c. 15.

Refinæ. Καίκαλις exfoleta, feu ὑπέρωρος, nigra, & κάτοπτος. Residuum expressæ myrrhæ quidam putant, quod bacillis suis adhæreat, sed perperam. Vidit Bodæus optimum myrrhæ genus bacillis adhærens, quod rarissimum. 6. Εργαζίμη, quæ deterrima, quippe ψάρα καὶ ἀλιπής, δριμύεια, κομίζεσθαι τῇ ὀσμῇ καὶ τῇ δυνάμει, squallore obsita, acris ac minime pinguis, & adspectu viribusque gummi referens. 7. Ἀμινάια *Aminæa*, cui nulla cum *Minnæa* similitudo. Facit ejus & Crito apud Galenum in pastillis ad lichenas mentionem. Sunt, qui μινναίαν legunt, a populis extimam Arabiæ partem incolentibus. At hæc inter præcipuas Galeno, & cum Troglodytica eadem. 8. *Adulterata* gummi macerato aqua, in qua myrrha maduit & permista. 9. *Optima* quæ recens, friabilis, levis, concolor undiquaque, quæque confracta candidas ὀνυχοειδείς habet διατρυφεύς & læves, quæque minutis est glebis, amara, odorata & acris. III. *Plinio* complura genera. *Troglodytica*, inquit, sylvestrium prima. Sequens *Minnæa*, in qua & *Atramitica* est, & *Ausatitis* Gebanitarum regno. Tertia *Dianitis*. Quarta *Collatitia*, (forte hinc & inde collata & contributa). Quinta *Sembracena*, a civitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam *Dusartim* vocant. Est & *Candida* uno tantum loco, quæ in Mesopotamio oppidum confertur. *Probatum* Troglodytica, pinguitudine, & quod adspectu aspera, sordidaque (vix Plinium scripsisse puto, ut ex Dioscoride colligi potest) ac barbara, sed acrior cæteris. *Sembracena* prædictis caret vitiis, ante alias hilaris, sed viribus tenuis. In plenum autem *probatio* est minutis glebis, nec rotundis, in concretu albicantis succi nec tabescentis: utque fracta candidos ungues habeat, gustu leniter amara. Secunda *bonitas* intus varia. *Pessima* intus nigra. Pejor si etiam foris. Pretia ex occasionibus ementium varia. Stactæ vero a VI. ad L. *sativæ* summum ad XXII. *Erythrææ* ad XVI. Hanc volunt *Arabicam* intelligi. Troglodyticæ nucleo ad XXI. ejus vero, quam *odorariam* vocant, ad XIV. (omnia hæc corrupta, nec video, quomodo corrigi possint). *Adulteratur* lentisci glebis & gummi. Item Cucumeris (agrestis nempe) succo amaritudinis causa, sicut ponderis spuma argenti. Reliqua vitia deprehenduntur sapore gummi dentelentescentis. Fallacissime autem adulteratur *Indica* myrrha, quæ ibi de quadam spina colligitur. Hoc solum pejus India adfert facili distinctione: tanto deterior est. *Opocalpasum* forte intelligit, quod sæpe in optima myrrha reperitur. Exitiale hoc, viditque κατὰ τινὰ τύχην Galenus mortuos, qui διὰ τὴν ἀγνοίαν, tali myrrha usi fuere. In *Opocalpasum* mutari, nunquam inde colligas. Refer huc *Bæoticam Myrrham*, quam Dioscorides arboris cujusdam in Bæotia incisam radicem esse dicit, vel potius ex incisa elici, & odoris gratia genuinæ esse similem. *Vires* si species, calefacit & desiccatur ordine secundo, & quia amara, abstergit etiam mediocriter. Itaque Caput vulnera glutinat: foetus & lumbricos enecat & ejicit: medicamentis contra veterem tussim & asthma miscetur, nec arteriam exasperat. Oris graveolentiæ medetur. Ulcera in oculis replet, & albugines deterit: sed odore suo dolorem capitis sanis inducit. Fit & *Vinorum* myrrhæ odore conditorum apud veteres mentio, quæ Plinio teste laudatissima. Christo in cruce pendenti ἐσμυρρίσθη. Matth. 27. v. 34. nov datum est, quod murrhatum perperam Baronius fuisse credit: ideo Marc. 15. v. 23. de murrhinis multa in vanum differit. Myrrhæ rara puritas; rubra Actuaria quæ adfertur, aut *Caucalis* est aut *Ergasima*. Non modo sicca nigraque est, sed & retorrída, macilentia, & cavo quodam situ obducta; & si quod inter tantos globulos aliquando reperitur fragmentum, quod & clarum sit & pellucidum, confractum tamen diversicolor adparet. Glebæ nihilominus aliæ pupillares fere, aliæ avellanæ magnitudine minores, aliæ pellucidæ, aliæ minus. Color fulvus, rufus aut ferrugineus. Ungues subinde alibi eximii, sapor amarus,

Galen. κατὰ
τόπας l. 5.
c. 107.

Galen. de
Antid. l. 1.
c. 14.

Plin. H. N.
l. 12. c. 16.

Galen. de
Antid. l. 1.
c. 11.

Dioscor. M.
M. l. 1. c. 78.

Matth. 27.
v. 34.
Marc. 15.
v. 23.

Brassavol. in
examine
simplic.

amarus, subacris, odor quando adole-
letur nares feriens. Flammam con-
cipiunt, dentibus attritæ frientur:
aquæ immersæ, non dissolvuntur ut
gummi, sed diutius in ea relictæ, li-
mi instar, diffuunt & flavescent: di-
gitis denique facile confringuntur re-
runturque. Male Brassavolus *Vul-*
garem Officinarum Bdellium. Lan-
gius & Cæsalpinus *Troglodyticam*
Benjoinum esse putat. Ille, quia illa
non adeo pellucens, nec taurino glu-
tino similis ut bdellium: facile digi-
torum attritu conteritur, cum bdel-
lium diutius tractatum lentescat. *Hic*,
quia nulla ex Benjoi no Staete: nec
ulla eidem amaritudo, quæ unum ex
bonitatis signis apud Dioscoridem.
Nec melius sentiunt, qui Staeten vel
Styracem liquidam, vel balsamum
Americanum esse opinantur. Vilis
illa nec amara. Pretiosa Staete, &
egregiæ amaritudinis. Ex selecta &
optima myrrha expressit Pennius, diu
multumque aromatum modo jucun-
de olentem, cum nonnulla gravitate.
Balsamum Americanum manat ex ar-
bore, & levem amaritudinem habet.
Ex myrrha Staete de amaritudine di-
ximus. *Usus* ejus in hydrope cum
agrimonia, si potetur: in quartana,
si drachmæ unius pondere cum vino
Malvatico hora una ante paroxys-
mum sumatur, insequente sudore:
Contra rugas faciei, si præscripto a
Matthiolo modo usurpetur. Electua-
rium contra flatu, putredinem, op-
pilationes & intestinorum dolores;
nec non trochiscos contra mensium
obstructionem, vide apud Bauhinum.
Oleum ex myrrha propinatur quar-
tanariis: miscetur in Colica clysteri-
bus cum decocto Veronicæ, in juscu-
lis galli gallinacei & vino Malvatico;
solet & umbilico inungi. Nec non
faciei ut a rugis præservetur. De
præparatione vide Dispensatoria.

8. *Styrax* seu *Storax Officinarum*,
lacryma est arboris, quam superius
descripsimus. Dum exstillat, in par-
vas micæ aut grumos concrevit, sub-
stantia resinosa, pinguis, in longum,
ubi incaluit, ductilis, in oleo resolu-
bilis admodum, cum gravitate non

pauca, odorata veluti propolis, præ-
sertim cum prunis imponitur. Dicam
de eo per *differentias*, prout istæ
apud *Veteres & Recentiores* occur-
runt. Est 1. *Flavus*, qui pinguis, re-
sinosus, grumorum subalbificantium,
ἐπιδιαιμένον τῇ ἐννοδίᾳ ὅτι πλεῖστον, & dum
molitur, melleam quandam humidi-
tatem remittit. Talis est Catbaali-
tes, seu Gabalites, Pissidiacus, Cili-
cius, & Cyprius. Pretium ei XIX.
2. *Niger* & friabilis, ac fursuri simi-
lis. Fursufosus & cano situ obdu-
ctus, Plinio qui utilis. 3. *Pellucidus*,
gummi similis, myrrham odore re-
ferens, qui paucus gignitur, & vix
nunc inveniri poterit. 4. *Pamphy-*
lius, qui aridior, minusque succo-
sus. Adportabatur e Pamphylia in
calamis, tantumque tempore Galeni
a vulgari distabat, quantum a vino,
quod in tabernis venditur, Faler-
num. Parcissimus nascitur, præstan-
tissimusque qui maxime pallescit, odo-
ris & saporis vehementissimi. 5. *Sy-*
rus, quem ex Syria revehunt, acri
odore, ejus, in focis abigentes fluo-
rum fastidium. 6. *Calamites*, qui
in candicantes & rufescentes grumos
concrevit; cum Pamphylio & rubeo
idem. Qui in officinis habetur, fur-
sufosæ plerumque sunt massæ, & sco-
be ligni sordidatæ, in quibus tamen
genuinus Styrax, parvis constans gru-
mis rubicantibus, colore fulvo & ru-
fo, saturatioreque, sub dente lente-
scentibus & ductilibus, sapore non
ingrato, odore fragrante. Liquidum
olim fuisse, nullo argumento prodit
Fuchsius. 7. *Liquidus*, Abensinæ
humidus, qui Arabibus perperam
Staete, Cordo in duas differentias di-
viditur. *Altera* enim resinosa est pin-
guedo, ex arbore quadam sponse de-
stillans, aut coctura elicita: *altera*,
quæ ex Styracis nucleis exprimitur,
cujus rarissimus usus. Liquidus ru-
ber officinarum, melleæ est & tena-
cis substantiæ, coloris fusci aut ex fu-
sco rubentis, aut ex cinereo fusci, odo-
re valido, & ob vehementiam fere
ingrato, inprimis cum prunis impo-
nitur, ita tamen, ut in eo remistus
Styracis Calamitæ odor se prodatur,
sapore acriusculo. Fit ex pauca Sty-
race

Dioscor. M.
M. l. i. c. 79.

Plin. H. N.
l. 25. c. 12.

Galen. de
Antid. l. i.
c. 14.

Plin. H. N.
l. 25. c. 17.

Bauhin. H.
P. l. 9. c. 56.
P. 345.

Cord. H. P.
l. 4.

Resinæ. race Calamita, cum laricea resina, oleo, & vino, simul coctis, expressis, & cum refrixerit, pistillo agitat, donec candorem adquirat. Eligi debet odoratissimus & in cinereo candicans. 8. *Oleosus* cum liquido fit. Dimisso enim uno & altero mense, quod tenuissimum & odoratissimum a crassiore discedit, eidemque ad fundum vasis descendente superius innatat, oleo crassior, laricea resina liquidior, colore fulvus & pellucidus, sub *olei styracini* nomine. Probatur fulvum pellucidum odoratissimum, quodque ab intincto digito defluens descendit. 9. Siccus a quibusdam thymiama vocatus, estque cortex in rufo colore nigricans, quem e styracis arbore colligi ajunt. Serapio feces Storacis liquidæ per decoctionem factæ adpellat. 10. *Præstantissimus*, purus, pinguis, in longum ductilis, odoratissimus, & qui suavitate caput adgravat, & ad somnum invitat. Tempore Amati Lusitani ex Zana Indiæ insula, quæ in Cambaja, portabatur. Lobelius ex tractu Gallo-provinciæ, qui a trium Mariæ sororum fano ad forum Julium usque porrigitur, Venetias in glebas Ammoniæ modo coactas scribit, quibus quidam melligini similis liquor, qualis e favis defluit, inest. 11. *Adulteratus*, qui arboris a vermiculis eroso scobe, melle, irini unguenti fæce, cedri resina, melle, amygdalis amaris, & quibusdam aliis depravatur. Quidam ceram aut adipem aromatis imbutum, in ferventissimo sole una cum Styraçe molliunt, & per colum *εὐρύπτερον* in frigidam exprimunt, vermiculosque effingunt, & vendunt. Hinc *Vermicularis* nomen. 12. *Assatus*, ex quo fuligo colligitur. 13. *Chrymatias* apud Hermolaum Barbarum, rarus inventu & gummi similis, sine dubio cum Calamite idem. 14. *Rubeus*, qui adsimilatur Maci, quæ creditur esse exterior cortex ipsius Styracis, secundum Serapionem. De usu si quæris & viribus, medetur tussi, faucibus, pectoris vitiis, vulvæ præclusæ duricieve laboranti. Ciet menses potu adposituve, alvum mol-

lit. Invenio potu modico tristitiam animi resolvi, largiore contrahi, (ut demententur). Sonitus aurium emendat infusus, strumas illitus, nervorumque nodos. Adversatur venenis, quæ frigore nocent. Actuarius ^{Plin. H. N. l. 24. c. 6.} in Trochisco Neapolito Styrax Hispanum cognominat. Ex ejus uncia semis cum oleo rutæ totidem, & ol. anethino, Chamæmel. ana unc. iij. pulv. Cumini unc. j. fit oleum, quod ventris pueror. dolorem sedat. Ex ejusdem drachma semis cum succi liquiritiæ, thuris, myrrhæ, Opii tantundem, Croci scrupulo, cum syrupo papaveris rhæados format ad urgentes catarrhos pilulas Vierus.

9. *Liquidambar* est resina arboris, quam superius inter arbores ^{De Laet Ind. occid. l. 5. c. 2. Bauhin. H. P. l. 9. c. 38. p. 323.} Novi Orbis lacrymiferas descripsimus. Coloris est melini fere nonnihil obscuri, odori Styracis liquidi remissiore, siue accendatur, siue non, tam valido, ut nullo modo celari possit, sapore non absimili. Admisceatur ei aliquando comminutus cortex, ex quo vulnerato profluit, ut suavius ^{Monard. H. simpl. c. 8.} & diutius in suffitibus spiret. Inferitur Hispaniæ in utribus & doliis ex nova Hispania solo sibi natali. Calida est in fine secundi, humida in primo. ^{Ind. occid. p. 9. l. 4. c. 296} Calefacit ergo, roborat, resolvit, frigidiori ventriculo inprimis utile, cuius coctionem adjuvat, si cum Styraçe & pauxillo ambrae vel moschi in emplastrum redigatur. Hispani eo in suffitibus, odoramentis, pastillis, Styracis loco utuntur. Quæ e ramorum pinguium coctione elicitur, deterior est. *Oleum*, de quo in arboris descriptione, calidum fere est in tertio, uteri tumoribus & obstructionibus mensium & aliis proficuum. Absumitur plurimum imbuendis chirothecis, illud inprimis, quod expressione elicitur.

10. *Bdellium* lacryma est arboris, ^{Dioscor. M. l. 1. c. 80.} in Arabia, India, Media, & Babylo-
ne provenientis. Varium apud veteres. 1. *Translucidum* gustu amaro, ^{Plin. H. N. l. 12. c. 9.} glutinis taurini in modum, intus pingue, *εὐρύπτερον*, ligni & fordis expers, suffitu odoratum, ungui simile, id est, ejus in suffitu odoris, qui ex Onychis Indici conchilii testæ suffitu

suffitu emergit, Saracenicum tale, quod circa Saracam Arabiae urbem prodeat. Plinius ceræ simile facit, gustu amarum citra acorem, in sacris vino perfusum odoratus. 2. *Nigrum* sordidum, uberius glebis, Aspalathi odore ex India advectum, *Seoticum* Galeno. 3. *Petræum*, quod a Petra urbe defertur, siccum, resinofum, sublividum, sed facultate secundum. 4. *Peraticum* ex Media advectum, facilius, crustosius, amariorque. 5. *Indicum* humidius & gummosum. 6. *Bactrianum*, cui nidor siccus, multique candidi ungues, quod de humanis unguibus frustra intelligas, sed ita, ut superius dixi. 7. *Judaicum* cum translucido idem fulgore coruscans, quod in Musæo Calceolarij visum est: quo & Bdellium de Mecha Arabum pertinet. 8. *Scythicum*, quod Galeno laudatur.

Bauhin. H.
P. l. 9. c. 34.
p. 317.

Quantum ad NEOTERICOS habuit Johannes Bauhinus Bdellii nomine magnas glebas, Taurino glutini aliquatenus similes, colore ex fusco non nihil rufescente, concretionemque quam molli & tenaci ad gummi magis accedente. Sapore, inquit, est subamaro, multum tamen a myrrha relinquitur. Odorem non insuavem spirat, flammamque concipit & quidem pertinacem, licet cum crepitu. In superficie granula exsudantis glebæ hinc inde adparent; in glebarum medio subinde digitalis crassitudinis bacilli, spinosi. Exterior facies myrrham aliquando refert, coloris ferruginei. Caspar Bauhinus sex ejus differentias posuit. 1. *Majoribus glebis* rufum, & cum frangitur, in plurimos grumulos diffiliens, mediocriter splendens. 2. *Minoribus glebis* subfuscum, intus rufum, cum frangitur, in duas partes quasi dissectum se dividens, translucens, densum, lentum, glutinosum, pingue, & lacrymas albas calido in loco emittens. 3. *Nigrum* intus ex nigro rufum, glutinosum, mediam inter thus & gummi Cerasorum qualitatem resipiens. 4. *Nigrum* quoque, sed intus *fulvum* purpureo colore, maxime translucens, molle, glutinosum, Cerasi gummi simile, ejusdemque sa-

Bauhin. ad
Dioscor. l. 1.
c. 69.

poris. 5. Colore & sapore priori simile, sed intus *pallidis* aut candicantibus maculis distinguitur. 6. *Pallidum* aut *candidum*, grumis oblongis, mediocribus, multis, longis, guttis densatis concretum, amarum, ingratum, omnibus speciebus acerrimum. *Eligendum* in quovis genere, ad spectu cum frangitur, nitidum, cornu aut taurino glutini simile, magis translucens, pinguius & mollius. *Adulterabatur* olim gummi & amygdalæ nucle: cætera ejus genera cortice Scordasti. Ita vocatur arbor æmula gummi. Sed deprehenduntur odore, colore, pondere, gustu, igne. Pretium sincero in libras X. terni. Exhibitæ & Bauhino pro *adulterino* nigricantes glebæ, micis si scindantur pellucetibus, alioquin visus aciem nequaquam admittentes, consistentia & sapore gummi, cujus modo, tenaciter dentibus hærent. Concipiunt tamen flammam, relicto interim crassamento copioso. Sunt, qui Bdellium legitimum *Anime* esse putant, vel myrrhæ speciem. Lobelius & Pena Londini multos surculos ligni videre, nigricantes, solida substantia, cortice duro, spinis multis, rigidis, & crassiusculis horrentes, quibus multa copia Bdellii intus forisque valde quam amari. Cæsalpinus gummi odoratum, quod ex palmis in Sicilia profluit, genus Bdellii apud Arabes fuisse censet. Comparatio conclusionem faciet. *Usus* si spectes, emollit vehementer Scythicum, at Arabicum desiccet magis. Antiquius & admodum gustu amarum, acre & siccum, ab eo, quod indurata emollit, mediocriter recedet. Dioscorides prodidit, turgentia guttura, & humidias hernias discutere, cum jejuna saliva dilutum impositum. Vulvæ spiracula laxare adpositu & suffitu; & partus humiditatesque omnes extrahere. Calculos potu comminuit Arabicum inprimis: malagmatis, quæ contra duritias & nervorum nodos profunt, inseritur. In laxandis tumoribus maxime laudatur.

11. *Belzoinum Officinarum*, Matthiolo, *Benzoinum*, Cordo *Benzoum*,
O o Benzoi

Resinæ. *Benzoi & Asa dulcis*; Ruellio *Ben Judæum*, Garziæ *Benioi*, Lugdunensi *Belzoe* vel *Belzoim* vel *Belzuium* vulgo, Linschottano *Benivinum*, Græcis & Arabibus ignotum esse crediderim; addo & Judæis, quia nulla ejus apud istos mentio. Adfertur ad nos ab incolis expressa, ac demum in magnos pastillos, massas ac panes compacta, qui malleo percussi facile in panes & grumos dissiliunt. Globæ inæquales puræ, nec ulla sorde ut plurimum infectæ. Color alias rutilans, alias magis ad albedinem vergens, creberrimis ceu unguibus, aut amygdalarum, friatura. Obscurius hi in rutilis massis lucent, in aliis candidi admodum sunt, sed non ita pellucidi; substantia compacta, arida & friabilis: sapor subdulcis, suavis, & modice velut arefcens. Commanducatum non resolvitur propter resinofam consistentiam, sed mastiches modo inter dentes lentescit, pallidumque in lurido colorem acquirit. Odorem spirat valde jucundum, cum teritur; prunis vero impositum, multo acriorem, & qui propter fuliginosum vaporem fauces siccant & tussim irritat. Plura ejus apud auctores genera. 1. *Amygdaloides*, quod myrrham troglodyticam Dioscoridis Amarus Lusitanus censet. Habet ungues, seu maculas candidas amygdalarum instar admixtas. Provenit in Sian præcipue, majorque ejus pars in Arabiam, Persiam, Asiam minorem, Africam & ad nos defertur. 2. *De Boninas*, quasi de floribus dicas nigrum, e novellis arboribus profluens, priore longe odoratius, & decuplo carius. Fuere, qui cum Styrace liquida permixtum crederent. Venit ex provincia Bayrros, idque præstantius, eo quod in Sian nascitur, ut natum in Sian reliquis præstantius. 3. *Nigrius*, quod vilioris est pretii, nasciturque in Java & Sumatra. Linschottanus *candidum* care vendi scribit: triplo carius nigrum. Quod *Amendoado* Hispanis, fragile atque friabile, quales fere sunt Amygdalæ contusæ, bonitate præstat cæteris. Omnium vilissimum in Palamban & Sumatra crescit. Usus si

species, sunt ex eo flores & oleum. Flores in dispensa laudatissimi. Oleum est duplex. 1. *Indicum*, quod ex recenti exprimitur, liquidum, tenue, rufum, fulvum & candicans odoratissimum, nares & caput opplens, atque multo Belzoim acrius, facileque penetrans. Raro sincerum adfertur. 2. *Destillatum*, multo ignavius. Adulteratur utrumque oleo, sed deprehenditur dolus turbido oleagineoque colore, & rancida faucesque offendente acrimonia. *Eligendum* purum, corticum & foliorum expers, translucidum, majoribus distinctorum colorum grumis, in densam massam compactum & formatum.

12. *Tacamahaca*, profluit ex arbore populo æquali, in parva quadam Indiæ orientalis insula & nova Hispania, si vulneratur. Substantia ex unguibus veluti diversis compacta, resinæ strobilinæ concretionem, bullatis alicubi scrobiculis cava. Color partim rutilus, partim flavus pallidior. Sapor amaricans & aromaticus. Odor Mastiches æmulus, vehemens, suavior, nulloque crassamento consumitur. Dissilit primum in pulverem sub dente, mox rursus recolligitur, lentescensque ducitur pro arbitrio. Importatur cucurbitino cortice comprehensa, punctulis nigricantibus externa parte notato, intrinsecus innumeris scrobillis non usque adeo profundis foraminulento. Magni est in medicina usus, calida in principio tertii gradus, sicca in secundo, cum singulari adstringendi facultate. Tumores mirifice maturat, resolvit, & dissipat, in principio tamen calidorum & inflammationum metuenda: sistit matricem umbilico emplastri modo imposita; validius, si Ambram vel Moschum addideris. Illita sic adhærescit, ut non nisi effectu præstito evanida decidat. Nobile remedium contra defluxiones ad faciem, oculos, dentes, si tanquam emplastrum temporibus adplicetur: contra dentium dolorem, si corrupti foramina indatur: contra scapulæ & cervicis distentiones, si inducatur: contra ventriculi imbecillitatem & flatum

Linschott.
P. 4. Orient.
Ind. c. 27.
Cord. H. P.
l. 4. c. 87.
Bauhin. H.
P. l. 9. c. 36.
P. 320.

Linschott.
Ind. orient.
P. 4. c. 27.

Monard.
hist. simpl.
c. 2.
Bauhin. H.
P. l. 9. c. 61.
P. 346.
Hist. Lugd.
l. 18. c. 28.
Ind. occid.
p. 9. l. 4. c. 29.

flatus, si cum triente Styracis & pauca ambra permixta imponatur: contra dolorem ischiadicum a frigida causa, si parti inducatur. Resolvit cum adstrictione. Monardes trientem ceræ flavæ addit.

Hist. Lugd.
plant. l. 18.
c. 29.

13. *Caranna*, Lugdunensi, *Caranna*, duplex est. *Una* oleaginosa,

colore Tacamahacæ, paulo limpidior, odore simili, sed gravior. Clusius tenacem sine multa adglutinatione & colliquatione scripsit. *Altera*

purior & Crystalli modo limpidior, odorator & præstantior. Adfertur ex continentis parte interiore, per

Monard. h.
simpl. c. 3.

Bauh. H. P.
l. 9. c. 49.

Carthagenam & nomen Dei. Bauhinus habuit sub hoc titulo Resinam galbanei coloris duriusculam, quæ etsi friata pulverem luteum emitteret, lentescibat tamen, resinæ strobilinæ odore, emittebatque adusta flammis nidorem Animes æmulum. Excedit secundum caloris gradum, ejusdem cum Tacamahaca, sed nobilioris *Usus*. Juncturarum doloribus imposita, facile eos sistit, modo humores calidi non adfluant. Humeri cruciatus, qui Tacamahaca sopiri non poterant, intra triduum sublati sunt. Tumores inveteratos dissolvit; defluxiones adeo sistit, ut temporibus sæplicitum extemplo fere dentium dolores coërceat. Fit ex ea, terebinthina, oleo de liquidambar, Tacamahaca, Balsamo, Mastiche, Myrrha, Aloë, thure, sanguine draconis & Sarcocolla ceratum adversus vulnera & hæmorrhoidum fluxum nobile.

Bauh. H.
P. l. 5. c. 19.
p. 335.

14. *Gummi Elemi Officinarum*, quibusdam Cedri, aliis oleæ Æthiopice lacryma est. Quia flammam facile concipit, & oleaginosus diluitur, inter Resinas recensetur. Hermolao dicitur quasi *Enhamon*, quod Plinio est oleæ in Arabia lacryma singulari effectum contrahendis vulnerum cicatricibus; Theophrasto mari rubro popularis, ex qua Medici medicamentum sistendo sanguini componunt. Cogitur in massas cylindraceas, duarum palmarum circiter longitudine, quæ folio Cannæ Indicæ si-

mili obvolvuntur, funiculis xylinis constrictæ. Substantia est uniformis resinacea, sub dentibus facile lentescit & dealbatur; color ceræ flavæ; odor fœniculi; sapor nonnihil acris & subamarus. Flammam concipit facile. *Vetustum* friabile magis & Hist. Lugd. exsuccum, colore fere croceo: tale plant. l. 2. que Bauhinus habuit. Commenda- c. 13. tur in Calvariæ vulneribus & fracturis vehementer. Male pro succedaneo Hederæ gummi adhibetur. De *Loco* natali nihil fere constat.

15. *Resinæ novi Orbis sunt*: 1. *Abiegna Indica*. 2. *Carthaginensis*. 3. *Ambraë facie*. 4. *Copal dicta*.

1. *Resina Abiegna Indica*, est liquor, qui ex vesicis Ambaigtingæ arboris colligitur exigua copia. Consolidat vulnera: dolores ex materia frigida & flatulenta mitigat; & ventriculi imbecillitatem, ex vino sumpta corrigit. 2. *Resina Carthaginensis novi Orbis*, purissima & odoratissima est. Utiliter nervorum, articulorum pedumque vulneribus injicitur. Similis ei a Paludano communicata, cuius Bauhinus mentionem facit, tam ea quæ flammescibat, odore fere picis, sapore subacri; quam ea, quæ colore rutilo & perspicuo. 3. *Resina*

De Laet
Ind. occid.
l. 15. c. 8.
Bauh. H.
P. l. 9. c. 39.
p. 324.

ambraë facie, coloris ex fusco cineracei erat, odore ambraë, ut quidam omnino eam esse crederent. Frustum adlatum unius libræ & unciarum sex. 4. *Resina Copal dicta*; Fragoso *Pancopal* candida est, diacitro valde transparenti haud absimilis, odorata una rugosa mollis & thuri similis; præstantior altera myrrha existimata. Adfertur ex nova Hispania. Vide, quæ de gummatibus diximus. Et tantum de Resinis liquidis.

Hist. Lugd.
Pl. l. 18. c. 32.

Bauh. H. P.
l. 9. c. 37.

Clus. Exot.
l. 4. c. 6.

Ind. occid.
p. 9. l. 4.
c. 29.

II. *Resinæ sicca sunt* 1. *Colophonia Officinarum*. 2. *Græcis ἔνθα dicta*. 3. *Strobilina*, & 4. *Abietina*. Sicci & calidi temperamenti secundum magis & minus omnes, & quibus, ut & superioribus, vina condiebantur, quæ quidem urinam ciebant, & catarrhosis ac tussiensibus opiculabantur, sed κεφαλαλγίαν & vertiginem excitabant.

Dioscor. M.
M. l. 1. c. 9.
Bauh. H. P.
l. 9. p. 247.

Resinæ. I. *Colophonia Officinarum* Galeno est cruda ex picea pinove sicca, Chia mastichi persimilis, Colophone advehi solita, Cordo *pix arida* & *græca*, aliis Resina hispanica & græca audit. Differt ergo a liquida, eodem nomine & solo gaudente, quæ, quod suavissime oleret, & pauca colligeretur, summo in pretio erat. Datur vero hoc nomen & illi, quæ *φευκτη* dicitur. Fit hæc si *συγκομισήν confusaneam*, in quo multa lignosa & lapidosa, liquatam & coctam duram reddideris ac friabilem, ut tundi, teri, & cribrari possit. Adhibetur ad odorata malagmata & acopa. Emollit & partium tenuitate digerit & discutit, tumores inprimis. II. *Resi-*

na Græcis *ἐρεα* dicta, e corticis rimis vel circa abscissos ramos exit, pin-
guedinis expers, & cito arefcens, quæ Galeno *ψύμα πινύων*. In Asia e picea admodum candida, *Spagas* vocatur. Est abieticæ strobilinæ & pityinæ mistura. III. *Resina strobilina* circa conos & strobilos concreta reperitur. Calidissima est, & celerissime siccatur. IV. *Resina abietina* male Colophonia dicitur, quæ dici liquida permanet. Minoris strobilina caloris. Dant vero & lapides in India occidentali, circa portum Tierra de Brea *aliquid resinæ*, quæ admodum bona pro navibus, nec ardore solis liquefcit.

Galen. l. 2. Ind. orient. P. 8.

CAPUT IV.

Pix.

De Pice.

Bellon. de arborib. coniferis.

E Cedro, etiam Terebintho & similibus, pix liquabatur aliquando & olim, e pinu & picea in tædam conversis fere semper. Modum Græcis usitatum Theophrastus, Cretenfis Bellonius descripsit. Obstruunt tædam, postquam constructam accendere terra, ne ullo pacto flamma erumpat. Canalis per medium acervum excitatus, fluentem in foveam ducit. Ex *Idæa* pino largior, nigrior, & odore gratior profluit: ex *Marina* flavior & crassior. *Purissimam* loca aquilonia & aprica præbent. *Horridiorem* & limosam depressa & opaca. *Nigriorem* ligna ficciora fundunt: *Copiosiore* imbribus frequentatis, quam squaloribus. Prima, quæ aquæ modo canali fluit, *liquidior* est & aquæ similis. Spissior & crassior altera, *Brutia* dicta, quæ vasculis collecta, aceto densatur. *Παλιμπίοσα* utraque. Præferitur splendens, levis, sincera. Plus calefacit quam siccatur, phthisicis, purulentis exscreantibus, tussientibus, asthmaticis propicia, si melli permista lin-

gatur. Cum eodem & uva passa, carbunculos & ulcera emarginat. Fit ex ea *arida*, si iterum coquatur, & quidem vel ad visci crassitudinem, vel igne tam valido, ut absumto humido oleoso, fragilis evadat. *Probat* pura, pinguis, odorata, subrufa & resinosa. Plus desiccatur, quam calefacit; pus movet, ulcera replet, tubercula panosque discutit, & bene vulnerariis medicamentis miscetur. Inter laudatissimas olim, *Brutia*, *Lycia*, modice cocta, inter resinsam & picem media, *Idæa*, *Pieria*, *Nerisia*, vel *Naricia* & *Nematurica*. Ad siccam *Rafilis* seu *Rabulana* pertinet, cruda quidem, sed vetustate ita durata, ut radi & in pulverem redigi possit. Hac Italiæ pars aliqua, lenitatem vino excitabat, Allobrogibus *Corticata* dicta. Ex Cera & resina conflata, navibusque, quæ in mari vitam velut peregere, derafa, *Zopis* audit, efficacior quasi, & quod adjecto salis marini callo stimuletur, *Apochema*. Dissipandi ei facultas, quia aqua marina macerata est.



HISTORIÆ NATVRALIS

DE

ARBORIBVS

LIBER VII.

De Arboribus siliquatis.

CAPVT I.

De Arboribus siliquatis Classis primæ.

ARTICVLVS I.

De Cytiso.

Cytisus.

TAB.
XCIII.

Arbores lacrymiferas excipiunt *Siliquatæ*, quæ siliquas ferunt, tam indigenæ, quam exoticæ, iisdemque similes, quas quatuor classibus includimus. In prima est. 1. *Cytisus*. 2. *Anagyris*. 3. *Laburnum*. 4. *Acacia*. 5. *Genista-spartium*. 6. *Genista spinosa* sive *Scorpius*. 7. *Genista non spinosa*. 8. *Chamaegenista*. 9. *Spartium*. 10. *Coluthea*. 11. *Senna*. 12. & *Jovis barba*.

ratis, & crassissimum caudicem habentibus sumendum est. Comprehen- dit celeriter in *quolibet agro*, quamvis macerrimo. inventus est in Cyth- no insula, inde translatus in omnes Cycladas, mox in urbes græcas, magno casei proventu: propter quod maxime miratur Plinius rarum in Ita- lia. Nascitur & ad urbem Cytizam inter campos & sylvas; & in Mysiæ tractu, quem *Brotton* nominant, cam- pus eo plenus. *Usus in re medica.*

Folia enim cedemata in principio cum pane discutiunt, & decocta urinam movent. In *re domestica* Aristoma- cho Atheniensi miris laudibus præ- dicatus est, *pabulo* ovium, aridus etiam suum: spondetque jugero ejus etiam annua H. S. M. M. vel medio- cri solo redditus. Utilitas, quæ ervo, sed ocyor satietas, per quam modico pinguescente quadrupede, ita, ut ju- menta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis major copia aut me- lior, super omnia pecorum medicina a morbis omni usu præstante. Quin & nutritibus in defectu lactis aridum, atque in aqua decoctum, potui cum vino dari jubet: firmiores celsiores- que infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit, madefactum. Apes quoque nunquam defore, Cy- tisi pabulo contingente, promittunt

Dioscor. M. I. *Cytisus Veteribus*, est planta fruticosa veluti ebenus, adpectu in- cana, uti Rhamnus, altitudinem Myr- ti attingens, quod Galenus prodidit. Non æstuum, non grandinum aut nivis injuriam expavescit. Adjicit Hyginus, ne hostium quidem pro- pter nullam gratiam ligni. Adeo plan- tis cæteris infestus idem, ut subrepto alimento fere omnes enecet. *Ra- mos* spargit cubitales, ac etiam ma- jores: *folia* fænugræci aut loti trifo- liæ, sed minora, *καὶ πάλιν ἔχοντα τρι- ζοῦα*. Ideo Plinius angustioris trifo- lii fruticem esse dixit. Cur ramulo- sa vocarit, vix scio. Digitis trita eru- cam olent, gustatu cicer viride sapi- unt. *Medulla* est dura, & ad Ebe- num proxime accedens, spissa, & ni- gra, ut apud Theophrastum inve- nies: quod tamen nonnisi de invete-

Dioscor. M.
M. l. 4. c. 113.
Theophr.
H. P. l. 1. c. 9.
de causis
l. 5. c. 6.
Galen. de
Antid. l. 4.
c. 4.
Plin. H. N.
l. 13. c. 24.
& l. 16.
c. 24.

Plin. H. N.
l. 13. c. 24.
Columella
R. R. l. 5.
c. 12.

P p

Demo-

Cytisus. Democritus & Aristomachus. Nec aliud minoris impendii est. Datur animalibus post biduum semper: hyeme vero quod inaruit madidum. Satiant equos denæ libræ, & portione minora animalia: obiterque inter ordines allium & sæpe feri, fertile est. *Distinguitur* a Columella, in sativum, & suæ spontis.

II. NOBIS est Cytisus triplex, 1. *Incanus* nempe, 2. *Hirsutus*, & 3. *Glaber*.

1. *Cytisus incanus* est multiplex. 1. *Siliquis falcatis*. 2. *Creticus*. 3. *Austriacus folio oblongo*. 4. *Siliqua longiore*. 5. *Folio medio longiore*. 6. *Albicans folio trifolii vulgaris*.

Bauhin. H. P. l. 11. c. 3. Matthiol. Lob. est Cytisus Maranthæ, p. 367. Matthiol. Camer. Cytisus Galeni, Eystettensi, ad Dioscor. l. 4. c. 108. p. 810. Lobel. obs. serv. p. 503. Honor. Bellus ad Clus. epist. 4. 1. *Cytisus incanus siliquis falcatis*, Matthiol. Lob. est Cytisus Maranthæ, Camer. Cytisus Galeni, Eystettensi, ad Dioscor. l. 4. c. 108. p. 810. Lobel. obs. serv. p. 503. Honor. Bellus ad Clus. epist. 4. 1. *Cytisus incanus siliquis falcatis*, Matthiol. Lob. est Cytisus Maranthæ, seu Cytisus verus; Bauh. Cytisus siliqua incurva, folio candidante. Totus frutex candidus est, myrti altitudine. Caudicis cor nigrum, Ebeni simillimum: rami tennes: foliola in longioribus pediculis terna retusa, nonnihil fissa, quæ gustu cicer recens æmulantur. Flos in cacuminibus multus, parvus, saturato luteus. Siliquæ contortæ circumflexæ latæ; una, aliquando pluribus spicis, parvæ, in quibus semina parva vix ineunte ætate maturescientia. Prodit in Rhodo, insulis Rhodo propinquis, & insula, cui nomen *Astachida*. Marantha prope Neapolim in colle quodam, quo ad Nesidem insulam itur, collegit. Visa Pfortzchemiæ aliquot cubitorum florens, quæ siliquas mense Octobri ferebat. Ferre hyemem extra tetum non potest. Ex ligno Calojeri in Pathmo sphæras præcatorias, Turcæ ensium manubria conficiunt.

Honor. Bellus ad Clus. epist. 1. & 4. Bauhin. H. P. l. 11. c. 3. p. 374. 2. *Cytisus incanus Creticus*, Anguillaræ Barba Jovis altera, Bello *αρχοντόζυλον* & *Ebenus Cretica*. Frutex est obliquus quinque cubitorum altitudine. Materies nigra, splendida & dura: Cortex cinereus, profundis scissuris plenus: folia terna,

plura sæpe simul juncta, argentea, trifolii æmula, dorso aliquantum prominente: flores trifolii majoris, rubri in quibus albi quidam villi, Struthiocameli pennas in minutissimas partes divisas æmulantur: semina milio majora, trifolii modo profert. Nascitur in asperrimis collium locis in Creta. Eundem cum isto puto & illum fruticem esse, qui sub Ebeni secundi, & *Ebeni Candia* nomine ab Italis missus est, & a Bauhino describitur. Virgulta sunt lenta, teretia, cana lanugine pubescentia; folia terna, longa, acuta, villosa, albida. Flores in spicam digesti, purpurantes, ex folliculo lanuginoso candicante, in plumatas cuspides desinunt, & uniusque acuminatum folium subjicitur. Semen in involucris trifolii bituminosi album, oblongum.

3. *Cytisus incanus Austriacus folio oblongo*, Clusio Cytisus quintus, Tabern. undecimus, in icone sextus, audit. Radix illi nigricans. Virgæ rectæ tenues, vimineæ, quas ab imo ad summum, folia ab uno pediculo terna, angusta, amara, & si terantur, quasi pinguis exornant. Flores in summo quini aut feni, aurei coloris. Ex folliculis siliquæ oblongæ planæ, hirsutæ, in quibus semen durum, subrotundum, tumidiusculum & rotundiusculum, quod dehiscens siliquis excidet, & a vermiculis sæpe eroditur. Frequens toto Viennensi agro, præsertim supra Phasianorum fabricam; in Moraviæ etiam locis aridis propter vias. Floret Julio, & subinde in autumnum usque: semen sub finem Augusti, & in Septembre maturefcit. Totæ aliquando stirpes vulgari cuscuta obsitæ conspiciuntur, Est & acuminatis foliis.

4. *Cytisus incanus siliqua longiore*, Bauhin. H. Lugd. Cytisus prior penæ, Tabern. quartus, quinque vel sex cubitis est procerior & universa cana. Radix lignosa: sarmenta genistæ plura, gracilia, prædura, striata; folia e tenuibus pediculis terna, non ita numerosa, sænugræco similia, angustiora, habitiora, rutacea. Flores genistæ vel sparti lutei, sed minores, Siliqua genistæ

nistæ par, cinerica, gracilior, compressior: intus loculis discepta semina nitentia, ex atrore genistæ. *Vulsa* in tractu Narbonensi, ad radices montis Calcarii, prope Veganium. Quia tenerior, est pecudum pabulo aptior. Attulit inde & Cherlerus *ramulum*, qui teretes & tenues propages alternatim producebat, tantillum in extremis hirsutas. Folia terna nullo pene pediculo, & inter Cytisi minima. Flores per ramulorum extrema genistellæ pares, lutei, calyculo subhirsuto, in acutas lacinias diviso. Rami aliquando, cum defloruit, candidi. De siliquis nihil proditum. In hortos translatus canitiem amittit.

dine sextantili, angustæ, quæ æstate Cytisus maturefcunt. *Semen* intus inter fænu-græcum & lenticulam figura & magnitudine media, gustu viciæ. *Nascitur* in montosis, inter petras & arbusta, locis potius apricis quam umbrosis. Copiose in collibus Ratisbonæ ad Danubium vicinis, & monte Castein dicto.

II. *Cytisus hirsutus* est sextuplex.
1. *Folius subrufa lanugine villosus*. 2. *Major foliis pinnatis*. 3. *Flore luteo purpurascens*. 4. *Supinus*. 5. *Foliis minoribus ramulis tenellis villosis*, quibus adjici debet. 6. *Pseudocytisus flore Leucoii luteo*.

Clus. H. P.
l. c.
Tabern. H.
P. l. 3. c. 106.
P. 819.

5. *Cytisus incanus folio medio longiore*, Clusio *Cytisus sextus*, Tabern. *nomus*, Gerh. *semper vivens*. Raro cubitalibus ramis ad surgit, iisque omnino incanis & tenuibus. Folia, quorum medium duplo longius est reliquis, cinerei & canescentis coloris, adstrictoriæ facultatis brevi pediculo insident. Flores per singulorum foliorum exortus in ramusculis aurei, jucunde odorati, bini aut terni simul nascuntur, ex molli quadam & candida lanugine hirsuta vaginula, similis cum superioribus formæ, sed minores. *Invenitur* variis Hispaniæ Baticæ locis, imprimis in regno Valentino. Incolis *Boga* & *Boxablanca*. Ramis a foliis liberis bombyces stamina sua sericea advolvunt, quæ deinde a pueris & mulierculis explicantur.

Cord. H. P.
c. 28. p. 188.

6. *Cytisus albicans folio trifolii vulgaris*, Cordo *Cytisus albus*, sylvestris, est frutex sæpe bicubitalis. Radix lignosa, multifida, perennis. Folia numerosa, in singulis pediculis, terna, dorso elato, ab utraque parte in mucronem desinente carinam referentem, glutinosa & dulcescentia. Flores post veris initium ab inferiore sui propemodum parte ad virgarum summitatem e foliorum alis prodeunt, longi, papilionacei, fabæ floribus similes, lutei, gustu immaturi cujusdam leguminis. Siliculæ e medio florum principio hirtæ, longitu-

1. *Cytisus hirsutus foliis subrufa lanugine villosis*, Clusio *Cytisus tertius*, Lobel. *Cytisus quartus hispanicus Clusii*, Gerh. *Pseudocytisus hirsutus*, attingit humanam altitudinem. Virgæ non admodum fruticosæ, lentæ. Cortex niger. Folia trifolii terna, supina parte viridia, prona, subrufa lanugine hirsuta. Flores calycibus longis, lanuginosis aurei coloris, quos circa Calpen & Baticæ maritimis mense Februario fundit. *Siliquæ* pilis obscurantur. Hispani *Escabon* vocant. *Nascitur* & in Apennino juxta Bononiam, in Burgundia circa oppidum Baulme; & in Sundgovia.

Clus. H. P.
l. 1. c. 64.
p. 94.

Bauhin. H.
P. l. 1. c. 3.
p. 372.
Lobel. Ad-
vers. p. 504.

2. *Cytisus hirsutus major foliis pinnatis*, Gerh. *Cytisus pinnatus*, Clus. *Cytisi quinti altera species*, Tabern. *Cytisus septimus icon. alias duodecimus*. Multo major est Cytiso incano Austriaco. Virgæ crassiores, erectæ admodum hirsutæ: folia duplo ampliora: flores colore aureo magis rutilant. *Nascitur* juxta sepem, minus Austriaco obvius.

Clus. l. c.
Bauhin. H.
P. l. 1. c. 3.
p. 369.
Tabern. l. c.

3. De *Cytiso hirsuto flore luteo purpurascens*, nihil occurrit, nisi quod a Pona magnus vocetur.

4. *Cytisus hirsutus supinus* est duplex 1. *Foliis incana lanugine inferne pubescentibus*. 2. *Foliis inferne & siliquis molli hirsutæ pubescentibus*.

P p 2

1. Cyti-

Cytisus. I. *Cytisus hirsutus supinus foliis incana lanugine inferne pubescentibus*, Clus. I. c. Tabern. l. c.

Clus. I. c. Tabern. l. c. *Cytisus septimus*, Tabern. *sextus*, Ger. *hirsutus*. Fundit aliquot ramos humi, lentos & fractu contumaces, qui nullis aut rarissimis foliis obseruntur. Ex lateribus prodeunt ramuli tenelli hirsuti, in quibus folia terna, dorso elato superne viridia, inferne cana lanugine pubescentia, herbacei odoris, saporis amariuscule, longis pediculis nituntur. Flores lutei, ex alarum sinu prorumpunt, qui dum marcescere incipiunt, adeo saturatum aureum colorem induunt, ut purpurascere videantur. Folliculi, unde flores emergunt, pallent & lanugine pubescunt. Siliquæ planæ & hirsutæ subfuscum & exiguum semen continent. Provenit in sylva ad Lachn pagum Viennæ vicinum, & in Interamni ultra Dravum Pannonia. Floret hic aliquando Aprili, Majo sæpius, & interdum novos per totam æstatem ex ramulis flores profert. II. *Cytisus supinus foliis inferne & siliquis molli hirsutæ pubescentibus*, Clus. I. c. P. 97. *Cytisi septimi species altera*, Eystettensi *Cytisus septimus*, virgas habet pedales, tenues, virides, supinas & humi fusas, quas ambiunt similia folia. Flores pares extremis virgis quini, seni, aut plures simul congesti innascuntur, nulli vero per virgas sparsi. Siliquæ & semina non differunt. Virgarum & foliorum pars inferior & siliquæ molli hirsutæ pubescunt. Clusius in folis Pannoniæ sylvis mense Majo florentem vidit.

Clus. H. P. I. I. c. 62. P. 92. Lobel. observ. p. 503.

5. *Cytisus hirsutus foliis minoribus ramulis tenellis villosis*, Clusio *Cytisus primus*, Lobelio *Cytisus hispanicus primus*, Tabern. *Cytisus hispanicus* I. icon. alias *septimus*, arbusculæ est aliquando magnitudine; *Stipes* durus, cujus materia flavescit, cor nigricat. Cortex candicat: ramuli toti villo obseruntur. Folia terna uni pediculo inhaerentia, Medicæ modo, dilutioris viriditatis, saporis viridium leguminum, amari tamen. In summis ramis flores genistæ spicatim prodeuntes, nonnihil odorati. Lobi genistæ pares, oblongi, asperi

& hirsuti, in quibus semen nigricans, tumidiusculum.

6. *Pseudocytisus flore Leucoii luteo*, Lobel. observ. p. 505. Lobel. & Bauhino *Cytisi facie Alysson fruticans quorundam*, Tabern. *Cytisus adulterinus*. Radix est lignosa durior. Folia Cytisi habitiora, albidia, hispida, setaceis pilis rigentia. Flores lutei leucoii minoris ætate, e sparsis numerosis, anfractuosis, Polemonii striatis calyculis fundit. Semen in folliculis.

III. *Cytisus glaber*, est quoque sextuplex. 1. *Glavis foliis subrotundis, pediculis brevissimis*. 2. *Viridis*. 3. *Nigricans*. 4. *Foliis incanis angustis quasi complicatis*. 5. *Foliolis glavis siliquis ornithopodii hirsutis*. 6. *Bellonii*.

I. *Cytisus glavis foliis subrotundis, pediculis brevissimis*, Lobel. observ. p. 388. Tabern. l. c. *Cytisus alter minor*, Tabern. *Cytisus quintus rotundifolius*, Eystett. *Trifolium arborescens*, Bauhino *Cytisus glaber siliqua lata*. Virgulæ ad tertium & quartum cubitum adsurgunt, glabræ, & ubi attenuari occipiunt, angulosæ. Folia in ramulorum principiis terna, concinna, rotunda, brevissimis pediculis hærent; in extremis bina aut singularia fortuito posita latiora, & in acumen desinentia, utrinque lato virore superba. Flores in ramulorum summitate lutei, genistellæ æmuli, ex pedicellis semuncia brevioribus insident. Siliquæ semunciam latæ, compressæ, glabræ; quibus semina fusca, subrotunda, compressa. Vidit in Italia, & Basileæ in Plateri horto Bauhinus. Forte est *Cytisus primus* Anguillaræ, qui etiam in Provincia & Corsica provenit, & Erucæ odorem ibidem habet. Tabernomontanus male siliquas hirsutas adpinxit.

2. *Cytisus glaber viridis*, Tabern. Tabern. l. c. Bauhin. H. P. I. I. c. 3. *secundus*, Gerhar. *siliquosus*, Guilandino *Trifolium fruticans*, quid sit, p. 373. vix ex Tabernomontano colligas, Gerhardus vero nobis ad manum non est. Johannes Bauhinus videtur *Cytisum glabrum*

glabrum siliqua angusta nominare: Si hic est, *folia* illi erunt terna, ex rotundo sublonga: flores ad virgularum angulosarum latera, ex foliorum alis singulares, magni, calyce satis longo. Siliquæ de lateribus prorumpunt, culmo angustiores, glabræ, inter cytisos omnes tenuissimæ, quæ pediculo brevissimo hærent, & siccæ nigrescunt. An non hic potius *siliqua lata* dici debeat, superior, angusta, consideret Lector. Facile in istis erratur.

4. *Cytisus foliis incanis angustis* Cytisus: Clus. l. c. Tabern. l. c. *quasi complicatis* Clus. *Cytisus secundus* Lugd. *Cytisus secundus hispanicus Lobelii*, Tabern. *octavus*, duorum est cubitorum. *Virgæ* candidæ, omnino tenues, ramosæ. *Folia* terna, incana, semper quasi complicata, dorso prominente, impense amara. *Flores* extremis ramis insident, colore plane aureo. *Siliquæ* longiusculæ, asperæ, ex purpura nigricantes, mucrone deorsum inflexo. *Semen* majus est subnigrius, quam in Cytiso minoribus foliis, ramulis tenellis villosis. *Crescit* Salmanticensi agro, & aliis Castellæ locis, juxta vias publicas: floretque ibidem Junio, semen Julio & Augusto profert. Circa Monspelium foliis est viridibus, in Hispania incanis.

Cord. H. P. c. 29. Gesner. hortor. germ. p. 256. Clus. l. c. Tabernom. l. c. Bauhin. H. P. l. 11. c. 3. p. 370. 3. *Cytisus glaber nigricans* est Cordo *Pseudocytisus* sive *niger*, Lugdun. *Cytisus Gesneri*, Gesnero *Cytisus minor*, Clus. *Cytisus quartus*, Eystetensi *Cytisus spicatus*, Tabernom. *Cytisus primus*, Bauhino *Cytisus Gesneri*, cui flores fere spicati. *Virgas* habet cubitales, lentas, vimineas, in multas alas tenues concavas, brevi pilo circa ramulorum fastigia hirsutas. *Folia* terna, viridia, eminentiore dorso, amariuscule. Summæ virgæ in oblongam *florum* quatuor foliolis constantium spicam desinunt; qui lutei pisi formam æmulantur, & melleum quid spirant. *Siliquæ* succedunt longæ, planæ, quibus exiguum & flavescent *semen*. *Nascitur* in omnibus Viennensis agri sylvis, in Pannonia, Austria inferiore. In sylva Hercynia, qua Bohemiam attingit, sub finem Junii florere incipit, & Augusto plerumque cessat. Gesnerus eum quatuor cubitorum facit, odoratis & oblongis *florum* seu spicis aut paniculis plusquam millenis, habuitque Tiguri florentem e colle prope Scaphusium. Est & circa Stutgardiam frequens.

5. *Cytisus foliolis glabris siliquis ornithopodii hirsutis*, virgis est rotundis, striatis, duris, tricubitalibus, in varios ramos nonnihil lanuginosos brachiatis; quos *folia* numerosa, terna uni pediculo in hærentia, in summis ramulis exigua, dilute virentia ambiunt. *Flores* parvi, lutei, genistæ similes. *Siliquæ* unciales, molli hirsutæ tectæ, instar siliquarum ornithopodii, minus tamen profunde sinuata, & plures simul junctæ, ternæ, quaternæ, quinæ, uni pedicello in hærentes; quibus *semina* parva, plana nigricantia. *Frequens* est in Hispania ad agrorum limites.

6. *Cytisus Bellonii*, in Thraciæ & Macedoniæ pratis provenit. Quid sit, non describit. Bellon. observ. l. 1. c. 56. 60. 63.

ARTICVLVS II.

De Anagyri & Laburno.

I.

TAB. XCIV. Dioscor. M. l. 3. c. 167. Plin. H. N. l. 27. c. 4. Virgil. in Moreto. Varro R. R. l. 1. c. 18. Plin. H. N. l. 29. c. 4. De *Anagyride* seu *Anagyro* pauca apud *Veteres* occurrunt. *Fructus* est δανδαῖος, & βαρύσμος. *Virgæ* & *folia* vitici seu agno casto adsimulantur. *Flos* brassicæ, Plinio oleosus. Ita illa apud Virgilium, Varro- nem, & ipsum Plinium κατ' ἐξοχήν vocatur. *Semen* in corniculis (κερεταῖς)

non brevibus (μικροῖς Oribasius legit) simile renibus gignit, ποικίλον καὶ εἶρεον (vetus Codex ερεγγύλον legit) quod περὶ τὸν τῆς σαφυλῆς πεπασμὸν, seu per messes, ut Plinius prodidit, durescit. *Usus foliorum* & *seminis*. Illa περιπτον δυστοκῆσαις, sed a partu tollere oportet. Recentia trita cedemata

Anagyris & Laburnum.

Anagyris mata reprimunt: sicca drachmæ ponere, in vino, secundas, menses & partus extrahunt. Hoc est λεπτομερεστερον & ἐμετικόν. Hinc proverbium, κινεῖς τὸ ἀνάγυρον, de quo in catalogo. Ad triginta sex grana contra δυσέρεσιν nimis audacter, exhibuere quidam. Galenus folia virentia propter misturam humidi minus acria facit; rescicata, incidere.

Plin. H. N. II. Pauciora de Laburno habebis. L. 16. c. 18. Aquas odere, inquit Plinius, Cupressi, juglandes, Castaneæ, Laburnum. Alpina hæc arbor, nec vulgo nota; dura & candida materie; cujus florem cubitalem longitudine apes non attingunt. (floris cubitalem longitudinem, legunt alii.)

III. MODERNIS duplex est Anagyris I. Fætida. 2. Non fætens.

I. Anagyris fætida, vel est prima, vel altera, folio rotundo.

Clus. H. P. I. 1. c. 63. Dodon. Pempt. 6. L. 2. c. 27. 1. Anagyris fætida prima, Dod. Anagyris, Gesn. Anagyris prope Arelatum, Clus. Anagyris vera. Tabern. Anagyris prima, frutex est hominis altitudine, in calidioribus præsertim regionibus; alibi duorum hominum magnitudinem æquat. Ramulis cortex ex viridi nigricans. Folia terna, superne dilute virescentia, aversa parte incana, fœtore caput petentia. Ex foliorum alis flores πενταφύλλοι, oblongi, Cytisi florum modo, sed quorum supremum quodque reliqua integit, brevius est, & minime ut in illis reflexum, coloris intensius aurei, reliquis pallefcientibus. Siliquæ digitalis longitudinis, pollicaris latitudinis, cartilagineæ, in quibus aliquando plura, quam quatuor semina, renis forma, exiguis phaseolis æqualia, quæ initio candicant, mox purpurascunt, tandem ex cæruleo nigricant. Nasctur circa Arelatem in colle Antonii; in Hispania, circa Hispalem, Valentiam, Mundam, Malaccam &c. Floret ibi Januario & Febuario; semen æstate maturum.

Bellus epist. 2. ad Clus. 2. Anagyris fætida altera rotundo folio, est Anagyris Cretica Honorii

Belli. Solo folio a superiore differt, & circa Idam montem in Creta provenit. Caseus ex lacte Caprarum, quæ anagyrin depastæ sunt, confectus, vehementes vomitus & fluxus ventris causatur.

II. Anagyris non fætens est etiam duplex I. Major vel Alpina, 2. Minor.

I. Anagyris non fætens major vel Alpina, Matthiol. Anagyris prima major, Angv. Egano forte Ebeni species Theophr. Cordo Arbor trifolia. Camer. & Bauh. Laburnum, Eystett. Anagyris latifolia, arboris magnitudinem aliquando adsequitur. Rami brachiati, quibus cortex virens, materies dura. Folia ex uno tuberculo terna, quaterna aut quina aliquando, inferne subhirsuta, ex virore pallido; superne glabra, satisque saturo virore tineta, pediculo hirsuto insident. Flores describente Bauhino, ex eodem tuberculo, cum foliis, aut in ramulorum extremis, aut e lateribus, in longa, tereti, tenui, hirsutaque & incana ligula dependent, dodrantali, interdum brevior, flavi, genistellæ floribus similes, ex foliis quaternis, supremo reliquis multo majore lata, sursum reflexo, nigrore intus nonnihil maculoso. Gesnerus cubitales facit. Siliquæ pisorum hortensium filiquis similes, compressiores, fractu contumaces: in quibus semen renis effigie, ex lato subrotundum, & qua filiquæ per petiolum hærent tantillum excavatum, quod primo viride, per maturitatem, varium, & tam durum, ut ne maceratione quidem vincatur. Provenit abunde in Alpibus Chamberii, & Lausannæ vicinis. Ex materie pali, quibus agri sepiuntur, & arcus nigri, tergo albi. Flores non attingunt apes. In horto Lugdunensi habetur folio longiore, angustiore, solidiore & atro-virente, quod Laburnum latifolium nominatur.

2. Anagyris non fætens minor, Dodon. Trago faba inversa, Dodon. Eghele, Eystett. Anagyris angustifolia, Matth. Altera, Lugd. Laburnum alterum, Ananienfibus in agro Tridentino Avornello

Matthiol. in l. 3. Dioscor. c. 149. p. 664. Bauhin. H. p. 111. c. 1. p. 361.

vornello dicitur. Frutex est Anagrydi haud dissimilis, non raro arborescens. *Folium* trifolii non foetens, nec ingrati saporis: *flores* lutei racematim palmi longitudine digesti. *Cornicula* genistæ æmula, in quibus *semen* oblongum, phaseoli modo, & subnigrum. *Nascitur* apud Ananienfes, Bononiæ, in montibus circa Clarevall Burgundiæ, & alibi. In monte Salevæ & Thuyri circa Genavam florebat in Julio: in montibus Apenninis, mense Aprili nondum aperti flores. In horto Montbelgardensi truncus ad crassitudinem cruris excrevit.

Ex EXOTICIS placet huc duas Anagrydis referre. 1. *Tlalamatl*, & 2. *Ytz-& Laburnum*.

I. *Tlalamatl*, arbor est *foliis* salvia pinguioribus & mollioribus: *flo-* ^{Reccus R. M. N.H. l. 3. c. 38.} *ribus* spicatis parvis & coccineis; ex quibus progressu temporis acini prodeunt. *Nascitur* in frigidis, floretque Februario mense. Ajunt radicem tritam ulceribus mederi. Folia manipuli pondere decocta, vomitum cient.

II. *Ytzatlalamatl* phaseolus est trifolius, venis foliorum rubris, floribus carneis papilionaceis; siliquis securidacæ, arborecenti similibus. ^{Reccus l. c. p. 452.}

ARTICVLVS III.

De Acacia.

Acacia.

I.

TABVLA
XCV.Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 133.

Acaria, quæ & *Acantha*, duplex est Dioscoridi. *Ægyptiaca* nempe seu *Thebaica*, & *Cappadocica*. I. *Ægyptiaca* est *δενδρώδης καὶ θαμνώδης*, id est, retinet formam fruticis, sed arboris aliquando altitudinem acquirit, ut *δενδρώδης τιθύμαλος* Dioscoridi dicitur. Cum myrrha instituta comparatio, lacrymæ succo, non arbori convenit, & pro *ὁμοίς ὁμοιον* legi debet. Non valde eadem *ὁρθοφυής*. *Florem* promit candidum & adspectu pulcrum, *σεφανωματικὸν & φαρμακώδη*. *Fructus* lupini in modum siliquis inclusus. Fundit pressus *ἐγγύλισμα*, immaturus *ὑπόκιρρον* & viridem, *πέπαιρος* nigrum, qui in umbra siccatur. Fundit & gummi. Eadem cum ista *Acanthos Theophrasti*, altitudine aliquando duodenorum cubitorum, ut testis idonea cadatur: materie dura, quæ cæsa colorem Loti repræsentat, & tertio statim anno renascitur. Tota, trunco excepto, aculeis horret, adeo ut & germina & folia iis rigeant, *florem* superius descripsimus, & coronis jucundis & medicamentis utilis. *Semen* in siliquis modo leguminum, quo coria perficiuntur, gal læ vice. Dum baccam Virgilius vocat, *καρπὸν σφόγγυλον* Demetrius apud Athenæum, vel de alia spina intelligendi sunt, quod verisimile; vel de flore, qui ex observatione moderno-

rum rotundus est, & platani pilulam mentitur. Fundit gummi, tum percussa, tum *αὐτομάτως ἀνευ χύσεως*. Circa Thebas hæc, ubi & quercus, & persica & oliva, trecentis a Nilo stadiis, sylvestri tractu, & suis fontibus riguo. *Duplex* Theophrasto; *Candida* nempe, quæ imbecillis facileque putrescens; & *Nigra*, quæ robustior, & incorrupta etiam in aquis durat, ob id utilissima navium costis. II. *Cappadocica*, quæ Pontica & Galatica, ^{Strabo geogr. l. 12.} quod Galatia confinis, *Ægyptiam* quidem refert, sed *χαμαίηνλος* & tenerior, (deterior legunt alii perperam; cum trunco præcedentis comparat) spinosior, *foliis* rutæ similibus. Autumno *semen* profert lenticula minus, in folliculis convexis, ternum quaternumve capacibus. Colligitur circa idem tempus, ante collectum (quia æstate fructus immaturus acerbus) nimio validius. Tota in succum expressa adstringit, facultate inferior, & ad ocularia medicamenta inepta.

II. NOBIS est Acacia quadruplex I. *Foliis scorpioidis leguminosa*. 2. *Trifolia*. 3. *Indica Farnesiana*. 4. *Americana Recci*.

I. *Acacia foliis scorpioidis leguminosa*, Bauh. *Acacia vera*, aliis *Acacia* *Ægyptiaca* & *Alexandrina*, An- ^{Bauh. H. P. l. 12. c. 8. p. 426.} *guil*.

Acacia, *guil. Acanthus Theophrasti*, Bellonio
 Epitom. *Acacia Officinarum Constantinopoli*,
 Bellon. ob- *Lobel. Spina Acaciae Dioscoridis pri-*
 serv. l. 2. *ma*, Rauwolf. *Acacia Schamuth, Schack*
 c. 56. Lo- *Halepi, Aegyptiis Sant.* Mori cre-
 bel. adverf. *scit magnitudine. Caudex pruni. Ra-*
 p. 409. Al- *mi, spinis albis, ab invicem divarica-*
 pin. de plan- *tis, binis ut plurimum simul junctis*
 tis Agypt. *armantur. Cortex ex nigro cinera-*
 c. 4. *ceus: lignum ex luteo pallescens. Fo-*

Columna
 ad Recci R.
 M. N. H.
 p. 866.

lia oblonga, parva, minutissime in-
cisa, pinnatim multa ad costam unam
coherent, ut trecenta quinquaginta
pollice tegere possis. Committun-
tur ad solem occidentem inter se, ut
absque lobis unicum esse censeas ad
Orientem sensim repanda. Flores
copiosi, parvi, flavi, pallide subfla-
vi, atque etiam albi rotundi, platani
fructibus similes, qui molli veluti la-
nugine constant, & pulverem ex se
remittunt. Alpinus mollem lanugi-
nem, rotundum globulum efforman-
tem dixit, jucundi odoris. Siliquae
lupini filiquis quodammodo similes,
fuscae, compressae, angusto isthmo
eoque fragili interceptae. Unicui-
que loculo ad latera apertili semen ut
Bauhinus habet unicum, spadiceum,
circulo in unguem ducto notatum,
oblongum, medulla durissima. Ipsas
intrinsecus pellicula rufescens succin-
git; inter quam & extremum corti-
cem liquor concretus, valde paucus.
 Vesling. ad *Veslingius latitudine pollicem trans-*
 Alpin. de *versum metiri, longitudine dispa-*
 plant. exo- *res esse scribit. Nam filiquarum ejus-*
 ticis c. 4. *dem arboris alias digiti, alias manus*
quoque, spithamæve mensuram su-
perasse vidit, non ternis tantum aut
quaternis, sed octonis, etiam denis
pluribusque seminibus inter arctatos
lobulos invicem subornatis. Nasci-
tur in Aegypto locis a mari remotis:
copiosissime in monte Sinai pone ru-
brum mare. Cahiræ flores flavos
vel pallidos; in montibus Arabiæ al-
bos profert. Circa Halepum humi-
lis est, in arvis inprimis, agricolisque
exosa. Prope urbem Bir ad Euphra-
tem major arbore & fructu, quam ali-
bi: in Arabia cum rotundis fuscis fi-
liquis, & circa Babylonem in arena.
In Creta plantante Honorio Bello, pe-
diculo uno flos unus exhibat, & cito

in terram decidebat, frutice ad sex
 cubitos elato, sed qui nullum semen
 produxit. Circa Sues ad mare ru-
 brum sola in deserto sterili prodit,
 reliquis plantis solum dedignantibus.
 Crevit & Neapoli, tripedali longitu-
 dine, caudice rufescente, foliis pen-
 natis quaternis in singulis petiolis.
 Bina primo crassa *lunata folia* ex se-
 mine prodire, dein unicum penna-
 tum octonis lobulis insertum cauli-
 culisque, in quo spinula binæ. *Usus*
gummatis nobilis & frequens, de quo
libro ultimo agemus. Folia pertica
decussa, arietum apud Arabes pastus:
succo ex immaturis filiquis & viridi-
bus expresso, Cahirenses coriarii pel-
les denigrant. Duplex est, si diffe-
rentiam quæras, Mas & Fœmina. 1.
Mas spinis horridus, fructus non edit.
2. Fœminæ pauciores & molliores,
quas extra ramos edit. Fœcundissi-
ma est; Orientibus Plejadibus, No-
vembri scilicet florere incipit, & rur-
sum ipsis Occidentibus Majo. Bife-
ra in anno, bisque fructus maturat.

II. *Acacia trifolia*, Matth. & Do-
 don. *Acacia altera*, Lobel. *Acacia al-*
 tera *Dioscoridis*, Cæsalp. *Aspalathus*,
 Bauh. *Aspalathus secunda trifolia*;
 frutex tricubitalis, foliis rutæ aut Cy-
 tisi ternis. *Siliqua* genistellæ aut vul-
 garis glycyrrhizæ novaculam effigiat
 dorso obtusiore, & altero latere quasi
 acie, acutiore. Tria etiam aut qua-
 tuor genistellæ semina parva, rotun-
 da, lata, dura, claudit: quæ nondum
 matura flavent, postea nigricant. Bau-
 hinus ramos ipsi tribuit rigidos & li-
 gnosos: *Corticem* subcinericium striat-
 um. *Spinæ* duarum aut trium un-
 ciarum, bifidas, trifidas, & striatas;
lignum albicans: *folia* exigua puber-
 tatis, quæ æstate amittuntur, ut au-
 tumno redeant. *Provenit* in Jacyn-
 tho, Creta & in Palæstina circa Hie-
 richuntem & Ramam. Visa Veronæ
 in horto Calceolarii, & Patavii apud
 Cartusum. Quidam eandem cum
 illa planta faciunt, quæ circa Nea-
 polim & Puteolos veris initio florem
 luteum genistæ similem, & filiquas
 pilosas aurei coloris profert, *Spala-*
trone dicta.

Lobel. ob-
 serv. p. 410.
 Bauhin. H.
 p. l. II. c. 3.
 p. 575.
 Alpin. de
 plantis exo-
 ticis l. I. c. 6.

III. Aca-

Aldin. horti
Farnesic. 1.

III. *Acacia Indica Farnesiana*, Roma in horto Cardinalis Farnesii ex semina ex insula S. Dominici missa crevit. Magnitudo ei nucis Ponticæ. *Radix* una, recta, profunda, a qua radiculæ plures: auctumno dum turgēt, brassicam contusam & putrescentem quodammodo redolet. *Caudex* semipalmum crassus. *Rami* longi, alti, erecti, juncturis in rectum sibi non respondentibus, flexiles, & fractu contumaces. Novelli, qui humum spectant, ex viridi cinerascunt; qui solem, obscure rubent, albisque punctis maculantur, omnes tandem cum diluto virore cinerei. *Folia* mense Majo prorumpunt, pennis quinque, senis vel septenis in singulis petiolis, quibus aculei. Panduntur sole Oriente, occumbente complicantur. *Flores* Quintili & Septembri mensibus funduntur. Pauci illi, ut singulatim exorti, postquam pauca ex veteri ligno emerferunt folia, & brevis pediculi, sed qui fructum perficiant: Copiosi hi, ex novellis surculis, tres, quatuor, quinque & sex orti quasi simul, longo pediculo hærent, nullum fructum forte propter frigus ferunt, & siccati arbori suæ ad verusque adpensi adhærent. Virides sunt initio, dum parvi, & exiguum frugum æmulantur; lutescunt dein, post unum & alterum diem canescunt, parvæ in modum pilæ rotundi, tomentosi, & quasi ex pluribus flocculis confarcinati. Occurrunt in iis & parva ac oblonga vascula, nisi calyculos malis dicere, 95. 100. & 110, optime simul in perfectam rotunditatem confarcta, quæ occlusa virent; aperta cum efflorescunt singula 40. vel 50. tenuissima, brevia, lutea capillamenta, quibus pro apice granum luteum, emittunt. Sapor cum amaritudine strictior; odor violæ luteæ, & in siccis pertinax. *Siliquis* ex vasculis ortus. Denæ sæpe ex uno flore, nec centum oriri, quia tot calyculi, impossibile. Contortæ parvæ, rotundiores & veluti cornicula, virentque; sapor stringentissimus: maturæ, lentum lobos expriment, sex uncias longæ, digiti minoris crassitie, tuberculosa, & niger,

rimæ. Crassas & ventriosas Columna dixit. *Semina* in siliquis sine ordine, viridia dum immatura, & piceoli magnitudine, sed longiuscula; dura & nigra, dum matura. Allium vehementer redolent, ejusdemque fœtore halitum mansa inficiunt. Substantia intus candida & levis. Missa est sub nomine *Sarza*.

IV. *Acacia Americana Recci* est duplex 1. *Spinosa*. 2. *Non spinosa*.

1. *Acacia Americana Recci spinosa* incolis *Mizquitl* dicitur. Incondita est & spinosa, foliis exilibus, alliorum in modum pennas avium imitantibus, ordine, utraque ramorum parte dispositis; flore betulæ nostratis proximo; siliquis longis, hinc & inde pendentibus, edulibus, dulcis & grati saporis, in quibus semen. Dat & *gummi*, & *Cassiam*. Ideo Ximenes veram veterum Cassiam esse credit. *Frequentissima* est novæ Hispaniæ, & sua sponte quibusvis in locis, sed maxime montosis, temperatis, & frigidis provenit. Ex siliquis placentulas *Chichimecæ* formant, quibus panis loco vescuntur. E tenerrimis turionibus effluit liquor vel exprimitur, morborum ocularium præsens remedium. Decoctum *Cicerum* nimium mensium fluxum compescit; qui si primiparæ, tineæ & lichenibus medentur.

2. *Acacia Americana Recci non spinosa* incolis *Mitzquitl Tzintzequam*, ut & *Tlacotic*, radice est fibrosa. *Caulis* & rami rubent ex luteo. *Folia* millesfolii subtiliora, quam in superiore. *Flores* tres in summo rubri, qui in altera icone designantur: in qua angustioribus foliis, densisque magis radicibus planta exprimitur. Provenit apud Michuacanenses, funditque *gummi* vocatum Arabicum.

EXOTICA.

Præter jam dictas possunt huc ex Exoticis Indicis & aliis referri. 1. *Frutex Mesopotamicus Acaciæ foliis*. 2. *Frutex Palestinus Bellonii*. 3. *Arbor cornigera foliis Acaciæ*. 4. *Ibira-*

Rr

pytan-

Acacia:
Columna
ad Recc. R.
M. N. H.
p. 867.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 24.

Laet Ind.
occid. l. 5.
c. 3.

Nieremb.
H. N. l. 14.
c. 63.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 25. &
p. 417.
Laet Ind.
occid. l. 5.
c. 23.

TAB.
XCVI.

Acacia. *pytanga Brasiliensium*. 5. *Tehoaxin Terentii*, quibus adde 6. & *Uty Brasiliensium*.

Columna
ad Recc. R.
M. N. H.
p. 867.

I. *Frutex Mesopotamicus Acaciae folius*, Petro de la Valle Equiti, qui ex Oriente redux attulit, debetur. Magnitudinem humanam non excedit. *Ramuli* lignosi, ulmeo cortice vestiti, qui *spinas* non simul binas in exortu foliorum, sed distinctas habent, unicamque in illorum exortu. *Folia* pennata, senis pennarum ordinibus utrinque dissecta, ac lobulis fere viginti utrinque admodum exiguis, ut vix pictura recte exprimi potuerint, incisa. *Flos* ignoratur, quia ficcus erat ramulus. *Lobi* crassi, contorti, obesi, medulla pallente fungosa turgidi; in quibus *semina* pauca pyri effigie, sed majora, minora parum *Acaciae Aegyptiae*, compressa, levia, nitida, & colore spadiceo, oblique disponuntur. *Crescit* in Mesopotamia juxta flumen Tigridem, & juxta Euphratem in deserta Arabia. *Siliquae* in sanguine cohibendo usus apud incolas, qui *Charnub* vocant.

dolorem, qui per diem durat. *Nascitur* in calidis Huaxteca, & propinquis mari septentrionali locis, seu editis seu campestribus. *Usus foliorum* in extrahendis ex parte scarificata venenis. Faciunt id tusa sex horarum spatio, coloremque nigrum contrahunt. *Succus* dentibus adplicatus dolorem placat. *Ova formicarum*, quae vermiculos referunt, in pulverem redacta, & auribus injecta, contra idem symptoma adhibentur.

IV. *Ibirapitanga Brasiliensium*, Lu. Marcgr. H. P. Brasil. l. 3. c. 5.

fitanis Pao do Brasil, arbor satis alta, *Cortice* fusco, brevibus spinis armato. *Rami* alternatim oppositi. *Folia* buxi similia, splendentia, diluto virentia, absque petiolis. *Flores* in ramulis quasi in unum congesti, *πενταφύλλοι*, quorum quatuor cavi, quintum repandum, odoris Lillii convallii, si non fragrantioris; quos Decembris protrudit. *Siliquae* oblongae, compressae, aculeatae, obscure fuscae, quae nihil in se continent. Circa Alagoa & alibi frequens.

Bellon. obs.
serv. l. 2.
c. 80.

II. *Frutex Palaestinus Bellonii*, myrrhae arbor ab eodem creditus. *Spinosus* est, *caudice* contorto, denso, horrentibusque spinis obsito. *Folia* *Acaciae* similia, sed paulo majora. Quid si cum priore idem, vel illi congener?

V. *Tehoaxin Terentii*, arbor est leguminosa; *folia* *Acaciae* similia; *siliquae* piso, quarum longitudo duodecim, latitudo duorum digitorum. Reccus R. M. N. H. p. 409.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 53.

III. *Arbor cornigera foliis Acaciae*, incolis *Hoitzmamaxalli*, est foliis *Acaciae* seu *Mitzquitl*, flore luteo, siliquis edulibus. In stipite ac ramis cornua taurinis similia, colore castaneo prodeunt. In corniculis generantur *formicae* fulvae nigricantes & tenues, quae ova ferunt, & morfu

VI. *Uty Brasiliensium*, arbor saturate virens & spinosa, sorbo aucupariae figura similis, & fere rotunda. *Lignum* album ac lentum. *Cortex* ex gryseo subfuscus. *Folia* minima, in extremitate quasi bicornia, nullius manifesti saporis. *Flosculi* prope ramulos in uvam congesti, albi, longis staminulis, ita, ut pilosi seu spinosi videantur. Marcgr. H. P. Brasil. l. 3. c. 13.

ARTICVLVS IV.

De Genista - spartio.

TAB.
XCVII.

De *Genista - spartio* nihil habeo ex Veteribus, quod dicam. Apud Recentiores est duplex I. *Foliatum*. 2. *Aphyllon*, utrumque spinosum.

I. *Genista - spartium spinosum foliosum* in triplici est differentia I. *Ma-*

jus. 2. *Minus*. 3. *Foliis polygoni*. 4. *Foliis lenticulae*, floribus ex caeruleo purpurascens.

I. *Genista - spartium spinosum majus* vel est flore luteo, vel flore pallido, vel hirsutum. I. *Genista - spartium*. Clus. H. P. l. 1. c. 73. Bauh. H. P. l. 11. p. 402.

Lobel. ob- *tium spinosum majus flore luteo*, Clu-
serv. p. 534. *sio Aspalathus alter primus*; Anguil.

Acacia altera; Lobel. *Aspalathus se-
cunda Monspeliensium*; Tabern. *Scor-
pius primus*. Frutex est bicubitalis
aut circiter, multis deorsum inflexis,
longis, & virentibus spinis horrens.
Ramis tubercula lignosa adnascuntur,
e quibus animalcula crocei coloris
emergunt. *Folia* pusilla, lentis ma-
gnitudine, subrotunda, viridia, &
nonnihil pilosa, auctumno prodeunt.

Flores in rigidioribus spinis, terni,
quaterni, aut plures, genistæ similes,
lutei, odore meliloti officinarum, sa-
pore nullo. *Siliquæ* parvæ, longæ,
tres vel quatuor læves, compressæ,
in quibus *semen*. Observatum foliis
caruisse florentem. *Anguillara* folia
spicatum sibi invicem per ramulorum
adscensum imposita facit. *Crescit* in
Narbonensi Gallia, in Cantabris supe-
rato Pyrenæo saltu & alibi. Caspar
Bauhinus inter Sommiere & Mons-
pelium Majo florentem vidit. Visa
& Bernæ in Benedicti Aretii horto.
Floribus quidam ad icterum viridem
utuntur, & toto cremio furnos cale-
faciunt.

2. *Genistaspartium spinosum majus flore pallido*, est Clusii *A.
spalathus alter secundus*, jam dicto si-
mile, sed firmitus, robustius, aliquan-
do altius, & cui flos perpetuo palli-
dus. *Provenit* in Castella vetere.

3. *Genistaspartium majus hirsutum*, Can-
tabris Hallada vocatur. Minus præ-
cedentibus plerumque, & pedali al-
titudine, tenerius etiam. *Ramuli* in
multo plures spinas dividuntur, istæ
denuo in alias, ut singulæ totidem fo-
lia Abrotani videantur. Ex ramulo-
rum lateribus prodeunt vere alii in-
cani & hirsuti, quibus adnata folia
molliora, & incana lentis, sed majora,
quam in primo genere. *Flores* in sum-
mis ramusculis seni aut octoni, genistæ
aut pisi forma majores, quam in pri-
mo, colore luteo. *Provenit* in Canta-
bris ad radices Pirenæorum, qua Hispani-
am spectant, tertio a Victoria milliari.

2. *Genistaspartium spinosum minus*,
est Scorpius secundus Clusii, *Genista-
spartium spinosum alterum* Lobel. *A.
spalathus alter hispanicus* Lugdunensi,
Scorpius tertius Tabern, *Spina Chri-*

sti Cæsalpino, *Aspalatho Monspelianno* Genista-
adfinis Bauhino. Pedem proceritate *spartium*.
vix æquat, & spinis horret densissi-
mis. Quæ virent, seriem quandam
servant, & semper contrario inter se
exortu nascuntur. Summis ramulis
bini vel terni flores lutei, mense Mar-
tio insident. *Siliquæ* vel potius *se-
mina*, incana, lanugine hirta latitant
sub spinis. Visum a Clusio in colli-
bus Granatæ vicinis itinere Cordu-
benfi duntaxat, nec usquam alibi.

3. *Genistaspartium foliis polygoni*, Rauwolf.
seu *Alhagi Maurorum* *Rauwolfii*, in itiner.
Bauhino Agul & *Alhagi Arabibus*, Bauh. H. P.
planta spinosa mannam respiciens, fru-
tex est cubitalis. *Radix* purpurea.
Virgæ densissimo spinarum acutissi-
marum, gracilium, flexiliumque sti-
patu refertæ. Surculi prope infini-
ti, teretes, & a trunco eleganti ordi-
ne hinc inde sparsi, majori parte Cu-
scuta obferuntur. *Folia* ad spina-
rum exortum oblonga, Polygoni fi-
gura, cinerea. *Flores* ex spinis plu-
rimi, rubelli: quibus decidentibus
succedunt *siliquæ* rubentes, semine
concolori farctæ. *Provenit* in Persia,
circa Halepum, & urbem Mesopo-
tamiæ Kacka. Incolæ novum quod-
dam Mannæ genus ex eo legunt, cu-
jus grana Coriandro nostro majora
paulo. *Folia* calidæ & siccæ naturæ
sunt. Manipulus in aqua decoctus
purgat.

II. *Genistaspartium aphyllon* est du-
plex 1. *Floribus ex cæruleo purpura-
scentibus*. 2. *Floribus luteis aculeis
tribus semper junctis*.

I. *Genistaspartium spinosum aphyllon*, Clus. H. P.
lon, floribus ex cæruleo purpurascen- Lobel. ad-
tibus, Clusio *Erinacea*, Lobel. *Spar-* vers. p. 409.
tum aphyllon fruticosum, junceis acu- Bauh. H. P.
leis lanatis capitulis, Cæsalp. *Genistæ* l. 11. p. 403.
rotundæ alterum genus. Tabern. *Scor-
pius quartus, & Spartium aculeatum*
aphyllon, Bauh. *Genista erinacea*, plan-
ta est dodrantalis, & in orbem per
solum diffusa. *Radix* lignosa & ma-
gna. *Spinæ* multæ, virides. *Foliola*
raro profert; & si quando perpauca
lenticulæ similia, illis decidentibus
multiplici spinarum vallo *Erinaceum*

Genista in se convolutum repræsentat. *Flo-*
sparium. *res* genistæ bini aut terni, ex cæru-
leo purpurascens, qui calyculis hi-
spidis, villosis, & omnino incanis in-
cluduntur, & mense Aprili prode-
unt. *Nascitur* regno Valentino, cir-
ca Siete agues oppidulum locis aspe-
ris frequens. Incolæ *Erizzo* vocant.

Bellon. ob-
serv. l. 1.
c. 18. Bellus
ad Clus.
epist. 2.
Plin. H. N.
l. 12. c. 8.
Plutarch.
Sympol. l. 1.

II. *Genistaspartium spinosum aphyl-*
lon, floribus luteis tribus aculeis *sem-*
per junctis, Bellon. *Achenopoda Cre-*
tensium, Bello *Echinopoda Cretica*,
Chenopoda Plinii, *Echinopoda* Plutar-
chi & Athenæi, vulgatissimum est in
Creta, & *Erinaceum* Clusii, superius

descriptum æmulatur. Tota planta ^{quæst. 4.}
viridis & in orbem diffusa cernitur, ^{Athen. Di-}
aculeis horrens. *Folia* nulla: *flores* ^{pnos. l. 3.}
parvuli lutei, ut Bellus habet. *Al-* ^{Alpin. exo-}
pino est frutex cubitalis, cui multi ab ^{tic. l. 1. c. 8.}
una radice *surculi* duri, lignosi, &
flavescentes, albicantes, si exaruerent.
Spinæ plures, sursum fere ex toto
actæ, acutorum triangulorum spe-
ciem præbent. *Floribus*, qui pauci,
thecæ parvulæ, triangulares succe-
dunt, quibus semina. *Nascitur* in
Creta. *Lignum* aliquantulum ama-
rescit, non absque grato odore. Non
patitur frigora. Non attingi ab api-
bus, Plinius prodidit.

ARTICVLVS V.

De Scorpio seu Genista spinosa.

I.

Scorpius.

TAB.

XCIIIX.

Theophr.

H. P. l. 6. c. 1.

& 3.

Plin. H. N.

l. 21. c. 15.

l. 22. c. 15.

De Scorpio, hoc duntaxat ex Anti-
quis occurrit, totam spinis con-
stare. *Radix* est simplex, brevis, &
recta. *Melius* ἐν δὲ ῥίζῳ leges, quam
βαδύρριζον. Non potest profunda-
dix esse, quæ brevis. *Folium* nullum
præter spinam. Non germinat ante
æstatem, prorogatque suam βλάστησιν
ad autumnum. *Florem* post æqui-
noctium autumnale, seu μετὰ ἰσημε-
ρίαν φθινοπωρίην, profert, ἐν τῷ σαρκώ-
δει, τῷ ἐποιδέντι ὑπὸ τῷ ἀκρῷ in car-
ne extuberante in extremo aculei,
(male, seu ἐξοιδέντι τὸ ὑπὸ τὸ ἀκρῷ,
seu τῷ ἐσποδέντι) initio candidum,
postea ἐπιπορφύρεοντα, seu leviter ad
purpuram accedentem. Hermolaus
cum asparago confundit.

II. RECENTIORIBVS duplex est

1. Major. 2. Minor.

I. *Genista spinosa major* est etiam
duplex 1. Brevibus aculeis. 2. Lon-
gioribus aculeis.

Bauh. H. P.
l. 11. p. 400.
Camer. in
horto Lo-
bel. advers.
p. 354.

1. *Genista spinosa major brevibus*
aculeis, Lobel. Bauh. Tabern. Nepa
Theophrasti. *Radices* habet ligneas,
multiplices, implexas, tennes: a qui-
bus mox exorsæ *spinulæ* rigidulæ,
densæ, Corrudæ simillimæ, aliquan-
to majores, virgulta universa sum-
motenus vestiunt, sicque tota planta
densis horret aculeis pro foliis: & fa-

ciem Corrudæ præfert gustu amari-
cante. Visa a Lobelio in Provinciæ
locis montosis ubertim fruticans, præ-
fertim prope montium radices, qui
Magdalenæ fano & specui finitimi.
Sed & faxeis & aridis, Sterellæi mon-
tis declivibus; nec non prope amnem
argenteum. Frutex, quem sub Ne-
pæ nomine quorundam, seu *genistel-*
læ spinosæ adfini tradit Bauhinus, fen-
ticofus est, & pro folio spinam gerit.
Pungens hæc mucrone creberrima,
longitudine inæquali, juniperinis fo-
liis angustior, & nova spinarum mi-
norum sobole fecunda, viridans,
striata, sæpe glabra, aliquando pilo
brevis obsita, quo & rami sesquicu-
bitales, striati, nonnunquam hirsuti
obducuntur. Facit & Ruellius fru-
ticis in montosis & asperis nascentis
mentionem, quo sepes tam vivas
quam struētes rustici stipant: sed
cum illi florem luteum adscribat,
frustra Scorpium Theophrasti cre-
dideris.

2. *Genista spinosa major longiori-* ^{Clus. H. P.}
bus aculeis, Dodon. *Genista spinosa*, ^{l. 1. c. 74.}
Clus. *Scorpius primus*, Tabern. *Scor-*
pius secundus, cubitali altitudine ad-
surgit. Virgæ multæ, ex atro viren-
tes, striatæ, densissimo *spinarum* val-
lo obsitæ, quæ dein mineribus cir-
cumsepiuntur. *Folia* nulla nisi pri-
mo vere adparent, brevi decidua.

Flores

Flores genistæ minores, pallidi, aliquando adeo rufescentes, ut rubere videantur, sub autumnum præsertim. Funduntur Majo & Junio, quandoque æstate tota, circa autumnum iterum floribus vestita conspicitur. *Siliquæ* cylindraceæ, magna ex parte inanes, aliquando semine pallido & subfusco turgidæ. *Nascitur* variis Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ, & Hispaniæ locis. Circa Burdegalam & apud Cantabros frequentissima & tanta magnitudine adsurgit, ut altitudine duos viros, crassitudine brachium humanum æquet. Sed & aculeorum multitudine & paucitate pro locorum varietate variat. Parum abest, quin *Scorpium Theophrasti* dixerim. *Ἀφύλλον* quidem scribit; sed potuit adultam descripsisse. Quibusdam est *Ulex Plinii*, sed nullas notas, unde colligas, addidit. Rorismarini similem dicit, asperum, & qui aurum retineat. Nec ab hac multum abire puto *Nepam*, quam *Bauhinus* Bononiæ vidit, spinis longioribus, minus rotundis & firmis, angulosis, quæ in alias subdividebantur. In summitate ramulorum mense Aprili adparebant florum pediculi, & veluti calyces hirsuti. Quia vero icon Bauhini ab istis diversa, placuit & eam adponere. Facta est ex ramulis tribus ex Anglia missis; in quorum uno folia in summitate latiuscula, hirsuta, in aculeum desinentia; in altero flores lutei ex brevi pediculo simul inter spinas; in tertio inter spinas *siliquæ* latiusculæ erant, compressæ, breves, nigrae, hirsutæ, calycibus foliosis æque fere longis obtectæ, in quibus semina bina.

II. *Genista spinosa minor*, est quadruplex. 1. *Germanica*. 2. *Hispanica villosissima*. 3. *Anglica* seu *Aspalathoides*. 4. *Montis ventosi*, cui 5. adde *Genistam* seu *Spartum purgans Bauhini*.

1. *Genista spinosa minor germanica*, Dodon. *Genistella*, Gesn. *Genistella spinosa*, Lobel. *aculeata*, Cæsalp. *Coroneolæ similis suffrutex*, Clusio *Genistæ species spinis & aculeis horens*, Bauhino *Genistella aculeata fo-*

liosa, *virgulas* quasdam admodum *Scorpius* tenues promit, initio minutulis *foliis*, ac exiguis innocentibus *spinulis* circumvallatas: postea vero, cum annuæ fuerint, defluentibus foliolis solis durioribus *spinulis* communitas. *Floresculi* pallide lutei. *Siliquæ* parvulae, in quibus semina exigua rotunda & subrubentia. *Radix* lignosa & lenta. Occurrit pluribus per Brabantiam locis nonnihil humentibus, incultis etiam & neglectis. Carere ea adhuc videtur Italia & Narbona, si Lobelio fides. Per Pannoniam vulgarissima. Circa Francofurtum & aliis Germaniæ locis frequens. Paulo ab ista descriptione *Bauhini Genistella aculeata foliosa* abit. Folia in ea hirsuta alterno posita nascuntur, spinæ longæ, creberrimæ, majoresque minorum sobolem infesto mucrone pungentium e lateribus pariunt. *Flores* lutei spicati &c. At *Cæsalpini Coroneolæ similis suffrutex*, ramulis est obsequiosis & lanuginosis, qui anno secundo *aculeis* rectis armantur, quibus alii a latere insunt; *foliis* Polygoni; *floribus* genistæ minutis; *siliquis* brevibus & latis lentis modo, in quibus pauca semina. Toti plantæ saporem austerum & glutinosum cum modica amaritudine addit; incultisque & humectis locis nasci.

2. *Genista spinosa minor hispanica villosissima*, in prodromo *Genistella Monspeliaca spinosa Bauhino* dicitur. Viticulis est palmaribus, in terram reflexis, quorum pars inferior in brevissimos ramulos, ex parvis spinulis constantes dividitur, a medio vero sursum villosi sunt, quandoque in ramulos brachiati, oblongis viridibus foliis, minoribus sæpe additi, vestiti, spinisque carentes: summitatibus flores pallide lutei, formæ genistæ spinosæ vulgaris similes, insident. Monpessuli quidam *Corrudam luteam* vocabant. *Similem*, sed per omnia majorem, caulibus pedalibus, foliis rarioribus, spinis longioribus, minusque pungentibus, floribus majoribus & aureis, quasi in spica dispositis, ex Hispania habebat Bauhinus. Tanta in hac specie varietas.

Ss

3. Ge-

Plin. H. N.
l. 33. c. 4.

Bauh. H. P.
l. 11. p. 400.

Gesner. in
hortis
germ.
p. 260.
Dodon.
Pempt. 6.
l. 1. c. 21.
Bauh. H. P.
l. 11. p. 399.

Lobel. ad
vers. p. 409.

Bauh. pro-
dromi the-
sauri l. 11.
c. 3.

Scorpius. 3. *Genista spinosa minor Anglica*, seu *Aspalathoides*, Johanni Bauhino est *Genistella minor Aspalathoides*, pedalem superat altitudinem. *Stipes* rotundus, lignosus, cortex rufus, hinc inde spinis rarioribus armatus, & in ramos, qui in minores subdividuntur, brachiatus. *Foliola* circum ramos rara, parva, quædam subrotunda, oblonga quædam, spinis interjectis. *Flores* lutei superioris duplo minores, hinc inde componuntur. Missa ex Anglia. Sed & in asperis circa Aureliam Gallorum visa, ramis late sese spargentibus. Johanni Bauhino est frutex vix cubitalis, cortice quasi cinereo. *Virgis* spinæ breviores alternatim dispositæ. *Foliola* juxta spinas fere rotunda, lenti palustri pene æqualia. *Flores* inter spinas per totos ramos copiosi, aurei.

Bauh. H. P.
l. II. p. 400.

4. *Genista spinosa minor montis ventosi*, frutex est palmaris, cui prio-

res rami plures duas uncias longi, spinis juniperinis ornati; alii longiores quatuor unciarum circiter, folia hirsuta, longiuscula & latiuscula, flores aurei.

5. *Genista* seu *Spartum purgans* Bauh. H. P. Bauhini, in duobus ramulis ab eo exhibitur. 1. *Prior* sesquicubitalis erat, rigidus, cortice crasso amaricante, ligno albicante intus, in numerosam virgarum sobolem divaricatur, in quarum extremis aculei, ipse uvæ marinæ quodammodo adsimilis. *Foliola* in ramorum extremorum geniculis, cinericia lanugine obferuntur. *Flores* ex longiusculis pedicellis lutei. Ex monte Pilati erat. 2. *Posterior* senticosior est & strigosior, innumeris nodulis torosus, incurvo ligno, vix pedalis. *Ramuli* in spinas desinunt. *Foliis & floribus* orbatus in extremis quibusdam capitula hirsuta, incurva & nutantia gerit, quod monstrosum quasi est.

ARTICVLVS VI.

De *Genista non spinosa*.

Genista non spinosa.

TABVLA
XCIV.

Genistam spinosam, *Genista non spinosa* excipit, quæ quintuplex. 1. *Angulosa*. 2. *Tinctoria*. 3. *Ramosa foliis hyperici*. 4. *Argentea & 5. Arabica*.

1. *Genista non spinosa angulosa* est duplex 1. *Scoparia*. 2. *Trifolia Bauhini*.

Lobel, observ. p. 531.
advers. p. 493.

Bauh. H. P. l. II. p. 390.
Clus. H. P. l. I. c. 71.

1. *Genista non spinosa angulosa & scoparia*, Clus. vulgaris, Lobel. & Eystett. *Genista scoparia vulgi*, & *Spartium*, Cæsalp. *Genista quadrato junco*, dicitur. Attingit sæpe hominis altitudinem. *Radix* lignosa, dura, fibras in obliquum emittens. *Caudices* tenues lignosi, a quibus *virgulae* angulosæ, virentes, flecti faciles. *Folia* exigua, obscure virentia: *flosculi* elegantes communiter lutei, raro albi. *Siliquæ* plenæ, per maturitatem nigricantes: in quibus semina plana, subrufa, dura, lentibus minora. Sæpe radici *Orobanche* adnascitur ex ipsius fibris profecta; qui-

dam *rapum genistæ* vocant, alii *hypospartium*. Tuberosum hoc turbina- tum, subnigricantibus squammis, pulpa sublutea. *Caulis* inde dodrantalis, cui *flores* circa fastigium subcandidi, Lamii fere æmuli, seu galeati; *siliquæ* oblongæ, crassæ, teretes; in quibus *semina* minutissima & supervacanea. Provenit locis siccis, glareosis, secus vias, aliquando in sylvis. *Rapum* mense Junio & Julio invenitur in Flandria, Gallia, Anglia, Austria & Pannonia sylvis. Sabaudia & Pedemontii colles copiosum fundunt. Cæsalpinus hujus generis exiguum in Alpibus, cespite lato, palmaribus juncis mollibus, sine foliis crescere scribit: Dodonæus illi subesse, quæ ad perfectionem non venit, & vel nullos vel paucos flores profert. Vehementer a quibusdam commendatur ad calculum & movendas urinas, si in vino decoctum, vel recens in succum, qui ad solem indurari debet; semisiccum in oleum reda-

redactum propinetur. Succus recens vulnera mundat & glutinat: pulvis cum calido vino exhibitus, infligne contra colicam remedium.

Bauh. H. P. l. II. p. 388. 2. *Genista non spinosa angulosa trifolia Baubini*, frutex est sarmentosus,

duos aut tres cubitos altus. Radix multifida, lenta, lutea. Rami densi, angulosi, virentes, flexiles. Folia trifolii crebra, hirsuta, acuminata. Flores crocei, galericulati, staminibus recurvis, cum apicibus croceis. Siliquæ nigrae, compressæ, latæ, hirsutæ, in quibus semen Colutheæ vesicariæ, fuscum compressum. Tota stirps graviter olet, & amarescit. Nasitur in arenosis juxta vias, in sylvis, agris, campis, & montanis arbutis, quæ statis temporibus cædi solent: in Germania, Gallia, Anglia, Italia &c. In Pannonia, Bohemia, Austria, Moravia, nulla sponte nascentis vestigia observavit Clusius. In Hetruria, Majo & Junio; inter Beffordiam & Masmunster Septembri floret. Inter Monspelium & Lugdunum visa a Bauhino mense Julio cum filiquis & foliis ex uno pediculo ternis, pilosis. Quantum ad vires & usum, calefacit & siccat in altero ordine, abstergens, & partium tenuium. Ex virgultis aridis & combustis factum lixivium, cum albo & tenui vino, potenter aquosos humores per vesicam pellit, acrimonia visceribus aliquando damnosum. Eadem in vino vel aqua decoctorum contra cachexiam, hypopem, & viscerum obstructionem virtus. Florum usus in acetariis, si gemantes adhuc decerpti sale & aceto condiantur, quod Germanis, Gallis, & Belgis solemne; nec ullus a nausea vel vomitu metus: contra calculum, si aqua ex iis destilletur. Seminis in purgandis hydropicis, podagricis, si drachmæ unius pondere in substantia, vel aucto pondere, ut artis est, duarum unciarum decocto, exhibeatur. Non minus potenter, quam helleborus, supra & infra pellit.

II. *Genista non spinosa tinctoria* est triplex. 1. *Hispanica foliis angustioribus incanis*. 2. *Italica seu Lucensis foliis latioribus*. 3. *Germanica*.

1. *Genista non spinosa tinctoria, hispanica, foliis angustioribus incanis*, non spinosa. Clus. tinctoria hispanica, Lobel. Genistella infectoria, Lugd. Oricella Theveti, Bauhino Genistella tinctoria hispanica. Frutex est bicubitalis. Caudex rectus, enodis nudus, cui cortex candicans. Rami multiplices, tenelli, fragiles, & breves. Folia lini aut thymeleæ, superne virentia, inferne incana, & argentei splendoris; gustus subamari. Flores summis ramulis spicatum congesti, genistæ tinctoriæ germanicæ similes, lutei. Quo tempore floret, crescit sub ea Hamodori quoddam genus elegans, pedalis altitudinis, brachialis crassitie, multis floribus a medio scapo ad summum usque exornatum, magnis, oblongis, luteis, extrema parte hiantibus, & in quinque partes divisis. Totum pingui & oleosa materia turget. Visa in regno Murciano secundum vias, mense Martio florens. Hamodoro si vaccæ vescantur, creduntur taurum expetere. Unde incolis Yerva tora. Theveti Oricella in insulis Canariis nascitur. Ferrea inprimis, locis lapidosis & montosis. Tincturam ad coria suppeditat.

2. *Genista non spinosa tinctoria Italica seu Lucensis foliis latioribus*, Bauh. H. P. l. II. p. 391. culo est lignoso, striato, nodulis ab ima parte contorto. Folia latiora, molliora, & breviora, quam præterita. Viridia eadem, adversa parte subcinericia, per ambitum leviter hirsuta; & alternatim ponuntur. Nervus insignis per medium excurrit, & in apicem terminatur. Flos luteus & hians. In sicca nullus notabilis gustus. Provenit in montibus Lucensibus.

3. *Genista non spinosa tinctoria germanica*, aliquibus lutea herba Plinii, Plin. H. N. l. 33. c. 5. Bauhino flos tinctorius, Trago Ferula, Leoniceno Lysimachia, Cæsalp. Coroneola Anguillæræ, Clus. Genista vulgaris, Dodon. Genista tinctoria, Cordo Chamæleuce, Lobel. Genistella infectoria vulgi dicitur. E radice lignosa viminum cubitalium, & teretium seges fruticat: quibus folia alternatim adnascuntur hyssopi, S s 2 majora,

Genista
non spi-
nosa.

majora, interdum paria, supra & infra atrovirentia, quæ fatuo madore os mandentis implent. Flores in thyr-
sis lutei; genistæ angulosæ minores. Siliquæ unciam longæ, latiusculæ, glabræ; in quibus multa semina par-
va. Invenitur in sylvosis locis, ad montanorum pratorum margines in Germania, Gallia & alibi. Genevæ & Ebroduni Majo, Junio & Julio floret; mense Augusto Montbelgar-
di. Usus florum in tingendo. Luteum colorem præbent, qui si cæruleo superinducatur, viridem efficiet. Variat foliis latioribus, angustioribus; ramulis modo erectis, modo procumbentibus. Coroneolam suam facit Cæsalpinus suffruticem cubito brevior, cui ramuli recti & striati; folia lini sed latiora; flos luteus, copiosus; siliquæ exiles. Oritur in sylvis.

Bauh. phy-

III. De Genista non spinosa ramosa

foliis hyperici, quæ Lugdunensi Genista minima, nihil habeo, quod dicam, nisi variare. Bauhinus non longe Friburgo & ad Petram pertusam frutescentem, Monspeli humilem collegit.

IV. Genistæ non spinosæ argenteæ, furculus est multiplex, teres, in multas alas transversas divisus, argenteus. Folia ad ramulorum exortum singularia, argentea hirsutæ obsita. Fructus in furculorum internodiis, Carpobalsamo officinarum similis, spadicei coloris, corticosus, in summo apicula acuta exornatus, calyculo foliaceo continetur. Semen in eo nigrum, subrotundum, rugosum, & fere evanidum. Habebatur in horto Patavino sub Cytisi argentei nomine.

V. Genista Arabica, quæ a nostra diversa, planities ad montem Sinai obsitæ sunt: quæ etiam in Arabia solitudinibus nascitur.

ARTICVLVS VII.

De Chamægenista.

Chamæ-
genista.

Vid.

TABULA
XCIX.

Chamægenista in sextuplici est apud Bauhinum differentia. 1. Foliis genistæ vulgaris. 2. Sagittalis. 3. Caule foliato. 4. Folio articulato. 5. Cretica. 6. Montana hispida.

Clus. H. P.

I. I. C. 71.

Bauh. H. P.

I. I. p. 393.

Tabern. H.

P. I. 35. 107.

I. Chamægenista foliis genistæ vulgaris, Clusio Chamægenista prima, Tabern. Genistella Pannonica, Bauhino Genistella pilosa, frutex aliquando bicubitalis. Radix longa & oblique serpens. Virgulta teretia, lenta, striata humi diffunduntur, in multos angulosos ramulos divisa. Folia per eos temere sparguntur terna quaterna, dorso eminentiore & quasi complicata, supra cana lanugine obduta, infra glabra, gustus amariusculi. Flores ad ramulorum latera multi, crocei, ex hirsuto calyculo, exterius pilosi, interius glabri; nullo alibi, alibi perexiguo, alibi etiam haud contemnendo odore. Siliquæ his succedunt, planæ, latiusculæ, hirsutæ: in quibus semen exiguum, flavescens. Prodit locis ficcis, editis, desertis, in Pannonia, Germania, Gallia, & ali-

bi. Inter vepres luxuriat, & in majorem altitudinem excrescit. In sylva Aigremont mense Aprili floret. Visa etiam in sabulosis & lapidosis tumulis, Oeno fluvio per Sequanos labenti propinquis. Mulierculæ in movendis menstruis in fomentis adhibent.

II. Genista sagittalis, Tabernom. Chamæspartium, Gesn. Genista minima, Lobel. Genistella graminea montosa, Clusio Chamægenista altera, Camer. Genistella sagittalis pannonica, Bauhino Genistella herbacea, Gerh. Genistella lagopoides, herba est potius lignosa, quam frutex, raro cubitum excedens. Ramuli molles, hirsuti, internodiis distincti, quibus duæ latæ & molles fimbriæ. Ad singula internodia folium unum oblongum, obtusum, pilosum, sine pediculo. Flores in virgularum summitate parvi, hiantes, lutei, spiciformes. Provenit in Burgundia circa Montbelgardum; in Gallia circa Monspelim; in hercynia sylva, Basileæ, ubi Majo floret. In Pannonia nascentem mul-

tis

his locis observavit Clusius. Reperitur & circa Francofurtum ad Moenum, & in colle juxta Limagum fluvium, infra Wettigam monasterium. Flores puerorum crepundia & lusus. Est Major & Minor. Unde *Chamaespartium primum* & *secundum* Tabernomontani.

Tabern. l. 2.
Clus. H. P.
l. c.
Bauh. H. P.
l. 11. p. 394.

III. *Chamaegenista caule foliato*, Dodon. *Genista humilis*, Camer. *pumila*, Clus. *Chamaegenista peregrina*, Bauhino *Genistella herbacea platyphyllos*, Tabern. *Chamaespartium tertium*, Gerh. *Genistella pinnata*, vix palmari altitudine adsurgit, admodum tamen fruticosa. *Folia* Chamæleæ proxima, breviora, dura, carnosæ, aliquantulum in ambitu sinuosa, crispa, rigidiuscula, uno nervo ex altero e medio folii prodeunte, qui nervus paulatim intumescit, & in ramulum convertitur. *Flores* in ramulorum summitatibus quini, seni, aut plures ex

villosis calyculis nascuntur, aurei planelæ coloris, nisi bina inferiora incana lanugine pubescerent. In solis Valentini regni asperis & incultis mense Majo florentem observavit Clusius.

IV. *Chamaegenista folio articulato*, Tabern. H. *Chamaespartium Narbonense*, P. l. 3. c. 107. se, Gerh. *Genistella globulata*, est sagittali simillima, nisi quod sit minor. Repit virgultis suis humi.

V. *Chamaegenistæ Creticæ virgulæ* Bauh. prodrom. l. 11. c. 3. palmo minores, humi diffusæ, ternæ, rotundæ, subcanæ, in ramulos divisæ. *Foliola* oblonga, angustissima, bina aut terna, ab eodem exortu, sed altero semper longiore, incana. Ex foliorum alis *flosculi* terni, quaterni, parvi, lutei, genistæ floribus æmuli. *Siliquas* non vidit.

VI. *Chamaegenista montana hispida*, Thallio genistæ minoris species.

ARTICVLVS VIII.

De Spartio.

Spartium.

TAB.
XCIX. & C.
Dioscor. M.
M. l. 4.
c. 158.

Plin. H. N.
l. 24. c. 9.

I. *Spartium frutex* est *Dioscoridi*, longas proferens virgas, ἀφύλλος, non quod folia omnino non habeat, sed quod, dum primo germinare incipit, exilibus cingatur, quæ quamprimum decidunt, ita ut reliquo anni spatio, viduum foliis cernatur; & δουραύς seu frangi contumaces. *Flos* ipse leucolus luteus. In *siliquis* seu *phaseolis* (sic cum Sarraceno legendum,) exilia *semina*, lenticulæ similia habentur. Plinius cum *genista* confundere videtur, dum ei eas vires, quæ *Spartio* a *Dioscoride* adsignantur, adscribit. *Usus* ramulorum in ischiade & tussi, si in aqua macerentur, mox tusorum succus, seu haustu seu per clysterem exhibeatur. *Flores* & *semen* cum aqua mulsa per superiora vehementer hellebori modo ἀκινδύνως purgant: hoc etiam κίβει την κάτω κάθαρσιν.

II. Apud RECENTIORES occurrunt. I. *Arborescens seminibus lenti*

similibus. 2. *Alterum monospermum semine reni simili*. 3. *Tertium flore albo*. 4. *Triphyllon*. 5. *Sterile*. 6. *Creticum Alpini*. 7. *Spinosum ejusdem*, cui adde 8. *Spartio primo adfinem*.

I. *Spartium arborescens seminibus lenti similibus*, est Bauhino & Cedro *Genista juncea*, Clusio *Spartium Dioscoridis*, *Genista Plinii*, Dodonæo *genista Italica*, Matth. *Genista*, Lugd. *Spartium*, Lobel. *Spartium Dioscorideum Narbonense* & *hispanicum*, Camer. *Genista trans-Alpina*, Eyst. *Spartium hispanicum*, frutex est quatuor vel quinque cubitorum. *Vimina* juncea, teretia, obsequiosa, viridantia: per quæ dum floret, & novella est, folia quadam oblonga, ramis concoloria, & decidua sparguntur. *Flores* in virgultorum summitatibus multi, lutei, adspetus lati, floribus pisorum similes, & gustu dulces. Succedunt his *siliquæ* quatuor vel quinque uncias longæ, compressæ, ali-

Tt

Spartium. aliquantum incurvæ, colore castaneæ, in quibus viginti sæpe semina compressa, rubentia, lucida, Lente minora, non ita circinata, saporis leguminosi. *Nascitur* in Italia, Gallia, Hispania & Germania. In Hetruria adeo copiosa, ut colles aurei videantur. Circa Monspelium floret mense Aprili. Visa Basileæ arboræa. Lignosiore stipite in Angliæ & Belgii hortis adolescit. Quantum ad *Vires*, calida est & sicca in secundo, semen calidius, floribus & ramulis humiditas incidens inest. *Lignum* vitibus ligandis apud Italos inservit, fiuntque ex macerato funes & rudia lintheamina, ex quibus succi. Expectitur & figulis, conficiendo vasorum fictilium generi, quod vulgo *de maida* vocant. Ut aureus color in opere conservetur, hoc solo fornaces succendunt. Aqua e floribus urinæ difficultatem tollit. Unguentum contra ovium scabiem paratur; oleum ad obstructions splenis, fermentaturque ad viginti dies in fimo.

Matthiol.
ad Dioscor.
l. 4. c. 152.

Dodon.
Pempt. 6.
l. 2. c. 3.
Lobel. observ.
p. 533.
Bauh. H. P.
l. 11. p. 397.

II. Spartium alterum monospermum semine reni simili, Dodon. *Spartum frutex majus*, Clus. *Spartum secundum hispanicum*, Lugd. *Spartium hispanicum alterum*, Tabern. *Spartium hispanicum quartum*, Lobel. *hispanicum alterum flore luteo*, Bauh. *Spartium hispanicum lobis rotundiusculis flore luteo*. Radix dura, lignosa. Stipes cubitalis, cui cortex scaber & striatus. Radix virescentes & striati, virgulæ junceæ, quibus novellis & dum germinant, aliquot folia, statim ac planta florere cœpit, decidua, ut dein ἀφύλλος videatur. Flores lutei inodori, trifolio pratensi aut glycyrrhizæ similes. Lobi cartilaginei, rotundiusculi, ex flavo rubescentes, in quibus semen plerumque unicum, durum, nigrum, exiguo reni simile, quod in lobis, dum quatiuntur, crepitat. Crescit variis Castellæ locis solo arenoso, floretque Majo. Semen Julio maturum. Semine in uvis Damascenis reperto, habuit in Belgio enatum Mutsonus.

Clus. H. P.
l. c.

III. Spartium tertium flore albo, Clusio *hispanicum tertium*, Dodon.

Spartum frutex minus, Tabern. *Spartium hispanicum quintum*, hominis aliquando altitudinem superat. Virgulis est superiore tenuioribus lentioribusque: flore ejusdem formæ, sed majore & candido, lobis & semine minoribus. Visum a Clusio Gadibus & locis vicinis, solo sterili & arenoso, Februario florens.

IV. Spartum triphyllon, Lugd. *genista Ilvensis*, Guiland. *Cassia Latino-rum*, Bauhino *Genista radiata sive stellaris*, aliis *Scopa Plinii*, ramosa est planta. Caulis unus, inquit Bauhinus, in tres dividitur ramos, hi rursus in alios bis aut ter aut quater semper ternos; internodia duas uncias longa: folia ad unumquodque geniculum sex verticillatim cauli circumposita incana, hirsuta: in viminum valde tenerorum angulosorumque extremis flores genistarum densi & lutei. Crescit in Ilva, & alibi.

Bauh. H. P.
l. 11. p. 398.

Bauh. H. P.
l. 11. p. 399.
Lugd. H. P.
l. 2. c. 25.

V. Spartium sterile juncus est proprie aridi soli, quod neque folium, neque florem, neque semen profert, *Nascitur* in Hispania & Africa. Utuntur eo ad varia.

Guiland. de
papyro.

VI. Spartium Creticum Alpini, planta est procera, densissime fruticans, furculosa: quippe ramulis ac crassis veluti caudicibus, rotundis, viridibus, dense maculis parvis albis punctorum alborum modo, infectis, nascentibus longis, subtilibus, sursum recte actis, flexilibus, rotundis, cortice viridi prædita. Hi deorsum ramulos multos habent, utrinque in æqualibus intervallis inordinatim positos, & in medio ramis folisque nudi sunt, & postea sursum in cymis dense fruticant. Folia flores & siliquæ aspalathi sunt. Tenera germina, flores & semina valenter per alvum, & vomitum pituitam & serofos humores purgare dicuntur. Indictum Alpinus putat.

Alpin. de
plant. exot.
l. 1. c. 12.

VII. Spartium spinosum Alpini duplex est, primum & secundum. I. *Spartium Alpini spinosum primum*, multos nigros ramos habet, virgas junceas,

Alpin. de
plant. exot.
l. 1. c. 13.

Alpin. de
plant. exot.
l. 1. c. 14.

junceas, subtiles, nigrescentes, triangulæ. In furculorum exortu folia, in eodem exortu quina, parva, tenuia; flores lutei, parvi, Spartii Cre-
tici similes; quibus *siliquæ* parvæ succedunt. II. *Spartium Alpini spinosum secundum*, ramos possidet cras-
sos, rotundos, asperos. *Virgæ* in *spinas*, acutas, triangulos multos fa-
cientes desinunt. *Foliis* duplex or-
do. Ad exortum furculorum ex ra-
mis, Spartii sunt similia, sed tenuio-
ra, ex uno exortu trina, quaterna,
quina: post in virgis rectis utrinque
crebra, tragacanthæ modo, usque ad
apicem fere virgularum, quibus sub-
tiles duræ & acutæ spinæ supersunt.
Nascitur in Creta cum priore.

VIII. *Spartio primo adfinis*, suf-
frutex est cubitum superans, *caule*
tenui, tereti, candicante cortice te-
cto, qui in plurimas *virgas* tenuissi-
mas dividitur, quarum aliquæ pal-
mum superant, aliæ minores sunt:
Circa quas *folia* longiuscula, angu-
stissima & rarissima, ita ut virgæ pe-
ne nudæ adpareant: summis virgis
singulis unicum *capitulum* rotundum,
villosum, molle insidet, genistellæ
tinctoriæ forma, sed ex minoribus
pallide luteis compositum. Nam
quilibet flos ex calyculo villosus, hir-
sutie albo prodit. *Visa* in montibus
saxosis ad aquas Blancas.

Spar-
tium.
Bauh. pro-
drom. l. 12.
c. 3.

ARTICVLVS IX.

De Colutea.

Colutea.

I.

TAB. C.
Theophr.
H. P. l. 3.
c. 14. & 17.

Theophr.
H. P. l. 1.
c. 18.

Colutea apud Veteres Theophra-
stus meminit. *Δένδρον ευμεγεθές*
(male quidam & μέγα legunt). *Fo-*
lium habet, non *τύλη* vel *τίλες* fænu-
græco sed *τῇ ἰτέα* falici non absimile:
fructum (non abunde pro magnitu-
dine sua fructificat) in siliqua lata, (*ἐν*
λόβῳ non *ἐν ὑμένι*) fert modice durum,
magnitudine lentis, qui oves *θαννα-*
σῶς πιάνει. Proprie Lipare esse cre-
ditur. *Nascitur* semine & fimo præ-
cipue ovillo. Seritur cum Arcturus
occidit, semine ante macerato, cum
jam in aqua tumere inceperit. *Ger-*
minat primo *μονοφυῖς* seu singulari
caudice, triennio maxime. Baculi
tum deciduntur, tanquam præstan-
tiores. Si quis ita decurtaverit, emo-
ritur arbor, *καὶ γὰρ ἀπαράβλαστος ἐστὶ*.
Deinde *κρίζεται* seu in ramos spargi-
tur, quartoque anno arborescit. *Ar-*
borem Judæ esse quibusdam placet,
qui ideo totam illam periodum, apud
Theophrastum in hunc sensum le-
gunt. *Ἡ δὲ κερκὶς ὡς περ κολυτῆα ἑλλο-*
χος, ἔχει τὸ μὲν φύλλον ἐγγύθεν κυσσῶ-
Πολύρονον καὶ πολύφυλλον τὸ δένδρον, ὅλον
μέγα. Τὸν δὲ καρπὸν καθάπερ χερσοπᾶ
ἐν λόβοις ἔχει πλατέσι, καὶ τὸ σπερμάτιον
τὸ ἐνὸν, μικρὸν, σκληρὸν δὲ μετρίως, ὁλί-
γα δὲ τοιαῦτα τῶν δένδρων. id est, Sili-
quat. est Cercis, ut & Colytea arbor

tota nodosa, foliosa, magna: fructus
ut leguminum, in siliquis latis semen
exiguum, paucum, pro magnitudinis
ratione inclusum siliquis, modice du-
rum. Tales arbores pauca, &c. Sed
nimis hæc coacta: nec respondet
comparatio. *Triplex* autem videtur
apud Theophrastum occurrere. *Pri-*
ma foliosa & ramosa, cui semen par-
vulum, non magnum modice du-
rum, &c. *Alter*a cuius libro citato
tertio capite descriptio habetur. *Ter-*
tia, quæ circa Idam provenit, frutico-
sa, ramosa, inventu rara. *Radices*
ei raræ, crispæ & flavæ. *Lignum*
durum & spissum. *Folium* lauri-
num, sed rotundius, amplius, ut vel
ulmeo simile adpareat, oblongius ta-
men, colore altera parte viridi, in-
feriore & averfa candicante, tenui-
bus multis fibris nervosum, inter eas
fitis, quæ costarum instar a medio
protenduntur. *Fructu & flore* pu-
tatur carere: *Cachryn* autem clava-
tam gemmasque circa folia læves, pin-
gues, candidasque facie amentacea
fundit. *Præcisa* vel igne deusta *πα-*
ραφύεται καὶ ἀναβλάσκει. Nos priores
duas conjunximus. *Revera* enim
una arbor est.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 17.

II. RECENTIORIBVS est triplex
1. *Vesicaria*, 2. *Siliquosa* seu *Scor-*
pioides.

Colutea, pioides. 3. *Caule genistæ fungoso.* Quibus adde siliquam oblongam cinericeam granis *Colutea*.

Bauh. H. P. I. *Colutea vesicaria* Cordo Sena, Cæ.
I. 11. p. 380. salp. *Emeri alterum genus*, aliis *Co-*
Tabern. H. *lutea Theophrasti*, arbor est non ma-
P. 1. 3. p. 817. gna in multos ramos divisa. Mate-
Dodon. ries fere sambuci durior, & cava;
Pemt. 6. cortex interior viridis, exterior cine-
L. 2. p. 772. reus. *Folia* novem vel undecim ad

costam unam, ut plurimum opposita, glycyrrhizæ aut fenæ modo, superne glabra, magisque viridantia, inferne albidiora & hirsuta, gustu amaro. *Flores* ex longo pediculo multi crocei, qui Majo, Junio, Julio, Augusto, Septembri & Octobri funduntur: quibus decidentibus succrescunt folliculi membranei pellucidi, interdum rubentes, spiritu veluti turgidi, ita ut digitorum pressu cum sonitu diffiliant. Intus *semina* ad folliculi futuram tanquam costam, quæ maturo semine dehiscit, brevibus pediculis adpenduntur forma renis, ante maturitatem lutea, post, minor, nigra fere, dura, & lacuna in medio prædita, pisorum sapore. *Visa* sponte juxta Castellum Sponeck ad Rhenum prodiisse. Lugduni & alibi copiose ex semine provenit. *Bafileæ* tertio a satione anno floruit, quinto Montbelgardi. Erat & *Lesnæ* in horto Illustrissimi Comitis Lescinii, supremi regni Poloniæ thesaurarii, sed metuo, ne in incendio florentissimæ illius urbis, scelestissimi cujusque jussu perpetrato, perierit. *Folia* dicuntur leniter purgare, si pondere unius unciz infusa adsumantur. Forte & per superiora purgat, propter aliquam cum genistæ similitudinem.

II. *Colutea filiquosa seu scorpioides* est quadruplex 1. *Major.* 2. *Minor.* 3. *Odorata Alpini.* 4. *Maritima glauco folio.*

Clus. H. P.
I. 1. c. 65.

1. *Colutea filiquosa seu scorpioides major*, Clusio *prima elatior*, Cæsalp. *Emerus* vulgo dicitur. *Rami* fractu contumaces angulosi & striati. *Folia*

Bauh. H. P.
I. 11. p. 381.

septena, novena, pinguiuscula, co-

lutea, si magnitudinem excipias, similia, ingrati admodum & amari saporis. *Flores* inter folia lutei, odorati, bini fere, rarius singulares vel terni, genistæ floribus similes. Quibus labellum duplex, inferius rotundum, integrum, striatum, superius bifidum, & quasi alatum duobus cruculis innititur. *Galea* in rostri acutiem mucronata, ex luteo virescens, apicum albicantium scirrhos occultit. *Siliquæ* hos insequuntur longæ, teretes, quibusdam veluti articulis distinctæ; in quibus oblonga, lævia, subfusci coloris *semina* singula singulis articulis clauduntur. *Crescit* sponte in Apennino monte prope Bononiam, in Helvetia, Italia, Gallia &c. *Monspelii* in locis nemorosis inter buxos Junio & Julio erumpit. *Genevæ*, qua itur Collognium in monte Sale, vidit Decembri virentem Bauhinus, florentem Majo. Juxta Arue ad Rhodanum siliquis maturis in Augusto.

2. *Colutea filiquosa seu scorpioides minor* duplex est, *simplex* nempe l. c. 1. & *coronata*. 1. *Colutea filiquosa minor simplex*, Bauhino *humilis*, superiori est similis, nisi quod humi diffundatur, *virgæ* palmares aut pedales hyeme marcescant, & vere novo e nova radice germinant. Sponte & abunde in vicinis Viennæ montibus nascitur. In hortis culta fit major, retinetque hyeme virgas, flores Majo.

2. *Colutea filiquosa minor coronata*, ex radice crassa, lignosa & lenta, plures novas singulis annis ineunte vere fundit virgas cubitales, vimineas, læves, virides. Alata in his temere sparguntur *folia*, quina, septena, novena, quæ uni costæ adherent, & gustata nonnihil acrimoniæ in summis labris relinquunt. *Flores* in oblongis foliorum virgulis copiosi, leguminacei, in orbicularem coronam dispositi, & flavi. *Siliquæ* articulatim distinctæ, superioribus breviores; semen in articulis singulis. *Crescit* in Pannonia inter vepres & ad vinetorum margines. *Floret* aliquando Majo, Junio nonnunquam.

3. *Colutea*

Alpin. de
plant. exot.
l. 1. c. 9.

3. *Colutea filiquosa odorata Alpini*, cubitalis est, & tota argentei coloris. *Folia flores filiquæ* vulgaris *Coluteæ* similia: in eo differentia, quod *illa* in extremo latiora, pediculisque undecim constet, quibus extrema latiora & coloris argentei: hi odorati; *istæ* albæ & minores. Floret vere, mense vero Majo filiquæ maturescunt. *Ægerrime hyeme in Italia vivit*. Alpino ex feminibus nata, & floruit & filiquas produxit, quibus matura semina. *Floribus vim purgatoriam* quidam adscribunt.

Bauh. prodrom. l. 11. c. 2.

4. *Colutea filiquosa seu Scopioides maritima folio glauco*, virgis est pedalis rarius cubitalibus, lignosis, rotundis, rufescente rigoso cortice tectis, in frequentes ramos divisis. *Folia* alata septem aut novem, unicastæ, binis semper ex adverso sitis adherent, uno impari extremam alam occupante, *Coluteæ* foliis similia, sed multo minora, obtusa, & cordata, glauci vel cæsi coloris. *Flores* & forma & colore *Coluteæ* similes, sed minores. Pediculis tenuibus *filiquæ* tenues, oblongæ, unciales,

articulis distinctæ insident, quarum singulis articulis singula semina inclusa sunt. *Crescit in maritimis Italiae prope Terracinam, ibique vidimus.*

III. De *Colutea caule genistæ fungoso*, ita Bauhinus. Monspeli nobis oblatus est *ramus* cubitalis genistæ hispanicæ firmitudine crassitieque, dilute virens, nudus, fungosus, ex palmari distantia in ramos divaricatus. Quorum commissuris *folia* hærent quina *Polygalæ* *Valentinæ* *Clusii* crassitie, angustiora longioraque. Externis ramulis *flosculi* insident dictæ *Polygalæ* quoque, exigui satis, in orbem congesti. Succedunt *filiquæ* angustæ, articulatae, in tenuissimum & *Scorpionis* simillimum spiculum terminatae.

IV. *Siliqua oblonga cinericea granis Coluteæ*, tres uncias erat longa, licet interdum brevior reperiatur, gracilis, rugosa, & inæqualis, cinericea cute constans, quæ secundum longitudinem in binas partes dehiscibat. *Grana* erant multa, plana & dura.

ARTICVLVS X.

De *Senna*, & *Jovis Barba*.

Senna & Jovis barba.

TAB. CL.

Ignota Veteribus Senna, etsi eam quidam *Dioscoridis Delphinium*, nonnulli *Pelecium*, alii *Empetrum*, *Peplium*, *Alypon*; alii *Theophrasti Cercidem* sive *coluteam* tertiam faciant. Mauritani primi ejus meminere, sub nomine *Sennæ* & *Sennæ*, Actuarii ex Græcis solus. Abenrhoe novam plantam esse adstruit. Duo vero ejus genera. Est enim 1. *Alexandrina seu foliis acutis*. 2. *Italica seu foliis obtusis*.

lo impari alam claudente. *Folia* ipsa ex viridi in flavum declinant, proximæ costæ adhaerescunt, *glycyrrhizæ* foliis similia, sed acutiora, gustus nonnihil viscidus, amari & nauseosi. *Siliquæ* falcatae, compressæ nigricant, in quibus semen parvum, gigartidis simile, compressum, album vel nigricans. Addunt quidam *flores* ex pallido luteos, rubellis vestigiis venosis: nec plantam ultra annum in Italia durare. *Seritur in Syria & Ægypto*, adolescitque in fineto ovilo probatur. *Ufus* foliorum & filiquarum in purgando egregius. Evacuant crassos, viscosos, melancholicos, & atrabilarios humores. Mesue folliculos tutius purgare putat; quod hi membranei, minusque flatulenta semina, quam folia. At quia immaturi secantur, ne folia, ex quibus plus

Uu

lucris,

Bauh. H. P. l. 1. p. 377.

I. *Senna Alexandrina seu foliis acutis*, aliis *Orientalis*, *Ægyptiaca* & *Syriaca*, adfertur ex Oriente. *Caules* cubitales aut altiores; ex quibus alternatim *pediculi* tenues palmo longiores exeunt: ad quos ex mediocribus intervallis quatuor aut sex *foliorum* conjugationes adnexæ sunt, nul-

Matthiol. ad Dioscor. p. 571.

Senna &
Jovis,
barba.

lucris, decidant, acerbiores iidem. Frequentior ergo *foliorum* usus, in infuso potius quam decocto vel substantia, vehementiusque movent, si Mannam vel rosarum dilutum cum cremore Tartari adjeceris. Parantur ex iis & *Syrupi* elegantes, quos in Dispensatoriis vide. Gratissimus est gustu, qui ex fol. Sennæ libra una, cum succi pomor. redol. lib. iij. Cinnamomi, Anisi ana unc. j. succi limonium lib. semis, spirit. vitrioli pauxillo & sacchari lib. j. secundum artem paratur. Datur uncias, duar. pondere. Quod si grana Diagrydii 4. vel 5. addideris, copiosius purgabit. Fit ex iisdem *pulvis*, si unc. folior. uni, jalapæ & Cremoris Tart. ana tantundem cum Zingibere & Zedoaria miscueris. Exhibetur in pas-sularum minorum decocto. Braſſa-volus in adpetentia Canina ab atrabile ventriculum insidente felicissime infuso usus est. Ego aquæ ferventissimæ, additis addendis, per aliquot horas immergere soleo: nec frustror intentione. *Duas* vero ejus *Species* Matthiolus facit. 1. *Mecchinam* ex Meccha delatam, folio angusto, longiusculo, crassiusculo, nonnihil acuto, colore ex luteo virente, quæ præstantissima. 2. *Sætticam*, a loco, ubi provenit, ita dictam, quæ vilior & minoris pretii.

II. *Senna Italica* seu *obtusis foliis*, aliis, Nostras, Communis, vilior, altera, & Senna simpliciter, *caule* est cubitali; *foliis* latioribus, gustu glutinoso; *floribus* luteis & pallescentibus, qui quinque foliis in concavitate aliquam reflexis constant, & nocte se contrahunt. *Siliquæ* compres-

sæ & falcata, orientali angustiores, linea utrimque per medium inæqualiter extuberante; quibus *semina* nigra, compressa, figura cordis. *Frequens* in agro Pistoriensi, Apulia, Liguria, feriturque in quibusdam Florentiæ locis, mense Majo: sed non perdurat ultra autumnum. Habetur & in Narbonensi Gallia. In horto Montbelgardensi provenire renuit: Basileæ visa cum flore. In Septentrione vix trimestre vivit, nec vel flores nec siliquas promit vel maturat, adeo delectatur calidis. Ex virente & rosarum diluto parabat Matthiolus quotannis syrupum, qui large satis purgabat. Duplex observatum genus, *semine* nempe *nigro* & *albo*.

II. *Jovis barbam* adjicimus propter aliquam adfinitatem, paucaque de ea occurrunt. Plinius odisse aquas scribit, in opere topiario tonsilem, & in rotunditatem spissam, argenteo folio, scribit. Dalechampio, seu qui historiam Lugdunensem conscripsit, fruticosa est arbuscula, magnitudine hominis, ramis densissimis, folio lentisci argenteo, sic collocato, ut lateribus folia paria sint, impar autem foliis versum claudat. *Coma* in opere topiario tonsilis & in rotunditatem spissa, elegantissimi adspectus. *Flos* in summis ramis copiosus, in cumulum coacervatus, luteus, genistæ similis. *Gignitur* in saxosis & lapidosis maritimis, montibus præsertim. Anguillara in monte nigro prope Livornam gigni tradit, *foliis* ordine dispositis, candidis, nitentibus, lenticulæ similibus, angustioribus, flexilibus *ramis*, luteis *floribus*.

Plin. H. N.
l. 16. c. 15.
Hist. Lugd.
H. P. l. 2.
c. 35.

CAPUT II.

De Arboribus siliquatis Classis secunda.

ARTICULUS I.

De Siliqua seu Ceratia.

Siliqua
seu Cer-
ratia.

TAB.
CII.

Arbores siliquatae Classis secundæ sunt 1. *Siliqua*. 2. *Cassia fistu-
la*. 3. *Tamarindus*.

I. Cur arbor ista siliqua simpliciter dicatur, in philologicis exposuimus.

Meminere ejus & *Veteres*: sed apud Dioscoridem nulla descriptio. Theophrasto & ex isto Plinio, similis est ficui Ægyptiæ, καροπορία nempe. *Radi-
x* leviter sublimis. *Rami* grandes. *Folia*

Theophr.
H. P. l. 4. c. 27.

Folia semper comantia; *flos* candidus cum vehementia odoris. Maximam fructus partem pellit caudice, paucum ramis, eumque in siliqua, quam *ficum Aegyptiam* quidam vocant. Gignitur is uvæ modo conformis atque uniformis: tum auctus circa Arcturum & æquinoctium floret: dehinc hyeme exacta durat usque ad Canis ortum. Plantigeram imis partibus, & ideo superficie flavescentem, succum auferente sobole, *Plinius* dixit. Pomo antecedentis anni circa Canis ortus detracto, statim alterum parere: postea florem per Arcturum hyeme scetus enutrientem. Siliquæ sunt, quibus digitorum hominis longitudo, & interim falcata pollicari latitudine. Nec omittenda feminis proprietas. Nam neque corpus, nec lignum, nec cartilago dici potest, nec aliud nomen inveniat. *Nascitur* in Syria, Jonia, circa Gnidum, & in Rhodo. An cum Ceronia sit una eademque, comparatio ostendit. *Usus* & in *cibis* & in medicina. In *cibis*. Horatius enim & Persius inter tenues referunt, quod & apud Galenum occurrit. Johannem Baptistam filiquis victitasse vulgo creditur: iisdemque prodigus filius ventrem implere cupiebat. Ex iis & vinum in Syria, καράτια sic expressa, porcorum pabulo servabantur, scrupulosa corticis inter nucleos quoque ruminatione. In *medicina*. Recentes enim alvum solvunt; siccatæ sistunt, & urinam cient in σιμφύλων συντιθέμενα, quæ vinaceis conduntur, vel potius ἐπὶ τῶν σιμφύλων ἐσθιόμενα, sine filiquis & granis comesta. Sic & Cassiæ sola pulpa manditur: nec verisimile est, filiquas in vinaceis conditas vim diureticam adquirere. *Semen* & in ponderibus olim locum habebat, & sextam scrupuli pendebat parrem, κόκκιον Anonymus de mensuris & ponderibus vocat. Inde *Caratorum* apud mercatores nomen. De differentiis nihil. Auctor de finibus, *Sylvaticæ* meminit, absolute, an contra distincte, difficulter dixeris.

II. MODERNIS siliqua est triplex
1. *Edulis*. 2. *Purgatrix*. 3. *Sylvestris*.

I. *Siliqua edulis*, Dodon. *Cerato*. Siliqua *nia*, arbor, ut tradunt, alta, & ramis seu Cera-
longis firmisque brachiata. *Caudex* ratia.
crassus. *Folia* circa extremitates ma- Vesling. ad
gis rotundata, ovalem propemodum Alpinum de
ambitum designant, nonnunquam si- plant.
nuosa & inæqualiter commissa. *Ri- Egypt.
gida* eadem, nervosa, crassa, crebris c. 2. p. 6.
obliquis venulis in margines excur-
rentibus, superius atro virore splen-
dent, inferius Novembri & Decem-
bri julum juglandis instar emittunt. In *flosculos* se hic aperit rubescenti
thyrsos insertos, plurimos, lacteo can-
dore perfusos, quorum foliolis dilap-
sis flavescentes apices superstites re-
manent, & ipsi tandem decidui. *Sili-
quæ* non tantum digito indici æqua-
les, sed & altero interdum longio-
res, latiores, modice intortæ, com-
pressæ, callo dulci & eduli. *Semina*
intus membranis distincta, seminibus
Cassiæ solutivæ fere æqualia, minora
tamen, colore spadiceo obscuriore,
compressa modice, altero fine in acu-
men leviter desinente, altero latius-
culo, pulpa buxea, dura, & legu-
minosi quid respiciente. Paucas in
Ægypto vidit Veslingius; frequen-
tiores in Palæstina; plurimas in Ju-
dææ montibus, & circa sacram ibi-
dem urbem. *Nascitur* & in regno
Neapolitano, in Apulia. Visa a no-
bis inter Fundos & Molam. Habe-
tur & in regno Valentino, nec non
orientali India. Nata Montbelgard
& Stutgardia ex semine, si vero ne-
gligatur, vix in alterum & tertium
annum perdurat. Florere mox so-
luta hyeme prodidit Dodonæus: fru-
ctus sub auctumnus maturi. *Usus*
siliquarum in *cibis* & *medicina*. In
Valentino regno jumentorum pabu-
lum sunt. Recenter decerptæ insipi-
dæ, sed in cratibus siccatæ, dulces &
esui aptissimæ evadunt. Mel apud
Ægyptios ex ipsis: quo in clysteri-
bus, haustu ad subducendam alvum,
renum inflammationibus, tussi & asth-
mate, Tamarindorum denique, Zin-
giberis, myrobalanorum & aliorum
conditura utuntur. Paratur ex iis
& syrupus, qui in officinis prostat.

II. De *Siliqua purgatrice* nihil ha-
beo quod dicam, nisi in Guinea nasci.

U u 2

III. Si-

Plin. H. N.
l. 13. c. 8.
Plin. H. N.
l. 15. c. 24.
& 25.

Baughin, H.
P. l. 12. c. 1.
P. 415.

Alpin. de
Egypt. c. 3.
Clut. H. P.
l. 1. c. 9.

Siliquea
seu Ce-
ratia.

III. *Siliquea sylvestris* est triplex 1. *Vulgaris*. 2. *Indica* & 3. *Siliquea sylvestri similis*.

Bauh. H. P.
l. 12. p. 433.
Bellon. l. 1.
de admir.
veter. oper.
c. 17.

1. *Siliquea sylvestris vulgaris*, alias *Arbor Judæ*, Bellon. *siliquastrum* seu *Fabago*, *Ceratia agrestis*, *siliquea fatua*, & *arbor amoris*, quibusdam *Cercis siliquata Theophrasti*, *Colutea tertia* ejusdem, nonnullis *Laburnum* vel ejus species, sed perperam, dicitur. Exiguæ magnitudinis arbor est etiam culta, neglecta & sponte nascens, plerumque inter frutices potius computatur. *Rami* alternatim ex lateribus nascuntur, quibus nigricans ex purpura cortex. *Flores* ante folia coacervati, amœni, purpurantes, pisorum vel genistæ floribus similes, πενταφύλλοι, & quorum duo inferiora, magnitudine superiora superant. Sapor subdulcis & nonnihil subacidus. *Siliqueæ* his succedunt, membranaeæ, sesquipalmari longitudine, compressæ, purpurascens, quibus *semina* coloris spadicei, dura, lentibus majora, nervosa, oblonga. *Folia* circinata rotunditatis, Asari, subinde majora, nervosa, dura, superius virent, inferius inalbescant. Est & *flore candicante*, quam alteram speciem Gesnerus facit. Provenit in Hispania, Italia, prope Bononiam imprimis, Gallia Narbonensi, prope rivus, & lætiores margines, aliquando & in amœnis collibus: sæpe & inter sepes. Turcis propter florem adeo commendatur, ut nullum Adrianopoli vel Constantinopoli videas cœmeterium, quod non hac confutum sit. Montbelgardi sæpius floruit, siliqueæ in Julio per hyemem summitates absumebantur. Visa Patavii mense Februario cum siliquis, Mantuæ cum floribus Martio.

Bauh. phy-
top. l. 11. f. 2.
p. 402.

2. *Siliquea Indica* est duplex. 1. *Siliquea Indica non spinosa*, quæ *folium* habet subrotundum, *florem* magnum elegantem & odorum. *Semen* nummi instar rotundum, planum, denarii magnitudine, crassiusculum, rufum. Missum Caspari Bauhino a Terentio ex India. II. *Siliquea Indica spinosa*, aliis *arbor Corallii*, cui fo-

Clus. ad-
pend. l. 1. hist.
plantar. Fer-
rar. Floræ

lia arboris Judæ valde similia, *flos* 1. 3. c. 21. colore corallo æmulus, siliqueæ præ- Bauhin. H. P. l. 1. 12. c. 8. grandes phaseolis pleni. Romæ ex p. 416. semine sata nostratis phaseoli simillimo, splendide tamen rubente planeque corallino, visendam in altitudinem in Barberinorum hortis prodiit, pluribusque a radice stolonibus, fruticavit. Medius & crassior *caudex* tres digitos biennio implevit. Palmari supra terram intervallo patulas dissipatur in ramos. *Cortex* per adolescentiam levior viret: in senecta rugosior ficulnei facie pallet. *Sentes* ei raræ, pallidæ, breves & hamatæ. *Folium* prope rotundo ambitu circumnatum leviter fastigiatur, ipsius hederæ rotunditate, crassamento & duritie æmulum, temperati latique viroris. III. *Siliquea Indica arboris Corallii similis*, in horto Stutgardia crevit. Bauh. H. P. l. c. *Caulis* erat crassus, spinosus palmum longus. *Folia* variabant. Duo priora subrotunda, ampla, singularia: cætera terna, trifolia, ad Cyclamini folia quodammodo accedentia. Huc pertinet *Siliquea Novæ Galaciæ* barbaris *Guanmochea* dicta, cujus fructus incolis in cibum cedit.

3. De *Siliquea sylvestri simili*, quæ Camer. *Acacalis* vel Syriace *Kismisen* five *Sifime*, ita Bauhinus. Ex Bauh. H. P. l. 12. p. 435. octonni semine enata tenella planta instar *Ceratiae* primum erumpentis, rotundis foliis, quaternis, utrinque costis adnexis binis. Caliculus subhirsutus. Sub autumni initium iterum exaruit. *Semen* altera parte rotundum, latiusculum, altera in mucronem collectum. Bellonius *Acacalia Dioscoridis* esse adfirmat, quæ fructus fruticis in Ægypto nascentis, fructui Myricæ aliquando similis, cujus cremor Collyriis admiscetur. Est & *Kesmesen* vulgare ad oculi morbos Constantinopoli remedium. Emes nummo, quantum vix requiras.

Ex EXOTICIS referri huc potest Recens R. Xochinacatzli, seu *flos auriculæ*. Fo- M. N. H. l. 2. c. 4. lia longa & angusta, viroris exsaturati, e pediculo veluti marcido propendent. *Flores* in folia divisi, auricularum pene forma, quæ interius pur-

purpurascunt, extra sunt herbacea. *na* coloris sanguinei, ex mutua com-
 Siliquæ longitudine sex unciarum, pressione fiunt angulosa.
 crassitie unius digiti, in quibus *semi-* Siliqua
 seu Ge-
 racia.

ARTICVLVS II.

De Cassia nigra seu fistulosa.

Cassia ni-
 gra seu
 fistulosa,

Vid.
 TABVLA
 CII.
 Theophr.
 H. P. l. 1.
 c. 18. & l. 4.
 c. 5.

Ignota arbor hæc Antiquis. Nec
 est *Faba Aristobuli*, quod Cordo
 visum, nec *siliqua Ægyptia* Theo-
 phrasti; nec ejusdem arbor Indica,
 cui fructus longus, contortus, cibo
 dulcis; sed qui morsum & difficulta-
 tem intestinorum excitet, ideo pro-
 hibitus ab Alexandro mandi. Ab
 Arabibus inventa est, & a Græcis
κασσία μέλαινα, dicitur. Habemus
 nunc ejus duo genera. Est enim 1.
Purgatrix. 2. *Non purgans*.

1. *Cassia purgatrix* est duplex 1.
Alexandrina. 2. *Americana*.

Alpin. de
 plant. Æ-
 gypt. c. 2.
 Vestling. ad
 l. c.
 Bauhin. H.
 Pl. 12. c. 2.
 p. 416.

Piso hist. na-
 tur. & me-
 dica l. 6.
 c. 10.

1. *Cassia fistula purgatrix Alexan-
 drina*, Matthiolo *Cassia solutiva*, seu
Siliqua Ægyptia, Guil. *Cassia stercor-
 raria*, Cordo *Siliqua Indica veterum*,
 Cam. *Cassia Ægyptia*, Acoftæ *Canna
 fistula*, Arabibus *Sagiar el selichet*,
 Ægyptiis *Chajarxambar*, arbor est
 inter proceras, nuci tamen juglandi
 stirpis magnitudine & robore cedens,
 etsi trunco ramis, foliisque proxima.
Cortex trunco planus mollis, cineri-
 cius. *Folia* nucis duplo longiora &
 in extremo aculeata decem, de alis
 ordinatim pendent, quinque utrin-
 que posita. *Flores*, qui foliorum
 proventum anticipant, aurei, multi,
 leucois proximi, sed multo majores
 numerosioresque, alis adligantur. O-
 doratissimi oriente sole, ideo Ægy-
 ptiis diluculo per ea loca spatari so-
 lemne. Quilibet (verba sunt Alpini)
 in medio multa capillamenta, tenuis-
 sima, rosarum flosculis similia habet,
 quæ paulatim crescentia, in crassio-
 res fistulas postea mutantur. *Fistula*
 tenuissimæ primo ac obtortæ, post-
 quam auctæ sunt, crassiores & ma-
 gis rectæ evadunt, ubi vere adoleve-
 re, rectissimæ ut calami evadunt. Lon-
 gitudinem duorum cubitorum maximam,
 Canna crassitudo. Maturantur toto

anni tempore, manentque in arbore.
 Junio colligere Cayri moris, quo,
 parvæ virides, & phaseolis similes
 visuntur, successu temporis nigræ. Et
 hæc Alpini descriptio. *Baubino* (na-
 tæ ei sunt ex semine) *flores* longis te-
 nuibus pediculis hærent, plures jun-
 cti veluti racematim ex ligula, eo
 modo, quo flores Laburni: foliis ea
 latitudine, ut ungue regas, striatis, e
 quibus stamina longa emicant, qui-
 bus apices sulcati insident. Ex his
 nunquam plane delapsis succrescunt
siliquæ, quæ paulatim grandescen-
 tes ad cubitorum duorum longitudi-
 nem, cylindracea forma, digitum
 transversum in diametro habent, co-
 lore nigricante; in quibus, secundum
 longitudinem commissurarum, vel-
 uti vestigia adparent spadicea, altera
 quidem parte duo, altera tria, intrin-
 secus membranulis ordine dispositis,
 intercipitur *pulpa* ecclysmatis consi-
 stentia, dulcis, nigricans, atque una
semen, Tamarindo grano minus, com-
 pressius, coloris fulvi, ex oblongo ro-
 tundum, durum, nitida superficie,
 quod medium secat stria rubra singu-
 laris. Rarius gemella semina inter
 parietes hosce veluti intergerinos re-
 periuntur. *Nascitur* in Ægypto, In-
 dia, & America, Alexandria & Cay-
 ri toto mense Julio floret, Damiatæ
 etiam Septembri. Ad littus a Suma-
 tra dictum tanta in sylvis copia cre-
 scit, ut ea naves onerari possent, sed
 non colligitur. Pendent de arbori-
 bus virentes aut cinereæ siliquæ, quas
 maturitas spadiceas reddit. In Cam-
 baja tam frequens, ut quingentarum
 viginti duarum librarum pondus, uni-
 co nummo aureo aestimetur, ibique
 optima. In montibus Cranganor, &
 in universa Malabare, singulæ libræ
 viginti maravedis redimantur. Ex
 insula S. Dominici, & S. Johannis de
 portu divite, defertur tam copiosa,
 ut

Garz. ab
 horto h.
 arom. l. 1.
 c. 29.
 Acofta hist.
 arom. c. 22.
 monard. h.
 simpl. c. 44.

Cassia ni-
gra seu fi-
tulosa.

ut toti Europæ sufficiat. Frustra Venetiis sata, non pervenit ad frugem, & opprimitur celerrime. Si semina bene macerentur, instar filiquæ provenire scribit Camerarius. Habetur & in Malacca, Sofala, Sian & Sunda. *Usus filiquarum, pulpæ, & seminum.* *Siliquæ* adstringunt, & perperam Sepulveda decoctum ad menses movendos, partus difficiles, & secundinas deturbandas cum artemisia laudat. Hujus hoc potius præstiterit vires, si aliquis eventus securus est. Condiuntur tenellæ & recentes, ut Monardes docuit. *Semen* evacuare scripsit Fallopius, idque se casu primum in duabus fimiis experiri scribit; duploque plus extractam pulpam evacuare, si contrita semina inspergantur. *Pulpa* humida est primo ordine & calida. Extrahitur sub floris nomine in officinis: & conditur alibi cum saccharo. Blande alvum subducit, si ab uncia semis ad drach. decem, vel fescunciam exhibebatur: efficacius, si ex sero lactis propinaveris. Tuto pueris & prægnantibus dari potest. Bilem, pituitam, melancholicosque humores, ex stomacho & venis mesaraicis deturbat, sanguinemque depurat. Cum saccharo candido & liquiritia secretum est in renum vitiis, quorum calorem exstinguit, impuritatem abstergit: traditurque præservare a calculo, si sæpius paulo ante prandium adhibueris. Debet paulo ante cenam vel prandium dari, monente Monarde, quod cibus permitta facultates suas exferat: & si diutius detineatur, in vapores, utpote debilis, resolvatur, vel in alimentum abeat. Est & in tussi antiqua, asthmate & orthopncea, imprimis si a falsis catarrhis concitantur, ejus usus apud Ægyptios nobilis. Nota vero. 1. Non dandam illis, qui humidiores sunt ventriculo, vel diarrhæa laborant: nec in urinæ ardore, quia prodente Fallopio bilem magis ad vesicam ducit: nec biliosis, nec omnibus pleuriticis. 2. Experientia compertum, adeo pulpa sola aliquando distendi ventriculum, ut magna flatuum copia perturbetur. 3. Optime in decocto aliquando convenienti

cum Syrupo de Cichorio cum Rhabarb. diasereos, vel rosarum solutivo exhiberi. 4. Eligendam non admodum crassam, pelluentem, recentem, gravem, fæctam, & quæ concussa inclusis feminibus minime perstrepit. Alpinus tamen, omnes recentes sonum edere, dixit, & sæpius senio confectas adferre. Reponuntur scilicet opportuno loco collectæ, ne ab aëre tangantur, conservareque ad XL. annos moris. Mercatores tamen crepitacula illa a solidiore fructu secernunt. Putrescunt, si minimus aër feriat. 5. Sæpe impostura pharmacopolarum noxas corpori humano inferre. Solent hi uliginosis aliquando locis reponere, aliquando arena operire, & aqua abstergere, aliquando singulis diebus per aliquod spatium macerare. Circa *differentias* nihil occurrit, est tamen aliqua in *siliquis* varietas. Sunt sub rubro, *Abes* a colore illius gentis vocatæ, quæ optimæ; sunt & *nigræ*. Pelusii corticem habent crassorem & parum intus substantiæ, Alexandria & Cahira tenuiorem, & multum. Ideo præferuntur.

II. *Cassia fistula purgatrix Americana*, Barbaris *Quauhajobuatli*, arbor est magna, *stipes* cinereus, *folia* pene laurina, *flores* lutei, stellati, racematim dependentes, e quibus *siliquæ* notissimæ. *Crescit* non tantum in Brasilia, sed & nova Hispania, apud Haxtepecenses, &c. *siliquæ* recentes saccharo condiri solent, & trium unciarum pondere, bilem & pituitam deturbant. Lobelius unciam unam plus purgare scripsit, quam duas Ægyptiæ.

II. *Cassia fistula non purgans* est duplex 1. *Brasiliensis*. 2. *Insulæ Tabago*, cui adde 3. *Arborem ibidem adfinem*.

1. *Cassia fistula non purgans Brasiliensis*, incolis *Tapyracoaïmana*, arbor est alta & magna. *Rami* exterius ex cinereo albicant. *Folia* cylindraceæ figuræ, duos digitos longa, subtiliter hirsuta, ad tactum mollia, surrectiora stant. *Flores* spicatim congesti sine ramulis, quinquefolii, cum tribus semi-

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 55.
De Laer
Ind. occid.
l. 5. c. 20.
Nieremb.
H. N. p. 327.
Lobel. in
pharm.
Rondeletii.

Marcgr. H.
H. P. l. 3.
c. 18.

semilunaribus corniculis, coloris incarnati elegantissimi, floris phaseoli magnitudine. Sequuntur hos, *Siliquæ concisæ*, duos pedes longæ, quinque digitos crassæ & ensis Polonici instar incurvatæ. Cortex exterior corticis arboris instar, interior lignosus & albus, nec possunt frangi, nisi malleo concutiantur. In siliqua multæ transversim *distinctiones*, quarum quælibet crassitiem pennæ anserinæ capit. In qualibet *nucleus* amygdalæ figura & magnitudine, ex albo flavescens lævis, durus, per longitudinem lineâ subrufa in uno latere divisus, cui nucleus corneæ substantiæ & albus. Ibidem *substantia* glabra, glutinosa, subnigra, subamari & adstringentis saporis. Piso addit, mensibus hybernis rosaceis floribus vestiri, æstivis innumeris fistulæ Cassiis inutilibus, duplo officinarum crassioribus & longioribus.

De Lact.
Ind. occid.
l. 17. c. 28.

2. *Cassia fistula non purgans insule Tabago*, arbor est procera. *Folia* Tamarisci instar; *fructus* similis veræ Cassiæ, sed grossior, cellulis ad eundem modum divisus. Pulpa amara cum adstringendi facultate. Accedit aliquanto ad Mizquid.

Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 34.

3. *Cassia fistulæ non purganti Brasiliensi adfinis*, mediocris est altitudinis. *Lignum* flexuosum, cortice rugoso, molli, & cinerei coloris. *Folia* rotundula & ejusdem congestus. *Flores* comosi, aurei, mox plumarum instar se extendentes, qui in summitatibus ex rubro purpurascunt, brevique pereunt. *Siliquæ* dulces, tortuosæ, & deformes, primo virides, mox nigrae & putrescentes. *Radiciis medulla*, quæ ex albo flavescit, a cortice liberata, in taleolas dissecta, per noctem sub dio macerata, & aliquoties pota, urinam cunctantem pellit, & renibus obstructis opitulatur, subamara quidem est, sed tenuium partium.

EXOTICA

TAB.
CIII.

Ex EXOTICIS huc refero 1. *Chatalbuic*, seu *arborem foliis Cassiæ*. 2. *Camolxochitl*, seu *arborem*

floribus Cassiæ, & 3. *Ceratium monococcum*.

Cassia ni-
gra seu
fistulosa.
Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 39.

I. *Chatalbuic*, seu *arbor foliis Cassiæ*, magna est, ramosa, & perpetuo virens. *Stipites* recti fulva lanugine. *Folia* Limoniæ aut Cassiæ fistularis similia, sed longiora & inferne candentia. *Flores* lutei. *Fructus*, nisi tenuior & asperior esset ac dulcis Cortex, par. *Usus* corticis, qui calidus & siccus ordine quarto, pulloque & candido variat colore, in farinam reducti & duar. drach. pondere ex aqua sumti, in detrahendis per inferna & superna bile & pituita, lumbricisque & vermibus pellendis: in dolore aurium, si permixtus Axin post aures adplicetur. *Fructus* quoque cortex dejectorius est & purgans. Tritus & in aqua infusus, capillos instaurat, si pecten ea tingatur. *Semen* ex aqua tritum placat febres.

II. *Camolxochitl* seu *arbor floribus Cassiæ*, arbor est leguminosa, *folia* in alas componit. *Flos* Cassiæ similis ex rubro flavus, in octo partes divisus. *Siliqua* piso similis.

Reccus R.
M. N. H.
p. 361.

III. *Ceratium monococcum* a Thoma Platero Bauhinus habuit. *Fructus* est quinque uncias longus, duas fere latus, inquit Bauhinus, pediculo brevi, crasso, firmo, cortice continuo. Cortex crassus, extrema facie spadicea, rugosa quadam sui parte pellucente, cum quibusdam verrucosis ruberculis: interna fusca, pulverulenta, digitorum contactum fusca quadam fuligine veluti ustilago inficiens. Ipsa cæterum corticis substantia, veluti ex arenosis quibusdam micis firmiter adeo compactilis, ut sine vi quadam rumpere, haud ita sit facile. Quod cavitatem replet intus, non faba est aut phaseolus, sed phalloides fungosus quidam fructus, internæ arque convexæ corticis cavitati exterius respondens magnitudine, ut integer fructus agitatus sonitum edat. Pulverulentus quoque est, teres, modice recurvus, ex fungosa quadam materie compactus, colore fusco intus forisque, sapor farinus, nec olfactus dignus.

Bauhin. H.
p. l. 12. c. 3.
p. 421.

Tamarindus.

ARTICULVS III.

De Tamarindo.

Vid. TAB. CIII.

Indicta *Antiquis* Tamarindus, quia ignota. Primi Arabes prodidere, sed in eo decepti, quod arborem palmam sylvestrem esse putarent. Nec minus illi errant, qui vel *δρυφορμία*, vel *Palmam* Plinii, de qua libro secundo egimus, esse credunt. In duplici nobis est differentia. Est enim 1. *Indica*. 2. *Americana*, quibus jungemus 3. *Fruticem Tamarindo similem*. 4. *Tamarindis simile semen spadiceum dentatum*, & 5. *Tamarindi seminis facie fructum Indicum*.

Bauh, phytop. l. 11. f. 2.
Bauhin. H. P. l. 12. c. 4. p. 422.
Alpin. de plant. Ægypt. c. 10.

1. *Tamarindus Arabica*, Bauhino *Siliqua Arabica*, quod ejus fructus ex Arabia in Indiam aliasque regiones, vel potius ex orientali India in Arabiam felicem, vel ex Æthiopia, quæ olim India, in Ægyptum & vicinam Arabiam deferatur, Cordo *Acacia Indica* vocatur. Arbor est pruni magnitudine, Castaneæ, juglandis vel fraxini aliis. *Rami* multi: *materies* firma & admodum solida. *Folia* ramuli sui lateribus intervallis insident æqualibus, numero utrinque paria, nullum relinquentia *δρυφον* foliolum. Filici hæc faminæ, pimpinellæ secundum alios similia, dilute virentia, palmi magnitudine, gustu acido. Occidente sole ita clauduntur, ut siliquas arctissime involvant, oriente panduntur. *Flores* octonis foliis constant, quorum quatuor interiora alba & crassiora, velut Mali aureæ florum folia, quatuor vero exteriora tenuiora, & bina ex his eleganti nervo radiata. Quatuor e medio stamina (Alpinus fila vocat) enascuntur, corniculorum modo inflexa, candida & tenuia, ex quibus fructus seu *siliqua*. In arcus aut digiti incurvi figuram efformantur istæ: cortex immaturis viridis, siccatis cinereus & facile avellitur: nuclei sativorum lupinorum magnitudine, rotundi quodammodo, (reperiuntur & quadrati) sed plani, fulvi & læves. *Pulpa*, quæ in massas coacta ad nos adfertur, nigra & acidissima, cui aliquando siliquarum

cortices, membranula tenuiores, quibus semina ab invicem separantur, & nervi cartilaginei duri immiscuntur. *Adulteratur* sæpe carne prunorum, sed obscura nigredo, humiditas largior & sapor dolum detegunt. Quidam siccam vino humectant, ut recentior videatur. Dicuntur in Canariis *Chincha*, in Malabar *Puli*, in Guzarate *Ambili*, in Malaya *Asfa*, &c. Habuit Bauhinus tenellam, quæ radicem egit singularem, tenuem, palmos duos longam, semen, ex quo provenit, transadigentem. Supra semen *stipitis* rudimentum, radice nihilo crassius, hirsutum, quod in duos utrinque ramulos oppositos abivit. *Folia* conjugatim ramulis adhærebant creberrima, oblonga, angusta, æqualia. *Provenit* in India, multis in locis, laudabilioremque & minus corruptioni obnoxium fructum fert, quæ in montosis & septentrionem versus nascitur. Visæ & Heidelbergæ aliquot annorum plantulæ, etsi Camerarius ex nucleis enatam nunquam alterum annum durare scripsit. In deserto Maccarii prope Assyriorum monasterium, ubi nulla planta prodit, vivere, miraculi loco habetur. *Usus foliorum, fructus, & seminum*. Ex foliis parantur acetaria: imponuntur partibus erisipelatosi trita. Cum sale Armuziano phlegmonas, cum cineribus ex Cambaja pituitosos & melancholicos tumores resolvere, comesta, infusa, vel decocta vermes pellere, creduntur. *Tamarindis* ipsis seu fructui frigus & siccitas in tertio. Parvi ac virides condiuntur ab Arabibus saccharo, vel melle Carub. Infunduntur unciarum quatuor pondere per tres horas in liquore stillatio, modicoque saccharo adspersi exhibentur, biliosos humores detrusuri. Mitigant calores febriles, & quia sitim extinguunt, vel ejus gratia plus quam ter millenæ libræ quotannis Cahiri venduntur. Sale condiri moris, ne temporis incommoda sentiant, præbent & aceti vicem, Pulpa apud nos

Garz. H. A. l. 1. c. 28.
Acoffa h. arom. c. 21.

Nieremb. H. N. l. 15. c. 17.

hos in usu in evacuandis succis bilio-
sis, daturque ad tres uncias. Casti-
gantur ob frigiditatem cinnamomo &
maci, ob tarditatem sero lactis capri-
ni acuantur. Hanc & per sitientia
Africa viatores sitis restinguendæ er-
go ferunt. Cum aqua marina exhi-
bere mos piratarum, quando deglu-
tisse mercatores gemmas suspicio est.
In gonorrhæa biliosa feliciter cum flo-
ribus Cassiæ exhibetur. In Java pa-
ratur ex Tamarindor. unc. ij. cum
limonib. incisis duabus, sacchari ni-
gri Javani totidem libris, & aquæ
triginta circiter amphoris potus, Hol-
landica cerevisia salubrior. *Semen*
assatum & in pollinem redactum in
alvi profluviis exhibetur. Idem &
Corticis usus.

II. Tamarindus Americana est du-
plex 1. *Brasilensis* nempe & *Mexi-*
cana.

Bontius
apud Pifo-
nem H. N.
l. 6. c. 4.

1. *Tamarindus Brasilensis*, arbor
est in maximæ tiliæ magnitudinem
excrecens, cortice exterius gryseo,
ligno albo & fatis lento. In multos,
inquit Marcgravius, expanditur ra-
mos, quorum quilibet in multos mi-
nores dividitur, qui ramulos gerunt
hinc inde alternatim dispositos, tres
aut quatuor digitos longos, in qui-
bus ordinatim posita foliola parva,
paulo plus semidigitum longa, mi-
nora quoque, angusta, æqualis un-
dique latitudinis, figuræ cylindraceæ.
Bina autem ubique sibi exacte oppo-
nuntur, & nullis fere pediculis, in-
niruntur, ac arcte se mutuo attingunt,
inferne dilute virent, superne satura-
tius, egregiamque aciditatem sapore
referunt. *Fructus* in extremitate ra-
mularum, in quolibet pediculo fo-

litarius provenit, figura varians. Qui-
dam enim figura & magnitudine si-
cus exsiccatæ compressus, quidam si-
liquæ fabæ majoris, quidam instar
columellæ laccæ, qua literas obfigna-
mus. Omnes cortice externo fragi-
li, coloris mespilorum, tenui quan-
do maturi sunt. *Pulpa* plenus cor-
tex nigricante, filamentosa, acidi sa-
poris gratissimi. In medio pulpæ in
quolibet fructu seu siliqua duo aut
tres lapides amygdalorum figura, aut
orbiculares, & compressi inveniu-
tur coloris castaneæ splendentis. Nu-
cleus Tamarindorum terræ commis-
sus, annuo spatio in arbusculam quin-
que pedes altam excrecit.

II. *Tamarindus Mexicana* eodem
fere modo, quo Indica describitur.
Sed quia in icone aliqua conspicitur
differentia, ideo eam adjicere placuit.

Reccus R.
M. N. H.
P. 83.

III. *Tamarindo frutex similis*, di-
citur *Queillos*. *Fructus* ei, ut fabæ
Romanae, subduplo longior, quo in
cibo utuntur.

Ind. orient.
P. 4.

IV. *Tamarindis simile semen spa-*
diceum dentatum, album erat, du-
rum, cortice spadiceo. Magis tamen
planum, & oris compressioribus.

Clus. exot.
l. 2. c. 16.
Bauhin. H.
P. l. 12. c. 5.
P. 43.

V. *Tamarindi seminis facie fru-*
ctum Indicum ex munificentia Ducis
Wirtembergiæ habuit Bauhinus. Un-
ciam, *inquit*, longus est, tertiam un-
ciæ partem latus, ovatus, compres-
sus, fuscus & paulo minus quam ni-
ger, superne qua adhæsisse videtur
leviter umbilicatus, inferne acutus:
utrinque linea ovata ad fructus figu-
ram impressa notatus.

CAPVT III.

De Arboribus siliquatis Classis tertia.

ARTICVLVS I.

De Evonymo.

Vid. T. A. N.
III.

Ad tertiam arborum siliquatarum
partem pertinent *Evonymus* &
Nerion.

I. *Evonymus* nota *Theophrasto* &
ex hoc *Plinio* arbor. Magnitudo ei
mali Puniceæ. *Folium* ejusdem Cha-
mæda-

Evony-
mus.
Theophr.
H. P. l. 3. c.
ult.
Plin. H. N.
l. 13. c. 12.

Y y

Evonymus.

mædaphnæ majus & molle, nec bene Plinius, inter eam & laurum folii magnitudine, quasi φύλλον μεταξὺ ρόας καὶ δάφνης exstaret. Flos colore τῷ

Theophr. H. P. l. 6. c. 4.

λευκῷ ἢ seu λευκοῖς Theophrasti bulboso non Dioscoridis similis, odore gravis ὥσπερ φόνι, veluti attractylidis, qui vere erumpit. Fructus cum putamine sesamæ filiquæ proximus, intus solidus: præter quam quod in versus dividitur quaternos, (δηρημένος κατὰ τὴν τετραστοίχην) Plinius ferre filiquas sesami similes, intus granum quadrangula figura spissum, dixit. Germinat περὶ τὸν ποσειδεῶνα, i. e. mense Decembri seu sole existente in Capricorno. Provenit cum alibi, tum in Lesbo insula, in monte Ordyno. Vires si spectes; enecat pecus folium, si gustetur: capras imprimis interimit, nisi ἀνόχῳ seu præcipiti alvi inanitione purgentur. Idem & fructus facit.

II. MODERNIS est triplex 1. *Granis rubentibus vulgaris*. 2. *Granis nigris*. 3. *Latifolius*, ad quos 4. *Ban Egyptiorum*, seu arbor fructu baccis lauri similis referenda est.

Tabern. H. P. l. 3. c. 79.
Bauh. H. P. l. 2. c. 14.
p. 201.
Lugd. H. P. l. 2. c. 70.
Matthiol. in Dioscor. l. 1. c. 114.

I. *Evonymus granis rubentibus vulgaris*, Crescentio *Fusanus*, Lon. *Carpinas Theophrasti*, Cæsalp. *Siler Plinii*, Lugd. *Tetragonia Theophrasti*, Bauhino *Evonymus multis*, aliis *Tetragonia* dicitur. Frutex est arboreus, quatuor aut quinque cubitorum altitudinis. Lignum satis solidum, fissile tamen & æquale, album aut flavescens. Rami propter excurrentem in quatuor angulos corticem, quadrangulares, ac si artifex dolabra perpolivisset. Folia acuta, oblonga, crenata. Flores, qui post veris initium funduntur, Monspeli Aprilis, in Germania Majo, pallidi, τετραφύλλοι, quibus totidem alternatim posita calyculi foliola subjiciuntur, pari numero, apicibus luteis, umbilicum curvofum viridantem cum stylo concolore occupantibus, singulis singulæ succedunt filiquæ quadrangulæ rubentes aut puniceæ, albæ aliquando, intra quas distinctis loculis semina parva, solida, ex rotundo oblonga, quibus cuticula cro-

cea, medulla alba, sapor cum obscura dulcedine amarus & nauseabundus. Autumno adpetente purpureo tinguntur colore, donec omnino rubescant: postea decussatim sua sponte rumpuntur, & hiantes in hyemem usque pendent. Natale ipsi solum regio calida & frigida. Juxta sepes & margines, in montibus dumetis & sylvis, inter spinosas stirpes juxta vias non dedignatur nasci. Usus fructus capris in cibo. Avidissime vorasse observavit in Pannonia Clusius. Terni aut quaterni homini exhibiti, per superna & inferna purgationem moliantur. In lixivio cocti capillis flavedinem conciliant: & ejus gratia unguentum Italicis mulieribus ex ipso. Ex ligno vasa & varia instrumenta tornantur; in Helvetia muscaria vel lardaria. Triplex ex eodem color, flavus viridis & fulvus. Exsurgit ille, si viridem adhuc cum tantillo aluminis bullire permittas. Nihil obest, quo minus *Tetragonia* Theophrasti dicatur, quam *Quadratoriam* Gaza vertit. Est ex sero germinantibus.

II. *Evonymus granis nigris*, Clus. H. P. l. 1. c. 37. *Evonymus alter*, Tabern. *Pannonicus*, Bauhino *Evonymus flore phæniceo*, frutex est homine altior, Caudex & rami tuberculis adpersi, punctis veluti notantur, pulverulentique sunt. Folia ferrata, pruno sylvestri similia, gustu primum exsiccante mox amariuscule & calido. Flosculi aliquot simul ex longis pedunculis quadrifolii, cum umbilico quadrato, & staminulis luteis quatuor angulos occupantibus, qui splendent & purpurascunt. Fructus in filiquis quadrangulis spongiosus, aurei coloris, in quo grana nigra, splendentia, loculis distincta, & pulpa comprehensa. Siliquæ dehiscences tenui filo propendent. Copiose nascitur in sylvis Pannoniæ montibus, qui Alpes non attingunt; nullibi abundantius, quam in sylva ad Greytzenstein arcem. Floret ibi Majo, fructu Augusto maturascit. Visa primum a Bauhino Sturgardii.

III. *Evonymus latifolius* virgas habet cubitales, rotundas, virides, fractu

Et contumaces. *Radix* in bicubitalem longitudinem excurrit, summo capite singulis annis virgas proferens, quæ levi per hyemem incremento, folia sub finem auctumni abjicientes, oblongam gemmam extrema cuspidē, spem novæ in vere germinationis proferunt. *Folia* nascuntur ex adverso bina, leviter ferrata, viridia, gustu amaro. *Flores* τετραφύλλοι, albicantes, & ad carneum quodammodo colorem tendentes. *Fructus* interdum quinque angulis constat, alatus quasi & maturitate dehiscens, in quo alba grana aureæ pulpæ immerso, Augusto vel Septembri visuntur. Observatus a Clusio ea parte Pannoniæ, quæ olim Interamnis vocabatur.

IV. *Bon* seu *Ban Ægyptiorum*, non-*Evony-* nullis *Elkarie*, Abensinæ *Bunebo*, Rha-
mus. si *Bunca*, Evonymo similis est, sed Alpin. plan-
tar. Ægypt. c. 16. *foliis* crassioribus, durioribus, & per-
petui viroris, fructu lauri baccis si-
mili. Visa in herbario Halybei Bas-
sæ. Ex seminibus paratur *Caova* po-
tio, quæ Turcis loco vini, asportan-
turque ex Arabia felice, saporis dul-
cescentis cum paucō amarore. Ute-
ro creditur egregie prodesse; ideo
ejus decocto fluxus mensium promo-
vere, mulieres Ægyptiæ solent. Nau-
seam stomacho concitare & pituitam
purgare, Alpinus ex Abensina pro-
didit.

ARTICVLVS II.

De Nerio.

Nerion.

TAB.
CIV.

I.

Dioscor. M.
M. l. 4. c. 82.

EX VETERIBVS describere Ne-
rion, Dioscorides, Plinius & Ga-
lenus. Frutex est notitiæ vulgaris.
Folia μακρότερα καὶ παχύτερα quam
amygdalo: flos ροδοειδής. *Fructus* ἐμ-
φερής ἀμυγδαλῶ, veluti κέρατιον (male
ὡς κέρατι) quod dehiscens, πλήρη ἐριώ-
δους φύσεως, pappis acanthinis simili
(sic lege, non ὑακινθίοις, nulli hyacin-
tho pappi) plenum, reperitur. *Ra-
dix* acuminata, longa, lignosa & sal-
suginosa. Plinius sempiternum fron-
de, rosæ similitudine, caulibus fruti-
cosum dixit, similem amygdalo fru-
ctum vix dixeris, nisi vel de exigua
adhuc filiqua & adolescente sumas,
vel ob corticis viriditatem & crassi-
tiem: vel locus corruptus sit & legi
debeat, καρπὸν δὲ ὡς περὶ κέρατιον ἀνεωχ-
μένον, omittis ἐμφερὴ ἀμυγδαλῶ. Ad-
ulta sane filiqua, angusta oblonga,
nullo duro & lignoso nucleo subje-
cta, lanuginosis tantum villis turgens,
amygdalo comparari non potest. Na-
scitur ἐν παραδείσῳ καὶ παραθαλασσίῳ
τόποις & ad flumina. *Vires* ad no-
xia. Flos enim & fructus, jumentis
capris, ovibus & canibus venenum.
De homine incertum. Homini con-
tra serpentina remedio, si e vino bi-
bantur, magisque ruta addita, Dio-
scorides prodidit. Galenus, extra

illita διαφορετικῆς esse δυνάμεως, intra
ὀλίγη καὶ δεινότητι. In Bithynia ob-
duntur foliis foramina ubi mures sta-
bulantur: quæ si dentibus egressuræ
attigerint, pereunt.

Pall. R. R.
l. 1. c. 35.

II. RECENTIORIBVS triplex est
Nerion. 1. *Floribus rubescentibus*.
2. *Floribus albis*. 3. *Americanum*;
quibus adde 4. *Arbores duas Nerio
similes*, & 5. *Fructum Nerii filiquæ
figura*.

I. *Nerion floribus rubescentibus*, Bauhin. H.
Anguil. *Oleander flore rubro*, Gesne-
ro *Rhododaphne*, Rauwolf. *Oleander*,
Defle circa Tripolim, est planta ar-
borea. *Caudex* rectus, rami recti &
firmi, crocei seu ex viridi palle-
scentes. *Folia* multa oblonga, rigida, cras-
sa, dura, exsucca, quæ superiore par-
te atrovirescunt, inferius maculis al-
bidis hinc inde adsparguntur. *Flo-
res* supremis ramis insident multi, co-
lore rosæ incarnatæ, divisura, (*ver-
ba sunt Bauhini*) quinque partita cle-
matidis daphnoidis: singulisque divi-
sionis partibus interne adnata quæ-
dam trifulca adpendix, in medio api-
ces quinque simul juncti, albi, pilosi:
floris vero longi, veluti calycis imum,
extrinsecus obvallant foliola intense
rubentia. *Siliquæ* marcidis floribus
succe-

P. l. 15. c. 19.
p. 141.
Tabern. H.
P. l. 3. p. 751.

Nerion. succedunt fursum spectantes. *Pro-*
venit ad aquarum fluentia & loca ma-
ritima, in Ponto, Syria, Italia, Gal-
lia, &c. Matthiolo ad Benaci ripas,
& in Argentario monte primo visum.
In tractu maritimo & montoso Ligu-
riæ inter Genuam & Niceam crescit
copiosissimum. In Creta ad trabes
ædicularum apta materia. In insula
montis Baldi Monachorum minorum
ex saxis nudis prope aquam pullulat.
Monspeli cum filiquis in autumno
visa, & mente Majo ac Junio florens;
Patavii cum filiquis vere, sub tecto
mense Januario. De *Viribus* nihil
apud Recentiores singulare occurrit.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 33.
Bauhin. H.
P. l. 15. c. 19.
p. 142.
Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 33.

II. *Nerion floribus albis*, nihil a
priori differt, florum colorem si ex-
ceperis.

III. *Nerion Americanum*, incolis
Quauhtlepatles, aliis *Chupireni* seu ar-
bor ignea, lauri est effigie. *Folia* ob-
longa, majora & latiora, quam amy-
gdali: *flores* in rosam conformati.
Nascitur apud Mechuacanenses, &
Huexorziacenses, prope humectan-
tia & aquosa. *Fundit* lac adurens,
quod in deturbandis in hydrope, &
gallica lue usurpant: tutius purgat.

si umbilico inunxeris. Potest tamen
& eo modo præparari, quo esula,
scammonium, & his similia.

IV. *Arbor Nerio similis* est duplex,
I. *Prima* habet *siliquas* de ramis &
furculis Sambuci sylvestris, medul-
losis, pallidis, pullis, nodosis, ses-
quipalmum & pedem longis vaginis
cutaceis, uno cohæsu septenis aut no-
venis, singulis lampetram gracilem
effigiantibus. *Pelliculæ* intus cepa-
cæ & tomentosæ, adeo exuvium ser-
pentis mentientes, & quiddam cada-
veruli anguini simile involventes, ut
pueris horrore sit. II. *Alteræ* Indis
Yccotli dicitur. In ea venæ *folio-*
rum nigra; *flos* Nerii luteus; *vascu-*
lum bursæ pastoris simile, ejusque
divisio in duo vascula adparet.

Lobel. ob-
serv. p. 199.
Terent.
apud Rec-
cum p. 443.

V. *Fructus Nerii siliquæ figura* Clus. exota
Clusio Kaye Balca teres & infra mini-
mi digiti crassitiem erat. *Cortex*
densus, rugosus, striatus, & innu-
meris tuberculis onagri pellis instar
oblitus: pars pediculo proxima rufa.
Pulpa intus admodum dura, & quæ
cultelli mucrone vix eximi posset, sub-
acidi saporis. Similis a Paludano
submissus, in quo lanugo quædam.

CAPUT IV.

De Arboribus quibusdam siliquatis Exoticis.

Exotica
quædam
siliquata.

TAB.
CV. & CVI.

Arbores siliquatae Exoticæ, quas
huic capiti inferere volumus,
sunt viginti. 1. *Comanda guira*. 2.
Atitara. 3. *Caaeo*. 4. *Sylva d' Agoa*.
5. *Quamochitl*. 6. *Cacaloxochitl*.
7. *Ecapatli*. 8. *Frutex innomina-*
tus primus Marcgravii. 9. *Frutex*
innominatus secundus ejusdem. 10.
Arbor siliquosa juglandis folio Brasi-
liana, lobo longissimo *Acaciæ siliquæ*
instar distincto. 11. *Arbor siliquosa*
Brasiliana lobo latissimo. 12. *Arbor*
siliquosa ex Virginia lobo fusco scabro.
13. *Arbor siliquosa, ex qua gummi*
Animæ elicitur. 14. *Arbor siliquo-*
sa lobo quadrangulo fusco. 15. *Arbor*
siliquosa Africana foliis fere pyri, se-
mine fabaceo. 16. *Arbor siliquosa*
Guineensis lobo spadiceo fusco. 17. *Ar-*

bor siliquosa Guineensis fructu faba-
ceo, lobo longissimo. 18. *Arbor sili-*
quosa in Sierra Lione. 19. *Frutex*
innominatus tertius Marcgravii. 20.
Arbor fabifera Javanensis.

I. *Comanda guira* sic a Marcgravio
describitur. Arbustum est seu fru-
tex ferens phaseolos. *Cortex* illius
viridis; *lignum* leve atque fragile.
In ramis habet multos ramulos surre-
ctos, sesquidigitum longos, directe
sibi oppositos, sed paria alternatim
posita, in quorum uno tria sunt *folia*
oblonga, acuminata, foliis salviæ acu-
ræ similia, inferne albicantia, super-
ne viridiora, & ad tactum instar se-
rici lævia, conspicuis venis prædita;
in altero *flores* sex, septem aut octo
magni-

Marcgr. H.
P. l. 2. c. 4.

magnitudine nostratium pisorum, foliis duobus sursum versus cum suo involucrio & uno deorsum, quod maximum. Sunt autem flores lutei coloris, & folium illud maximum deorsum versus, inferius venulis rubris per totum insignitur. Flores sequuntur *siliquæ* compressæ & quasi contortæ, quarum quælibet continet quatuor grana phaseoli, alba, nostris pisus paulo minora, quæ cocta bene sapiunt, & alvum laxant. Fert fructus toto anno.

Marcgr. H.
P. l. 2. c. 5.

II. *Atitara*, alias *Iatitara* Brasiliensis, spina est foliis sigilli Salomonis. In novem pedum ad summum altitudinem adsurgit. *Caudex* crassus acutissimis spinis ubique munitur. *Ramuli* fruticem per intervalla aduncis & deorsum versis spinis, viridibus, cum cuspidibus brunis, splendentibus ambiunt. *Folia* sesquipedem longa, inferne, a tribus vel quatuor rectis & acutissimis spinis muniuntur. Nulla in extremitate ramorum, quæ spinosa, & in modum sagittæ tripliciter figurantur. Arcte in modum foliorum palmæ complantur, antequam se pandant. *Siliqua* hinc inde pedem aut quindecim digitos longa, duos aut tres digitos crassa, acuminata utrinque & paulatim incurvata, ubique per ambitum frequentissimis spinulis obsatur, primo viridis, post nigrescens. Ubi se sponte aperit, ramum ex se more & modo palmæ nuciferæ in multos ramulos distributum promit, coloris ex flavo albescens, cui flosculi multi, hinc globuli copiosi fiunt, qui in fructus abeunt.

bi opposita, angusta, oblonga, ut *Exotica* lentium, sine pediculis, ad tactum quædam tenera, in medio secundum longitudinem subtili nervulo, qui non potest videri, nisi foliolum obvertatur. Ad caulem, ubi ramuli prodeunt, brevis provenit pediculus, (raro plus quam unus in uno loco, sed in uno habens multos, & in summitate caulis quasi spicatum congesti sunt globuli) unum digitum longus, qui capitulum producit rotundum, magnitudine globulariæ Monspel. Car. Clusii Rar. Plant. lib. IV. cap. I. vel etiam majus, constans caruleo purpureis (vel etiam incarnati coloris) flosculis egregiis, arcte junctis, ita, ut capitulum hirsutum videatur. Post flores proveniunt siliquulæ tenues, striatæ, hispidæ, mollibus aculeis munitæ, tres circiter digitos longæ, in quibus semen nigerrimum, splendens, oblongum, figuram fere habens cordis, magnitudine grani filiginis. Radix hujus plantæ perennis est, & semper protrudit caules recentes. Est autem radix pedalis aut paulo majoris longitudinis, quatuor circiter digitos crassa superius, sed quæ paulatim attenuatur versus inferiora, est autem contorta instar funis, & multa habet filamenta ad latus e sui medio, unum aut duos pedes longa: exterius est coloris umbræ, interius alba, lignosa, medullosa, lenta, filamentosa. Tota radix fortem odorem habet plane similem vaporum nostratium, diu in cella tempore hiberno servatorum. Herba inodora, sed saporis subdulcis. Mirabilis autem, nam manu, pede aut baculo tacta, statim contrahit se & componit, brevi autem post iterum se explicat, quod ab adstante videri potest. Etiam circa solis occasum tanquam tristitia adfecta se componit.

IV. *Sylva d'Agua*, herba fruticescens viva, est pyri sylvestris magnitudine. *Folia* prioris speciei foliis similia, sed angustiora in ramulis disposita, nimirum quilibet ramus quatuor, quinque aut sex digitos longus est, habetque octo aut novem paria ramulorum sibi invicem opposita, quorum quilibet sesquidigitum longus

Marcgr. H.
P. l. 2. c. 12.

Exotica
quædam
siliquata.

gus, & in singulis multa paria foliorum sibi opposita. Flos convenit cum flore primæ speciei, paulo tamen major & cerasi magnitudine. Lignum subrusum habet corticem, estque lentum, multis spinis rufescentibus munitum. Fert semen in siliquis magnis, latis, instar siliquæ pisi, plane hispidis, brunni coloris, tres digitos longis, quando semen maturum est, siliquæ sponte in tot partes diffiliunt, quot seminis grana continent: & secundum longitudinem siliquæ ad utrumque latus, filum quoddam hispidum etiam se absolvit: quodlibet granum seminis habet magnitudinem farris, compressum, coloris olivacei, quadratæ seu parallelogrammæ caspulæ inclusum. Tertia species, itidem fruticescens, minor est, præcedente, habetque foliola prorsus angusta & multo angustiora foliolis prioris, atque ad hunc modum disposita: ramuli sesquidigitum longi & non per paria sibi invicem oppositi, sed in orbem stantes, sex, septem aut octo numero, foliola tam in illis sibi invicem adposita, ut in reliquis speciebus. Color ligni similis secundæ speciei, uti & flos, verum semen continetur in siliquulis parvulis teretibus, hispidis, fuscis, quarum multæ conjunguntur, figura rosæ, quælibet autem siliquula habet tria grana & totidem tubercula, semen autem coloris est olivacei paulo obscurioris, rotundum & paulo compressum, instar lentium, sed minus. Siliquulæ etiam sponte diffiliunt in tot partes, quot semina continent.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 69.

V. *Quamochitl*, seu *Arbor fructus crepitantis*, spinifera est. *Folia* fert mali punicæ, paulo tamen obtusioris cuspidis, & *capitula* in postremis viticulis epythimo similia, majora tamen, ac *siliquas* e purpureo rubescentes, nigricante semine refertas, quod licet edule sit, halitum tamen inficit. *Nascitur* in calidis regionibus, qualis est *Cuaauebchinancensis*, quibusque locis. *Usus* radice corticis in adstringendo, dysenteria, aliisque fluxibus. *Folia* cum siliquastro satureti medentur. Succus seminis

egregium errhinum est, & humores aquosos affatim a capite trahit.

VI. *Cacaloxochitl* arbor est medio-
cris magnitudinis. *Folia* mali medi-
cæ, sed ampliora, & frequentioribus
a dorso in latera venis adpersa. *Flo-*
res magni & pulcri. *Fructus* siliquæ
permagnæ & fulvæ. *Usus* *florum*
in torquibus & corollis; nec quem-
quam salutant Indi sine his. *Lactis*
quod fundit, in refrigeratione & con-
glutinatione: medullæ in ventriculi
& intestinorum emundatione, si dua-
rum drachmarum pondere sumatur.
Generum diversitas ex floribus sumi-
tur. Ferunt quædam coccineos, quæ
Tlapalticacaloxochitl dicuntur: quæ-
dam candentes, quibus *Ticaxochitl*
nomen: nonnullæ coloris varii, quæ
Tlansqueluixochitl, *Hoiloxyitl ayo-*
teçtli vocantur.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 70.

VII. *Acatli*, aliis *Tlaloaxin*, *To-*
toncaxi hoitl seu *calida medicina*; qui-
busdam, *Xomo tonli* seu *parva sam-*
bucus, & *Xiopatli*, frutex est hispi-
dus, odore gravi, sapore amaro, *sti-*
pitibus lentis purpureis, tenuibus &
teretibus; *floribus* luteis, mediocri-
bus, in extremis ramorum flagellis;
ex quibus *siliquæ* teretes, tenues, lon-
gæ, & majore ex parte purpureis
granulis lenti similibus, minoribus
tamen refertæ. *Provenit* in campe-
stribus calidarum aut temperatarum
regionum. *Usus* foliorum in vomitu
infantium, qui lac sugunt, si con-
tusa ventriculo imponantur: in capi-
tis doloribus, si illinantur: in horro-
ribus febrilibus, si adsumantur.

Reccus R.
M. N. H.
l. 6. c. 16.

VIII. *Frutex primus innominatus* *Marcgr. H.*
Marcgraviæ, herba est fruticescens, in
trium aut quatuor pedum altitudi-
nem adsurgit, multis caulibus juxta
se positis, lignosis, rectis, paulo in-
canis, qui hinc inde ramos habent.
Folia fert in ramulis bina sibi opposi-
ta, in quolibet plerumque sex paria
& in extremitate unum solitarie posi-
tum. Sunt autem folia vix digitum
longa, inferius quasi lanugine incana
obducta, superius paulo viridiora.
Prope exortum illorum ramulorum
etiam

Marcgr. H.
P. l. 2. c. 8.

etiam proveniunt *ramuli* singulares, qui singuli ferunt *spicam* parvam, conicam, constantem *flosculis* parvulis, coloris ex albo & incarnato mixti, instar floris Loti. Post flores sequuntur *siliquulae* multae juxta se positae, semidigitum fere longae & figura cornu caprini: quodlibet autem corniculum continet quinque, sex aut septem *granula seminis*, quod propriae suae cellulae incumbit, parvum albicans, & figura instar panis sacchari, verum ad latera paululum compressum, durum, saporis instar pisorum. Quando semen plene maturuit, siliquula diffilit, & semen suum effundit.

Marcgr. H. IX. *Frutex innominatus secundus*
P. l. 2. c. 15. *Marcgravi*, ligno est saligno; me-

dulla alba intus; cortex cinereus; *Folia* myrti aemula, sed majora inferne ex viridi albicantia, quibus nervus secundum longitudinem postica parte prominulus, superna vix conspicuus. *Flores* non descripti. *Siliquae* quatuor circiter digitos longae, teretes & quasi ex globulis compositae, in quibus *semen* magnitudine pisorum, ex flavo obscurum, una extremitate acuminatum, & rimula quadam insignitum.

Clus. exot. X. *Arbor siliquosa juglandis folio*
l. 3. c. 1. *Brasiliana* lobo longissimo, *Acaciae siliquae* instar distincto. Lobus erat binos pedes Romanos cum triente longus, quatuor uncias latus, & planus, color cineraceus, tumor in medio. *Semina* contracta, & rugosa, orbiculari pene figura, nuci vomicae non valde dissimilia ex atro rufescentia.

Clus. exot. XI. *Arboris siliquosae Brasilianae*
l. 3. c. 2. lobo latissimo, duplex lobus est. *Primus* major ex fusco cineraceus, octo uncias longus, quatuor latus, cui intus lacunae decem, semen quasi quadrangulare oblique situm. *Alter* minor ex fusco rubescens, cui octo intra lacunae, semen imperfectum semini mali Citrii haud dissimile.

Clus. exot. XII. *Arbor siliquosa ex Virginia*
l. 3. c. 3. lobo fusco scabro, talis Principi Wirtembergico ex officulo terrae mandato prodiit, qualis hic depingitur. Lo-

bos *Baubinus* & *Clusius* habebant. Exotica *Clusii* sunt duo. *Unus* ex Virginia quaedam fuscus, quinque vel sex uncias longus, duas latus, unam crassus: *Alter* ex insula Haythi sive Isabellae vicina, spadicei coloris, septem uncias longus, tres cum semisse latus. Utrique crassus, validus, durus & firmus cortex, cui bini a pediculo nervi foris fusci, intra cineracei utrobique scabri producebantur. Pulpa intus fungosa, cineracea, in qua quina vel sena officula, nigra, dura, avellanae magnitudine & sapore, uncialis longitudinis immersa. *Baubini* lobo longitudo sex unciarum, latitudo trium. *Cortex* insignis crassitudinis, tuberculis minimis respersus, durissimus, Castanei ex una parte, fusci & nigricantis ex altera coloris. Tumor & sulcus in icone conspicitur per longitudinem. *Pediculus* ad lobum tenuior, rotundus asperiusculus, in extremitate teres. *Cavitas* intus uncialis plusquam fusca & nigricans, ad pediculi regionem arcta in opposita parte arcuata; crusta succingens tenuior est, cui splendens quaedam alia subest.

XIII. De *Arbore siliquosa, ex qua gummi Animae elicitur*, nihil occurrat, quod dicam, nisi forte ex Guinea advectam. An sit *Guama Oviedi*, dubitat *Clusius*.
Ovied. H. N. Ind. p. 1. l. 8. c. 8.

XIV. *Arbor siliquosa lobo quadrangulo fusco*, lobum habet septem uncias longum, duas latus, sulcis laterales alas superantibus, distinctum. In media spina aliquot semina, quibus niger & splendens cortex, pulpa viridis pistaciorum sapore, sed fervidiore. In lobi alis, succus quidam dulcis, qualis Ceratiorum.
Clus. exot. l. 3. c. 5.

XV. *Arbor siliquosa Africana foliis fere pyri, semine fabaceo*, siliquas fert candidas, phaseolis longiores & majores. *Semina* putamine albo ablato minii colorem habent, & siccatae in binas partes sponte finduntur. *Fructus*, qui incolis *Coles* resiccatus durus valde ac solidus evadit. Sumitur ab incolis in Africae tractu juxta Promontorium viride jejuno ventriculo, tole.
Clus. exot. l. 3. c. 7. Bauhin. H. P. l. 12. c. 7. p. 425.

Exotica quædam filiquata. toleraturi tribus vel quatuor adsumtis per totam diem famem. Adfirmant præmanso, quemvis potum sapidiorem evadere.

Clus. exot.
l. 3. c. 4.

XVI. *Arbor filiquosa Guineensis lobo spadiceo fusco*, qualis sit non proditur. Lobi longitudo unciarum decem, latitudo trium, spissitas vix quadrantis. *Cortex* lentus cutaceus ex spadiceo fuscus, frequentissimis venis ab infima filiquæ parte, ex pediculo dependente, fursum & ad latera perfusus. *Medulla* intus pallescens, gravis & caput ferientis odoris, cui grana aliquot dura, ex spadiceo fusca, granis arboris Judæ non dissimilia. Perniciem creant intus sumta: in polinem redactorum ad vulnera curanda usus.

Clus. exot.
l. 3. c. 6.

XVII. *Arbori filiquosæ Guineensis fructu fabaceo, lobo longissimo*, lobus erat nigricans, viginti unciarum longitudo, trium latitudine, cortice duro, crasso, rugoso, extra fuliginoso, intra spadiceo. Intus septem magni phaseoli, binas uncias cum semisse longi, coloris ex spadiceo nigricantis & splendentis.

Purchaf.
navig. T. 1.
p. 415.

XVIII. *Arboris filiquosæ in Sierra Lione* tres sunt species. *Prima* eximæ est altitudinis, cui filiqua fabacea quatuor aut quinque obliquas fabas, semini Tamarindorum similes, duro

cortici inclusas, quibus intra flavus nucleus, venenum præsentissimum, quo suas sagittas Nigritæ inficiunt, Fructus incolis *Ogot*. Altera est paulo minor, cui filiqua curva, crasso cortice, septem vel octo unciarum in longitudine, quatuor in latitudine, quinque fabas magnas continens. *Tertia*, est etiam ampla, cui folia breviora, fructus in valido ligneo pediculo, crassus, ad latera depressus, novem uncias longus, quinque latus, intra quem quinque fabæ majores præcedentibus, & venenati. Incolæ *Quenda* vocant.

XIX. *Frutex tertius innominatus* Marcgr. H. Marcgravii, minor est frutice inno- minato secundo. *Ramuli* sex vel octo in orbem stantes sesquidigitum longi. *Foliola* prorsus angusta. *Siliquæ* parvulæ, teretes, hispidæ, fuscæ, quarum multæ conjunguntur figura rosæ: cui libet tria grana & totidem tubercula. Diffiliunt in tot partes sponte, quot grana continent. *Semen* coloris est olivacei paulo obscurioris, rotundum, compressum, & minus quam lentium.

XX. *Arbori fabiferæ Java patria*. *Flos*, qui depictus, in præalta arbore crescit, cujus truncus spinosus, folium nostratis tilia. Apertus egregie rubet; in filiquis rubræ fabæ, quibus turdi avide vescuntur.

De Lobis
& fructi-
bus qui-
busdam
filiquatis.

Vid.
TABULA
CVI.

CAPUT V.

De Lobis & fructibus quibusdam filiquatis.

Tredecim tales occurrunt, 1. Lobus orbicularis, fuscus, spinosis tuberculis obsitus, binos phaseolos nigros continens. 2. Lobus cortice cartilagineo rugoso, fusco, duplici crusta sinuosa donatus. 3. Lobus cortice membranaceo atro tumido. 4. Lobus membranaceus atrospadiceus planus Guineensis. 5. Lobus quadrangularis. 6. Lobus aromaticus subfuscus, Terebinthi corniculis similis. 7. Fructus oblongus cineraceus rugosus & gibbosus. 8. Fructus compressus quadrangulus, venis candicantibus & nigricantibus, ut Co-

les fructus distinctus. 9. Fructus subrotundus, durus, eleganter rubens. 10. Fructus flavescens lobo forti inclusus Bauhini. 11. Siliqua thymiamatis odore Cherleri. 12. Siliqua parva Indica semine oblongo, nigro. 13. Fructus filiquosus, Orucoria dictus.

I. De Lobo orbiculari fusco, spinosis tuberculis obsito, binos phaseolos nigros continente, nihil habeo, quod dicam, nisi ita a Bauhino nominari.

II. Lobus cortice cartilagineo, rugoso, fusco, duplici crusta sinuosa donatus,

Bauh. phy.
top. l. 11. c. 2.
p. 401.

Clus. exot.
l. 3. c. 9. & 10.

tus, ex insula Mauricii advectus est. In arbore cresceret, an leguminis genus esset, cognoscere non potuit Clusius. Duo erant, quorum tres vel quatuor cum semisse uncias longi, binas lati: quorum unus tres, alter duos phaseolos orbiculatos ex puniceo nigros, veluti annulo cinctos, eosque duros continebat.

Clus. exot.
l. 3. c. 16.

III. *Lobus cortice membranaceo atro, tumido*, Clusio *Lobus niger primus turgidus*, non multum a lobo ciceris abludebat forma, major tamen. Semina bina aut terna, nigra, circumscripta fere rotunditatis, plana tamen, forma articulis lobi Acaciae non multum dissimili, quae membrana nigra & tenui teguntur.

IV. *Lobus membranaceus atropadiceus planus Guineensis*, Clusio *Lobus niger secundus planus*, forma valde superiori similis. Binarum unciarum longitudo, latitudo unius, extremitas paulo latior.

Clus. exot.
l. 3. c. 17.

V. *Lobus quadrangularis leguminis* genus esse videbatur. Longitudo quadrantis, crassities semuncia, quatuor crassiores & eminentiores nervi. *Cortex* densus & oblique striatus, coloris ex fusco fuliginosi. Septena intus grana quadrangula in duas partes dividua.

Clus. exot.
l. 3. c. 18.
Bauh. H. P.
l. 12. p. 438.

VI. *Lobus aromaticus subfuscus Terebinthi corniculis similis*, Clusio *Lobus oblongus aromaticus*, Bauhino *Lobus longus aromaticus*, odore fere Balzoini, variae est magnitudinis, sunt septem & octo uncias longi. Terebetes omnes, rugosi, & subfusci coloris. Intus tenuis niger & splendens pollen, qui tenaciter parti interiori adhaeret, odore Benzoino æmulus, & Cephalalgiae, si diutius naribus admoveatur, auctor.

Clus. exot.
l. 2. c. 14.

VII. *Fructus oblongus cineraceus rugosus & gibbosus* Clusio fructus ex Bengala. Inde enim adlatus. Plurimum ad fructum Coles accedit. Longitudo quinque pene unciarum, & totidem ambitus. *Cortex* crassus, durus, lignosus, coloris ex fusco cine-

raei. *Nuclei* uncialis longitudinis, De Lobis in quatuor partes dividui, duri, ex fusco subrubi, saporis adstringentis. & fructibus quibusdam siliquatis. Clus. exot. l. 2. c. 22.

VIII. *Fructus compressus quadrangulus venis candicantibus & nigricantibus*, ut Coles fructus distinctus, Clusio *Fructus VI. Parduyni*, habebat substantiam interiorem subfuscam, solidam saporis adstringentis.

IX. *Fructus subrotundus, durus, eleganter rubens*, Clusio *fructus peregrinus*. Mates nomine, Cassiae solutivae aut Ceratiorum semen magnitudine aequat, cui & forma satis respondet: tumidior tamen aliquantulum & colore differens. Durus est solidus, & aquae fundum petens. Clus. exot. l. 2. c. 30.

X. *Fructus flavescens lobo forti inclusus Bauhini*, ita a Bauhino describitur. Sescunciam circiter in longitudine sua adaequat, unciam vero in latitudine adimplet. *Corticem* habet ex una parte semirotondum, & undique fere teretem, flavescens, laevem: in medio tamen aliquatenus fastigiatum, unde ad utrumque latus costa quaedam elatior decurrit, usque ad finem huius dimidii fructus, parte etiam huius superiore, gibbus quidam eminentior visitur, tandem fructus hic in segmenta quasi distinguitur, sulcis quibusdam obliquis ypsilon graecorum pene imitantibus, secundum latera utraque ad finem pene corticis productis: ex altera fructus istius parte dimidia, cortice prior denudatus detectusve conspicitur, ita quidem, ut alteri alicui rei adhæsisse, priusquam avelleretur, credibile sit. Nam in extremitate in orbem circumducta, cava quaedam fossula, partem interiorem ambiens conspicua fit; nucleus vero in medio cortice contextus inaequali, multisque scrobiculis nunc profundioribus, nunc vero parte intermedia elatiore foveolae minimae occurrunt; in fossula vero extrema hinc inde lineae nunc semirotondae, nunc vero decussatim se interfecantes offeruntur. Spectandae fossulae denique ora extrema a corticis prius descripti extremitate inaequali fimbria donatur. Modo enim

De Lobis enim elatiori fine intro curvata altius
& fructi- adsurgit, modo retusior hebetiorque
bus qui- adparet.

XI. Siliqua thymiamatis odore Cher-
leri, coloris est Castaneæ dilutior tamen,
secundum longitudinem rugosa, tota sulcis constans, odorata, &
post se aliquam acrimoniam relinquens. *Semina* intus minima, nigra,
splendentia & sub dentibus stridentia.

XII. Siliqua parva Indica, semine
oblongo, nigro, externe rugosa & cinerea erat, & quinque interstitiis distinguiebantur. *Semina* intus quinque nigra, lucida, sublonga, inæqualia & utrinque extuberantia.

XIII. Fructus siliquosus, Orucoria dictus, siliquam refert majorem com-

pressam subluteam partim, partim subfuscā, partim ad latera multis majoribus decurrentibus sulcis, partim ad siliquæ incurvæ ductum oblique dispersis. A parte petioli superiore pergendo deorsum, latiusculam, unciamque fere longam impressionem obtinet, quæ in adscensu superioris partis gibberosæ rotundatur. *Siliqua* senæ similis, spissa, & duriuscula, in qua nucleus phaseolum æmulans, tenui, rugosa, & colore violaceo quodammodo imbuta, tunica vestitus, cui pulpa duriuscula & albicans. Si eadem est cum Clusii *Orucoria*, quæ in Virginia in arbore Juruwa nascitur, vim consolidandi habet, si ex confuso succus in vulnera instilletur.



HISTORIÆ NATURALIS

DE

ARBORIBVS

LIBER VIII.

De Arboribus Rhodofloris.

CAPVT I.

De Rosis.

Rosa.

I.

TAB.
CVII. —
CXII.Theophr.
H. P. I. I.
c. 15. Plin.
H. N. I. 21.
c. 4.Theophr.
H. P. I. 6. c. 2.Theophr.
H. P. I. I.
c. 21. 22.Theophr.
H. P. I. 6. c. 6.Pallad. R. R.
Tit. 21.
mense Febr.

ARBORES filiquatas Rhodoflo-
ræ excipiunt, *Rosa* nempe, *Ci-*
stus, *Chamæcistus*, *Cistus le-*
dum, & *Ledum Alpinum*. De *Ro-*
sis egregia apud *Antiquos* occurrunt,
differentias imprimis & genera si at-
tendas. Theophrastus modo inter
frutices, modo inter suffrutices nu-
merat: spina verius, quam frutice,
nasci scribit Plinius. *Rami* sunt acu-
leati, & perpetuus in cacumine vi-
ror. *Germinat* omnis primo inclusa
granoso cortice: quo mox intume-
scente & in virides alabastros fastigia-
to, paulatim rubescens dehiscit ac se-
se pandit, in calicis medio sui stantes
complexa luteos apices. *Flores*, qui
calyce, cortice, anthera seu croceo,
capillamento, folio, ungue & lana
constant, de quibus in philologicis,
Theophrasto bicolores, quod in his
alterum florem insidentem medium
gerit, suntque supra fructum. *Poë-*
tæ Deæ alicujus sanguine tinctam cre-
didere. *Semen* in ipso cortice (caly-
cem intellige) est, sub ipso flore oper-
tum lanugine: seu, ut Theophrastus,
sub flore, *μύλω* inclusum, lanugine
quadam, cnici modo aut echini *Car-*
duorum (lege, *κνηκωδῶς ἢ ἀκανθῶδῶς*,
vel *κνηκωδῆ ἢ ἀκανθῶδῃ ἔχοντι τινὰ χνῆν*) ob-
ductum, omnia semina proxime am-
biente. Palladius baccas nutrire scri-
psit, quas in brevissimi pyri similitu-
dinem plenas seminibus post vinde-
miam reddunt maturas, quarum ta-
men maturitas ex colore fusco & mol-

litie poterit æstimari. De *Natali solo*
hoc solum habeo, montibus deterio-
res emergere. De reliqua *Natura*
hæc accipe. *Tardissime* prodit se-
mine, ob id potius caule conciso in-
feruntur. Et ocellis radices, ut ha-
rundo, unum genus inferitur palli-
dæ spinosæ, longissimis virgis quin-
quefoliæ. Omnis *ustione* aut *recisio-*
ne proficit: *translatione* quoque ut
vitis optime ocyssimeque provenit,
furculis quaternum digitorum longi-
tudine, aut ampliore, post Vergilia-
rum occasum sata: dein per Favo-
nium translata pedalibus intervallis,
crebroque circumfossa. Plurimum
terra refert, cœlique temperies. Ideo
Cyrene odoratissima, Carthagine præ-
cox. Seri nec pinguibus vult, nec
argillofis locis nec riguis, contenta
raris: proprieque ruderatum agrum
amat. Quibusdam enim annis mi-
nus odorata provenit: præterea lo-
cis omnibus siccis quam humidis odo-
rator, & si prope allium plantave-
ris. Trahit hoc ad se quicquid fœti-
di; purius rosæ alimentum: vel ca-
lescēta ab hoc terra, elaboratius &
magis excoctum redditur. Viola &
hyacintho serior, & novissima erum-
pit, & prima inter vernos flores de-
finit: vitæque rosæ quinquennium ad
vigorem scilicet non adustæ nec re-
cisæ, flos in amurca si mergatur, ut
humor exstet, manet. *Usta* recisa-
ve melius florem profert; *relicta* ex-
crescit sylvescitque. *Recens* a lon-

Theophr.
H. P. I. c.

Rosa. ginkuo olet, sicca propius. Omnis verno tempore acrior & matutinis: quicquid ad meridianas diei horas vergit, hebetatur. Novella quoque vetustis minus odorata. Acerrimus tamen odor omnium æstate media, exquisitior cum serenis diebus leguntur, & omnia in calidis, quam in frigidis. *Ufus* apud Veteres in *Medicina* & aliis. In *Medicina*. Ex triplici enim parte constat, acerba nempe, quæ terrea, crassa & frigida; amara, quæ tenuis & calida; & aquea, necessario quidem frigida, sed in tenuitatis & crassitie oppositione quadantenus media, quod aquei admixtio qualitates omnes exsolvat: & hinc æstimandæ vires. Naturalem refrigerandi vim habet Plutarchus, ad spectu igneum quid ostentare, quod in superficie tenuis efflorescat calor, eo a frigore ἐνδύμενος, quod de rubra fumendum est. *Foliorum* succus per se vel cum aceto in febribus ad somnos & nauseas usurpatur, in rofionibus ventris & intestinorum stomacho illinitur: in hypochondriorum inflammationibus utilis, nisi adstrictio obesset, in externis non respiciendus. *Flos* somnum ciet, mulierum fluxiones sistit; stomachi dolores lenit. *Capita* sanguinem & ventrem comprimunt. *Virgues* epiphoris salubres. *Semen* optimum crocinum, nec aniculo vetustius, & in umbra siccatur, nigrum inutile. Dentium dolori illinitur, & urinam ciet, naribus subditum caput purgat. Oleo etiam macerabatur, idque a Trojanis temporibus, Homero teste, & in unguenta transiit. Diapasmata quoque inde ad sudores coercendos, ut a balneis inarescant corpori, dein frigida abluantur. In aliis. Cibi foliis lapathi modo condiebantur. Dabatur rosea corona in conviviis: inspergebantur mensæ & ferculis, pulvinis triclinaribus accubitoriis infarctus exinde. Heliogabalus in recumbentes convivas per laquearia veluti per impluvium effundi jubebat. Mensæ citreæ succo inungebantur: tantusque flori huic honos, ut apud Anacreontem ἀφ' ἑρῖον ἀνδρός, ἕαρος μέλημα, θεοῖσι, τερπνὰ, audiat. *Differentiæ* & genera a foliis, locis, colore & odore, præcipue sumuntur. Color quadruplex est, rubeus, candidus, carnatus, & pallidus. A Loco & aliis est Urbana, Sylvestris, Prænestina, Campana, Milesia, Trachinia, Alabandica, Græca, Græcula, Cyrenaica, Carthaginensis, Mosceutos, Auctumnalis, Centifolia, Sexagintafolia, Quinquifolia, Spineola. 1. De Urbana sumi debent, quæ diximus. 2. Sylvestri asperiores virgæ & folia, flos minus coloratus, minus odoratus, & parvus. Fructus exsiccatus, exempta interiori lanugine, in vino fervefactus & potus alvum sistit. Diximus de eo sub Cynosbathi nomine in Rubo. Eadem cum hac Cynorrhodos Plinii, cuius radicem oraculo quodam ad morsum canis rabidi repertam scribit. Bibit quidam in prætorio militans, servatusque est ex insperato: & postea quisquis auxilium simile tentavit. Alias apud auctores Cynorrhodi una medicina erat, spongiolæ, quæ in mediis ejus spinis nascitur, cinere cum melle alopecias expleri. Averso flatu colligi jubetur fructus, propter lanuginem. Alias noctu accipere jubent. 3. Prænestina novissime definit. 4. Campana præcox. 5. Milesia sera, colos ardentissimus, nec duodena folia excedit. 6. Trachinia minus rubet. 7. Alabandica vilior, albicantibus foliis. 8. Græca, Græcis lychnis, nonnisi humidis locis provenit, nec unquam quinquifolia excedit, violæ magnitudine, odore nullo. 9. Græcula, convolutis foliorum paniculis, nec dehiscens nisi manu coacta, semperque nascenti similis, latissimis foliis. 10. Cyrenaica odoratissima, ideoque ibi unguentum pulcherrimum. 11. Carthaginensis hispana, hyeme tota præcox. 12. Mosceutos e caule malvaceo folia oleæ habente funditur. 13. Auctumnalis, cui & Coroneolæ nomen, odorata, & magnitudine inter has media, 14. Centifolia in Campania Italiæ habebatur, Græciæ vero circa Philippos, sed ibi non suæ terræ proventu. Pangæus mons, inquit Plinius, in vicino fert, numerosis foliis ac parvis, unde incolæ transferentes conserunt, ipsaque plan-

Dioscor. M.
M. l. i.
c. 131. Ga-
len. de
simpl. me-
dicam. fa-
cult.

Dioscor. M.
M. l. i.
c. 123. Plin.
H. N. l. 8.
c. 41.

plantatione proferunt. Non autem talis odoratissima est, nec cui latissimum maximumque folium: Cepio Tiberii Cæsaris principatu, negavit centifoliam in coronas addi, præterquam extremos velut ad cardines, utpote nec odore, nec specie probabilem. 15. *Sexagintafolia*, seu *ἑξακονταφύλλος* Herodoto memorata, in Midæ hortis sponte nascebatur, fragrantiori odore, quam cæteræ. 16. *Quinquefolia* vulgaris est; ut & duo. 17. *Spineola*, vilissima, (utilissimam alii legunt) foliis plurimis, sed minutissimis. Sunt, qui *Spermoniam* vel *Sycioniam* vocant. Adde his, *Odoratiorem*, quæ spinosior, seu quod modum naturæ magis adsecuta est; *ἀκανθώδες φύσιν το ποδόν*; seu quod expulso magis terreo, & quidem per corticem, quod remanet subtilius & elaboratius redditur.

II. RECENTIORIBVS est Rosa triplex. 1. *Sativa*, 2. *Sylvestris*, & 3. *Exotica*.

I. *Rosæ sativæ* novem dantur genera. Est 1. *Rubra*, 2. *Purpurea*, 3. *Versicolor*, 4. *Multiplex*, 5. *Alba*, 6. *Moschata*, 7. *Spinis carens*, 8. *Subviridis*, 9. *Folio subrotundo & crispo*.

I. *Rosa sativa rubra* est triplex.

1. *Intense rubra*, 2. *Rubra pallidior*, 3. *Rubens saturatius*. 1. *Rosa sativa intense rubra*, est *Rubra Milesia Plinii*, Matth. *Rosa domestica punicea*, Lobel. *Rosa Damascena*, Cæs. *Rubens multifolia*, Dodon. *Rosa sativa tertia*, quæ *Provincialis Gallis*. Frutex brevius, vix cubitum aliquando excedens. *Virgæ* non ita crassæ, *spinæ* rariores non valde mordaces, in quibusdam ramis nullæ; *folia* ex longiusculo pediculo, cui in principio veluti auriculæ terna vel quina utrinque glabra, superne magis virentia, subrotunda: *flos* ruber intense, magnus, odoratus, ficcus inprimis, *Calyx* scaber, sed exilis. *Prodit* in multis regionibus, *Genevæ*, *Montbelgardi*, *Basileæ* intense rubet. *Ufus* ejus in medicamentis nobilis. Plus quidem terrestris & adstringentis facultatis habent,

non tamen absque permixtione humidæ, in virentibus inprimis. Resiccata validius stringunt, sed minus quam virentes refrigerant. Laudantur ergo in superfluis fluxibus, ventriculi debilitate, sudorum repressio- ne, cordis tremore & palpitatione, hepatis, renum & aliorum viscerum atonia, & aliis. Fit ex illis *tinctura* contra ardorem febrilem; *Rhodome- li*, ad vulnere & ulcerum abster- sionem: *Julepus* ad fallendam sitim, *Aqua*, *Syrupus*, *Electuaria*, *Conser- væ*, *Diarrhodon Abbatis*, ad supe- rius dicta. *Aromaticum rosatum*, calidiora etiam recipit, ventriculo a frigiditate debili dicatum. *Acetum* deliquis animi succurrit, si olfacia- tur; ventriculo vomituriienti, si du- plicato panno imponatur. *Oleum & unguentum* earundem, ut superius dixi, sunt virium. *Apices & stamina* validius adstringunt. Ideo pulveri- zata cum aqua *Cydoniorum* destilla- ta, in nimio mensium fluxu exhiben- tur. *Aqua* e calycibus destillata cum æqua aceti scillitici portione gingivas roborat, & dentes a corruptione præ- servat. Conficitur & ex *semine un- guentum*, quod cupulæ glandium, balaustia, myrrha, terra sigillata, suc- cinum & alia ingrediuntur. Vehe- menter adstringit & consolidat. De *collectione, delectu, repositione* & aliis nota. Colligendas dum adhuc clau- sæ coni figuram imitantur. Siccan- das loco sublimi meridiano, quo so- lis radii penetrrent, sed rosas non tan- gant. Sæpius vertendas ne sicum contrahant. Tardius collectas non diu servari & cito nigrescere; tem- pestive, biennium durare. Si sol, quo die sunt lectæ, non lucet, raras disponendas, ne corrumpantur den- satæ. Meliores montanas campestri- bus & minus siccando minui, cum ex harum libris decem ficcatis libra unica supersit quibusdam. *Differen- tias* si attendas, est *simplex & multi- plex*, colore *magis minusque rubro*. Referri huc debet 1. *Rosa Milesia flo- re rubro pleno*, vulgo *Rosa fina* dicta, quæ in urbe Provins plenissimo flore nascitur, & exsiccata per varias Gal- liæ partes defertur. *Rosa Milesia flore simplici*

Rosa.

Herodot.
Hist. l. 8.

Aristot.
probl. s. 12.
quæst. 8.

Bauhin. H.
P. l. 14. c. 1.
p. 34.
Lobel. ad-
vers. p. 446.
obs. p. 618.
Dodon. H.
P. Pempt. 2.
l. 1. c. 28.
Gesner. in
hort. germ.

- Rosa. *simplici rubro*, de qua nihil singulare occurrit. 3. *Rosa ex rubro nigricans flore pleno*, quæ aliquid violacei diluti admixtum habet, & Germanis *Kohlrosen* dicitur. 4. *Rosa Heitzmanni* a Bauhino visa mensis Maii medio, cui densissimis fæctus foliis flos multo minoribus, quam in vulgari, sed odorator; *Calyx* spinulis horret; *folia* duum ordinum, duo semper sibi ex adverso opponuntur, quintum vero in summitate medium inter ordines locum occupat: Omnia in circuitu serrata, glabra, superne virentia, inferne canescentia. 5. *Rosa rubicanda saccarina* forte Plinii *Græcula*, observavit in horto fontis & balnei admirabilis Bauhinus, spinis multis foliis utrinque pilosis, ad pediculi originem latis, velut duæ auriculæ, crispioribus; capitulis hispidis, brevibus, crassis; *flore rubro*. Vix in totum idibus Junii explicatur, si hortulano credimus. II. *Rosa sativa rubra pallidior*, Gallis *Francha*, Lobel. *Holoferica*, Camer. *Rubicunda*, Lugd. *Damascena rubra*, aliis *Prænestina*, quibusdam *Trachinia*, *Græcula*, priore minus rubet, & *flore simplici* plerumque est, foliis latissimis, ramis plerumque spinis carentibus. III. *Rosa saturatius rubens*, Clusio *Rosa prima Prænestinae similis*, Camerario *in rubro nigricans*, quadragenis aut pluribus foliis amplioribus & saturatius rubentibus constat. Stamina multa flava umbilicum occupant. Alabastrum crassius & brevius: ideo *Tulpel rosæ* vocatur. Odor minus suavis & albæ fere proximus.
2. *Rosa sativa purpurea*, Plinio *Rosa Trachinia*, Gesn. *ex purpura albicans*, Matthiolo *domestica carnis colorem referens*, Camer. *incarnata*, Tabern. *Provincialis major*, Eystet. *provincialis flore incarnato pleno*. Quidam *Alabandicæ similem*, *Prænestinam*, *Campanam* Plinii alii volunt. Bauhinus *Rosam rubello flore majore multiplicato pleno*, *incarnatam vulgo* vocat, Pharmacopæi *Zebedenas*. *Frutex* excedit quatuor cubitos. *Spinæ* ramorum copiosæ aduncæ & mordaces. *Folia* non virent ut in rubra,
- nec polita ut in alba, terna, quina, septena, pene rotunda. *Flores* ex pediculis hispidis, multi simul, magni, pleni rubelli odoratiores, dum virent, & inter primos protruduntur. *Calyx* hispidus. Gesnerius *Damascenas* vocari scribit, & ante triginta tum annos innotuisse. Norimbergenses *Ulmenses* nominant. V. Bauhin. H. P. l. 14. c. 1. p. 36. *sa Basileæ* Majo & Junio; *Monspeli* Martio, Aprili & Junio; *Genevæ* Octobri, Novembri & Decembri copiose floruisse: jucundissimique tum flos odoris, nec facile flaccescit. Frigoris impatiens est, sed altero anno a radice repullulat. Paratur ex ea Syrupus ex multiplici infusione purgans, nec non Mel foliatum.
3. *Rosa sativa versicolor*, Clusio Clus. H. P. *Prænestina versicolor*, dicitur. *Flos* l. c. Bauh. phy. media ex parte candicantibus, altera top. l. 12. f. 5. purpurascens foliis, vel venis si- p. 481. milis coloris adspersis constat. Vel folia quædam integra alba, quædam integra rubra, inter se commixta sunt.
4. *Rosa sativa multiplex* est triplex Clus. H. P. l. c. 1. *Maxima*. 2. *Media*. 3. *Major*. *Prænestina*. I. *Rosa sativa multiplex maxima*, est Clusio *Centifolia Bata-vica rubra*, centum & viginti aliquando folia profert, extrinsecus majora, intrinsecus pusilla, staminum locum explentia, & in ipsum calycem reflexa. Color *Prænestinae* non dissimilis. Nec odor multum abit. Ideo dubitari potest, an sit veterum *Centifolia*. Est & *flore albo*, Clusio *alba major provincialis*, Eystetteni *provincialis flore albo*. II. *Rosa sativa* Bauhin. H. *multiplex media*, priore est aliquan- P. l. 14. c. 1. to minor, forma colore & odore p. 38. convenit. III. *Rosam sativam majorem Prænestinam*, Eystetteni *variegatam*, Johannes Restau Colonizæ aluit. Forma & magnitudine *Prænestinae* similis. Dimidia ut plurimum ex parte folia candida, reliqua rubra: vel tertia duntaxat ex parte alba; vel nunc integra alba, modo integre rubra inter se commixta.
5. *Rosa sativa alba* est duplex *ma-jor* & *minor*. I. *Rosa sativa alba ma-jor*,

Bauh. H.
P. l. 14. c. 1.
p. 34.

Bauhin. H.
P. l. 14. c. 1.
p. 47.

Lugd. H. P.
l. 2. c. 2.

Clus. H. P.
l. 1. c. 31.

Gesn. in
hort. germ.
Tabern. H.
P. l. 3. c. 100.

Joannius
tract. de pi-
lul. Aloës.

Rosa,

jor, Plinio *Campana*, aliis *Spineola*, nonnullis *Alabandica Plinii*, longis lignosis & fungosis virgis adsurgit, quibus spinæ raræ acutæ aduncæ, cortex politus & levis. Folia quina vel septena, crenata glabra sublonga. Calices extremis ramis plures spinulis non minacibus inhærent, quibus apertis rosæ albæ, odoriferæ, multifoliæ adparent, & in medio luteos apices includunt. Succedunt fructus rotundi, rubri, ubi maturuere; in quibus grana dura lana involuta. Floret Majo, Junio, Octobri & Novembri. Amarior est, & vim purgandi habet. Est floreo simplici & pleno. Lugdunensis quasdam densissimis foliis esse scribit. II. *Rosa sativa alba minor*, Camerario & Bauhino *Læteola* elegans est nec magna, foliis multis dense stipatis: quæ singula, si evellantur, candida sunt, cum calyci simul inhærent, diluto rubore blandiuntur. Colitur Vratislaviæ & alibi frequentissime. Forte Plinii *Centifolia* numerosis foliis & parvis. Parum quidem fragrantia aliis cedit: non est tamen odoratissima.

6. *Rosa sativa moschata* triplex est
1. *Flore simplici*. 2. *Flore pleno*. 3. *Semper virens*.
I. *Rosa sativa moschata flore simplici* est duplex, major & minor. I. *Rosa moschata flore simplici major* est frutex robustus, rectus, spinosus. Rosæ in ramorum summitatibus ex pediculo paucis spinis aculeato prodeunt, quinque aut septifoliæ magnæ albæ cum aliquo rubore, qui demum in exsiccatis detegitur, odoris suavissimi. Floret Majo & Junio. Genevæ non facile a frigore læditur. Montbelgardi quotannis gelu superiora absumebat. In Italia topiario opere colitur, caudice crassiore, ramis longissimis, aculeis rarioribus. II. *Rosa moschata flore simplici minor* Matth. *Damascena*, Anguil. *Nesrim* vel *Nesrim Serapionis*, Dodon. *Sativa quinta*, Lugdunensi *Coroneola*, quam *Damascenam* vocant, Bauhino *Moschata minor flore simplici*, aliis *Alexandrina*, stolones habet longos, rectos, crassos. Spinæ raræ a trunco rubræ & robu-

stæ. Folia, describente Bauhino, satis raræ, quæ non multum differunt a rosis albis & incarnatis, nisi quod minus rugosa, & magis acuta, glabra superne cum viriditate, inferne albidiora cum pilis vix adparentibus, in circuitu serrata, quæ ut plurimum habent septem foliola, interdum novem majori ex parte sibi invicem opposita, in foliorum pediculis parte inferna spinæ valde aduncæ. Rami extremi divisi in alios minores, qui quadam quasi lanugine obducuntur & rubent: pauca habent folia abundanteque multis floribus simul cohærentibus, qui priusquam se expandant, longa adparent capitula, mollia & hirsuta. Apertæ rosæ vix diem durant, & mediocres sunt magnitudinis, albæ, habent nonnunquam ungues rubentes, qui lutei sunt, priusquam expanduntur, constantes singulæ quinque foliolis. Apices lutei foliolis deciditibus nigrescunt, relicto in medio uno, magno, hirsuto, clavam aliquatenus exprimente. Odor moschum proxime refert: sapor amarus, cum levicula adstrictione, qui aliquam in faucibus acrimoniam relinquit. In Italia toto fere floret anno, Monspelii auctumno & mense Majo; Lugduni, ubi frequens Augusto, Septembri & Octobri; Genevæ etiam Novembri. Raro in Hispania occurrat. Vires si respicias, tentat caput odore, & scammonii instar alvum subducit. Sex vel octo foliis totum acetarium purgans redditur: stomachum rodere, fauces & linguam excoriare in condito etiam adsumtam, Amatus experimento prodidit. *Nesrim Abensina* & *Serapionis* esse, dubitat Gesnerus. Calida enim hæc & sicca ordine tertio, abstergit & attenuat; nervis frigidis prodest; aures vermium occidit, & dentium dolorem mitigat. At & has calidas esse, acrimonia, odor & amarities ostendunt. 2. *Rosa moschata flore pleno*, Plinio *Coroneola*, Gesnero *Damascena Alexandrinæ*, Tabern. *Moschata alba multiplex*, Cæsalp. *Muscatula multifolia*, Eystett. *alba Damascena flore pleno*, Lugd. *Coroneola altera*, aliis *Prænestina Plinii*, posterioribus se-

Amatus Lu-
sit. apud
Bauh. H. P.
l. 14. p. 83.

Rosa. culis demum Italiae innotuit. Similis est simplici, habens in flore foliola exteriora majora, minora interiora. Lobelius sylvestrem exuisse animum olitorum arte & mangonio, & hortensem duplam factam autumat. Condiuntur in Italia, Venetiis praesertim. Ciet alvum vehementer, stomachique dolores & animi deliquia accersit. **3. Rosa moschata semper vivens,** a radice luxuriat, (Clusii sunt verba) sarmentis flexibilibus & caducis, nisi quis palo sustineat aut ad parietem adplicet. Nam non valde crassa sunt, sed lenta, viridia, spinis rubescentibus, hami instar aduncis, & mucrone versus terram converso obsita. Ambiantur alternatim a foliorum alis, septem interdum, sed quinque ut plurimum foliis praeditis, ex adverso se spectantibus. Horum duo quae latiori alae fedi, qua ramum amplectitur proxima, minora sunt; bina alia, quae succedunt, duplo paene majora, quintum extremam alam occupans, & imparem numerum faciens, omnium maximum. Singula a nervo medium folium occupante aliquot venas habent ad folii oras excurrentes, in ambitu ferrata, & praeviriditate splendentia: perdurantque hyeme. Novo vere e flagellis e foliorum ramis multi oriuntur novelli rami, initio quidem cum foliis nonnihil purpurascentes, sed qui dein viriditatem contrahunt: quorum nonnulli summo fastigio ternos aut quaternos gerunt flores, uncialibus gracilibus petiolis subnixos, quinquefoliis paene uncialibus constantes prorsus nivei candoris, e quorum medio plura staminula prodeunt candida, flavis apicibus insignita, & inter illa capitellum hirsutum albicans. Floris odor suavis est, & ad Rosam moschatam simplici folio odore valde accedit: nec ipsius floris forma dissimilis.

7. Rosa spinis carens est duplex, flore majore & flore minore. **I. Rosa spinis carens flore majore,** Clus. sine spinis secunda, Bauhino Acanthus flore pleno coloris rubelli vocatur. Radix repens lignosa dura. Virgae humanae altitudinis, si fertili & umbro-

so loco pangatur, cubitales & sesquicubitales plerumque. Summi furculi propter floris calycem & folia horridiusculi, ex densissima apicularum nigrarum & asperiuscularum congerie. Foliola, quae summa ramorum occupant communiter sena, aliquando terna, sena, lata, opposita, impari seriem claudente, superne quidem atrovirentia, inferne subcinerea. Rosa speciosa, non minore foliorum stipatu quam incarnata, odoris suavis, coloris saturate rubelli, quem varia vagaque venularum purpurascentium delineatio ornat: subtus omnia ex incarnato candicant: succedit huic fructus orbicularis, majoris avellanæ, obscure rubens, & densissima lapillorum villosorum agmine fartus. Clusius semen inaequale, & xunwōdes vocat. Floret Montbelgardi in Junio, Octobri cum fructu observata Argentinae. Sunt, qui flore albo videre. **II. Rosa spinis carens flore minore** Viennæ etiam olim in hortis culta. Rarior foliorum textura in floribus, qui facum vini rubri colorem praese ferunt. **III. Rosa sine spinis minima** observata a Cherlero.

8. Rosa sativa subviridis, a manu artificis provenit. Fit talis, si in teneras Agrifolii arbusculas, ut produnt quidam, inferatur: vel frigidior constitutione annus turbetur. Provenire tum & sine calyce prodidit Costæus, materia quasi ob nimiam humiditatem defluente in flores. Creantur in Italia & cæreuleæ haberi.

9. Rosa folio subrotundo & crispo, Pfortzhemii in horto Greningeri a Bauhino observata est, flore rubello seu incarnato. Montbelgardi feliciter provenit, sed absque flore.

II. Rosa sylvestris multiplex est **1. Vulgaris flore odorato incarnato.** **2. Flore majore & rubente.** **3. Flore pleno.** **4. Foliis odoratis.** **5. Flore rubro odoratissimo.** **6. Flore albo odorato.** **7. Odore Cinnamomi.** **8. Rubra**

Lobel. ad-
vers. p. 446.

Clus. H. P.
adpend. alt.
auct.

Bauh. H. P.
l. 14. p. 41.

Stapel. in
Theophr.
H. P. l. 6.
p. 646.

Costæus de
plant. l. 2.
c. 12.

Bauh. H. P.
l. 14. p. 37.

bra præcox flore simplici. 9. *Majalis flore rubello.* 10. *Lutea.* 11. *Campestris.* 12. *Pumila rubens.* 13. *Pomifera.* 14. *Arvensis candida.*

1. *Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato*, Dioscoridi *Cynosbatos*, Plin. *Cynorrhodos*, Brunfel. *Sentis canis*, Lugd. & Camer. *Sylvestris vulgaris*, Trago *Rosæ sylvestris primum genus*, Bauh. *Rosa sylvestris alba cum rubore, folio glabro*, excrefcit in magnum fruticem. *Spinæ magnæ, folia utrinque glabra: flores simplices, quinquefolii, albi cum aliquo rubore: stamina in medio lutea. Capitula longa primum viridia, dein coralli modo rubra, cum maturuere, mollia, sapidi cum aliqua aciditate gustus. Semina involvuntur pilis. Virgis pilula hirsuta, echino Castaneæ quasi similis, at mollis adnascitur.* *Spongiolam rosæ nuncupant, alii spongiolam Bedeguaris, Officinæ Bedeguar.* Lugdunensi folia sunt aspera & aculeata. *Provenit* passim circa scrobes & margines agrorum & pratorum locis humidis. *Floret* Junio, Julio, Augusto, Septembri, Octobri, Novembri, pro locorum diversitate. *Fructus* ipse exsiccatus & cum vino coctus moderate stringit. *Ex acinis* fit magisterium contra calculos. *Vermiculi* in spongiis temporibus illiti, vigilias tollunt: tritici contra vermes in vehiculo convenienti feliciter propinantur. *Ex glomis seu Capitellis* mense Majo & Junio collectis parat Arcanum seu Spiritum Hartmannus, præsentissimum in calculo renum remedium, si granor. XII. pondere in vehiculo conveniente propinetur.

2. De *Rosa sylvestri flore majore & rubente* nihil occurrit, quod dicam, præterquam colore & majoribus foliis a priore differre.

3. *Rosa sylvestris flore pleno*, forte *Rosa Alabandica* Plinii, Camer. *Rosa canina duplicato flore* visa a Bauhino Vesuntii, foliis majoribus, quam in spontanea. *Rosam Eglentinam pleno flore* vocat. Similis huic illa, quam idem Bauhinus *Rosam sylvestrem*, fo-

lio *Eglantinæ virente albo flore & rubello nominat.* Magna est, foliis plerumque quinis ex virore nigricantibus, *Eglantinæ rugis & colore similibus.* *Rosæ sunt albæ: spinæ hinc inde per ramos aduncæ.* *Habetur & flore rubello in Ducatu Wirtembergico, quæ Majo floret.*

4. *Rosa sylvestris foliis odoratis*, Ruellio *Englanteria*, Dodon. *Rosa* 1. *Cynorrhodi species odorata*, Lacunæ *Cynosbatos*, Bauh. *Rosa sylvestris foliis odoratis Eglentina dicta*, proceritate sæpe omnes sylvestres superat. *Virgæ duræ, crassæ, lignosæ, aculeatæ. Foliola subrotunda, rotunda quædam pæne, plerumque septena. Dodonæo splendentia, virentia, Trago cineracea, Bauhino virentia, odore gratissimo, maxime vento flante. Flores exigui, quinquefolii albi, vel potius ex purpura saturate candicantes (visi & rubentes). Fructus oblongus coloris subrubentis. Spongiolæ circa virgas tenues hirsutæ. Totus frutex ὄσμος est. Lugdunensis Cynosbaturum Dioscoridis, & Cynorrhodon Plinii esse putat. Provenit* Montbelgardi, Genevæ, Basileæ, mense Junio, Augusto vel Septembri cum spongia. Nusquam in Gallia aut Belgio sponte vivit. Erumpere & in Anglia circa Bathæniam vidimus. Loco a Gesnero umbroso plantata, odorem amisit: aprico & in ipso muro a cive ibidem, procera & odorata evasit.

5. *Rosa sylvestris flore rubro odoratissimo*, Trago *Rosæ sylvestris tertium genus*, Bauhino, *Rosa sylvestris rubella parvo frutice*, cubitalis est ut plurimum. *Spinæ nonnunquam curvæ, sed raræ. Folia quinquepartita, rarius in septem foliola distributa, ferrata, glabra, superna parte obscurius virentia. Flos quinquefolius, non parvus, rubellus, jucundissimi odoris; cui succedit Capitulum cum pediculo hispido. Apud Tragum habet spinas minus præcedente minaces, frondem inodoram, rosam majorem, odoris suavissimi, tactu pinguiorem & lentam. Luxuriat in humectis, agris avenaceis, dumetis:*

C c c

& ra-

Bauh. H. P.
l. 14. p. 43.

Hartmann.
chymiatr.
p. 154.

Dodon. H.
P. Penit. 2.
l. 1. c. 28.
Gefner. in
hortis
germ. p. 276.
Cord. in
Dioscor.
l. 1. c. 124.

Bauh. H. P.
l. 14. p. 35.

Bauh. H. P.
l. 14. p. 43.

Rosa. & raro supra trium cubitorum altitudinem se attollit. Floret Junio. Crescit in Ducatu Wirtembergico, Genevæ circa Castellum l'Abatie & alibi.

6. *Rosa sylvestris odorata flore albo*, Casalp. *sylvestris humilior*, Clus. *quarta*, an *græcula Plinii*? humilis est & fruticosa, floribus albis, sed nunquam plane sese explicantibus, ejusdem cum alba vulgari odoris & coloris, qui tamen plus carnei admixtum habet. Paulo serius alba floret. An sit *Cynosbatus quarta Cordi*, dispiciendum relinquo. Lanuginosa & incana huic folia, rosæ in candido suaviter rube-
 scentes. Non abludit ab ea *Rosa sylvestris alba cum aliquo rubore folio hirsuto Bauhini*. Magna est, ramosa, spinis hinc inde robustis aduncis circumfita. Folia quina vel septena subrotunda, rugosa, albicantia, hirsuta, nonnihil odorata. Flores quinquefolii albi, cum aliquo rubore, quorum pediculi spinulis asperi. Frequens in sepibus & dumetis circa Montbelgardum. Species hujus & illa, quam mense Septembri in monte Wirtemberg. ubi arx Teck, Bauhinus invenit, spinis rectis, foliis tenuioribus, minus rugosis, angustioribus, septenis: & in cujus pediculo raræ quædam spinæ.

7. *Rosa odore Cinnamomi duplex est simplex & flore pleno*. I. *Rosa odore Cinnamomi simplex*, Bauhin. *Rosa Cinnamomea floribus subrubentibus spinosa*, Dodon. *Rosa Cinnamomea*, & 7. vel *sylvestris secunda*, ramis est tenuibus, spinosis, subrubentibus; foliis minoribus; floribus parvis, simplicibus, odoratis, rubellis. Præcox est. Franciæ, Belgio, Angliæ ruri sponte crebra, ipso odore notissima. Gesnerus pro *Lychnide Plinii* habet; & in Albio monte majorem & minorem nasci tradit, illam *fœminam*, hanc marem faciens. Illa, prodente forte ex chartis Gesneri Camerario, quaternas in costis singulis foliorum *ovæ* habet. Hæc minores gerit spinas, floris pericarpium spinosum modice, superioris læve. II. *Rosa odore Cinnamomi flo-*

re pleno Bauhino, *Rosa minor rubello multiplicato flore asperis spinis armata* dicitur. Camerarius vulgo Venetam, aliis Provinciam, *Spermoniam* (pro spineola) Plinii Barbaro, *Sycioniam* quibusdam vocari scribit. Frutex est raro duorum cubitorum. Radix vivida & late serpens. Rami purpurascentes, spinis raris, asperis, duris & brevibus armati. Foliorum alæ ex quinis aut septenis foliis æquali inter se spatio distantibus constant, uno hinc altero inde geniculatim semper adhærente, coloris superne viridis, inferne candicantis. Floribus multiplex foliorum pusillorum glomeratio; odor qualis in alba vulgari plena. Fructus Clusio nullus etsi diu aluerit. Primo vere floret. Vienenam ex Tyrolensi Comitatu adlata. Visa Castellis supra humanam altitudinem, quæ & Autumno florebat, sed flore minore, ramis & stolonibus minus rubentibus.

8. De *Rosa præcoce flore simplici*, Eystett. hortus, nihil habeo, quod dicam, præterquam quod exiguo sit odore, & foliis a præcedente latioribus.

9. *Rosa Majalis flore rubello*, Camer. *Rosa Cinnamomea altera*, Tabern. *Rosa provincialis minor*, quod Johanni Bauhino non placet, qui eam Bauh. H. P. *Rosam rubello flore, parvo, simplici*, l. 14. p. 39. non spinosam adpellat. Frutex hominis altitudine. Pediculus asper est; folia glabra superne virentia, inferne albicantia, glabra. Flos quinquefolius, odoratus, rubellus. Fructus parvo Mespilo minor, per maturitatem rubens, grana tomento involuta. Crescit sponte ad Albii montis radicem, odoratior & pretiosior Cynorrhodo. Visa in monte Thuri & in Burgundia. Floret Majo, unde nomen: inque hortis facillime durat.

Gesner. in hort. germ. l. c.

10. *Rosa lutea duplex est, simplex & multiplex*. I. *Rosa lutea simplex*, Gesn. *Rosa Citrina*, Dodon. *tertia vel octava*, aliis aurea, est veteribus indicta, & nunc rarior. Virgæ spinosæ; foliola glabra quina vel septena vix tantillum horrida. Rotunda, obscura

securæ viriditatis, valde infecta, cre-
nis propemodum rigentibus, addit
Lugdunensis. *Flos* luteus cum gra-
vitate odoratus. *Poma* brevia, ven-
tricosa, Sorbis simillima. Floret Ma-
jo & Junio. Habetur in Ægypto,
Alexandriæ inprimis. Augustæ fru-
tice odorato visa, quam *Vulpinam*
vocabant. In Anglia artifice manu
in genistæ scapum inferuntur, unde
colorem viresque mutuuntur novas.
Cardanus *croceam* male olentem vo-
cat, Gesnerus talium, quæ moschum
fragrent, meminit. II. *Rosa lutea*
multiplex Clusio *flava plena*, Eyft. *lu-*
tea maxima flore pleno, & Pragæ in
horto Cæsareo, & Viennæ, & in Ger-
mania colitur. Missus Clusio digi-
talis longitudinis ramulus, binis foliis,
& flore flavo multiplici foliorum se-
rie constans. Duplex est. Altera
florem totum expandit: altero flore
semiclauso permanet.

II. *Rosa campestris* est triplex 1. *Spinosissima*. 2. *Repens alba*. 3. *Spinis carens, biflora*. I. *Rosa campe-*
stris spinosissima est triplex, flore nem-
pe albo, & rubro, & *hirsuto*. 1. *Rosa*
campestris spinosissima flore albo est
Clus. *campestris odora* & *quinta*, Do-
don. & Stapel. *Dunensis*, Eyftett. *præ-*
cox spinosa flore albo, Bauhino, *Rosa*
pumila spinosissima foliis Pimpinellæ
glabris flore luteo, bicubitalibus ad
summum, duris, lignosis, rubescen-
tibus, & densissimo spinarum vallo
munitis virgis adsurgit. Rami multi
inconditi, & virides. Folia conjuga-
tionum quatuor alata, glabra, subro-
tunda, & ut Clusius addit, inter eam,
quæ luteos simplices fert flores, &
illam, quæ in aggeribus sponte pro-
venit, quæque a Pimpinellæ foliorum
similitudine nomen apud Belgas acce-
pit fere media, nullius splendoris.
Flos *πενταφύλλος* candidus, creber,
quem in Majo promit, medium lu-
tea capillamenta possident. Alaba-
striculi parvuli. *Fructus* rotundus,
brevis, initio viridis, maturitate in
Augusto niger, cui crassa, angulosa,
candida, & dura semina. Inveni-
tur circa Viennam editoribus & mon-
tosis locis. In Morinorum finibus

juxta Icium portum in arenosis juxta *Rosa*.
mare tumulis frequens est, & quia
in ficcis nascitur, odoratissima. In
hortis non parum se multiplicat se-
rendo, ideo in altum non attollitur.
2. *Rosa campestris spinosissima flore*
rubro, Lugd. *Cynorrhodon polyacan-*
thon, Bauh. *Rosa spinosissima pumila*
flore rubro, altitudinem pedis non
excedit. Cauli, furculi, ramuli, fo-
lia, spinis rigent. *Flos* ruber exi-
guus. Colligitur in Gramontio ne-
more prope Monspelim. Cherle-
rus ramis spinosissimis cum minimis
foliis *Rosam* passim provenire in ru-
petis & frutetis collium Narbonensis
Galliæ, ac ibi florere Majo observa-
vit. 3. *Rosæ spinosissimæ hirsutæ*, ra-
mum habuit Bauhinus; de qua hoc
saltem meminit, folia habuisse hirsu-
ta, subtus ad tactum lævia, conju-
gationum trium, postremo solo. II.
Rosa campestris repens alba, est Cordi
Cynorrhodos seu Cynosbatos tertia.
Omnium minimam facit, vix humo
attolli; ideo Chamærrhodon dici pos-
se. III. *Rosa campestris spinis carens*
biflora, Lugdunensi *Rosa græca*, &
Cynorrhodon læve, valde est humilis,
spinis carens, flore languidius rubro,
qui vere & Autumno prodit. Na-
scitur sponte in sepibus. Alia est *odo-*
rata, quæ humi jacet, foliis exiguis,
ut vix Rosa esse videatur, & in Ce-
meneorum montium jugo altissimo
Lugduno propinquo, quod montem
Pilati vocant, colligitur. Alia *Ino-*
dora, quæ in Carthusianorum pri-
mario cœnobio Gratianopoli vicino
provenit, & nisi fallor, a nobis ibi-
dem conspecta est.

12. *Rosa sylvestris pumila rubens*,
Clus. *sexta* & *pumila*, cubitales ali-
quando, plerumque pedales profert
virgas, easque virides, lentas, infer-
ne paucis, superne multis spinis ri-
gentes. *Foliorum* alæ rubræ similli-
mæ, quinque aut septem foliis super-
ne viridibus inferne candicantibus
constant. *Calyces* in summis virgis
magni, hirti, barbati, ex quibus men-
se Junio Rosæ magnæ quinquefoliæ,
initio rubræ, dein incarnatæ. *Fructus*
ruber, rotundus, omnium maximus
C c c 2 & Pyri

Lobel. ad-
vers. p. 446.

Lugd. H. P.
l. 2. c. 2.

Bauh. H. P.
l. 14. p. 38.

Cord. in
Dioscor.
l. 1. c. 124.

Rosa. & Pyri in modum turbinatus, fulvescente pulpa, qui *semina* inæqualia alba continet, Augusto maturescit, & plerumque tota hyeme ipsi frutici adhæret. Nascitur passim in cædis sylvis, sublimioribus & desertis agris per universam Pannoniam.

Bauh. phy-
top. l. 12.
f. 2. p. 481.

13. *Rosa sylvestris pomifera* est triplex, *major* nempe, *minor* & *hirsuta*, 1. *Rosa sylvestris pomifera major*, sequente est altior, ramosior, paucissimis aculeis, *foliis* majoribus pallide virentibus, & Basileæ locis humidis & in alnetis proveniens. Adfinis, si non eadem est, *Rosa pomo spinoso folio hirsuto Cherleri*, quam ex monte Calceri & horti Dei declivibus attulit. *Folia* palmum fere longa, quinque-partita, minus rotunda, subtus hirsutæ quadam tactu lenia & pene cinerea. *Fructus* spinosi magnitudine avellanæ rotundæ, ex pediculis brevibus spinosis. *Spinæ* per ramulos rariores. II. *Rosa sylvestris pomifera minor*, Tabernom. *Rosa arvensis*, Gerhard. *Rosa pimpinella*, Thal. *Cynorhodi species*, duplex est, *spinosa* & *sine spinis*. 1. *Rosa sylvestris pomifera minor spinosa* est forte illa, quam Thalius in Broccenbergæ nasci tradit, rariorem inventu, fructu nigro, rotundo, Cerasi magnitudine, continente semina pauciora, quam reliquæ species, duplo tamen grandiora, ac forma quodammodo granorum vitis. 2. *Rosa sylvestris pomifera minor sine spinis*, fruticat pumila, bicubito non altior, sed inodora: folio minore & pereleganti: *pomo* Mespili Aroniæ non dispari minore multo colore viridior, rubello, subpunico, per Augustum maturo. *Flos* rosæ sylvestris est. III. *Rosa sylvestris pomifera hirsuta* in horto Sprengeri Heidelbergæ a Bauhino visa, foliis sylvestri pomiferæ majori adfinis, albicantibus & hirsutis: Spinis in extremis ramis raris; foliis conjugationum trium. Vidit & Majo idem Basileæ genus, foliis similibus; spinis ramorum juxta folia aduncis firmis; flore rubello simplici; Capitulo spinoso.

Lobel. ad-
vers. p. 446.

14. *Rosa arvensis candida*, Trago *Rosæ sylvestris quarta species*, rosas pro-

fert candidas prorsus, odoris non adeo jucundi, & est sylvestrium omnium rosarum vilissima. Adparet in flore suo Junio & Julio mensibus, in ficaneis, agrorumque limitibus, juxta itinera. Cognata huic, quam Bauhinus *Rosam sylvestrem folio glabro flore plane albo* vocat. Multum ferpit, ramis quibusdam parum spinosis. Calyces eorumque pediculi rubent, folia septena, flores multi simul juncti, omnino albi odoratissimi. Vis a Bauhino in Burgundia inter Courchaton & Grange castellum. Provenit in sylvis & frutetis. Circa itinera inter Montbelgardum & Borongne modo singulares modo plures flores, mense Junio & Julio protrudit. Visa & mense Septembri inter Wallenburg & Lichtal Basileensium.

III. *Rosa Exotica* est triplex 1. *Hierichuntina*, 2. *Sinensis* & 3. *Memphitica*, quibus adde 4. *Adfines quatuor exoticas*.

1. *Rosa Hierichuntina* est duplex 1. *Vulgo dicta*. 2. *Sylvestris*, quibus additur 3. *similis quædam*. 1. *Rosa Hierichuntina vulgo dicta*, Cordo *Amomum*, Cæsalp. *Amomis Dioscoridis* & Plinii, aliis *Rosa Mariæ*, *Rosa Hierosolymitana*, Uva Dioscoridis Bauh. H. P. Galeni & Ætii, vocatur. *Radicem* l. 16. c. 52. habet satis crassam lignosam, simplicem, sapore raphani. *Stolones* a radice palmares confertos, cinerei coloris in numerosam ramulorum sobolem cancellatim divaricatos, superiore parte omnibus veluti in globum coeuntibus, gustui acres. *Folia* rara fescunciam plerumque longa, semunciam lata, laciniata, cinerea, hirsuta. *Flosculi* secundum ramos intrinsecus ubique racematim quodammodo nascuntur, candidi: quorum unumquemque sequitur *vasculum*, duobus loculis membranula disclusis, totidem *semina* orbicularia compressa, rufa, acria continens, binis supra loculos extrinsecus veluti auriculis prominentibus ex adverso positis, ex intergerino calycis pariete, surgente stylo longiusculo. Lobelius *semina* Lobel. ob- harere complura, racematim una sti- serv. p. 616. Advers. tra p. 445.

Thalius in
sylva her-
cinia.

tra fruticis cancellatim reticulatimque implexi glomum contineri, quod forte de vasculis sumendum est. Haud difficulter ex semine recenti prodit. Montbelgardi fata Junii principio florebat. Radice in aqua merfa expanditur. Hinc impostorum fabellæ vigilia nativitatis Domini; imo ea ipsa, qua natus est, hora expandi & florere. Nulla circa Hierichuntem nascitur. In Arabia deserta, ad arenosum maris rubri littus nascentem vidit Bellonius. *Uusus* apud mulierculas quasdam in deprehendenda partus hora. In aquam dimissa non prius fatiscere credunt, quam foetus nasci incipiat: quod superstitiosum esse puto. Giraudetus enim, in aquam benedictam positam, statim pandi, & foeminam sine periculo parere scribit. *Duplicem* Cordus facit, alteram inspidam & inodoram, quæ Amomis: alteram aromaticam, odoratam, quæ amomum sit. At nulla rosa Hierichuntea, quæ odorata & infecunda sit, ac folia Bryoniæ habeat, quod de Amomo scribitur, huc usque inventa est.

II. *Rosa Hierichuntina sylvestris* Syriæ rectis & ruderibus innascentem invenit Rauwolfius. III. *Rosæ Hierichuntinæ exsiccatae similis*, Hollandis Blatterlos, Bauhino *Aphyllon Indicum* dicitur, inventa in insula S. Laurentii, ubi copiose crescit. Teneriores ramuli feliciter scorbutum curant.

2. *Rosa Simensis* Barbaris Euyo, aliis Malva Indica, quibusdam Japonica dicitur. Prodiit primum ferme ex India occidentali adlato Romæ, curante Ferrario. *Radix* ei albida, lignosa, numerosis implexisque fibris ad summam usque tellurem capillata est. *Caudex* pallidus, simplex, lævis, frequentibus subinde distinctus oculis connivet. *Materies* ficulneæ instar candida, & carnosa modice durefcit. *Folia* magnitudine pampineis, asperitate ficulneis, figura utrisque aut hederaceis angulosis consimilia, crenata, qua superiore parte virent, inferiore candicant, utrinque lanugine asperantur. Qualia per microscopium adparuerint, apud Ferrarium videre est. Ab æquinoctio vero in germina oculi turgent: convo-

luta foliola primum adparent, quibus paulatim sese tum explicantibus, tum amplificantibus virgei subeunt ramuli, assiduo e gemmis folia protrudentes: ita, ut toto ferme anno, perpetuo ramorum & foliorum proventu, ad hibernum usque solstitium sylvescat. Tertio a satione anno *florere* cœpit. Septembri mense e pusillis cum foliis tum floreis *alabastris* confusæ paniculæ existunt: mox *calyces* complusculi, seni plerumque vel octoni modicis suffulti petiolis, e summis plerique ramis eminent. Forma nondum oscitantibus globosa, quinis eminulis commissuris compactilis & quasi cristata, quæ medios circa alabaistros inchoatæ acuta coitione fastigiantur in summo. Color *alabastris* qua pediculis insident viridis, inde ad summas ex viridi rubens. *Pediculi* in stellas foliaceas, octonis denisque virentibus, usque planis radiis rosarum calyces excepturas panduntur. Ubi ad nucis juglandis magnitudinem isti papillati corymbi extumuere, in lacteum florem, extimis foliis, intimorum oris subrubentibus dehiscunt. Mox totam sese pandit, repando calyci, sæpius quinque partito & nonnihil in pateræ formam sinuoso insidens, varia serie foliorum ramulosis rugis crispantium speciosa. Lactea nascitur; albo deinde rubroque coloratur; tandem purpureo, qui apud nos dilucior, moritur. In India una die, quam unicam vivit, matutino cum albore albicat; cum meridiano ardore flammeola est; cum noctescente luce purpurat. Ita etiam innata ei hæc colorum mutatio, ut recisa, seu in vasculo aquæ pleno, seu inter manus, si diutius habeatur, variet. De *folliculo* & *semine* sic Ferrarius. Floris caput sive globulus pediculo adhærescens inter quinque florei calycis jam aridas foliaceas lacinias, ad ejusdem adulti calycis magnitudinem extumidus, eminulis pulvinorum toris orbiculatim striatur, canaliculis in summa imaque parte stellatam in figuram coeuntibus: aridi præterea colore folii, qui ex viridi inclinat in flavum, decoloratur: brevique subalbido pilo hispidus inhorrescit. At

D d d

vero

Bellon. observ.
serv. l. 2.Ind. orient.
p. 4. figura
21.Ferrar. Flor.
ra l. 4. c. 6.
p. 479.

Rosa. vero totus interior folliculus candicat. Sex circiter carinata loculamenta intercurfantibus membranulis discriminantur, quæ strias inter exortæ, in duriusculam mediam lanuginem coeunt. Intersepta membranis concava pars, lanugine densa, longiuscula, & candida pubescit. Pediculi alba cuspis ad medium usque folliculi pertinet, cui media cartilago adhærescit. *Semina* ipsa numerosissima, rufula, minutula, rotunde longula, modice incurva, pilosa, petiolis albicantibus liratum annectuntur. In uno folliculo tria & sexaginta supra centum numerata. Totum corpus renibus arietinis simile ex fulgo gilvum, & punctum pumicosum. Triplex ejus *genus*. Est enim I. *Foliosior*, cui flos densissimus, qui, cum totus hiascit, plerumque aliqua ex parte rubet, quia velut ex pluribus coagmentatus floribus, particulatim panditur & coloratur, & paulo serius vernat. II. *Foliosa*, cui sparsim eminentibus inter crocos foliis minus comans est. III. *Quinquesolia*, quæ florem totidem foliis profert, mediisque crocis turbintam in figuram acervatis, quatuor tantum aut quinque pavoninum in apicem exstantibus, progenerat.

Stapel. in
Theophr.
p. 651.

3. *Rosa Memphitica* ex *Ægypto* adlata, foliis est *Eglenteria* non dissimilibus; flore albo pleno lilii positu, figura Provinciali non dissimili. Floret Augusto, Septembri & Octobri cadunt folia, quæ primo vere renascuntur. Muniri adversus hyemis injurias debet.

4. *Adfines exoticæ* sunt quatuor, 1. *Meutang Chinensum*. 2. *Izquixochitl novæ Hispaniæ*. 3. *Chillapatli ejusdem* & 4. *Arbor roseo odore Brasiliensis*.

Atlas Sinen-
sis p. 141.
Admiranda
Europæ &
Chinæ c. 32.
p. 897.

1. *Meutang Sinensum*, spinæ nulla flos Rosæ nostratis figuræ æmulus, sed major, cui folia magis expansa, color albicans, quasi ex purpureo & albo mistus, odor minor. Nascitur in virgulto sambuco nostrati haud dissimili. Magna ejus ad urbem Chungking in provincia Suchuen, ut & in Xeusi ad Jengan urbem copia. Tanti aestimatur, ut Regem florum vocent, & in viridariis summa diligen-

tia colant. Reperitur etiã ruber & flavus.

II. *Izquixochitl novæ Hispaniæ* arbor est excelsa, folia mali Medicæ; flos Cynorrhodi forma albus, nostratisque rosæ sapore, odoratissimus, basi virente quinquefolia magna, ex quo umbilico flavicante, ex quo stamina plura virentia prodeunt, floret toto anno. *Fructus* in acutum definit, distinctionem valvularum per medium ostendens, colore ex viridi purpureo, fusco luteis punctis inscriptus. *Nascitur* Quauhnhuensis agris locis calidioribus & cultis. Frigida est & stringit. Flos dentium dolores sedat, & halitus gratia commendatur.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 37.
Fabius Co-
lumna ad
Reccum
p. 869.

III. *Chillapatli novæ Hispaniæ* frutex est radici insitens fibratæ, foliis roseis, floribus coccineis binisque juxta singulos foliorum exortus, universo caulis procurfu. Provenit in calidis Hoaxtepecensibus & Yacachtlenensibus. Calida & sicca in ordine tertio. Dolorem ventris, si devoretur, sedat.

Reccus R.
M. N. H.
l. 4. c. 2.

IV. De *Arbore roseo odore Brasiliensi* hoc tantum dicere habeo, materiam ejus adeo suavem spirare odorem, ut fragrantissimas rosas æmuletur. Hisce adde 1. *Flores arboris Xuchinacatzli*, seu *Hucinacatzli*, Hispanis *Flor de la Oreia*, quod foliis interiore parte purpureis, exteriori virentibus & ita dispositis, ut aurem referant, consent. 2. *Flores arboris Yolloxochitl*, quorum umbilicus correfert, & multis foliis albicantibus & interiore parte subrubentibus, grandibus, glutinosis & bene olentibus constat. Creduntur adfectibus uterinis vehementer opitulari. 3. *Flores arboris Cacaloxochitl*, qui sunt grandes, pulcri & fragrantissimi, coccinei quidam, quidam candidissimi & plurium colorum. *Nascuntur* ex illis fructus, siliquæ grandes & rubicundæ, quarum pulpa ventriculum & intestina mundat. 4. *Arbuscula floribus rubris* in Chiapa, cujus folia siccata & in pulverem trita, vulnera vetera & multum exulcerata sanant.

De Laet
Ind. occid.
l. 15. c. 9.

De Laet
Ind. occid.
l. 5. c. 4.

De Laet
Ind. occid.
l. 7. c. 4.

CAPVT II.

De Cisto.

Cistus.

TAB. B.
CXIII. &
CXIV.
Theophr.
H. P. l. 6.
c. 2. Dio-
scor. M. M.
l. 1. c. 127.
Plin. H. N.
l. 24. c. 10.
& l. 21. c. 9.

I.

Cistus VETERIBVS frutex est πολυλάδος, improcerus major thymo, φυλλάδης, vel potius, ut Serapio legit, ξυλλάδης. Folia περιφερῆ, (Plinius Ocimi habet, quæ quodammo- do tantum rotunda sunt) δάσεια, μέλανα, aut, quod in antiquo & vulgato codice habetur, σερφά, acerba, quod gustus comprobatur, & Oribasius sequitur. Cum hedera a Plinio confundi, nec inter κιστὸν & κισόν semper distinguere, collatio ostendet. Nascitur πετρώδεσι. Duo ejus apud Dioscoridem, Theophrastum & Plinium genera. Alius enim est Mas, alius Fœmina. 1. Mari majus durius pinguiusque folium, flos mali punicæ, επιπορφύριζον Theophrasto. Rosaceus Plinio, quod de colore intelligendum est. 2. Fœminæ flos albus. Utrique rosis sylvestribus similis; & in iis color tantum oblectat, odor autem abest. Theophrastus ἐλάττω καὶ πόσμα dixit. Usus si spectes, uterque vim adstringendi habet, adeo frigidus, ut aliquid de calore participet. Folia & parva germina tria, ulcera glutinant. Florum vis validior. In vino austero ternis digitis capti, & his de die poti profunt dysentericis & ventris solutionibus. Illiti, nomas depascentes cohibent. Cum cerato vero ambusta & vetera ulcera sanant. Radicibus Cisti adnascitur quoddam Malipunicæ Cytino simile, quod Hypocistis dicitur. Est ex ipso quoddam fulvum, quoddam viride, quoddam album, ex quo succus velut ex Acacia exprimitur. Quidam resiccatum & contusum maderfaciunt, ac coquunt. Magis est quam flos adstrictoria. Ideo dysentericis, sanguinem spuentibus, & nimio mensium fluxu adflētis, commoda. Plinius dum Cysos erythranos adpellari & similem hedera scribit, manifeste Cistum cum Cisso hedera confundit.

II. Apud RECENTIORES totidem ejus summa genera. Est enim unus Mas, alter fœmina.

1. Cistus mas est quintuplex, 1. Folio rotundo hirsutissimo. 2. Folio ob-

longo incano. 3. Angustifolius. 4. Folio breviori. 5. Foliis Chamædrys.

1. Cistus mas folio rotundo hirsutissimo, in humanam altitudinem attollitur, ramulis aliquantum incanis. Folia reliquis majora, hirsutissima, & quasi orbiculata. Flos reliquis forma similis, major, & saturatius rubens, Capitula hirsuta, dura, pentagona; in quibus semen rufum. Qui ex Apuleia Zuingero adlatus erat ramus, minus nigra gerebat folia, pluresque longiores & albidiores pilos. Matthiolus rotunda habet. Color floris nunc saturatior est, nunc dilutior. Provenit in regno Valentino, Arragonia & Italia. Visus & in hortis Belgicis ex semine inde transmissio.

2. Cistus mas folio oblongo incano, Clusio Cistus mas primus, Tabern. Cistus mas latifolius, Hispanis Eltopa, Lusitanis Cergacos, frutex est bicubitalis, hirsutus, fœmina albidior. Lignum fragile candicante cortice tegitur. Folia in novello molliora & longiora, in adulto contractiora, duriora & aspera, incaua semper & hirsuta. Flos magnus in folia quinque divisus, rosæ incarnatæ colore, confertus & agminatim stipatus, apices luteos in medio contentos ambit, & in ramulorum extremis ex brevibus pediculis dependet. Decidenter Capitula hirsuta, trifariam secta, perennia, foliolis tribus mucronatis hirsutis obsepta, pentagona, in quibus semen ex rufo nigricans, exiguum, papaveris magnitudine. Frequens est in Hispania & Lusitania, in itinere versus Frontignanum inter saxa & monte Setho. Floret Aprili & Majo. Ad radices ejus, quæ summis cespitibus diffunduntur, provenit copiose, novo vere, cum Cistus jam ad explicandos flores se parat, Hypocistis, omnium, quas unquam Clusius vidit, elegantissima. Cum primum e terra emergit purpureum seu Kermesinum sericum esse diceret; deinde paulatim adsurgens & se explicans, multum de pristini coloris ele-

Clus. H. P.
l. 1. c. 45.

Bauhin. H.
P. l. 13. c. 1.
p. 2.
Matthiol.
in Dioscor.
l. c. p. 157.

Cistus. gancia remittit, & Cytinos suos candicantes, turgidos & lento succo plenos profert, qui a Pharmacopæis densatur & in usum adservatur. Datur & lutea, & πολυπόκιλος, ut post dicemus. Succus, qui ad nos adfertur excoctus, & in orbiculatos panes concretus, splendidi Asphali nitore nigricat, consistentia cerea ductili & molli, sapore acidulo. Frisimeleca in calidis fluxionibus sceminarum imprimis, ex vino exhibuit, in oriente natam; Cl. D'Avissonus basin sui Anodynii esse voluit: quod ex mumia Ægyptiaca, styrace calamita, epatibus ranarum, lacte ex vulneratis papaveris capitibus, succino &c. paratur. Quæ vulgo in officinis prostat, ex Hirci barbula ab impostoribus paratur. Erroris causa Arabes, qui Cistum ita nominavere. Substitui ei succus prunorum sylvestrium, vel floris agrestis Punice poterit.

Bauhin. H.
P. l. 13, c. 1.
p. 2.

3. *Cistus mas angustifolius*, Clus. *Cistus mas secundus*, Bauh. *Cistus mas secundus folio longiore*, eadem altitudine adsurgit, qua superior, non minor fruticoso stipite, nec minore ramorum frequentia: minus tamen candicat. Folia eodem ordine disponuntur, molliora, longiora, & magis mucronata. Flos similis superiori, carnei coloris. Capitula & semen similia. Ramuli teneriores rorulentum quiddam pingue & odorum sub Autumnum contrahunt. Crescit in Hispania, & diutius cæteris generibus floret. Nulla sub ea hypocistis observata.

4. *Cistus mas folio brevior*, Clus. *Cistus mas tertius*, superioribus brevior, sed pariter fruticosus. Rami tenuiores. Folia dilutius viridia, rugosiora, pingua & odorata. Flos dilutius rubet, aliquantulumque odoris spirat. Capitula diutius suis involucris, quæ florum calyces, occultantur. Semen in iis æquale. Nasceitur sponte in Lusitania, supra Ulysipponem, & maritimis.

Clus. H. P.
l. 1. c. 45.
Lobel. obs.
serv. p. 543.

5. *Cistus mas foliis Chamædrys*, Lobel. *Cistus mas supinus sinuatis & fimbriatis foliis*, Clus. *Cistus mas quintus*, Bauh. *Cistus mas quintus foliis crispis & sinuosis*, Gerh. *Cistus*

mas dentatus, Tabern. *Cistus mas tertius*, humilis est & supinus ut plurimum. Rami pedales multi ex eadem radice prodeunt. Folia crispa, sinuosa, candicantia, hirsuta, gustu acerbo & adstringente. Flores in ramulorum summitatibus, umbellatim mense Aprili, citius aliquando, aliquando & tardius prodeunt, colore eleganter ex rubro purpurascens. Conspiciuntur aliquando & Novembri. Capitula reliquis minora, suis involucris plerumque contexta, semen magis atrum, quod mensibus, Augusto, Septembri & Octobri maturefcit, continet. Provenit in Lusitania, solo admodum arenoso, nec usquam frequentior, quam circa monasterium Peralongas dictum. Lusitani Rosellam vocant.

II. *Cistus scemina* plures habet species. Est enim 1. *Folio salviae*, 2. *folio plantaginis*, 3. *folio portulacæ maritimæ*, 4. *folio spicæ*, 5. *folio jampsuchi incano*, 6. *folio stæchadis Citrinæ*, 7. *folio Majoranæ*, 8. *folio Thymii*, 9. *folio salicis*, 10. *flore pallido punicante, macula insignito*, 11. *Ledi folio*, quibus 12. addo, *Cisti folio arborem exoticam*.

I. *Cistus scemina folio salviae*, in cubitum nonnunquam adsurgit, aliquando humi sternitur. Rami graciles & nigricant. Folia circinata rotunditatis, rudia, aspera, viridia, & saporis adstrictorii. Flos albus nonnunquam flavus, luteis fibris medium occupantibus. Capitula nigra, & superius compressa, in quibus semen paulo nigrius & satis magnum. Observata a Bauhino florens Aprili & Majo in sylva Egremont prope Monspelium, in monte Sethi, in Sabaudia penes Rhodanum, in montibus Egeaneis inter Balneum Aponense & Arqua, ubi Hypocistim nasci ajunt. Est & elatior, virgis rectis, & supinus humi sparsus. Albo qui flore in Hispania, Lusitania & Aquitania occurrat: qui luteo, nonnullis duntaxat Hispaniæ locis, & extrema Aquitania circa Bayonam. Referri ad eam potest *Cisti species quædam hispanica flore albo*, a Barone quodam Germano Lugduni exhibita. Foliola illi multa, oblon-

Clus. H. P.
l. 1. c. 46.

Bauhin. H.
P. l. 13, c. 1.
p. 4.

oblonga, hirsuta, adstringentia. *Flores* ex ramulis plures simul, pediculis incanis & hirsutis infident, albidis, quos nondum explicatos alabastriculi mucronati lanugine alba densaque hirsuti ambiunt.

Lugd. H. P.
l. 10. c. 2.

2. *Cistus fœmina folio plantaginis*, Lugd. *Tuberaria major Myconi* multos subhirsutos & rotundos caules fundit, in quibus *folia* multa, hirsuta plantagini similia iis, quæ se vix a terra attollunt minora. *Flores* in summitate caulium lutei: *semen* folliculo includitur. Tota herba aliquantum pilosa est, & adstringens. Nascitur in locis siccis. Referri ad eam debet *Tuberaria nostras Bauhini*, cujus *caulis* pede altior, teres, glaber, ima parte candicante tomento oblitus, *folia* circa imum crebra, plantaginea, nervis tribus distincta, incana lanugine pubescentia; in superioribus acutiora, longiora, glabra, nervosa. Supremo fastigio *pediculi*, quorum singulis *capitulum* turbinatum, ex pluribus foliorum voluminibus contextum, cujus basin foliola acuminata, perpusilla fulciunt. *Flores* interdum duodecim. *Collecta* in montibus D. Johannis prope Pisas, inter plantas *stachadis Arabicæ*.

Bauh. H. P.
l. 13. c. 12.

3. *Cistus fœmina portulacæ marinæ folio duplex est*. Una, latiore obtuso; altera, angustiore mucronato.

I. *Cistus fœmina portulacæ marinæ folio latiore obtuso*, Clusio *Cistus folio halimi primus*, Bauh. *Cistus folio halimi flore luteo*, habet ramos cubitales, fruticosos. *Folia*, prout dixi, subacidi saporis. *Flores* in summitatibus flavi quinquefolii, quibus fibræ in medio. *Capitula* longiuscula & triangula, in quibus *semen* rufum. Ad radicem observavit Clusius Hypocistin luteam seu potius Ochra colore, quam pueri & pastores manducare dicuntur. Crescit in Lusitania solo & aura marina adflato inter Ericas, non procul Ulyssipone. II. *Cistus fœmina portulacæ marinæ folio angustiore mucronato*, Clus. *Cistus fœmina folio halimi secunda*, præcedente procerior, ramis minoribus, incanis. *Folia* halimi sed paulo longiora & angustiora, mucronata, dorso ela-

Clus. H. P.
l. 1. c. 46.

tiore, incana & subacida. *Florem* *Cistus* qui descripsit, non vidit.

4. *Cistus folio spicæ*, Clus. *Cistus folio lavendulæ*, Bauhino forte idem cum *Helianthemo recto*, cubitali plerumque est altitudine, ramis brevibus, sed copiosis, foliis confertim nascentibus, angustis, incanis, adstringentibus. *Flores* albi & parvi. *semen* non observatum. Solo odore & sapore a spica discernitur. *Crescit* in regno Valentino aridis & petrosi locis. Rhauwolfius *unicaulem* in Provinciæ montibus invenit, rectum, cubitalem, cui *flores* in cacumine *helianthemi* lutei forma similes, *folia* per caulem multa, & longa. Florebat Majo.

Hist. plant.
Lugdun.
l. 2. c. 54.

5. *Cistus folio sampsuchi incano*, habet multos graciles ramulos. *Folia* parva, circinata quasi, sampsucho similia, dorso eminente, pediculis contrariis, cum faldedine & aciditate adstringentia. *Flos* in summis ramis quinquefolius, albus, cujus meditullium macula ex purpura nigricans inficit; medium villi & stamina lutea occupant. *Capitula* fere lini trigona; in quibus *semen* minutum hyosciami, ex nigro candicans, quo maturo totus ramulus, qui *florem* & *capitula* sustinet, arescit. *Crescit* copiosus in Castella nova, & toto agro Bætico inter Tagum & Anan flumina.

6. *Cistus folio stachadis Citrinæ* de nomine duntaxat mihi ex Bauhino nota est. Subjicimus ei *Cistum minimum folio subrotundo* Johannis Bauhini, quem Sprengerus sub titulo *Cisti tenuifolii Candia* communicavit. Plantula erat semipalmaris, radice tenui, lignosa, reliqua planta longiore; foliis parvis subrotundis, latiusculis, binis ex adverso respondentibus, cinereis, in coliculo singulari, tenui, tereti, cujus summum occupant *Capellæ Helianthemi* cana lanugine pubescentes. Colebatur in fictili Junio mense. Perennen dictabat.

Bauh. H.
P. l. 13. c. 1.
p. 14.

7. *Cistus folio Majoranæ*, Lobel. in *icone Cistus folio majoranæ deflexis floribus*, alibi, *Helianthes species rara, figura leguminosa floribus aureis*, Lugd. *Helianthes species penæ*, dicitur.

Bauh. H. P.
l. 13. p. 20.
Lugd. H. P.
l. 7. c. 40.
Lobel. ad-
vers. p. 405.

Cistus. tur. *Radix* lignosa valide fibrosa, foris buxea intus alba. *Rami* sex aut octo per terram sparguntur, spithamai & teretes. *Folia* terræ vicina longiuscula; quæ per ramos visuntur, Majoranæ similia, glabra, ex viridi luteola, decurrente per longitudinem nervo unico. *Flores* in extremis ramulis conferti & Scorpioi-dis reflexi, quinquefolii albi, quibus apices luteoli, quinque viridantibus extrinsecus obvallati. Lobelius aureos facit, quod ex sicca planta descripserit. *Capitula* hos sequuntur triquetra, fusca, semine exiguo, papaverino pari atro, cui una parte cavitas, altera gibbus amarus. Missa Raymundo ex arduis montis D. Bonaventuræ jugis non procul Aquis Sextiis eruta. Provenit floruitque Junio & Julio mense Bauhino e semine. Vila Luteriæ cum capitulis Augusto. Duravit aliquot annis etiam non reposita. Quidam *Telephium Candiae*, & *Helenium Cratevæ* dixere, alii *Telephium Dioscoridis*.

Clus. H. P.
l. I. c. 47.

8. *Cistus folio thymi*, pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præterquam circa eorum summitates, in quibus confertim nascuntur, exilia admodum, viridia, thymi æmula, gustu adstringente. *Florem* fert summis ramis, Cisto folio sampsiuchi similem, minorem neque maculis insignitum. Semen non observatum a Clusio. Conspectus in extrema Baticæ parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat.

Clus. H. P.
l. I. c. 49.

9. *Cistus folio salicis*, Clus. *Cistus annuus primus*, crescit ad cubiti altitudinem. *Radix* lignosa, nigra. *Virgulae* longiusculæ, hirsutæ, rectæ & raræ. *Folia* inferius rotundiora, superius angustiora, veluti per genicula bina Majoranæ similia, circa medios caules longiora, pilosa. *Flores* in extremis ramis e pediculis hirsutis, uno folio longo & duobus parvis constant, pallidi aut albicantes succedunt. *Vascula* triquetra, breviora, magna, quæ matura in tres veluti cotylas latas, corticofas, rufas, dehiscunt, quas foliola tria, hirsuta, costas ha-

bentia cingunt. Intus membrana tenuis, lucida, cui semina multa, minus rufa adherent, & Augusto maturescunt. *Nascitur* in vinetorum marginibus apud Salmenticensis, & Granatensi regno. Observatus & Genævæ semine in Augusto maturo, in Julio Argentinæ cum vasculis triquetris. *Ufus* seminis in nephriticis doloribus. Est & alia ejus species longioribus aliquantulum virgis, non tamen minus hirsutis, angustioribus etiam foliis, cujus flos minor, pallidus, valde caducus: Capitula & semen similia. Nec abludit *Tuberaria minor Myconi*, cujus folia plantaginis æmula, sed minora & villosa humi repunt; alia caules dodrantes, rotundos, inanes, hirsutos per intervalla ambiunt. *Flores* in caulium vertice lutei, in quorum medio purpureum quiddam in nigrum vergens. *Semen* in exiguo folliculo, dilapso flore statim conspicitur. Planta tota hirsuta; sapor cum siccitate adstringens. Reperitur in pratis & locis pinguibus. Sane Castellani & priorem & hunc Cistum *Yerva Turmera*

Lugd. H. P.
l. 10. c. 2.

Athen. Di-vocant, quod ubi crescit tubera plerumque invenias. *Hydnophyllum* forte *Athenæi*. Nam & hujus eadem ratio.

Athen. Di-
nos. l. 11.

10. *Cistus flore pallido punicante macula insignito*, Clus. *Cistus annuus secundus*, Columnæ *Helianthemum flore maculoso*, pedali est altitudine. *Cauliculis* exiguis & rectis. *Folia* oblonga, angusta, hirsuta, virescentia, per Caniculæ æstus humore quodam pingui & lento oblinuntur. *Flos* quinquefolius, exiguus, pallido colore, macula punicante insignitur. *Capitella* tenella admodum, triquetra, in quibus semen pusillum & cinereum. *Floret* in Majo. *Prodit* in sylva Madritiana, secundo a Luteria miliari. *Variat*. Est enim *flore maculoso*, macula ex nigro rufescente, seu puniceo, & non maculoso. Eundem quidem cum isto *Cistum annuum flore guttato* Ponæ facit Caspar Bauhinus; placet tamen cum Johanne descriptionem adponere. Adsurgit, attestante Ponæ, recto furculo tripalmari, quadrato, hirsuto, virescenti; cui prope terram folia multa Oleæ effigie, deinde ad latera

Ponæ in del
script. mon.
tis Baldi.

tera, opposita per intervalla alternato situ bina, ad medium usque, deinde per aliquot ordines terna spectantur, duobus tamen ex his angustioribus, e quibus flores multi colore & forma Helianthemi. Sed hoc amplius in singulis foliis guttulam sanguineam sortiti, ad instar Pyropi, auro summa arte excepti, tum summitati, tum pediculo longiusculo & capillari calycibus adfixi hærent. Horum tamen aliqui sine foliis unicum florem in suprema parte obtinentes plantam finiunt: quæ radice unica, exili, lignosa, ac parum fibrata alitur. Floret initio Julii. Provenit in plano Agro altero, sed frequentior in oppi-

Bauh. H. P. l. 13. p. 15. do Ciani. Addatur huic, *Cisti speciei annua angustifolia*. Cubitalis est aliquando. Radix unica, tenuis recta. Caulis unicus, teres, quatuor vel quinque geniculis constat. Folia ex geniculis bina, angusta, hirsuta, duabus uncis longiora, ad radicem breviora. Flori in medio circulus niger, interiora alba punctulis nigris adspersa, aliquando etiam striis intercurrentibus, folia flava. Capitula multa, parva, triquetra, quæ quaterna foliola hirsuta circumplectuntur, ex pediculis in unam partem ju-

bæ instar vergentibus propendent. Cistus. Caspar Bauhinus *Monspeli* in via Perou versus, florentem invenit.

11. *Cistus ledi folio*, Lugd. *Alyssum trigonum*, & *Cistus annuus alter Lobelii*, caulem habet aliquando sesquipedalem; folia ledi angustifolia hirta; semen in pericarpio nitido triquetro, exile, angulosum, rubrum, pulchellum, glandis ilicis lævare. Fruticat via, quæ ducit Monspelio ad Rondeletii prædium vulgo Teral, inter Sfero-cavallo & Cristas gallinaceas. Lugdunensis tribuit suo Alyssum radicem brevem lignosam, parum fibratam; Caules quatuor palmos altum folia oblonga, angusta, in ambitu minime divisa, per intervalla prodeuntia; semen rotundum minutum papaveri simile in conceptaculis triangularibus scuto similibus; florem Aprili micantem; & aspera lapidosa, diuturnaue solis mora æstuantia loca.

12. *Cisto folio arbori exotica*, extrema virgulta lignosa sunt, Cisto coloria & similia. Folia rugosa, oblonga, Salviæ aut Menthæ, sed in summis ramulis villosos, exacte sphaericos floccos, sive lanosa Platani capitula ostentant.

Lobel. observ. p. 559. advers. 387.

CAPVT III.

De Chamacisto.

Chamacistus.

TAB. CXV. CXVI. CXVII.

Chamacisti varia sunt genera, sub quibus suæ species continentur.

1. *Vulgaris*. 2. *Frisicus foliis Nar. di Celticæ*. 3. *Foliis minoribus & incanis*. 4. *Foliis thymi incanis*. 5. *Quadrifolius*. 6. *Foliis myrti minoris incanis*. 7. *Angustifolius*. 8. *Serpillifolius*. 9. *Hirsutus*. 10. *Ericæ folio luteus*. 11. *Folio pilosellæ*. 12. *Folio polii montani*. 13. *Folio sam-psuchi capitulis valde hirsutis*. 14. *Pussillus folio candido, flore luteo*. 15. *Flore purpurascens Alpini*.

1. *Chamacistus vulgaris* est duplex, 1. *Flore luteo*. 2. *Flore albo majore*.

Lugd. H. P. l. 6. c. 24. Matthioli, in Dioscor. l. 3. 1. *Chamacistus vulgaris flore luteo*, Trago *Hyssopus campestris*, Matthiolo & Lugd. *Panax Chironium*

sive *flos solis*, Gesn. *Gratia Dei*, & *Hyssopoides*, Cordo *Helianthemum*, Eyst. *Helianthemum flore luteo*, Cordi schol. *Consolida aurea Chirurgis*, Lon. *Hyssopus montanus* sive *sylvestris*, Clus. *Chamacistus primus*, Tabern. *Helianthemum germanicum secundum*, Cæsalp. *Chironia*, Bauh. *Helianthemum vulgare flore luteo*, dicitur. Radice nititur lignosa alba & lenta. Ramuli rubentes, lignosi, hirsuti. Folia opposita. Hyssopi latiora multo, modice in acumen desinentia, sapore glutinoso, hirsuta. Flores longo thyrsis dispositi, qui cum apicibus lutei, quinque foliis constant, Cisti positi, hirsutis, tripartitis folliculis circumsepti, quibus pericarpia succedunt lini longiora, trifida, in quibus

Chamaecistus.

bus semen. Viret Genevæ Februarii principio; Lugduni, Monspelii & alibi floret Majo; Basileæ Septembris & Octobri. *Habetur* inter vulnerarias. Recentium vulnerum labra constringit, si imponatur. Sanguinis sputo & alvi profluvio opiculatur, si cum plantagine & symphito in vino rubro decocta propinetur. Ad oris & genitalium ulcera prodest, si in vino rubro cum modico aluminis decocta abluantur. Quidam *Helicantem* Plinii esse putant, nonnulli *Panax Chironium Dioscoridis*. *Helicantem* vocatur in Themiscyra regione & Ciliciæ montibus maritimis folio myrti. Hæc cum adipe leonino decocta, addito croco & palmeo vino, perungi Magos & Persarum Reges, ut fiat corpus adspectu jucundum, ideo *Heliocallidem* nominari. Vides quidem ethymologiam, descriptionem brevem & effectus non abcludere. Et cum hic *Cytisus viscosus* sit, in fucos adhiberi posse: adserere tamen eam esse non ausim. *Panax Chironium Dioscoridis*, folia habet amaraco similia, ἀνθή χερσοειδής, radicem tenuem, neque altam, gustu acri. Radix descripti *Cytisi* insipida est. Potest tamen hoc ex *Oribasio* de ποῶν seu herba tota intelligi. An sit *Helenium Aegyptium Cratevæ*, difficile est dicere, cum nec ipsi *Dioscoridi* notum fuerit.

Plin. H. N. l. 24. c. 17.

Dioscor. M. l. 1.3. c. 37.

Eyftett. hortus Lugd. H. P. l. 7. c. 39. Bauhin. H. P. l. 13. c. 1. p. 16.

2. *Chamaecistus vulgaris flore albo* majore, Eyft. *Helianthemum albis floribus*, Cæf. *Chironia flore candido*, Lugd. *Helenium minus Dioscoridis*, Bauhin. *Helianthemum foliis majoribus, flore albo*, habet folia uncis duabus longiora, satis lata. Forte & cultura ex angustifolia talis evadere potest. Bauhinus mense Octobri florentem Argentinæ vidit: vidit & Spiræ in Junio.

Clus. in Curis poster. p. 5.

II. *Chamaecistus Friscus foliis Nardi Celticæ*, Clus. *Hirculus Friscus Dortmanni*, qui *Chamaecisti* genus, ejusdem est cum *Nardo Celtica* magnitudinis. Cauliculus gracilis se attollit. Folia *Nardi Celticæ*. Flores quini aut seni, speciosi, flavi, parvis tamen maculis alterius coloris, dupli-

ci serie circa umbilicum orbiculatim distinctis, Ranunculorum æmuli, sex foliis simplici serie dispositis constant. Vascula mucrone bifido prædita, paleaceo semine referta sunt. Nascitur in palustribus & siccis, graminei *Parnassi* permixto in Comitatu Drentiæ.

III. *Chamaecistus foliis minoribus & incanis*, Dodon. & Lobel. *Flos solis*, quoad iconem, *Chamaecistus quarta Clusio*, *Helianthemum primum sati-vum* Tabernomontano, *Helianthemum omnino candicans flore nunc albo, nunc pallido*, Bauh. exigua est planta. Virgulae tenues & lignosæ humi sparguntur. Folia vulgari primo similia, gustus adstrictorii, omnino candicant. Flores extremis ramis insident, πενταφύλλοι, coloris interdum albi, ut plurimum pallidi, staminibus mediis occupantibus. Semen in capitulis triangularibus lino paribus, exiguum rufum. Frequens est in Salmanticensi agro, ubi *Perdiguera* ab incolis adpellatur, quod perdices se circa eam frequentes volutent & pulverent. Visa Monspelii in montibus prope Gigan florere Martio & Aprili; inter Lugdunum & Montuel ad ripam Rhodani Majo.

IV. *Chamaecistus foliis thymi incanis*, Camer. *Panax Chironium minus*, Lobel. *Chrysanthemis Erica minima*, Cistus humilis angustifolius, Clusio *Chamaecistus quintus*, Tabern. *Helianthemum peregrinum angustifolium*, nec magnitudine, nec ramulorum tenuitate, a præcedente differt, floribus etiam & seminibus similis. Folia angusta & omnino tenuia, Cisto foliis thymi respondentia, incana & ejusdem temperamentis. Radix dura & fibrosa. Flores Majo aperit. Provenit in agro Salmanticensi, eodemque cum superiore apud Hispanos nomine gaudet. Vicinum huic Bauhinus putat suum *Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto*, quod Monspelii & Lugduni provenit. Ramos habet dodrantes partim repandos. Folia mediocriter magna, angusta, pilosa, incana, nonnihil viscosa, insipida. Flores ex longa serie plures, albi, fibris luteis medium occupantibus. Calyces hirsuti. Vascula

Lobel. ad. verf. p. 185. Clus. H. P. l. 1. c. 48. Bauh. H. P. l. 13. p. 16.

Camer. in epit. Clus. H. P. l. 1. c. 48.

Bauhin. H. P. l. 13. c. 1. p. 17.

Bauhin. H.
P. l. 13. c. 1.
p. 19.

scula consimilia, in quibus *semen*. Quod Monspeli pro venit, *radicem* habet crassiusculam, lignosam, & in frequentes propagines abit. At differt ab utroque *Helianthemum folio thymi incano*, quod Cherlerus in vineis & collibus Nemauso vicinis collegit. Virgulæ tenues, plures, quæ in alios repandos mox abeunt ramulos. *Foliola* thymi durioris incana, brevia, hirsuta, cinerea, terna, quaterna, interdum plura ex eodem geniculo enata. *Flos* & *Capsellæ* in tres carinas dehiscentes, cum involucris hirsutis. *Radix* crassiuscula contorta, lignosa, multifida, & multorum capitum. Monspeli observata mense Septembri adhuc florere: in montibus vero prope Castelnœuf & juxta patibulum Majo. In monte Sethi

Tabern. H.
P. l. 3. c. 76.
p. 790.

Aprili. Referri etiam hic potest *Helianthemum germanicum tertium Tabernomontani*, cui *radix* lignosa, *virgæ* flexiles & tenues, folia saturejæ: flores quinefolii lutei, capitula lini rotunda.

V. *Chamæcistus quadrifolia*, Tabernom. *Helianthemum Sabaudicum*, quia in Sabaudia provenit. Quia ignotum sibi esse dicit, non describit. *Folia* & *flores* sine dubio ab aliis generibus non longe abibunt. Quatuor ut plurimum foliis constat, si icon non decipit.

Clus. H. P.
l. 1. c. 48.

VI. *Chamæcistus angustifolia*, Clus. *Chamæcistus sextus*, radice est lignosa & vivace. *Ramuli* dodrantes humi funduntur. *Folia* oblonga, angusta, saporis initio velut gummosi post amaricantis, nullo ut plurimum ordine disponuntur. *Flores* lutei bini aut terni, quinefolii, cum suis staminulis extremos ramulos occupant. *Capitula* trigona satis magna, in quibus *semen* majusculum & inæquale. *Rarior* est, nec nisi in monte thermis Badenibus imminente, & circa Pofonium visus mense Junio florens, quo tempore & *semen* perficit.

VII. *Chamæcistus foliis myrti minoris incanis*, Clus. *Chamæcistus tertia*, Tabern. *Cistus humilis latifolius*, vocatur. Dodrantalibus ramulis humi diffunditur. *Folia* bina, contrario inter se situ, Myrti Tarentinæ fo-

liis inter se æqualia, quibus superne *Chamæcinea* lanugo, inferne canities, gustus adstringens & amaricans. *Flores* quini aut seni *Chamæcisto* serpillifolio similes, lutei coloris, pedicellis mense Majo insident. *Capitula* his succedunt parva, trigona, *semine* inæquali, minuto, rufo plena, quo deciduo (sic hoc in Junio) rami exsiccantur. *Radix* lignosa, dura, vivax. *Nascitur* maxima copia in illis montibus, qui a Calenbergk Danubio imminente ad Alpes Austriacas continua serie procurrun: nec non aliis locis sublimioribus præsertim, & gramine tectis agris.

VIII. *Chamæcistus serpillifolia* est duplex. 1. *Floribus carneis*. 2. *Repens lutea*.

1. *Chamæcistus serpillifolia floribus carneis*, Clus. *Chamæcistus septimus*, Lobel. *Alpina altera*, oblongis, quandoque dodrantalibus serpit ramis, humi diffusis, nigricantibus, in multos alios breves ramulos divisis. *Folia* frequentia & conferta, exigua, serpilli minora, crassa, superna parte viridia, inferne candicantia, saporis amaricantis. *Flosculi* extremis ramulis innascuntur perpusilli, bini aut quaterni simul juncti, quinefolii carnei quasi coloris. Hos excipiunt *capitula* maturitate in quinque crenas sese aperientia, in quibus *semen* exile. Exsiccata planta non injucundum fundit odorem. *Nascitur* tenui solo inter saxa in summis Sneberg, Snealben, & aliis Austriacarum & Styriacarum Alpium superciliis. *Floret* Junio, interdum maturius.

2. *Chamæcistus serpillifolius repens luteus*, Clus. *Chamæcistus secundus*, Bauhin. *Chamæcistus serpillifolius nigricante & hirsuto*, flore aureo odorato, multos promit ex radice multifida & fibris late sparsis capillata, ramulos tenues subrubentes. *Folia* in his serpilli exigua, nigricantia, hirsuta & crassa duplici serie disponuntur: sub florum partim in novellis longiora & candidiora. *Flores* in extremis ramulis terni quaterni *πένταφύλλοι*, aurei coloris & odorati pedicellis hirsutis inhærent. *Semen* ob-

F f f

observa-

Bauh. H. P.
l. 13. p. 17.

Chamaecistus. observare scriptori non licuit. *Pro-*
venit in summis Alpium montibus. *Floret* ibidem Augusto, in hortum
 translatus Majo: sed flores cum pe-
 dicellis nimis caduci. Adfinis huic
Cistus helianthemus flore parvo luteo,
 qui palmo longiores fundit virgulas
 molli lanugine incanas, foliis per ge-
 nicula binis mollicellis, pilosis, ex quo-
 rum alis ramuli propagantur. *Flores*
 virgularum extremis multi, saturate
 crocei, triplo minores, quam alterius
 helianthemis. *Calyces* hirsuti. Cher-
 lerus Nemausi collegit.

Tabern. H. P. l. 3. c. 76. IX. *Chamaecistus hirsutus*, Clus.

octavus, Tabern. *Chamaecistus humi-*
lis Austriacus; palmaris est aut paulo
 amplior. *Ramuli* multi, recti, ni-
 gricantes. *Folia* numerosa & adeo
 conferta, ut quaternis versibus dige-
 sta videantur, Myrti minoris foliis
 non dissimilia, minora tamen & hir-
 suta, licet atra viriditate superne splen-
 deant. *Flos* unicus interdum & al-
 ter extremis ramulis exit, unico qui-
 dem constans folio, sed quinque pro-
 fundis crenis velut circinatis diviso,
 ut quinque folia habere videatur, ex
 albo purpurascens & quasi dilate car-
 neus. Decem stamina extrema par-
 te nigra & stylus oblongus purpura-
 scens medium occupant. *Capitula*
 floribus excussis pentagona obtuse
 mucronata, quibus *semen* exiguum
 & flavi coloris. Rarissimus est fru-
 tex, in Snealben jugi scopulis dunta-
 xat a Clusio observatus, & quidem
 Junio florens, & semine maturo in
 Augusto turgidus. Non potuit ulla
 ratione cicurari. Idem forte cum eo
 vel adfinis *Cistus pumilis montis Bal-*
di, compluribus hic fescuncialibus
 & quadrantalibus lignosis adolescit
virgulis tenuibus & hirsutis. *Folia*
 crebra, virentia, Myrti Tarentino
 similia, ortu & positu diversissimo,
 quippe bina, incondita tamen, for-
 titius pilis, supra subtrusque donata
 per margines copiosioribus, ut in Ne-
 rio Alpino. *Flores* extremis ramulis
 unici, satis magni, cum multis stami-
 nibus. Delata est e monte Baldo.

Lugd. H. P. l. 2. c. 31. X. *Chamaecistus ericæ folio luteus*,
 Cæsalp. Cori simillimus frutex in ma-

ritimis, Lugd. *Erica Chrysanthemos*, Bauhin. H. P. l. 13. c. 1. p. 18.
 Bauh. *Helianthemum tenuifolium gla-*
brum flore luteo, frutex est humilis.
Radix crassa, nigra, lignosa, furcu-
 losa. *Ramuli* plures lignosi, inter-
 dum per humum sparsi. *Folia* val-
 de tenuia & angusta, viridantia, sub-
 rubentia, glabra, alternatim ramos
 conscendunt. *Flores* violæ aurei, ca-
 duci, quos excipiunt *vascula* majuscu-
 la, lucida; quæ *semine* maturo, in
 tres veluti scutellas triquetras dehi-
 scunt, & tribus tunicis vestiuntur.
Semen est copiosum, ferrugineum, tri-
 quetrum. Lugdunensi est durum, mi-
 lio simile, in folliculis turbinatis & stri-
 atis, per maturitatem flavescentibus.
 Prodit in sabulosis editorum collum
 locis apricis & perflatis, observavitque
 Dalechampius florere Julio. Cherlerus
 Nemausi collegit. Visa & Basileæ in hor-
 tis, semine Septembri maturo. Nul-
 lius fere saporis est. Duo ejus spe-
 cies. Altera *humilior* brevioribus
 foliis: Altera *elatio*r, foliis quadru-
 plo longioribus.

XI. *Chamaecistus folio pilosellæ mi-*
noris Fuchsi, Bauh. *Helianthemum*
Alpinum folio pilosellæ minoris Fuch-
si, fruticosa est herba, foliis oblon-
 gis, inferiore parte magis candican-
 tibus, superiore viridibus & pilosis,
 flore luteo, Helianthemis vulgaris.
 Collectus in siccis montium circa Ge-
 nevam locis, & translatus in hortum
 floruit Junio.

XII. *Chamaecistus folio polii mon-*
tani, Bauh. *Cistus helianthemus folio*
polii montani, similis est superiori.
Cauliculi albicantes, unciarum qua-
 tuor aut quinque ramosi. *Folia* albi-
 cantia polii montani. *Flores* in te-
 nuibus pediculis tres vel quatuor par-
 vi lutei. Non dissimilem in rupetis
 Agdes Galliae Narbonensis, sed folio
 candidiore collegit Cherlerus.

XIII. *Chamaecistus folio sampsuchi*
capitulis valde hirsutis, Bauh. *Helian-* Bauh. H. P. l. 13. p. 20.
themum sive Cistus humilis folio sam-
psuchi &c. radicem habet crassiuscu-
 lam, lignosam, longiusculam, caules
 rigidos, dodrantes, perquam hir-
 sutos; per quos veluti ad nodos fo-
 lia adversa Majoranæ foliis paria, alia
 oblonga & latiuscula, alia angustio-
 ra.

ra. Flores multi lutei, calyce folio-
fo, striato, villoso obsepti, de hirsu-
tissimis pediculis dependent. Cher-
lerus Monspelio detulit. Subjicio ei
*Helianthemum ad Nummulariam ac-
cedens* Bauhini, cujus rami magnis
pilis hirsuti; folia ad Nummulariam
accedentia, sed minora, bina in or-
dine disposita, cum pediculis longiu-
sculis, minus pilosa.

Bauh. H. P.
l. 13. p. 19.

XIV. *Chamaecistus pusillus* folio
candido flore luteo, est radice palma-
ri, lignosa, intus alba, extus rubente,
quæ in numerosa capita dividitur.
Rami hirsuti. Folia numerosa, acu-
minata, culmis multis onusta, infer-
na parte candicant, densa lanugine
obsita, superna viridescunt. Flores
perpusilli lutei bini singulis suis pedi-
cellis insident, capillamento luteo do-
nati; quorum exteriori parte folia

extima, pilis obsita canescunt, inte-
riori parte lutea. Nota vero non
multum istos a se abire, & facile in-
ter Naturæ lusus ob soli varietatem
reponi posse: nec forte a Chamaeci-
sto serpillifolio distare. Addere ta-
men volui, ne quid omitteretur.

XV. *Chamaecistus flore purpura-
scente Alpini*, exigue fruticat. Radix
maxima, in tres divisa, longa, cras-
sa, nigricans. Caules multi, breves,
qui in alios non dividuntur. Folia
cisti ledi crispa bina vel quaterna ab
eodem exortu. Flores in cacumine
purpurascens, a quibus *siliquæ* par-
væ, oblonge nigrescentes, quæ mi-
nuta semina fulvescentia continent.
Pulvis foliorum tritus ex vino auste-
ro contra omnes fluxus commenda-
tur.

Alpin. exo-
tic. l. 1. c. 41.

CAPVT IV.

De Cisto Ledo.

Cistus
Ledum.

I.

Duplex *Antiquis* Cistus, non La-
danifer, de quo hætenus actum,
& *Ladanifer*, de quo nunc agemus.
Genus hoc a nonnullis λῆδον (non la-
da) adpellatur, & eodem, quo Ci-
stus, modo nascitur (male herba Pli-
nio) sed longioribus foliis & nigri-
oribus, quæ λιπαρίας τινὰς vere contra-
hunt, quod in cisto, sub quo hypo-
cistis nascitur, non accidit. *Ladanum*
hoc, si loca & colligendi modos spe-
ctes, varium. Est namque I. Cy-
prium, Plinio verum, Dioscoridi o-
ptimum. Odoratum enim, subviri-
de, ἐνυμάλακτον, pingue, ψάμμις ἢ ψα-
φάρις, expers & resinofum. II. Ara-
bicum, quod in Nabatæis, qui sunt
ex Arabia contermini Syriæ, (Rufus
apud Galenum Erembos vocat) col-
ligitur. Gloriabatur enim & tum
ladano, forte casuque hoc, & injuria
fieri odoris (sic lege) plures tradide-
re: & forte ideo ab Herodoto scri-
ptum, in δυσοδρομιάτω loco nasci, &
ἐνωδίστατον esse. Vilius hoc, si Dio-
scoridem sequimur, nobilius si Pli-
nium, sed falso. III. *Syrium*, quod
idem cum Arabico esse puto. IV. *Ly-
bicum*, seu *Africanum*, quod ibidem

habetur, ejusdem cum superiore no-
tæ. V. *Facticum*, quod ex hirco-
rum villis carpitur. Capras malefi-
cum alias frondibus animal, scribit
Plinius, odoratorum vero fruticum
adpetentius, tanquam intelligant pre-
tia, carpere (non germinum caules)
sed germina caulium prædulci liquo-
re turgentia, destillantemque ab his
(dele, casus mixtura) succum, impro-
bo barbarum villo (i. e. grandi & pro-
misso. *Improbe natus* apud Sueton-
ium homo enormis improbitatis)
abstergere. Hunc glomerari in pul-
verem, incoqui sole; & ideo in la-
dano caprarum pilos esse. Recentio-
res, addit idem, ex auctoribus *staba-
lon* hoc vocant, (sic lege. *Strobon*
enim eodem capite alia arbor est, quam
Arabes ad suffitus accendebant, vino
palmeo perfusam, σάβαλον est ἔλκον,
Æoles σόβολον dicebant) traduntque
sylvas Arabum pastu caprarum in-
fringi, atque ita succum villis inhæ-
rescere. Idem & in Cypro fieri tra-
dunt, & esse cespitem hircorum bar-
bis genibusque villosis, (Dioscorides
addit femora) inhærens, sed hederæ
flore deroso (confundit λῆδον cum λίσ-
τω)

TAB.
CXVIII.
CXIX.
CXX.

Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 128.

Plin. H. N.
l. 12. c. 17.

Galen. κατὰ
τόπους l. 1.
c. 1.

Herodot.
hist. l. 3.

Plin. H. N.
l. 26. c. 8.

Cistus. τφ, cistum cum hedera) pastibus ma-
Ledum. tutinis cum est rorulenta Cyprus.
 Deinde nebula sola discussa, pulve-
 rem madentibus villis adhærescere,
 atque in ladanum depecti, Dioscori-
 des addit ὑλίζευσαι & in μαρίδας for-
 mari. VI. *Terrenum*, quod fruti-
 cibus insidens, attractis per eos funi-
 culis convolvitur, (seu deraditur) &
 in offas cogitur. Plinius alibi, ner-
 vos in arcum circumdatos lanis tra-
 here dixit, adhærescente roscida la-
 nugine, idque *Toxicon* (a colligendi
 nempe modo, τόξον arcum significat)
 vocari. In fegetibus (arva intellige)
 idem nasci dicit, contundi & cribra-
 ri, utpote friabile; gravissimum odo-
 re, durissimumque tactu. Plurimum
 enim terræ colligit. *Usus & vires*
 si attendas, calidum est in primo, sic-
 cum in secundo cum pauxilla adstrin-
 gendi facultate, & substantia tenui
 malaëtica, & sympeptica. Utero
 & ventriculo egregie opitulatur. De-
 fluentes capillos retinet, dum omnem,
 qui ad radicem defluxit, humorem
 absument, & meatus, quibus infixi sunt,
 contrahit. Suffitu secundas ejicit,
 & dolori vulvarum exulceratisque
 imponitur. Alvum cum veteri vino
 potum sistit, & cicatrices cum ele-
 gantia ad colorem reducit. Sortiri
 digerentem a calidiore regione calidi-
 tatem, quod Galenus & Ætius pro-
 didere, ne credas. Nobiliorem enim
 in Cypro insula frigidior, quam Ara-
 bia vel Lybia diximus.

Galen.
Simpl. l. 7.

II. Apud MODERNOS multa Ci-
 sti ledi occurrunt genera. Est enim
 1. *Monspeliensium*. 2. *Hispanicum*
incanum. 3. *Foliis laurinis*. 4. *Fo-*
liis populi nigræ. 5. *Cretense*. 6. *Fo-*
lio myrti. 7. *Hirsutum*. 8. *Angu-*
stis foliis. 9. *Foliis rorismarini*. 10.
Foliis thymi. 11. *Foliis salicis angu-*
stifoliae, quibus adde, 12. *Myrtoci-*
stum Pennæi. 13. *Pseudocistum le-*
don Alpini & 14. *Ladanum Alpinum*.

Lobel. ad-
 vers. p. 418.
 Lugd. H. P.
 l. 2. c. 55.
 p. 229.
 Matthiol.
 in Dioscor.

I. *Cistus ladanifer Monspeliensium*,
 Lobel. *Cistus ledon latifolium*, Gesn.
Ledon alterum Cisti genus, alijs *Ledon*,
Ladanum Cistus ledun, Cordo, *Lada*
 & *Ladon Cisto similis frutex*, Camer.

Ledum latiore folio Italicum, est sine
 dubio illud ipsum, quod Johannes
 Bauhinus vidit, suo Monspeliensi an-
 gustifolio simile, folio longiore & tri-
 plo latiore, cujus & Amatus figuram
 habet. Lobelius rariorem speciem
 facit, virgis, furculis, foliis multo
 crassioribus, longioribus, latioribus,
 Rhois modo fruticantem, *semine* tri-
 cocco. Caudici ad radicem adnasci-
 tur *Hypocistis* sobole fungosa, ex lu-
 teo in puniceum, granati bicoloris
 gemmante, cætero Hyposparti &
 Orobanche æmula. *Lascivit* in mon-
 te quodam agri sterilis Savenæ, cui
 nomen S. Columbo. Alioqui gustu
 Cisti Ledi & fragrantia graviuscula.
 Habuit in horto florentem & Colden-
 bergius.

II. *Cistus ladanifer hispanicus inca-*
mus, Dod. *Cistus ledon*, Clus. *Cistus*
ledum primum angustifolium, Bauh. l. 13. p. 3.
Cistus ledum flore macula nigricante
notato, Lugd. *Cistus ledum primum*,
 superat aliquando altitudinem homi-
 nis. Rami frequentes, lignosi, duri,
 nigri. Folia oblonga, transversum
 aliquando digitum lata, aliquando la-
 tiora, superne ex viridi nigricantia,
 inferne candicantia, cum ramis te-
 nellis, pingui quodam odorato cali-
 do & transparente adeoque copioso
 liquore ita adpersa sunt, ut procul
 ex splendore agnosci possint, & odor
 ad octavam miliaris germanici par-
 tem diffundatur. Flos rosæ, magnæ
 instar, simplici foliorum textura con-
 stat, omnino interdum albus, sed cu-
 jus singula folia circa unguem ex pur-
 pura nigricante macula, rhomboide
 nunc majore, nunc minore & angu-
 stiore ut plurimum infecta sunt, flo-
 ris umbilico multis fibris croceis ple-
 no. Capitula in longis pediculis foliis
 suis denudata omnium maxima, ro-
 tunda fere & plura, decagona, dura,
 interne flavescentia; quibus dehiscen-
 tibus semen decidit copiosum subru-
 fum, omnium minutissimum. Sicca
 candorem quemdam contrahit. Cre-
 scit in Hispania & Lusitania; copio-
 sissime in collibus declivis inter Ta-
 gum & Anam flumina, & toto fere
 monte Sierra morena dicta. Hispani
 Xara, Lusitani *Estepa* vocant.

III. Ci-

III. *Cistus ledon foliis laurinis*, Clus. *Cisti ledi* I. altera species, forte Lugdunensi *Cistus maritimus*, latiore est folio, quod ad lauri angustifoliae formam accedit. Abundat & pingui illo lentoque succo. Provenit in littore marino, qua superata Calpe Malacam iter est. *Cistus marinus Lugdunensis* frutex est in maritimis proveniens cubitalis, nonnunquam altior, densis, numerosisque radicibus, caulibus multis surculosis, cortice ex rufo rubente, foliis longis, in ambitu laciniatis, acuminatis, superne obscure virentibus, inferne candicantibus & parum lanuginosis, flore Cisti rosæve sylvestris albo vel ex albo purpurascente.

IV. *Cistus ledon foliis populi nigrae* est duplex, major & minor.

1. *Cistus ledon foliis populi nigrae major*, Clus. *Ledon latifolium secundum majus*, stolonibus adsurgit ramosis & bicubitalibus, ubi sponte nascitur. Rami fragiles. Folia inter Cisti genera maxima, superne viridia, inferne nonnihil candicantia, rudia, carnosa, subacidi saporis, quæ rubedinem aliquam hyeme contrahunt. Flos candidus. Capitula pentagona, acuminata, in quibus semen exile & nigricans. Tenellus nec est odoratus nec pinguis; annotinus & vetustior scatet suo succo in Autumno, crassiore & tenaci. Invenitur in monte Mariano, qui Hispalim Ulyssipone iter facientibus, superandus est.

2. *Cistus ledon foliis populi nigrae minor*, Clus. *Ledon secundum latifolium minus*, per omnia præcedenti simile est, sed humilior, nec cubitum excedens, folia quoque sunt minora.

V. *Cistus ledon Cretense*, Clus. *Ledon tertium Cyprium*, Alpino *Ladanium Creticum*, diversimode a Clusio, Alpino, Bellonio, & Bauhino describitur. 1. Clusio ex semine natum est cubitali & majore altitudine. Rami nigricant. Folia carnosa, & præ saturata viriditate nigricantia, inter primi & secundi generis folia magnitudinis, brevioris tamen & rhomboidis quodammodo figuræ, quæ cum novellis ramis, lento, roscido,

sed nec adeo denso & odorato humore inundantur. Flos albus. Capitula rotunda, in quibus semen exile, nigricans. II. *Alpinus* cubitalem etiam & ultra facit, ramis a radice una multis lignosis duris. Folia cisti maris, sed longiora salviæ proxima, odorata, ramis æqualibus spatiis adhærent, per æstatem ex quodam lento humore manibus. Flores in cauliculis cacumine purpurei, cisti floribus majores. Siliquæ parvæ rotundæ, oblongæ, involucri rotundo contentæ, nigrescentes, quibus minuta nigra semina. Tota planta odorata est, adstringens, & viscida. Simillimam prope Clodiam civitatem juxta Brundulum vidit, hoc unico excepto, quod nulla in foliis humiditate adspergeretur. III. Apud Bellonium, ea est hujus fruticis natura, ut deflorentibus floribus vernis, abjectisque hybernis foliis, novis frondibus amiciatur, quasi lanugine pubescentibus in proximam ætatem, quæ per solis æstus uliginoso quodam rore pinguescunt, quoque ardentiores sunt calores, tanto abundantior ille ros foliis innascitur. Huic omnibus notis respondens incultis Oise locis in Ducatu Cenomano sponte nascitur, sed qui minor est, nec pingui rore oneratur. IV. Multum ab his abest *Cisti ledi latifolii Cretici* apud Bauhinum descriptio. Folium habet mucronatum, inferne candicans, decurrentibus tribus secundum longitudinem plantagineis nervis, superius nigrius, & in extremis ramis longum angustum, & ledi Monspelienensis latius. Flores ex longis pediculis tres dependent, quibus calyces hirsuti cum brevibus pilis. Vascula ciceris magnitudine, oblonga, hirsuta, quinquangularia, membranis distincta, in quibus semina minuta, papaverina, fusca, angulosa. Prodit in Creta insula ubique fere locorum. Imo tanta ejus est abundantia, ut montes eo vestiantur. Colligendo vero ladano peculiare instrumentum parant Græci. Rastro est simile, cui nulli dentes, sed ligulæ seu Zonæ e corio rudi. Adfricatur hoc ardentissimo caniculæ æstu fruticibus, adhærensque viscus dera-

Cistus
Ledum.

deraditur cultris, hæcque Calojero-
rum seu Monachorum græcorum
opera. Nusquam majore copia,
quam ad montis Idæ radices, pago
Cingalus nuncupato & apud Milopo-
ramo colligitur. Quod in officinis
habemus, viscidus est succus in ma-
gnas offas, easque graves, ex purpu-
ra fuscas coactus, odore valido, sed
suavi, præsertim si calorem senserit.
Paratur ex eo cum mastiche, Cinna-
momo, Caryophyllis, nuce moscha-
ta & oleo nardino Cerotum stoma-
chale; vel cum balsamo hispanico,
balsamo macis oleo anysi absynthii,
& cera emplastrum.

Tabern. H. VI. *Cistus ledon folio myrti*, Lugd.
P. l. 3. c. 90. *Cistus ledum aliud myrtifolium* Penæ
p. 796. quoad iconem, Tabern. *Cistus ledum
myrtifolium*, nititur radice lignosa, ex
qua virgulæ robustæ in satis magnam
altitudinem surgunt. *Folia* myrto
similia, brevia, lata, acuminata. *Flo-
res* cisti, capitula rotunda & acumi-
nata.

VII. *Cistus ledon hirsutum*, Clus.
Ledum quartum, Camer. *Ledon al-
terum angustiore folio*, multis, cubito
longioribus lentis, flexibilibus, hirsutis,
& albicantibus ramis fruticat. *Folia*
reliquis Ledi generibus molliora, Ci-
sti femina paulo longiora, angustiora,
nigriora, hirsuta, per totam æstatem
lenta pinguedine consperguntur. *Flos*
albus, nec Cisti femina flore minor.
Capitula exigua membranaceis & la-
xis involucribus contecta, in quibus *se-
men* omnium Cisti generum maxi-
mum, nigrum. *Reperitur* in Castel-
la veteri, vicinis pago S. Martini del
Castannal locis, ubi frequentissimum,
& Ardiveja dicitur. Apud Belgas
satum feliciter provenit.

Clus. H. P.
l. 1. c. 50.

VIII. *Cistus ledon foliis oleæ, sed
angustioribus*, Clus. *Ledon quintum*,
Eystett. *Cistus flore albo*, pari altitu-
dine adsurgit. *Rami* duri, oblongi,
nigricantes. *Folia* oleæ oblonga, an-
gustiora, fusca, pingua & lento hu-
more conspersa. *Flos* albus omnium
fere minimus. *Capitula* ex longo an-
gulosa. *Semen* exiguum, ex rufo,
nigricans. *Vulgatissimum* in toto
Valentino regno, & Narbonensi Gal-

lia. Ad radices ejus invenit genus
illud *αιμωδωπς* Cynomorii, cui hypo-
cistidos nomen Clusius, ex multis
squammis compactum, pallefcens,
quibusdam tamen lineis purpurascen-
tibus & nonnihil virescentibus distin-
ctum, quod Cytnos suos summa par-
te proferebat, lento glutinosoque suc-
co prægnans. Idem cum hoc putat
esse *Ledum Monspelii angusto folio
nigricans* Bauhinus. Bicubitale hoc,
odoratum, in ramos plures brachia-
tum, qui cortice obducuntur. *Folia*
sesquiunciam longa, angusta, nigra,
rugosa. *Flores* albi, parvis rosis syl-
vestribus adsimiles, in quorum me-
dio apices lutei. *Pericarpia* hispida,
in quibus *semen* exiguum. Obser-
vavit ad radicem hypocistida, seu po-
tius hypoledon mense Majo copiose
provenire. Multa uni fungi instar
adhærent, palmari longitudine, ex
squammis multis imbricatim compa-
cta, quibus sui sunt in summo Cytni
luteoli; sub quibus *Capitula* rotun-
da, mediocriter magna, succo visci-
do & lento plena. Dourez Pharma-
copæus ex aqua ad spissitudinem de-
cocta, in qua hoc eluerat, Monspe-
lii verno tempore, optimum Lada-
num se confecisse notat. Ira in sylva
Ægremont circa Monspelium abun-
dat, ut satam diceret. Aprili & Ma-
jo floret. In Provincia & Apulia in
monte S. Juliani fert quidem hypocis-
tin, sed quæ parum liquoris continet.

Bauh. H. P.
l. 13. p. 10.

IX. *Cistus ledon angustis foliis*, Clus. H. P.
Clus. *Ledon sextum* præcedenti simi-
le est, brevius paulo, minoribus, an-
gustioribusque foliis, lento humore
adsperis, *Flos* major est, albus item,
& quinque foliis constans, *semen* re-
sponder. Observatum in Valentino
regno, circa Xativa.

X. *Cistus ledon foliis rorismarini*
est quadruplex. 1. *Foliis hispidis*,
2. *subtus incanis*, 3. *non incanis*, 4.
ferrugineis.

1. *Cistus ledon foliis rorismarini
hispidis*, Clus. *Ledon septimum*, cu-
bitale est. *Rami* multi frequentes
cineracei coloris; quos *folia* copiosissi-
ma, Rorismarini coronariæ folio-
rum æmula, canescentia, hispida, pin-
guia,

guia, & lento succo cum tenellis ramulis perfusa sepiunt. *Flos* summis ramis copiosus candidus, superiori similis, nec *semen* differt.

2. *Cistus ledon foliis rosmarini subtus incanis*, Clus. *octavum*, Raulwolf. *Ladani species foliis rosmarini* paris cum superiore magnitudinis. Rami magis expansi; folia tenuiora, superna parte ex fusco viridia, inferna candicante, lento humore cum tenellis ramis perfusa, gustus adstringentis. *Flores* numerosi, exigui, πενταφύλλοι, lutei, secundum ramorum longitudinem nascuntur. *Semen* in pusillis capitellis ex cinereo nigricans. *Invenitur* incultis circa Tagum supra Ulyssiponem locis, incolis *Romero*.

3. *Cistus ledon foliis rosmarini, sed non incanis*, Clus. *Ledum nonum*. minus est superiore. *Folia* majora, rariora, & magis glutinosa. *Ramulos*, quibus *flos* inhæsit, tenues, exsuccos, planeque retorridos, aliquot inania capitula & omnino hiantia jam excusso semine sustinere deprehendebat Clusius. *Nascitur* in extrema Bætica parte, qua Castellam novam spectat.

4. *Cistus ledon foliis rosmarini ferrugineis*, Matthiolo *Rosmarinum sylvestre*, Cordo *Chamaepeuce*, Clus. *Ledum Silesiacum*, Lugdun. *Rosmarinum sylvestre seu Bohemicum* Matthioli, Bauh. *Rosmarinus sylvestris quibusdam*, cubitalibus aliquando est virgis firmis & lignosis. *Cortice* cinereo, quæ in alias purpurascens & rubiginei coloris tomento obsitas disspescuntur. *Folia* libanotis coronariæ, confusa, superna parte viridia, & ita in pronam inflexa & convoluta, ut nihil præter nervum per longitudinem excurrentem, qui simili cum pediculo tomento pubescit adpareat, grati odoris. Summis ramis insident *Capita*, ex multis brevibus quasi squammis ferrugineis compacta, ex quibus se explicat corymbacea quædam multorum *florum*, qui lanuginosis pedicellis inhærent, & grato odore nares feriunt, coma. πενταφύλλοι hi, albi, mediosque decem candida staminula cum

stylo occupant. His succedunt *capitula* oblonga, pentagona, sæpe officulorum Corni magnitudine, quæ viridia, argenteis punctis distinguuntur; matura, rubiginei sunt coloris. *Semen* in his oblongum, flavescens, & adeo exile, ut scobem e ligno a verme eroso referat. *Capitula* matura deorsum inflectuntur, ne semen effluat, a pediculo enim aperiri solet. *Semine* maturo terni aut quaterni alii *ramuli*, rubigineo tomento obducti cum suis foliis in comæ lateribus nascuntur, spem florum in sequentem annum pollicentes. Tota planta aromaticum quid spirat. *Nascitur* plerisque Silesiæ locis. *Floret* sub finem Junii & Julii; semen Augusto & Septembri maturum: inhærentque interdum in sequentem usque annum capitula, sic, ut recenti flore & fructu superioris anni vacuo, nonnunquam & tertii anni fructus, pedicellis onusti rami conspici possint. *Vires* ejus egregiæ. Calefacit, attenuat, digerit & concoquit. Prodest articulorum contracturis vehementer, si ejus decoctum folio infundatur; mensium obstructioni, si in infestibus adhibeatur: scabiei, si cum scrofularia balneo incoquatur. Aquosis tumoribus, si rite cum floribus adplicetur. Elicitur ex eo & oleum, majoris sine dubio efficaciam. Rustici jumentis & porcis ad avertendam scabiem & grandinem substernunt. *Apiarii* foliis alvearia ob gratum odorem perfricant. *Cymæ* cerevisiæ ad inebriandum incoquantur. *Cromerus* ad montium radices invenit, cujus flores sex foliis & duodecim staminibus constabant: Venator quidam in summis jugis, quæ digitalem longitudinem non excederet. *Σενδνισχ Βιντραυ* nomen.

XI. *Cistus ledon foliis salicis angustifoliae*, Camer. *Rosmarinum sylvestre minus*, Lobel. *Chamaerhodendros montana Allobrogum lentiscifolia*, icon. Clus. *Rosmarinus sylvestris ῥοσμος*, & *Cisti Silesiaci genus*, frutex est pedalis altitudinis. *Virgæ* tenues subrubentes, quæ in tenuiores candicantes ramulos abeunt. *Folia* confuso ordine posita, salicis pumilæ similia,

Cistus superne virentia, inferne canescentia, nullius grati odoris, saporis peradstringentis. Summis ramis insident *capitula* ex multis brevibus squammis compacta Cachryos modo; e quibus se *flosculi* quinquefolii coloris quodammodo carnei explicant: quibus excussis pentagona breviter, obtuso mucrone *capitula* conspiciuntur, exili & pallescente *semine* turgida. *lisdem nascitur locis*. Sed & inter Brabantinæ Campaniæ ericeta eruitur, cultumque a Clusio Mechliniæ.

Clus. H. P.
l. c. 44.
Baubin. H.
P. l. 13. c. 9.
p. 21.

XII. *Myrtocistus Pennæi*, tricubitalis interdum frutex est, cortice admodum scabro & tuberculis obsito, qui in vetustis ramulis sponte decedit. *Folia* myrti, superne lævia, conjugatim circa ramulos nascuntur. *Flores* in summis virgis, quinquefolii, lutei, cum multis longiusculis staminibus. *Capitulum* oblongum pentagonum, *semine* plenum. Tota planta odorata est, & gummi quoddam, seu potius pinguedinem effundere videtur. Londini in Anglia ostendit ficcā Clusio Pennæus, quam ex Majorica, Balearium insularum majore, acceperat.

Alpinus ex-
ot. l. 1. c. 42.

XIII. *Pseudocistus ledum Alpini* duplex est, *primum* & *secundum*.

1. *Pseudocistus ledum Alpini primum*, habet radicem longam & crassam; surculos rectos rotundos, graciles. *Folia* ligustri minora, paucissima. *Flores* in summitatibus cisti floribus minores. *Siliquæ* rotundæ, oblongæ, in acutum desinentes, nigræ, in quibus *semen* minutum. Tota planta inodora & insipida est.

2. *Pseudocistus ledum Alpini secundum*, herba est fruticosa. *Radix* una, parva: *cauliculi* plures, molles. *Folia* myrti, sed minora, quaterna, mollia, in nigrum albicantia, caulem ambiunt. *Flores* ab his parvi, albicanter, ex petiolis descendunt. Succedunt *folliculi* parvi, rotundi, in acutum desinentes, flavescentes, ciceris magnitudine, qui *semen* minutum ejusdem coloris continent. Quid si *Chamaecistus* quadrifolia?

XIV. *Ledum Alpinum* est duplex, 1. *hirsutum*, 2. *foliis ferrea rubigine nigricantibus*.

1. *Ledum Alpinum hirsutum*, Ca. Clus. H. P. l. c. 51. mer. *Balsamum Alpinum Gesneri*, frutex est elegans & odoratus. *Rami* multi, cubitales, lignosi, duri, cortice cinereo, humi diffunduntur, & aliquando fibras agunt. *Folia* extremis ramulis, confusa Chamæleæ Italicæ foliorum æmula, dura, superne viridia & splendentia, inferne dilutioris coloris, in ambitu villosa & hirsuta, insident. In germinum extremis *florum* coma, qui deorsum inflexi & propendentes, campanulæ modo concavi, summa labra quinquedivisuris secta ostentant, foris intensius rubentes & argenteis veluti guttis conspersi, interius dilutius rubri, cum staminibus aliquot, gratiusculi odoris. *Capitula* exigua, quinquefoliis constant, in quibus *semen* fulvum & scobis instar minutissimum. *Nascitur* in summis Sneberg, Snealben, Wechselfeln, Durrenstein & vicinarum Alpium jugis inter saxa, ad devexaplerumque latera: nec non supra Garmingam Carthusianorum cœnobium. Viridia *capitula* trita odore suo capitatis gravedinem inducunt.

2. *Ledum Alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus*, Gesn. in Alpibus Gesner. de lunaria. roseo flore, & Nerium Alpinum, Lobel. *Chamaerhodendros Alpigena* odora, Clus. *Ledi Alpini genus alterum*, Lugd. *Evonymus Theophrasti tertius*, foliis est rarioribus, majoribus, durioribus, admodum venosis, magis mucronatis, nec in ambitu hirsutis, quæ pro parte plerumque flavescent, aut ferrea rubigine nigricant. *Flores* superiore paulo dilutiores. *Capitula* & *semen* similia. Floret Junio & Julio. Foliis & ramis adnascuntur quandoque tubercula, nunc nucis ponticæ, modo pisi magnitudine, inæqualia, intus fungosa & alba pulpa plena, quæ foris rutilant, & nonnunquam pallescunt. Præstare gallarum vicem possunt. *Reperitur* in Snealben supra Neuburg. Est communiter flore dilutius rubente; in Pyrenæis albo.

HISTORIÆ NATURALIS

DE ARBORIBVS

LIBER IX.

De Arboribus miscellis tam Indigenis quam Exoticis.

CAPVT I.

De Arboribus miscellis Classis primæ.

ARTICVLVS I.

De Ebena.

Ebenus.

Sic de Arboribus & Fruticibus in suas *Classes* digestis egimus. Claudunt agmen miscellæ, tam *indigenæ*, quam *exoticæ*, siliquata nempe, vesiciferæ, juliferæ, bacciferæ, scopariæ, pulcrifloræ, cum aliquot lignis, maximè aromaticis. Sex illarum classes, in quarum prima *Ebenus* & *Guaiacum* habentur.

I. Ebenus Theophrasto fruticosa arbor est Cytisi modo; rara & e palmarum genere Plinio. Natura ejus perpetua, lignum grave, arefactum etiam, ideo petit fundum & nigrum. *Medulla* lignum potius & benè Plinio tota ossea. Unam e peculiaribus Indiæ arboribus Virgilius celebravit *Ebenum*, nusquam alibi nasci professus. Sed quia & Meroëtica Lucano, Herodotusque eam Æthiopie intelligi maluit, India ita accipienda erit, ut omnem Æthiopie plagam comprehendat. Onesicriti sententia ἡ Ἰνδία τὸ πρῶτον τῆς διακρίσεως μέρος esse putabatur. In Arabia quoque & variis locis nasci tradidit Pomponius Mela. *Usus* & in Medicina invenit. Ex iis enim lignis est, quæ trita cum aqua facile in succum resolvuntur. Vis ei excalescendi, exstergendi, penetrandi, quia tenuium partium. Ad oculorum medicamenta redditur efficax, si ramenta in vino

Chio per noctem macerata, diligenter contrita, in Collyrio digerantur. Efficaciora evadent, si quis facta ex eo corticula utatur. Uritur & in fictili, ὡς ἀν' ἀνδρακωτῇ, lavaturque plumbi usti modo, & ita præparatum aridis scabrisque lippitudinibus conducit. Genera ejus duo. Est I. *Æthiopica*, ideo Plinius, raram arborem, Meroën usque a Syene sine imperii per non-gentena millia passuum. Optima hæc, ἑξυλος, nigra, venarum pectinumque expers, cornu elaborato lavore similis, quæque fracta densa adparet, δεικνύει ἐν τῇ γούρῃ καὶ ὑποσφύρα: prunis imposita, odore jucundo, καὶ δίστα καπνίζει uritur. Recens igni admota ob pinguitudinem accenditur, & ad eorū trita subfulva redditur. Bonum, quem habet, colorem adservando διασυνεζομένην (id est, *temporis tractu*) non acquirit, sed eum statim, quando caesa est, a natura habet, ut vere protinus sine arte jucundi dicatur. Romæ eam Pompejus M. in triumpho Mithridatico ostendit: Herodotus vero in tributi vicem regibus Persidis e materie ejus centenas phalangas tertio quoque anno pensasse, Æthiopas cum auro & ebore prodit. Ideo in tributis auctoritatem tertiam fuisse ebenum apud Plinium habemus. Adlatas & ἀπὸ Βαρυγάζων

H h h

ευγάζων

Theophr.
H. P. l. 4. c. 5.
Plin. H. N.
l. 12. c. 4.
Theophr.
H. P. l. 1.
c. 8. 19. l. 5.
c. 9. Virgil.
Georg. 2.
Lucan. l. 10.
Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 129. Ga-
len. simpl.
l. 6.

Ebenus. *ρυγάζων* εἰς ἀμφοτέρω τὰν τῆς περὶ τοῦ
Arrianus in *ἐμπόρια*, Arrianus auctor est. II. In-
periplo ma- dica est intercurrentibus *διαφύσει* can-
ris rubri. didis & fulvis, itemque maculis fre-

quentibus, priori bonitate cedens. Cytisi modo fruticosam & tota India dispersam dixit *Plinius*. Nonnulli sesamini aut acanthi ligna quod confimilia (*ἐμφεῖη*) essent vendebant. Fraus deprehenditur, quod fungosa sint, & in assulas, (*ἡδάνας ἐμπορεφύρας*) ad purpuram vergentes resolventis, nec quicquam mordacitatis in gustu, vel suavitatis in odore præ se ferant. Apud *Plinium* lego esse ibi & spinam similem, sed deprehensam vel lucernis igni protinus transiliente. *Spina Ægyptiæ* materiam esse vix dixeris. Robusta enim hæc & incorrupta. *Συνάμυνα* pro secamina legere non ausim. Nam nec mori lignum fungosum, *Sesamo* vero cici arboreo seu ricino caudex ramique concavi; nisi forte in *Creta*, ubi adeo arborefcit, ut ad carpandos fructus scalis sit opus. Quæ de Ebena *Pausanias* scribit, fossili potius quam vegetabili conveniunt. Nulla ei folia, nullus fructus, stirps nulla; radices tantum terra occultantur, quas eruunt *Æthiopes*.

II. Recentiores *Ebeni*, *Ligni pice nigrioris*, *Guirapariba*, & *lignorum quorundam durissimorum*, meminere.

1. De Ebena non constat inter auctores. *Anguillaræ* ignota arbor est. *Curtius* fingit ut plurimum esse tenuem, vimine raro, & in crassitudinem caudicis extuberato, cortice hiulco & admodum reticulato, adeo venis dehiscens, ut per sinus ipsos intima pars tenui libro contegatur. In rubro mari nasci, foliis fructuque olivæ. *Lobelius* *Officinarum Ebenum* speciem *Guajaci* facit. *Thevetus* in *Indiæ* insula *Palmobotere*, præstantissimam & nigram tradit. *Bauhino* lignum duorum est generum. *Verum* unum, *sylvestre* alterum. I. *Verum* sylvestri ponderosius est, nigrum, alicubi colore ligni nucis juglandis aut etiam pallidius, minutis quibusdam quasi segmentis scarificatum, & longe frequentibus aliis splendicantibus nec impressis refertum. Adolescentis flamma non injucundum

spirat odorem, nec tamen sine gravitate quadam. Viti & hominis crassitudine trunci, sed suberis instar fungosi, & quibus aliqua putredinis labes. II. *Sylvestre* nigredine ac pondere superiori cedit, sed vix splendore & elegancia. Scarificatur per vestigia, sed non tam profunde, splendide tamen. Utrumque aquis injectum protinus fidit: sed sylvestri major oleositas. *Nascitur* & in *Calecut*, si *Theveto* fides. Artificiosa apud magnates & artifices *Augustæ*, *Venetiis*, *Amstelodami* & alibi opera ex ea; thecæ nempe, pectines, arculæ, abaci, capsellæ, fellæ plicatiles, pocula, signa crucis & alia ejusmodi. *Albertus* *Cunis* adalligatam turbulentia somnia prohibere prodidit. An vulgare *Ebenum* veterum *ebenum* sit, ex collatione habebis.

2. De ligno pice nigriore nihil habeo, quod scribam, præter quam quod idem polito ebore sit lævius. Arbor crasso cortice vestitur, in cujus sinu deciditur *Ebenus*. Ejusdem generis ligna rubentia, & alia *Ceræ* instar flaventia reperiuntur in insula *Mauritania*. Adpellatur alibi *Ebenum picis modo nigrum*.

3. *Guirapariba*, *Ebeni* species est. *Arbor* magna & ampla. *Cortex* similis arbori *Guajabæ*. *Lignum* interius coloris est obscure olivacei ad nigrum vergentis, saporis, si viride mastigetur, amari; exterius ex parte pallidum. *Folia* parva in quolibet ramulo æqualia, paria, cylindracea aut similia, saturate viridia, nervo secundum longitudinem, & venulis transversis vix conspicuis prædita.

4. *Ligna durissima* sunt aliquot I. *Lignum Mangles*, quod ferrum duritie æquat. Arbor, quæ *Brasilien-*sibus *Mangua*, refert foliis nostras faciles semper virentes. *Nascitur* juxta littora & *Oceani* recessus magno numero in *Brasilia*. Reperitur sub eaculicum quoddam genus, exiguum quidem, sed acriter pungens. Unicum remedium fumo abigere, aut fimo oblinere corpus, quod barbaris fuerum. Fiunt ex ligno mali & antennæ navium. II. *Lignum de Cochi*, ejusdem cum ferro ponderis, ex qua

Ind. Orient.
p. 4. & 5.

Marcgr. H.
P.B. l. 3. c. 9.

De Laet.
Ind. occid.
l. 15. c. 13.

Ind. occid.
p. 9. l. 4.
c. 30.

Bauhin. H.
P. l. 3. c. 196.
p. 394.

Ind. oriens quā ancoras conficiunt. Lusitanis
P. 7. c. 44. *Pao di ferro.* III. *Maga* lignum du-
rissimum in insula S. Johannis de por-
turicco, ex quo fabrilis opera paran-
tur. Est cariei minime obnoxium.

Marcgr. H. IV. *Ibera puteruna* arbor, quæ lignum
P. B. I. c. 13. habet tam durum, ut aciem cultri ob-
tundat. Magna est & ramosa. *Folia*
figura cordis, in extremitate acumi-
nata, tenuia, superius dilute viridia,
inferius pallida. V. *Lignum Teixo*,
Linschot. quod ferrum, duritie æquat, & inte-
Ind. or. p. 3. rius coccinum undulatum expressissi-
c. 6. me refert. Habetur in insula Pico.
Preciosum est, fiuntque ex eo instru-
menta. Simile huic in Macao, Lu-

sitanis *ferrum ligneum*, quod colore Ebenus.
pondere & duritie durissimum æquet, Admir. Si-
& in aquis subsidet. Arbores ingen- nensium,
tes in Chaoking monte Caoleang vi- p. 968.
suntur. VI. *Angeliana* arbor, apud Linschot.
Cochinum, cujus trunco continuo na- Ind. or. p. 4.
ves Tonas vocatas exstruunt tam gran- c. 14. & p. 7.
des, ut una XX. vel XXX. dolia aquatica c. 27.
vehi possint. Lignum adeo durum, ut
ferrum atterat. Forte arbor in Gui-
neæ insula Formosa, cujus pars ima
crassitie est viginti quatuor orgyrum.
Apud Acoftam solum nomen exstat.
VII. Arboris *μυτροσιδής* in Java li-
gnum, cujus medulla sit ferrea, sed
exilis, fabulosum esse credo.

ARTICVLVS II.

De ligno Guajaco.

TABVLA
CXXI.
Hist. Lugd.
plant. l. 18.
c. 1.

Lignum Guajacum ignotum *Vete-*
ribus erat. Ab Ebena nigredine
differt: nec scio, quomodo buxi
species dici possit. Nova ergo arbor
est, quam nobis occidentalis India de-
dit. Quintuplex vero hoc 1. *Magna*
matrice. 2. *Propemodum sine ma-*
trice. 3. *Foliis lentisci.* 4. *Oriente.*
5. *Foliis Cerasi acidæ*, ad quæ *Jaca-*
randa reduci potest.

Monard.
med. simpl.
c. 20.
Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 29.

1. *Guajacum magna matrice*, aliis
Gayco, *Gayacan*, & *Guayacan*, arbor
est juglandis vel Ilicis magnitudine.
Lignum in extremis colore, qui in
buxo interne nigrescente conspicitur,
ponderosum, ut minima ejus pars in
aqua subsidat, pingue & resinaceum
quid spirans, demittensque gummi
accensum, prædurum, ubi refrixe-
rit. Amarum idem statim, post acri-
monia miti palatum ac fauces com-
pungens. Medulla maxima. *Cortex*
extrinsecus cineritius permixtis mul-
tis viridibus maculis, intus subruber,
immodice durus, qui ligno recenter
cæso firmiter adhæret, progressu tem-
poris facile sejungitur. *Folium* cras-
sum, parvum, durum, viride, multis
venis distinctum, quod in ramo si-
tum habet, ex opposito alterius qua-
terna vel sena folia. *Flores* multi,
pallidi lutei, *ἑξαφύλλοι* in umbellam
vel corymbum componuntur, in
quorum medio rudimentum fructus

bursæ pastoris effigie. *Fructus* a qui-
busdam Castaneis, ab aliis prunis si-
milis refertur, geminis loculamentis
constans, Aceris quodammodo instar,
sed sine alis, qui cordis figuram ele-
ganter exprimit. Longitudo, *inquit*
Reccus, est transversæ digiti, latitudo
paulo minor, color totius corii ali-
quantulum corrugatus Pruni instar,
in conjunctione cum altero fructu
membrana est densitate, colore du-
ritie persimilis ei, quæ juglandis se-
men bifariam dividit. *Corium* exter-
num corrugatum mollius est, inter-
num vero nucis interno putamini du-
ritie & colore respondet ejus densi-
tas. Nucleus intus conclusus, colo-
re & variis venarum ductibus Nuci
myristicæ vel buxi radici admodum
similis. Hunc si diu in ore volvas,
quasi pulpam quamdam abras, quæ
acrimoniam manifestam linguæ im-
primit, & nucleus in recenti fructu
manet coloris Castanei quasi transpa-
rentis, in aliis vero omnino niger. Nu-
cleum si secundum longitudinem fin-
das, duritiem dactylorum offendes
totumque osseum flavum in recente,
cinereum in obsoleto: albæ autem
lineæ transversim parallelos totum
pertranseunt, ut *Lyncurium* radius
splendore referat. In medio ejus ca-
vitas est longa a summo ad imum
pertingens, sed sine ulla fere latitudi-

Lignum
Guaja-
cum.

Lignum
Guaja-
cum.

Bauhin. H.
P. l. 4. c. 53.
p. 499.

Sennert.
medic.
pract. l. 6.
p. 4. c. 13.

Reccus. R.
M. N. H.
l. 3. c. 29.

ne, qualis in Evonymo etiam conspici-
tur, ubi seminis duo ovalia, sed
plana viridia quasi foliola sejuncta in
summo uniuntur, corque extrorsum
versus componunt. Et hic est ille
fructus, quem Clusius a Syvertzio
Pona accepit, Bauhinus vero ex Italia
nomine fructus Guajacini, quem Jo-
hannes Bauhinus describit. *Crescit* in
Hispaniola, & in continentis regione
Nagrando dicta, tanta copia, ut Hi-
spaniæ pinus superet. Frequens &
in insula S. Dominici. *Usus* in *Medici-
na* celebris *ligni & corticis*, quamvis
etiam sint, qui folia & fructus in con-
servas & electuaria redigant. *Lignum*
calidum est in secundo & siccum, te-
nuumque partium, & proprie viru-
lentiæ venereæ per sudores & insen-
sibilem transpirationem subvenit. Pa-
rantur ex eo decocta, ita, ut pro ra-
tione indicantium permittentium &
coindicantium ad aquæ libras XII.
tres aliquando sex & plures ligni un-
ciæ sumantur. Fuere, qui acido Ci-
tri maceratum in conservam redige-
re volebant. Optimum secundum
quosdam interiore parte nigricans,
ponderosum, resinofum, & quod
acrimonia linguam vellicat. Redu-
citur in resnam & spiritum, magnæ
apud Sennertum dotis. *Cortex* ama-
rior & acrior. Ideo validius ficit,
attentiar & digerit. Balsamica sub-
stantia minor, quam in ligno.

II. *Guajacum propemodum sine
matrice*, quibusdam *lignum sanctum*,
Indis *Hoaxacan*, & *Matlalquaubtl*,
arbor est similis admodum Guajaco
mediocris magnitudinis, strigosis &
inconditis stipitibus, ac veluti spino-
sis. *Cortex* enim magis, quam Gua-
jaci, pustulosus, cinereus, maculis-
que conspersus, qui etiam intrinse-
cus rubet, & in recenti ligno facile
separatur. *Lignum* albicat & ad lu-
teum quendam colorem vergit: imo
Cyaneum est. *Meditullium* in ligno
parvum, in ramis nullum, pondus
idem cum Guajaco. *Folia* exigua
rutaceis, paulo majora lentisci, mo-
do bina ex adverso posita. *Flos* vin-
cæ pervincæ colore & figura similis,
cui foliola quasi duplicata, sibi quasi

superponuntur. *Fructus* descriptio
ab auctoribus non ponitur. *Nasci-
tur* copiose in insula S. Johannis de
portu divite. *Cortex* est amarus, &
calidus ordine secundo. Ejusdem
temperiei folia, cum manifesta sicci-
tate. Magni in lue venerea, & aliis
diuturnis adfectibus, qui a frigidityte
procedunt, effectus. *Pulvis ligni*,
quod piperis instar fauces pungit, na-
ribus insufflatus sternumenta ciet. De-
coctum amarius est, magis odorum,
magisque flavescens. In plura gene-
ra a quibusdam dividitur. Quod-
dam enim nigricat. Aliud *spadiceo
colore flavescit*. Est & quod colores
istos omnes discretos habet. Proba-
tur maxime, quod rufum, spadiceum,
flavum, lividumque colores simul
mixtos habet.

III. *Guajacum foliis lentisci*, de-
scribitur a Clusio in ramo, pedalis
longitudinis, valde contorto & fre-
quentibus nodis distincto. *Materies*
erat dura & pallescens. *Cortex* ru-
gosus, cineracei coloris. *Superiorum*
ramulorum nonnulli folia adhuc reti-
nebant, alii etiam flores & fructus
rudimenta. *Folia* seu potius folio-
rum alæ nata erant in tenellis ramis,
(*verba sunt Clusii*) contrario inter se
situ, singulis alis quaterna, aut sena
foliola lentisci modo, ex adverso sem-
per nascentia, obtinentibus, crassiu-
scula, orbiculata, & multis venis di-
stincta, quæ siccitate facile defluerent,
manentibus nudis alis, & foliorum,
ubi sita fuerant vestigia duntaxat re-
tinentibus. In superiorum ramulo-
rum nodis tubercula veluti erant, e
quibus conjunctim exorti, seni octo-
ni, deni. interdum plures tenues pe-
tioli, sustinentes singuli *florem* sex fo-
liis constantem, e quorum umbilico
multa prodibant staminula, & in
nonnullis floribus fructus rudimen-
tum medium emergere incipiebat,
binis lateribus præditum, & instar
loculorum bursæ pastoris formatum.

IV. *Guajacum orientale*, Lobel.
Palma aut *Palum sanctum*, Bauhino
palme sanctæ similis arbor, arbor est
Fraxino minor, cortice concolore.
Folia plantaginis, sed crassiora, mi-
nora, pinguiora, breviora. *Fructus*
juglan-

Monard.
med. simpl.
c. 20.

Lobel. ad-
vers. p. 420.
Bauhin. H.
P. l. 4. c. 52.
p. 499.

juglandis magnitudine, alvo subdu-
cendæ idonei, ut Fragosus habet. Lo-
belius *corticem* arboris Judæ habere
scribit; *folium* Cetri carnosum, nu-
dum, lauro latius, brevius, nervo-
sum. In summis hærent folliculi pal-
lidi, coriacei, circinata rotunditatis,
admodum compressi, coronæ galli-
cæ pares, quorum medio *semina* len-
tis effigie & colore compressiora, gu-
stu amaricante insunt. Ramus ex In-
dia orientali in Angliam delatus erat.

Marcgr. H.
P.B.I. 3. c. 5.

V. *Guajacum foliis Cerasi acidæ*,
arbor est cortice gryseo, glabro. Fo-
lia inordinate disposita, late viridia,
Cerasi similia, sed non ferrata.

VI. *Jacarandæ* duæ sunt species.
Prima *ligno nigro* bene olente, duro,
quæ in Capitania omnium sanctorum
reperitur. Altera, *ligno albo*. Fert
hæc *folia* in ramulis alternatim sibi
oppositis directe quoque sibi opposita,

tres digitos longa, non ferrata, superne Lignum
splendentia, obscure viridia, inferius Guaja-
ex viridi quasi albicantia. Floret hoc cum.
modo. In quolibet, (inquit Marc-
gravius) ramo versus exteriora, mul-
ti proveniunt ramuli, qui quasi race-
matim per multos dies habent glo-
bulos, nuclei cerasini magnitudine,
coloris exterius ex olivaceo sublute-
scentis, qui se aperientes in quinque
scinduntur folia, quæ deorsum incli-
nantur, & interius tactu & visu re-
ferunt holosericum olivaceum splen-
dens. His insidet flos unico folio lu-
teo subrotundo ad latus explicato con-
stans, e cujus regione sursum incur-
vata sunt quatuor stamina alba elly-
ptica figuræ, apicibus luteis, & in
horum adhuc medio corniculum ex
albo viride: in medio autem floris
eriguntur multa stamina, alba, api-
cibus luteis satis magnis, in scoparum
seraceorum modum. Flos dulcis
odoris, fructus haud edulis.

CAPVT II.

De Arboribus miscellis Classis secunda.

ARTICVLVS I.

De Jasmino.

Jasmi-
num.

Vid.
TAB.
CXXI.

In classe secunda sunt *Jasminum* &
Syringa. Jasminum ignotum Dio-
scoridi & aliis Græcis esse videtur.
Jasme certe non est, cujus floribus ole-
um apud Persas imbuebatur, quia gra-
uius spirat. Et violæ latior multo est
significatio, quam ut certam quam-
dam plantam designare possit. Ara-
bibus sub nomine *Sambach* & *Jam-
bach* describitur, triaque ejus genera
Serapio tradit. Flos uni albus, lu-
teus alteri, quod Babylone habetur
cæruleus tertio. Apud Bauhinum
plura genera inuenies. Est 1. *vulga-
tius flore albo*, 2. *humilius*, 3. *cæru-
leum* Serapioni, 4. *luteum vulgo di-
ctum bacciferum*, 5. *millefolii folio*,
cui nos 6. *Brasilianum* addimus.

Dodon.
Pempt. 3. l. 3.
c. 22. Bau-
hin. H. P.
l. 15. c. 3.
p. 103.

I. *Jasminum vulgatius flore albo*,
habet secundum Bauhinum & alios
longissima, lenta & tenuia *vimina*,
quibus *cortex* viridans. Folia septem

ad nervum adligata, acuminata, ala-
rum instar expansa viciæ fere, paria
glabra atrovirentia eminente in cacu-
mine reliquis majore. Flores veluti
in umbella suavissimi odoris, ex ob-
longo, gracili tubulo in calathum
quinquepartitum explicantur, colore
candido. Matthiolo e semine rarissi-
me *semen* oritur, in aliquibus tamen
locis edit Lupino simile. Crassescit
vetustate specie arborea coeuntibus
instar caudicis viticulis. Floret post
rosam diutius e singulis foliorum alis.
Fructum in frigidis vix perficit, hye-
me emittit folia. Sunt, qui *Pothon*
Theophrasti esse credunt, qui Plinio
maxime spectabilis, & duorum est
generum, flore nempe *hyacinthi*, &
flore candido, qui fere in tumulis na-
scitur, vel potius circa sepulcra se-
rebatur, ut ejus vaga fronde & deci-
duis floribus contegerentur. Ubi-

Theophr.
H.P. l. 6. c. 7.

Jasmi-
num.

vis in hortorum angulis apricis, & pro prædiorum cavædiis furculo pangitur, adque pergularum ornamenta pedamentis erigitur ad fornices. Nobilis in morbis *florum* usus. Oleum, quod ex illis crudos discutit humores, doloribus colicis, uteri morbis, contractis induratisque artubus articulis & tendinibus, si competenter adhibeatur, commodissimum. Sed caveant sibi temperamento calidiores. Dolores his capitis, & si diutius olfaciant, sanguinis ex naribus profluvium.

II. *Jasminum humilius* est duplex, 1. *luteum*, 2. *flore magno*.

Baithin. H.
P. l. 15. c. 3.
p. 102.

1. *Jasminum humilius luteum*, superioris ritu fruticat, virgultis viridantibus angulosis striatis. *Folia* ei terna Polemonii Monspeliensium, de quo mox, ritu, sed acutiora & firmiora quam in albo, interdum duodecuplo majora, alias vero pinnata, ex una duabusve conjugationibus constæ adnexis, impari semper uno alam claudente. *Flores*, ejus, qui in vulgato, ordinis, foliis obtusis, luteis. *Fructus* mediocris magnitudinis, niger, oblongus: in quo bina *semina* magna, nigra, oblonga, altera parte plana, altera modice gibbosa. *Argentina flores* Julio, maturat fructum Octobri. *Pfortzheimia* Novembri viret.

Lobel. ob-
serv. p. 543.
Camer. in
epitome.
Lugd. hist.
plant. l. 13.
c. 14.
p. 1431.
Baithin. H.
P. l. 15. c. 3.
p. 101.

2. *Jasminum humilius magno flore*, Lobel. *Chamægelsimum grandiflorum*, Camer. *Gelsimum catalonicum*, Lugd. *Jasminum puniceum Dalechampi*, Bauh. *Jasminum hispanicum flore majore externe rubescen- te*, vulgari concinnius est. Tres quatuorve foliorum conjugationes cum extremo impari alam complent: at singularia ex oblongo rotundantur; propius plerumque se mutuo contingunt, extremumque folium impar contractius ac brevius, quam in vulgato. *Flores* longe sunt majores, speciosiores, ac fragrantiores, foliis obtusis, intus lacteo candore, foris puniceis. E *Chio* insula Genuam primo advectum, inde Lugdunum. *Floret* autumno per totam hyemem Patavii, Lugdunii, Basileæ & alibi

in urceis pensilibus culta. A Turcis & Græcis studiosissime colitur.

III. *Jasminum cæruleum Serapi- nis*, nondum, inquit Bauhinus, vidi- mus. An Arabes *Ligustrum orien- tale*, quod alias Syringa cærulea di- citur, intellexerint, Cæsalpinus du- bitat. Alii *Clematidem cæruleam* esse volunt.

IV. *Jasminum luteum vulgo di- ctum bacciferum*, Lobel. & aliis Po- lemonium Monspeliensium, Gesner. *Rutacapraria Gallorum*, Dodon. *Tri- folium fruticans*, Tabern. *Ruta bac- cifera*, Bauh. *Trifolium fruticans qui- busdam Polemonium flore luteo*, ra- dice est alba; ramis tricubitalibus an- gulosis, viridibus, in quibus alter- natim furculi surgunt. *Folia* terna fere lato virore splendentia: singu- læ portiones ad Rutæ vulgaris por- tiones accedunt, sapore ingrato & fervido. *Flores* in ramulorum ex- tremis Jasmini facie, quinquepartiti, lutei: quibus *baccæ* satis magnæ ro- tundæ, rubræ, in quibus *semen*. Pi- so vulgari simile, intus album, in- grati saporis. *Ferrarius folia* ei adsi- gnat, oblonga, Puniceæ mali foliorum instar duriuscula, non incisa, non de- cidua, quinis ternisve in singulos ra- mulos coeuntibus, alarum adpectu per virgularum latera explicatis. *Flo- res* omnino aurei, per summa ramo- rum in umbellam diffusi, diutius ver- nantes. *Baccæ* minuscule oleæ ma- gnitudine, primoque virore exæquan- tes, a maturitate liventes, maturæ instar uvæ translucidæ &c. Visum mense Martio, Aprili, Majo & Junio floruisse. *Baccæ* in Augusto prode- unt durantque per hyemem. *Pro- venit* Monspeli in sepibus, nec non inter Monspelum & Nemausum, Lugduni, Montbelgardi, Romæ, Bo- noniæ, Patavii, Genevæ in hortis.

Gesner. in
hortis germ.
Lobel. ad-
vers. p. 329.
Bauh. H. P.
l. 11. p. 374.

Ferrar. Flo-
ræ l. 3.
p. 389.

V. *Jasminum millesolii folio*, Ca- mer. *Quamoclit*. Clus. *Quamoclit*. five *Jasminum Americanum*, Ponæ *Gel- seminum Indianum pennatum flore sanguineo*, Col. *Convolvulus penna- tus exoticus*, cauliculos habet ruben- tes, sed qui magis ad nigredinem vergunt. *Folia* viticulis purpura- scentibus alternatim hærent, pinnata, tenui

Clus. in eu-
ris poste-
rior. p. 5.

tenui admodum divisura, obscure virentia. *Flores* oblongi, tubulosi, in summo quinquepartiti, rosei, lineis sive plicis striati. *Lobi* pauci primum, dein utrinque plures, usque ad ter denos & unico in summo: priores bifurcantur. *Semen* intus oblongum, durum & fuscum, quod aqua maceratum plerumque rumpitur. Primo vere solum Junio emicat: & prima folia Aceris fructus referunt, effigia alata, vel Ari bifurcata modo. Sapor plantæ subdulcis & modice nitrosus; *Capsulae* & *semen* piper gustu referunt. Lacte turget dilutiore.

VI. *Jasminum Brasilianum*, ex

descriptione Marcgravii, ex tenui *ra-* ^{Jasmi-} ^{num.} *dicula* unum atque alterum filamentum superius habente, unicum *caulem* emittit, teretem, glabrum, viridem, geniculatum, intus medullosum. Ad singula genicula bina sibi opponuntur *folia* sine pediculis, tres vel quatuor digitos longa, late viridia, lævia, nervo secundum longitudinem & costis transversis oblique discurrentibus. *Flores* ad internodia copiosi, papilionacei, uno quasi folio constantes, quod in tres partes sectum est, splendidissime rubri. E medio flore duo stamina flavescentia, apicibus flavis prodeunt, & e medio aliud staminulum absque apice.

ARTICVLVS II.

De Syringa.

Syringa.

TAB.
CXXII.

Syringa Arabibus duntaxat nota, & Africum vocabulum est. Genera ejus quatuor invenio. Est 1. *Cærulea*. 2. *Arabica foliis mali Arantiae*. 3. *alba sive Philadelphus Athenæi*. 4. *lutea*, quibus accedit 5. *Syringæ albæ adfinis*.

Bellon. observ. l. 3.
c. 50. Clus.
H. P. l. 1.
c. 36.

I. *Syringa cærulea*, aliis *Lilac*, *Lilach*, Bellon. *Cauda vulpina Turcarum*, Lobel. & Eystett. *Syringa cærulea Lusitanica*, Cæsalp. *Ligustrum orientale*, forte *Jasminum cæruleum Mauritanorum*, arboris aliquando magnitudinem acquirit. *Radix* pululans. *Lignum* solidum & firmum; *Cortex* exterior ex cinereo virescens. *Virgæ* rectæ & nodosæ tenellis fraxini æmuli. In extremitate ramulorum crassæ & turgentes gemmæ. *Folia* hederæ æmula, subrotunda, in acumen tamen desinentia, mollia primum, duriora post, in pediculis longioribus subamara & acria, serie quadam cruciformi disponuntur. *Flores* ex privato furculo imbricato foliorum stipatu obvallato, suaveolentes, in jubæ formam dispositi, numerosi, sine foliis, oblongi, rubentes, aut ex rubeo cærulei, quinquepartiti, quinque croceis alte reconditis apicibus farciuntur. Excipiunt eos *siliquæ* duabus veluti membranaceis valvulis constantes, in quibus *semina*

oblonga, foliacea, ex atro rufescentia. Attulit primum Constantinopoli Augerius Busbequius. Nunc in plerisque Belgii, Germaniæ, Galliæ & Italiæ hortis conspicitur. Bellonius perpetuo virentem facit: forte quia ibi talis. Apud nos decidunt folia. *Ostryam* seu *Ostryon* Theophrasti non esse, ex descriptione videbis. Unica hæc species *Oxyæ*, tum satum tum cortice similis folio pyri, multum oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibris multis & crassis, a medio dorsi in modum costarum secundum rectam ac magnam fibram porrectis, in fibris ipsis rugato & ambitu leviter serrato: *materie* dura, decolore, exalbida: *fructu* parvo, oblongo, hordeo simili, flavo; *radice* summo cespite serpente. Aquas collesque amat. Nullum hic folium secundum fibras rugatum, omnique in ambitu incisura carens. Quando in arborem abit, mediocris illa, nec instar fagi comosa.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 10.

II. *Syringa Arabica foliis mali Arantii*, Alpino *Sambac Arabum*, Clusio *Jasminum Arabicum*. Sarmentosus frutex est, qui sarmentis serpendo altius se extollit, *foliis* mali Arantii proximis. *Flores* albi *ὀγδοφύλλοι*, vulgaribus foliis similes, magnitudine & odore validiore. Veslingius adole-

Clus. in curis poster.
Alpin. de plant.
Egypt.

Ferrar. Flora l. 2. c. 12.
Vesling. observ. ad Al-

Syringa.
pini plant.
Ægypt.
c. 19.

scere stipite robusto scribit, quæ ternis quaternisque cubitis in altum porrigitur; animadversumque in flore duplicem ordinem, & sæpe decem aut duodecim folia rosea serie brevior tubulo digesta. Ferrarius obsoleta altitudine pallidulos facit. *Rami* flores omnes facili obsequio admittunt. *Nascitur* Cayri in Ægypto. Paratur ex floribus *oleum*, cuius mulieribus Ægyptiis contra scirrhusos uteri tumores intra & extra usus. Sed & contra asthma, tussim, & pleuritidem, in qua difficilis expectoratio. Unguentum hoc ex dulcibus amygdalis & sesami seminibus florum Jasmimi odore imbutis parant. Valde odoratum est, postquam expresseris.

Clus. H. P.
l. 1. c. 36.

III. *Syringa alba*, Lobel. & Eystett. *Syringa Italica*, Clus. *Frutex Coronarius*, valde elegans frutex est. *Virgæ* a radice longæ, brachiales aliquando, nodosæ & geniculatæ. *Cortex* cinereus. *Folia* ex intervallis bina, laurinis majora, oblonga, per extremum mucronata, rugosa, viridia, in ambitu crenata, amariusculi primum saporis, post acris. *Flores* bini, quini septeni, plures aliquando τετραφύλλοι albi, odore florum mali arantii extremis ramulorum insident, occupantque mediam cavitatem & umbilicum fibræ numerosæ pallidæ. *Capitula*, quæ succedunt, e numerosis quasi valvulis compinguntur, superne obtusa, primum viridia, post nigricantia, quibus dehiscens oblongiusculum & tenue semen excidit, quod plerumque novellas plantas sequente anno procreat. *Floret* Junio, semen Augusto

maturatur. Nullibi sponte nascens a Clusio visa; in Belgicis & Hispanicis hortis sæpius. Facile furculis propagatur. Ex floribus odorem habebis aquam. Matronæ Austriacæ chiroteas floribus immergunt, ut bene oleant. Est vel *pleno flore* vel *simpli-ci*. Ignoram quidam Veteribus volunt; alii sub Ostryis nomine a Theophrasto & Plinio descriptam; nonnulli *Philadelphum Athenæi* esse credunt. Aptumis naturæ nomen accepit. Nam cum ex intercapedine sponte rami coiverint, animato complexu coherescunt, & procurentes rivos furculos pariunt. Ideo in retis morem compositi, circa hortos, tutelæ ergo plantantur. Difficilis enim inter junctos transitus.

Athen. Di-
pnos. l. 15.
c. 12.

IV. *Syringa lutea Americana* incolis *Toton Capatli*, frutex est stipites & ramos cavos & purpureos ex radicibus furculosis proferens. *Flores* lutei versus centrum rubescens, cordis initio figuram ostendunt, mox in quinquefolias stellulas concinnantur. Ex his erumpunt *vascula*, in quibus *semen* exile & nigrum clauditur. *Folia* quia primo gustu acida, post plane amara sentiuntur, calida, sicca & adstringenti facultate esse judicari debent. Illita corpori frigoris rigoribusque accessionum mederi dicuntur. Fluxus veteris admota compescere nullum dubium.

Reccus R.
M. N. H.
l. 4. c. 19.

V. *Syringæ albæ adfinis*, ramulus Clus. exot. erat, cui capitella octo striis exilibus notata, quæ in binas partes rostellæ aviculæ modo dividebantur.

CAPUT III.

De Arboribus miscellis Classis tertiæ.

ARTICULVS I.

De Ulmo.

Ulmus.

Vid.

TAB.

CXXII.

Theophr.

H. P. l. 3.

c. 6. & 14.

Plin. H. N.

l. 16. c. 17.

Ad tertiam miscellarum classem refero, *Ulmum*, *Betulam*, *Alnum* & *Populum*. I. De Ulmo non ita multa apud Veteres. Mature germinat sterilis lucosæque. *Lignum ævum*, *αἰώνιον*, subflavum, buxæ coloris cui ficior est lentitia, totum cor, diutur-

nusque in aëre manet. *Folium περι-
νεχαράγμενον ἡρώχῃ*, oblongius quam pyro, scabrum non læve. *Gummi ἐν κωρύκοις* in folliculis gignit, & animalcula κωροποικῆ, nec non Cachryn peculiarem, auctumno multam, minutam, nigram. Præcis ramis, dum

Theophr.
castra. H. P. l. 9. c. 1.

castratur arbor, prodit lacrymæ in modum humor, fluitque e medulla. Facilis auctu quæ ad aquas, prove- nit tamen & in montanis. Prostratam, sponte restitutam prodictum. *Ufus ligni, corticis, radicum, foliorum, hu- moris & lacrymæ.* Ligni in navi- bus ad *χέλισμα* seu statumina & au- riculas, ad *δυσώματα πολυτελῆς*, forium assamenta vel cardines *τῆς σρόφιγγας*, quia validum & fortissime rigorem servat. *Cortex* si fasciæ loco circum- volvatur, glutinat vulnera: crassior in vino vel aqua uncia unius pondere, pituitam educit. *Radicum* decocto quosdam fracturas perfundere, quæ callo inducto opus habent, Galenus auctor est. *Folia* ad obsonia, si re- centia, olerum more usurpantur. *Humor* seu *Gummi* cuti nitorem inducit, faciemque gratiorem præstat. Reci- pitur & in emplastrum melinum. *Lacryma* imponitur collectionibus, vul- neribus & ambustis quæ decocto fo- vere prodest. Capillos eadem red- dit capiti illitu, defluentesque conti- net. Ex *ramulis* virgæ fervorum tergoribus parabantur. *Genera* apud Theophrastum duo. Est *πτελέα*, quæ campestris & fruticosior, & *ὄρεπτε- λέα* Ulmontia, quæ auctior totidem & Columellæ, *Gallica* nempe, quæ & *Atinia* longe lætior & procerior, & quæ frondem jucundiorē bubus præbet; & *nostras*, quæ Campestris. *Plinio* quatuor placent. Græci, in- quit, duo ejus genera noverē. *Montosam*, quæ sit amplior, & *Campestem*, quæ fruticosa, (i. e. *ramis pluribus, sed exiguis & brevibus opaca*) Italia *Atinias* vocat excelsissimas, & ex iis *Siccaneas* præfert, quæ non fiunt ri- guæ. Alterum genus *Gallicas*. Ter- tium *Nostrates* densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore. Quar- tum *Sylvestre*. Sed nota, separare ho- mogenea Plinium, *Gallica* & *Atinia* una eademque ulmus est, ut verna- cula & nostras. Et quod *Atiniam la- maram* ferre negat, fallitur. Rario- rem creare, & idcirco plerisque ste- rilem videri, seminibus inter fron- dem quam prima germinatione edit latentibus, apud Columellam prodi- tum.

II. Nobis *Ulmus* est duplex, *Cam-Ulmus*, *pestris* nempe & *Montana*.

I. *Ulmus Campestris*, Plinio *Italica*, Bauhin. H. columellæ *vernacula*, aliis *Ulmus* arbor P. l. 8. c. 2. est aliquando procera, aliquando infra P. 139. justam altitudinem subsistens, & *ra- mis* brachiata. *Cortex* nunc lævis, nunc profundissimis sulcis & eminentissimis porcis secundum longitudinem exara- tus, interiori albo flexibili. *Materies* al- ba & firma. *Flores* ante omnia promit, ex ramulorum extremorum tubercu- lis, in muscarium congestos, ex stami- nulis plurimis atro purpureis, quorum terna vel quaterna includuntur rece- ptaculo oblongiusculo in viridi pur- purante. *Floribus* foliacei utriculi compressi succedunt, seminibus Atri- plicis similes, multi, ex oblongo ro- tundati, magni, tenues, in extremo parum fissi: in quorum medio *semen* parvum, tenerum, planum, candi- dum, sapore dulci; quod prout & cortex, masticatum glutinosum red- dit succum. Tandem post semina ex ramulorum fastigiis *folia* se proferunt, lætius primum virentia, oblonga, cri- spa, aspera, ex rotundo fastigiata. Per mediam longitudinem decurrit *ner- vus* rectus & a tergo magis conspi- cuus, a quo alii minores costarum instar exeunt; in uno tamen latere plures, ita, ut altera foliorum pars al- teram longitudine vincat, quod Cor- dus observavit. Foliis quotannis fere adnascuntur *folliculi* cavi, tuberosi, subrotundi, ac diversarum figurarum, in quibus glutinosus quidam liquor, ex quo exigui vermicelli, qui in cu- licellos minutos abeunt, gignuntur. *Provenit* passim in sylvis earumque marginibus, pinguibus lutosisque campis. Sed & ad aquas facilius suc- crescit. *Usum* in *Medicina* nobilem *folliculorum* liquor præstat. Vix quic- quam in glutinando laudabilius. Per- forata brachia & femora hoc solo cum melle misto spatio viginti qua- tuor horarum restituit circumfora- neus. Et vide quid Henricus ab Heer Heer in ob- de oculi vulnere scribat. Fallopius servationis in podagricis doloribus, cum fluxio- bus, nes fierent, adhibebat. Colligi men- se Majo debet, antequam nascuntur vermiculi. Imponuntur vitro angu- stioris

Plin. H. N.
l. 16. c. 40.

Dioscor. M.
M. l. 1. c. 3.

Theophr.
H. P. l. 3. c. 4.

Columella
R. R. l. 5. c. 5.

Plin. H. N.
l. 16. c. 17.

Cord. ob.
serv. l. 3. c. 1.

Heer in ob-
servationis
bus.

Ulmus. stioris folliculi, quod alteri paulo minori aptatur inversum, sic liquor commode exstillat. Alii ad solis radios destillant; vel quia liquor ipse diu non durat, oleum parant; sed quod in vulnere simplici minus profuisse Fallopius expertus est. Sordescit inde vulnus, & impeditur, quæ intenditur, glutinatio. Ex cortice conficiuntur lagenæ. In *Alsatia* prope Polvillam arcem in sepibus observavit *singularem* ejus *speciem* Bauhinus. *Folia* erant valde crebra, parva, nec articulo pollicis postremo multa majora, plurima etiam minora, rugosa minus, superiore parte nonnihil lucida, non aspera nervis exquisito ordine dispositis. Collectus & *Monspeli* talis ramus, sed foliis majoribus minus lucidis, nec tam argute dispositis nervis. Septembri gerebat folliculos. In Hispania, observante Clusio, Ulmorum juxta Thormim amnem radices, in tenuissima stamina abeunt, quæ a præterlabentibus aquis perlutæ, rubescerem colorem contrahunt. Exigua in his animalcula, locustis exiguis similia, quæ in escam piscibus capiendis colliguntur. Quæ adolescunt, avolant, & certo tempore post in aquas ad suum genus conservandum remeant. Ad *Wormatiam* in pratis & ad ripas fluminum procera evadit, nullo fructu prægnans, sed ad ædificia expetita. Huc & *illam* refer, cujus foliis averfa parte folliculi adnascuntur, *Tilia* mas quibusdam, *Carpinus nigra* Castori.

Clus. H. P.
l. 1. c. 8.
p. 13.

Matthiol.
in Dioscor.
l. 1. c. 95.

II. *Ulmus montana*, aliis *latifolia*, Dodonæo *secunda*, Trago *tertia*, latius se diffundit: quamquam & in altitudinem ingentem exurgere Cæsalpinus prodiderit. Cortice est eidem lævi, rufo vel maculoso. *Folia* ampla, aliquando palmum longa, uncias

quatuor vel quinque lata aspera, in quibus præter ferraturas lacinia quædam. *Julos profert*, si Matthiolum sequimur. *Dodonæus* ei adscribit *Matthiolum* lignosam & multo duriores; ideo ad cochleas & molendinorum rotas expetitam; *folia* averfa parte læviora, & dilutius virentia, quæ resiccata gratum olent: *folliculos* ex foliis nullos, *semen*, prioris satis simile.

Dodon. H.
P. pent. 6.
l. 14 c. 15.

III. Ex EXOTICIS huc spectant
1. *Arbor foliis ulmeis*. 2. *Cortex arboris ulmo similis ad Catarrhos*. 3. *Pacal Indorum*.

I. *Arbor foliis ulmi* Mexicanis *Ayacuicueramo*, *Tlacuilolquahuatl* seu *arbor picta*, & *Ocelolquahuatl* seu *arbor tigridis*, arbor est magna & comata, materie discolora; foliis ulmeis, sed gracilioribus. Materies in aquas conjecta statim mergitur; operibus tamen intestinis & torno interpellandis aptissima, longeque grato odore & adspectu. *Oleum* inde stillat styracem olens, ad omnia remediorum genera, quibus styrax congruit, perquam admodum.

Nieremb.
H. N. l. 15.
c. 54.

II. *Cortex arboris ulmo similis ad Catarrhos*, crassus est, & ex arbore ulmo tum amplitudine tum forma simili detractus. Provenit hæc ad ripas fluminis viginti quinque leucis a Lima distantis: nec alibi in America facile reperitur. *Cortex* in capitis defluxionibus in tenuissimum pulverem comminutus, naribus inditur. Sic educuntur humores. Calidus est in secundo.

Monard.
hist. simpl.
medic. c. 43.

III. *Pacal* arbor Peruana, præcedente multo minor, quæ ad cujusdam fluminis ripas nascitur. Ligniusti cineres cum sapore mixti, sædissimos lichenes in capite & aliis corporis partibus tollunt: & vetustas cicatrices emaculare dicuntur.

Monard.
hist. simpl.
medic. c. 58.

ARTICVLVS II.

De Betula.

Betula.

I.

De *Betula* nihil apud Dioscoridem occurrit: Theophrasto, cui *σμηδα*, folium habet *τῇ καλεσμένην καρύα* simile, sed paulo angustius, corticem *ποιμίλον*, & lignum *ελαφρον*. Per *τὴν καρύαν* quidam corylum intelligunt.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 14.

At notis rebus non solent addi voces *τὸ καλεσμενον*, & pyro magis similia videntur. Forte ergo transpositio facta, ut quod alno, cui coryli folium tribui debebat, betulæ adscriptum sit. Legendum potius, ἢ δὲ σμηδα καλεσμενη.

Plin. H. N.

l. 16. c. 18.
& 40.

μὲν, φύλλον ὁμοῦν ἔχει ἀπὸ τοῦ. *Plinius*
de ea breviter. Betula Gallica arbor
mirabili candore atque tenuitate, ter-
ribilis magistratum virgis. Eadem
circulis flexilis, item corbium spor-
tis. Bitumen ex ea Gallia excoquunt.
In eorum alibi genere ponit, quæ
frigidis & aquosis gaudent. Lentif-
simæ & ideo scutis faciendis aptissimæ,
quarum plaga contrahit se protinus,
cluditque suum vulnus, & ob id
contumacius transmittit ferrum. Cu-
lumella ad vinculorum usum com-
mendat.

II. *Nunc* arbor est satis procera,
sæpe etiam fruticans; *Rami* flexiles
tenuēs, multiplici libro vestiuntur,
& deorsum magna ex parte pendent.
Cortex in tenera ætate rufus aut fu-
scus, qui adolescente arbore subinde
candidior adparet, in tenuēs phily-
ras ductilis satis crassus; qui huic sub-
est interior, tenuis admodum, lævis,
ac instar membranæ pellucidus. Mi-
nimorum ramulorum puniceus aut
spadiceus est. *Folia* primo exortu
plicata sunt & crispa, viridique & her-
baceo colore tinguntur; ubi excre-
vere, saturatius virent, pingua, odo-
rata, sapore amaro. *Cæsalpinus* in-
ferne subhirsuta facit, punctis albis
distincta. *Radicibus* minora quædam
fila crassitudinis culmi triticeï adna-
scuntur, quæ sub arenis ad quadra-
ginta & amplius pedes prorepunt.
Fert *Julos* seu nucamenta longa Alni
julis similia ineunte vere, quæ semi-
nis loco sunt. Siccati certe in semi-
nium quoddam parvum compressum
ac leve fatiscunt: exque illis novæ pro-
gignuntur betulæ. Non decidunt
ante autumnum. *Schwenckfeldius*
semen paleaceum in illis Julio a ven-
to dispergi scripsit. Ex trunci medii
substantia fungi flavi, Rhabarbaro si-
miles aliquando nascuntur. Ex *cau-
dice* initiis veris, antequam folia pro-
diere, si vulneretur, limpidissimus &
copiosus liquor effluit, qui mense
Majo collectus, & soli expositus mu-
sti instar effervesceat. *Provenit* felici-
ter aquosis arenosis, & umbrosis lo-
cis. In Brabantia adeo sterilibus lo-
cis, ut ne herbam quidem producant,
viget egregie. Circa Basileam ma-

gna est: in sylva Hercinia pumila, Betula.
Montbelgardi in horto in maximam
altitudinem excrevit. Sonii saltus ac-
colæ fago cæsa subnasci ex eodem
trunco betulam constanter adfirmant.
Duas aut tres fagos ita cum betula
connexas, ut ex eodem trunco vide-
rentur pullulasse, scribit *Goropius*.
*Ufus ligni, corticis, virgarum, folio-
rum, succi* pinguis liquoris & fungo-
rum egregius tam in Medicina, quam
in aliis. *Lignum* ad quasillos plecten-
dos, & circulos doliarios expetitur.
Cremati liquorem albugines & cica-
trices oculorum delere scribit *Lobe-
lius*: sed vide, ne ejus usu pecces. Ex-
usti carbonēs diu vivacem ignem re-
tinent, ideo ab Ananiis ad liquanda
metalla expetuntur. Ex crassiore axes
& absides fiunt. *Cortex*, quia bitumi-
nosus, excalefacit, emollit, resolvit,
delibratus contortusque faces ad no-
cturna lumina suppeditat: oris ulce-
ra & maculas abstergit, si ex usto li-
xivium paretur; idem caseos a ver-
mibus innoxios præstat. Piscatores
Northumbri delibratum, fisso bacillo
interpositum accensumque ad pi-
scationes nocturnas adhibent. Relin-
quitur & balistariis. Ex philyris bal-
neum contra scabiem paratur. *Virgis*
nihil ad scoparum usum frequentius;
nihil in scholis trivialibus magis tri-
tum. Sed & in foro adhibentur, pel-
lendis ex urbe facinorosis. Et tales uri-
næ incontinentiam tollunt, si ægrum
semel duntaxat ferieris. Impotentiam
a maleficio solvunt, *Helmontio* pro-
dente, tenelli & subnigricantes ramu-
li, qui gemmas tumentes habent, si
conquassati, cum cerevisia fermenta-
ti, propinentur, liquore ex ramis
superioribus admisto. Ventriculi pe-
corum quibus coagulum lactis nostri
parant succo macerati, caseos a ver-
mibus afferunt. Elegantissimum de
illis Generosi *Matthiæ Gloskovii Ca-
merarii Calissiensis* in majore Polonia,
amici nostri sub nomine *Betulæ* car-
men habet. *Folia* quia amara, exca-
lesciunt, abstergunt, & attenuant.
Sanant oris maculas & papulas, si
aqua ex iis destillata fuerit. Ex deco-
ctis in aqua cum alumine, quidam lu-
teum colorem parari tradunt pro pi-
ctori.

Goropius
Becanus in
Niloscopio.

Schwenckf.
in *H. P. Si-*
lesia.

Helmont,
de *Lithiassi*
c. 8.

Berula.

Storibus. *Succus pinguis*, quem vel virentes ramuli mittunt, vel scopæ aridæ super pelvim accensæ stillant, oculorum rubores, canthis immixtus discutit: & lumbrices enecat, si linteolum immersum umbilico imponatur. *Liquor*, qui crescente luna colligi debet, soli tam diu ut effervescat

expositus, per totum fere annum servari potest, calculos & morbum regium pellic; faciei maculas, & oris papulas collutu tollit; hydropicis levamentum, si sæpius cum aqua sambuci bibatur. In abstergendis vulneribus laudabile remedium. *Fungis* sanguinis fluxus compescere suetum.

ARTICVLVS III.

De Alno.

Alnus.

TABULA

CXXIII.

Theophr.

H.P. l. 3. c. 7.

& 14.

I.

Alnus Theophrasto & Plinio *μολογενής* quid, & facillime augescens. *Radix* ei summa nec major quam lauri rectum, *lignum* molle, *medulla* iidem, ὥς ἐστι δι' ὅλης κοιλίας διεσπασμένη. *Cortex* scaber ru-

fusque intus. *Folium* crassissimum, ὁμοίον ἀπρίω, vel potius κατὰ ἡγεμονίαν τινὴ (cum pyro non magnam habet similitudinem) sed amplius & nervosius. Germinat post favonium. *Fructus* Plinio nullus aut semen; Theophrasto semen autumno reddit: ἀναρπός tamen, non tam quod inconspicuum ferat, quam quod inutile esui. Malim tamen ἐγναρπὸν scribere, ut experientia ostendit, falsusque est Aristoteles, qui, quod in Creta fructum ferat, inter miracula posuit. *Natale* folium si spectes, inter ἀμύβλια reponit.

Provenit in ἐρύδους & planis: ita ut dubie scripserit Plinius, nonnisi in aquosis provenire. *Radix* & caudicis tantum aliquid in aqua, reliquum totum corpus extra patescit. *Ufus ligni* in ædificiis. Habet in se, inquit *Vitruvius*, egregias rationes. Etenim aëre est & igni plurimum temperata, non multum terreno, humore paulo. Itaque quia non nimis habet in corpore humoris, in palustribus locis infra fundamenta ædificiorum palationibus crebro fixa, recipiens in se quod minus habet in corpore liquoris, permanet immortalis ad æternitatem, & sustinet immania pondera structuræ, & sine vitiis conservat. Ita quæ non potest extra terram paulum temporis durare, ea in humore obruta, permanet ad diuturnitatem. Contra erumpentium amnium impetus, riparum muro in tutela ruris excubare, in aqua

fatat, cæsasque densius innumera hærede prodesse, Plinius dixit. Cur extra aquas putrescat, sub aquis immortalis permaneat, disquirat alicubi Theophrastus.

II. Nobis duplex Alnus erit, *Julifera* nempe & *Baccifera*.

I. *Alnus julifera*, quadruplex est, 1. *Rotundifolia glutinosa viridis*. 2. *Folio oblongo viridi*. 3. *Folio incano*. 4. *Alpina minor*.

1. *Alnus julifera rotundifolia glutinosa viridis*, Crescentio Amedanus, p. 151. Cretenſibus *Schlitro*, aliis *Alnus vulgaris*, arbor est justæ magnitudinis, ramosa, cortice scabro, fusco, ligno molli rufescente. *Rami* fragiles valde, quibus cortex ex fusco subcinereus maculatus, interne luteolus saporis amari & ingrati; *lignum* intus album & medullosum. *Folia* lata, avellanæ vulgaris, rotundiora, nervosa, splendentia, lento & viscido humore obsita. *Oculi* triangulares, rufi ex cinereo, interdum & virides, in purpuram aliquando quodammodo vergunt. In ramulorum fastigiis *micamenta* seu *Juli*, virentes vel rubentes, unciam circiter longi, & fragiles antequam commissuræ conferruminatarum particularum dehiscant: quæ ubi se explicuerint, duas etiam uncias longitudine superant, sapore adstringente cum aliqua amaritudine. Mense Septembri minimorum rudimenta adparent, quo etiam veteres *coni*, *bini*, *terni* aut *quaterni* pulcre hiantes & aperte de privatis ramulis pendent. Eo tempore vel paulo ante videas novos, parvæ avellanæ magnitudine, primo virentes, ubi maturescunt rubentes mox, hiantes, qui

Bauhin. H. P. l. 8. c. 6. Stapel. Bot. datus ad Theophr. l. 3. c. 14. p. 221.

Plin. H. N.

l. 16. c. 18.

Theophr.

H.P. l. 9. c. 9.

Vitruv. in

Archit.

Plin. H. N.

l. 16. c. 37.

ex

ex imbricata squammarum compage congeruntur; e quibus & ante *seminis* maturitatem stamina purpurea prominula quædam observata, quæ fortasse florum loco haberi possent. In iis & *semina* parva admodum; compressa inæqualia rubentia, quibus *medulla* alba, pauca, insipida. Habetur in conis & pulvis arenosus. Observata ad radices & *excrecentia* ramosa. Uvæ quercinæ similis. *Occurrit* passim, humectis & uliginosis locis, & opacis vallibus. Rarior est in Gallia & Italia. Basileæ Majo viret cum fructu, Augusto conis & nucamenta visuntur. In Sundgovia mense Martio cum conis veteribus, novorum rudimentis & julis simul observavit Bauhinus. Communiter tamen fructus Septembri *maturescit*. *Seritur* ex semine, in sepibus pratorum commodissime, quia felix graminis sub ejus umbra proventus, foliaque decidua impinguant solum. Tonsa densior fit & ramosior. *Usus* suum habent *materies*, *cortex* & *folium*. *Materies* difficulter ardet, commendatur a multis ad navalia, inservit & usibus culinariis futorumque formis. Abit artificio in lapidem. Immergitur aquæ, in qua lupulus ad cerevisiam coquitur; exemptus arena vel glareâ obruitur ad triennium. Cotes ex tali fiunt, quo mensarii ad ferramenta acuenda utuntur. *Cortex* cum siccitate quadam refrigerat & adstringit. Imponitur incipientibus inflammationibus, & oris tonsillarumque tumores sedat. Maceratus cum veteri ferro in aqua, nigrum & atramenti similem præbet colorem. Ex eodem cum fructu viridi, gummi & chalcanto atramentum scriptorium conficitur. Interior, qui nonnihil rubens, cum momento aluminis in vino coctus gingivas corroborat, doloresque dentium lenit. *Folia* viridia tumores discutunt; rore madentia cubiculis inspersa, pulices fugant, si post horæ spatium amoveantur. Mos tabellariis calceis imponere, caloris & lassitudinis levamen. Curtius vulnere ad cicatricem perducere scribit, si imponantur.

2. De *Alno julifera folio oblongo* *Alnus*, viridi nihil occurrit, præter foliorum diversitatem. Observata est locis aquosis inter Mutetam & Münchensteinium ditionis Basileensis a Bauhino.

3. *Alnus julifera folio incano*, in Bauhin. l. 9. Matthiolo *hirsuta*, arbor est vulgari minor, foliis longioribus acuminatioribus, & majoribus per ambitum incisuris subnigris. Mollia sunt superne ob exiguam vixque conspicuam lanuginem, quæ aversa parte copiosior, *juli* vulgari breviores; *fructus* oblongus. *Reperitur* in Helvetia juxta pagum Hünningen ad Rhenum; inter Brisacum & Burckenheimium, Genevæ, circa Montbelgardum humidis præcipue locis, in Burgundia ultra pontem rigidum cum julis & nuculis, quos Septembri habet. Simile huic, si non idem *genus* illud, quod in Austriæ & Styriæ montanis, circa flumina, & in Danubii insulis provenit, & a Clusio sub *Alni* alterius nomine describitur. *Cortex* candidior est; *folia* minora & candicant inferne, juli & strobili minores. Rustici albam alnum adpellant.

4. *Alnus Alpina minor*, cum prima quidem convenit, sed per omnia minor est & humilior, nec folia ita humore lento adpersa sunt.

II. *Alnus baccifera* est triplex 1. *Nigra vulgaris*. 2. *Pumila*. 3. *Polycarpos*.

1. *Alnus baccifera nigra vulgaris*, Dodon. Crescentio *Avornus*, Dodon. & aliis *Frangula*, Bellon. *Jovis barbæ species*, Lonicero, *Arbor fætida*, quibusdam *Siler* Plinii, arbor est mediocris proceritatis. *Virgæ* plurimæ X. aut XII. pedes altæ, pollicaris crassitudinis, in alias virgulas dividuntur. *Cortex* exterior tenuis, niger, glaucis maculis adpersus; interior, luteus. *Lignum* candidum & fragile; *medulla* ex rubro nigricans. *Folia* alni vel cerasi nigriora tamen & paulo rotundiora, oblonga & magna in tenera, & si solo pingui conferitur, prodeunt primo vere. *Flosculi* inalbescant, & Apri-

Alnus. & Aprili funduntur. *Baccæ* sunt rotundæ magnitudine piperis, in quibus fissuræ quædam quasi ex duabus in unum coaluissent, primo virides, dein rubræ, tandem nigræ. Maturescunt Augusto. *Nascitur* frequens in sylvis udis & humidioribus locis, Angliæ, Belgii, Germaniæ, Poloniæ &c. *Ufus* interioris corticis apud rusticos loco rhabarbari in purgando. Deji-

cit cum magna ventris perturbatione per alvum & vomitum crassos, lentos, pituitosos & biliosos humores.

2. *Alnus nigra pumila* mentionem Thalius in sua sylva facit Thalius, descriptione non addita.

3. *Alnus nigra polycarpus*, Lonicero *Kreuzbeer*. Copiosos fert fructus.

ARTICULVS IV.

De Populo.

Populus.

Vid.

TA B.
CXXIII.

Theophr.
H. P. l. 1. c. 8.
16. l. 3. c. 4.
6. 7. l. 5. c. 1.
Plin. l. 16.
c. 18.

I.

Populi nulla apud Dioscoridem descriptio; vires duntaxat exponit.

Apud Theophrastum & Plinium, hinc & inde nonnulla invenies. Facilis est auctu, *Cortice* carnosio, *ligno* dum uritur fumido. *Folia* *ἐτεροχίμωνα*. Orbiculantur nova, vetera *γωνοειδῆ* evadunt. *Amat* plana, lucos, aquosa, *καθύγρα*, & *ἐλώδη*: ideo male Plinius in montibus posuit. *Triplex* iisdem est, *Alba* nempe, *Nigra*, & *Lybica*, seu *Alpina*. I. *Populus alba*, *ὀρεοφυῖς* est, minus celsa quam nigra, & lævior. Lignum cum cæditur *τῇ λευκότητι* nigræ persimile; nec foliorum *χῆμα* abscedit, erumpentium nimirum. Neutra florem

Plin. H. N.
l. 16. c. 23.

habere videtur. Addit Plinius, folio bicolore, superne candicantem, inferiore parte viridem: Numerosius idem, grandissima lanugine, quæ evolat ut julus; quod multum a veritate abludit. Nec constat Theophrastus sibi, cum modo albam *λειοφλοιοτέραν* καὶ τὸ ὅλον εὐτροφώτεραν scribit; modo nigram, *μακρότεραν καὶ λειότεραν*. Dioscorides *σφαιρίων* prima foliorum germinatione meminit. Adnascitur & muscus. Surrexit Stagiris in Museo prociua. Similis nigræ in senecta evadere dicitur, quod *ἐξαγχεῖσθαι* Theophrasto, καὶ φύλλοις καὶ τῇ ὅλῃ προσοίσει, adspectu videlicet, non tota, specie, ut a Gaza versum. Circumaguntur etiam ei folia, post solstitium: nec alio argumento certius intelligitur sy-
dus confectum. Aquarum est præ-
avida; nec modo avulsione, sed &
summis ramis facillime pullulat. Si

Theophr.
de Caus.
plant. l. 5.
c. 8.

Theophr.
H. P. l. 4.
c. 19.

Theophr.
de Caus.
plant. l. 2.
c. 21. l. 3.
c. 6.

quis grandem cum arbore se exæquantem transtulerit, optime perdurat. *Ufus ligni, corticis, & foliorum* aliquis. Temperaturæ ex aqueo tempore & terrena extenuata constitutione, mista facit Galenus. *Lignum* vitibus placet; & quia lentissimum scutis faciendis aptissimum erit. *Cortex* potus ischiadicis & stranguriæ prodest; & conceptum impedit, Nec defuere, qui memoriæ proderent, in tenuia frustra concisum, ac stercoratis areolis sparsum, quavis anni tempestate edules fungos proferre. *Foliorum* succus calidus aurium dolori confert. Corona ex frondibus sola athletis utilis. II. *Populus nigra*, Græcis *αἰγίρος*, (interpretes Herodoti & Strabonis male *alnum* vertunt) *μάκρῃ* Homero arbor, & alba celsior. Fert foliis guttam, ex qua apes propolin faciunt. Et *σπέρμα* & *κόπκον* ei *Ægineta* adscribit, quod de primo resinoso germine forte sumendum est. Dioscorides resinam vocat. Unde Plinius incogitanter exiguum resinam fundere dixit. Colligi hæc non *δέρεσιν* sed *ἡρεσιν* debet. Arcades sterilem putavere, in montibus: sed fructificat in Creta, ubi laudatissima, cuius & Hippocrates meminit. Una apud aditum speluncæ Ideæ, in qua *τὰ ἀναδέματα* Deo consecrata servantur: altera parva, quæ ab ea proxima stat; ad fontem quendam Sauridictum pleræque, in monte Cedrio, & circa

Plin. H. N.
l. 24. c. 8.
Dioscor. M.
M. l. 1.
c. 109.

Artemid.
l. 2. c. 25.

Homer.
Odys.

Hippocr. l.
1. de morb.
mulier.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 5.

inde adlatam prodidit Theophrastus. *Ufus foliorum, seminis, & resinæ* in Medi-

Dioscor. M.
M. l. 1. c. 13.

Folia, quæ in primo recessu calida, ita tamen, ut ad ficcitatem deflectant cum partium subtilitate, ex aceto imposita podagricis doloribus opitulantur. Ex *resina* verno tempore *unguentum ægiri- num* paratur. Foliis & floribus calidior, acopis & malagmatibus miscetur, quæ fœtus pellendo adhibentur. *Semen* quod subtilissimarum partium est, nec tamen admodum calefacit, ex aceto potum Comitilibus utile est. Adde his humorem e cavis arboris effluentem, qui verrucas papulasque & attrita corporis tollit. Emittere eundem, dum accensa uritur, vel dum castratur. III. *Populus Lybica*, ut Plinius vocat, *Alpina*, ut Gaza vertit, *κέρκισ* seu *κέρκισ* est Theophrasti, populo albæ non est absimilis, cum magnitudine, tum quod ramis albicantibus spargitur. *Cortex* asperior, καὶ μᾶλλον ὑπόλευρος, ut pyro sylvestri. *Folia* sunt hederæ, sed partim angulosa, partim oblonga & in acutum fastigiata; colore parte supina pronaque fere simili, (folii utraque pars ejusdem est coloris, sed superior intensioris) pediculo longo & gracili pendentia, ideoque non recto, ἀλλ' ἐγκυρμένω. Plinius addit, minimam folio ac nigerrimam, fungisque enascentibus laudatissimam. Nigerrimam ad albam licentiosius dixit: fungi, si Dioscoridem sequimur, ad istam pertinent; sed si legerimus, *nigerrimam evanescentibus fungis*, salvabitur Plinius. Nam autumni fine, non amplius erumpentibus fungis, arbores totas, priusquam folia decident, pene nigra fronte vestitas videas. Sunt, qui *Cratægum Theophrasti*, de qua alibi, eandem cum ista faciunt.

II. RECENTIORIBVS est Populus quadruplex. 1. *Alba*. 2. *Nigra*. 3. *Tremula*. 4. *Rotundifolia Americana*.

I. *Populus alba* est duplex, *majoribus* nempe & *minoribus foliis*.

Bodeus ad
Theophr.

I. *Populus alba majoribus foliis*, *Cordo Farfarius antiquorum*, Arabi-

bus *Haur*, arbor est facilis auctu, & cito in altitudinem adsurgit, ramosaque evadit. *Caudex* crassus, *cortex* albicans ac lævis. *lignum* candidum, quodque haud difficulter finditur. Fert in primo foliorum germinatu gemmas. *Folia* omnium maxima, in acuminatas circum rotas lacinias divisa, superne cum atro virore lanuginosa, inferiore parte denso tomento incano pubescunt, quo etiam cum pediculis longis ramuli obferuntur. Ante horum exoritur fert catulos, & salicis modo edit, observante Lobelio; qui Tabernomontano villosi & ex purpureo fusci. *Nascitur* in locis uliginosis, humectis, & flumina. Provenit & in monte Baldo Calceolario prodente. Turnerus nunquam se in Anglia vidisse meminit. *Folia* decocta torminibus medentur, & ambusta sanant. Lanugo ad fluxum sanguinis commendatur, sed molliter evellenda vel abradenda. Quia annosa crispum *lignum* habet; fluviorumque fluxus ac cursus mentitur, commodissima est ædificiis. Mensæ & spondæ ex ea ditioribus.

2. *Populus alba minoribus foliis*, folis his a prædicta differt. Frequentissima in Brabantia & circa Bafileam qua itur ad novam domum.

II. *Populus nigra* in altum quoque se attollit, estque procerior. *Ramuli* potissimum albicant; *Cortex* lævis exalbidus ac incanus. *Materies* dura, pallefcens, minus quam in alba sessilis, flavior, nervosior, ac difficilior diffinditur, levissima est, cum aruit. Prima *germina* futurorum foliorum rudimenta oblonga, hordeaceo grano majora, pingue oleosum & resinosum quiddam continent, digitis adhærescens, colore flavo, ad luteum accedens, odore suavi, quod majoribus factis & in folia jam abeuntibus perit. Oculos alii vocant. *Folia* hederaceis similia, ex rotundo mucronata, serrata, atro virore splendentia longis pediculis adpenduntur. Producit & *julos* in

Populus.
H. P. l. 3.
c. 14. p. 219.
Bauhin. H.
P. l. 8. c. 8.
p. 160.

Lobel. ob.
serv. p. 441.
Tabernom.
H. P. l. 3.
c. 37. p. 707

Goddin. in
Chirurgia
militari.

Bauhin. H.
P. l. 8. c. 8.
p. 160.

Populus. longo racemo coacervatos, lanugine ubi dehiscunt alba plenos. Quædam, observante Bauhino ante exortum foliorum floret, at fructum non fert. Flos instar amenti colore rubente aut candicante. Quædam fructum fert seu julos racematim compactos, multis rotundis & viridibus granis constantes (*uva Populi* aliquibus) in quibus *lanugo* candida in pappos avolans, cui pauca semina valde minuta adpenſa sunt. *Nascitur* passim locis aquaticis, in Italia ad Padi ripas, & Baldo monte; in Helvetia circa Basileam ad elices aquarum, quibus prata & pomaria irrigantur. In Anglia minus frequens est. Visa circa Biningam pagum cum suis racematis feminibus. *Usus* si spectes, calidam omnes in primo faciunt: solus Amatus Lusitanus frigidam voluit, quem Bauhinus egregie refutat. *Oculi* unguentum populeum ingrediuntur. Illinitur podagris calidis felicissime; conciliatque somnum, sinaribus temporibus & arteriis illinatur. Inveteratum perdit vires. Ex iisdem odoratis unguentum paratur ad capillorum polituram. Impostores incoctas atramento populneas assulas ad capsulas speculorum pro Ebena vendunt. Vernice undulato tinctum lignum longe elegantius crispitudinem undulatam ostendit.

III. *Populus tremula*, Plinio *Lybica*, Gaza *Alpina*, Clus. *Cercis Theophrasti* est *ῥαυχὴς*. Radices reptando late se propagant. *Cortex* partim nigricat, partim albicat. *Folium* brevius quam nigrae, per ambitum crenatum, superne parte virens, inferna ex cinereo candicans ac prope mo-

dum glaucum. Matthiolus albis punctis adpersum notat. In extremo ramo magis est angulosum, subtus incanum. Tremet continuo, sudo etiam celo. Fert & *nucamenta* uncias circiter quinque longa, lanuginosa, cinerei & fusci coloris, arundinaceæ jubæ porciunculis similia: quibus subsunt verticillatim quodammodo apices perpusilli, albidii. *Oculi* acuti, nitidi, spadicei. E semine suo reviviscere Tragus prodidit. *Familiaris* est toti Germaniæ, Bohemiæ & Poloniæ. In Sundgovia prope Basileam cum plurimo visco observata, protulitque julos ante folia Martii fine. *Usus ligni corticis & nucamentorum.* *Lignum*, quia candidissimum & levissimum, expetitur a tornatoribus; præbetque commodissimum ad tormentarium pulverem carbonem. *Cortex* junior, quia facillime ardet, facium Passavantii materia. *Nucamenta* Aprili collecta, aceto macerata, contra hæmorrhagiam naribus induntur.

IV. *Populus rotundifolia Ameri-* Lobel. ad *cana*, Bauhino *Populus novi Orbis* verſ. p. 441. ab Anglis adlata est. *Virgulta* sunt aliquantum flexuosa, & per semipalmum palmumque crebra, geniculata, velut insertione commissuraque partium nodosa: Unde exeunt e singulo pediculo singula *folia*, ora exquisite rotunda, nec uspiam, nisi qua pediculis hæret intercisâ, crassa, rigida, latiora Arboris Judæ: cui *Populi* alternatim exeunt prælongi loruli, stipati acinulis multis exiguis, plane *Populi* ritu, gustus adstringens, aliquantum calefaciens, sub-salsus.

CAPVT IV.

De Arboribus miscellis Classis quarta.

ARTICVLVS I.

De Salice.

I.

Salix.

TAB.
CXXIV.
—CXXVI.

Arbores Classis quartæ sunt *Salix* facilis, caudice brevi & *σπολιώτερος*. & *Spiræa*. *Salix* arbor auctu Germinat mature, prout τὰ ἀναγκα

καί

Theoph. καὶ ἀλωὶν faciunt. *Folia* an amittat,
H.P. l. 1. 8. varia olim sententia. *Fructum* ocys-
& l. 3. c. 4. sime amittit, & quidem πρὸ τῆς τελείας
6. 7. ἀδρύναι καὶ πέσαι, antequam omnino
maturitatem sentiat, ob id dicta Ho-
mero *frugiperda*, secutaque ætas sce-
lere suo interpretata est hanc senten-
tiam, quando semen salicis mulieri
sterilitatis medicamentum esse con-
stat. Sed in hoc quoque provida na-
tura facile nascenti & depacto surcu-
lo, incuriosius semen dedit. Una ta-
men pròditur ad maturitatem perfer-
re solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Jovis speluncæ, torvum li-
gneumque magnitudine Ciceris. Abit
ante maturitatem in *araneam*, quæ
nihil aliud, quam spuma albicans. *Suc-
cus* ei secundum Plinium in *cortice* trium
generum. *Unum* arbor ipsa exsudat
gummi modo. *Alterum* manat in pla-
ga cum floret exciso cortice trium di-
gitorum magnitudine. *Tertius* suc-
cus est detruncatione ramorum a falce
destillans. *Locum* si spectes, ancipi-
tis vitæ censetur. Provenit ἐν γῇ διελ-
ματώδει, aquosis & palustribus, & in
lacu Orchomenio; provenit & in pla-
nis. In Theneo Arcadiæ, ὡς περ ἐξερ-
ράγη τὸ συναθροισθὲν ὕδωρ ἐν τῷ πεδίῳ
φραχθέντων τῶν βερέθρων, ubi prope a
loco inundato salices steterant, ibi se-
cundo anno sole resiccato iterum pro-
diere. *Usus ligni, corticis, foliorum,
succis, florum & fructus.* Ex ligno quia
lentum, leve, & rarum, ideoque istum
contrahit plagam, scuta parantur. *Cor-
ticis* cinis illitus cum aceto verrucas
extirpat & clavos. Siccioris tempe-
raturæ, quam alia. *Folia* quia adstri-
ctoria cruenta vulnera glutinant; cum
aqua sumta conceptum impediunt, &
libidinis intemperantiam coercent, at-
que in totum auferunt usu sæpius sum-
ta. Iisdem in vino cum cortice deco-
ctis foveri artus utilissimum. *Succus*
cum rosaceo in calyce Punici calefa-
ctus, infunditur auribus. *Floribus*
ea desiccatio ut mordacitate careat,
& egregia adstrictio. Tritus cum fo-
liis furfures purgat in facie. *Fru-
ctus* epotus sanguinem exspuentibus
prodest. Pabulo pecudum admixti
pingues faciunt idem. Et paucis dicam.
Nullius tutior est reditus minorisque

impendii, aut tempestatum securior. *Salix.*

Tertium ei locum in æstimatione ruris
Cato attribuit, prioremque quam oli-
vetis, quamque frumento aut pratis.
Nec quia desint vincula, sed quia fa-
lici præcipua dos. Cædua vero ei fer-
tilitas, densior tonsura ex brevi pugno
(cuneo alii legunt) quam ramo, non
ut remur, in novissimis curanda ar-
bore. Diversa ejus apud Theophras-
tum, Plinium & Columnellam genera.

Theophr.
H. P. l. 3.
c. 13.

I. *Theophrasto*, cui πολυειδής est tri-
plex 1. *Nigra*, quæ cortice nigro aut
puniceo tegitur, virgasque pulcrio-
res καὶ χρησιμωτέρας εἰς τὸ πλέκειν ge-
rit. 2. *Candida*, cui candidus cortex
& spissiores virgæ. 3. *Parva nigra* &
albæ communis, cui nulla εἰς ὕψος ἀν-
ξησης; quod & in cæteris arboribus
occurrit. Arcades ἐλκινὴν vocant,
existimantque fructum fecundum
eam parere. II. *Plinius*, ita de suis.

Plin. H. N.
l. 16. c. 37.

Salicis statim plura genera. Namque
& in *proceritatem* magnam emittunt
jugis vinearum perticas pariuntque
baltheo corticis vincula: & *aliæ* vir-
gas sequacis ad vincula laticis: *aliæ*
prætenues viminibus texendis specta-
bili subtilitate. Rursus *aliæ* firmiores
corbibus, ac plurimæ agricolarum su-
pellectili candidiores ablato cortice, le-
vique tractatu, vilioribus vasis quam
ut e corio fiant, atque etiam supina-
rum in delicias Cathedrarum aptissima.
(Tales sunt, in quibus ignavæ sedent
totos dies mulierculæ, & cum iis mol-
les ac effeminati viri) Finditur *Græ-
ca* rubens, (quæ flava sunt ad rube-
dinem dilutam vergunt) *Gallica* ut &
amerina, haud paulo flexibilior, (ita
lege, non, haud paulo fragilior) ideo
solido ligat nexu. (Hujus *folia*, teste
Hippocrate, cum nigro vino pota ad
uteri purgamenta faciunt. Trita &
in aceto cocta ægilopas perfrant: In
aqua decocta donec colorem mutave-
rint, Trallianus in anginis ad gargari-
zandum dabit.) In *Asia* tria genera
observant, *Nigram* utiliorem vimini-
bus: *Candinam* agricolarum usibus:
tertiam, quæ brevissima est, *Helicen* vo-
cant. Apud nos quoque, addit, mul-
ti totidem generibus nomina impo-
nunt. *Vimineam* vocant eandem pur-
puream. (Græci purpureum non raro

M m m

μέλαν

Theophr. καὶ ἀλωὶν faciunt. *Folia* an amittat,
H.P. l. 1. 8. varia olim sententia. *Fructum* ocys-
& l. 3. c. 4. sime amittit, & quidem πρὸ τῆς τελείας
6. 7. ἀδρύναι καὶ πέσαι, antequam omnino
maturitatem sentiat, ob id dicta Ho-
mero *frugiperda*, secutaque ætas sce-
lere suo interpretata est hanc senten-
tiam, quando semen salicis mulieri
sterilitatis medicamentum esse con-
stat. Sed in hoc quoque provida na-
tura facile nascenti & depacto surcu-
lo, incuriosius semen dedit. Una ta-
men pròditur ad maturitatem perfer-
re solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Jovis speluncæ, torvum li-
gneumque magnitudine Ciceris. Abit
ante maturitatem in *araneam*, quæ
nihil aliud, quam spuma albicans. *Suc-
cus* ei secundum Plinium in *cortice* trium
generum. *Unum* arbor ipsa exsudat
gummi modo. *Alterum* manat in pla-
ga cum floret exciso cortice trium di-
gitorum magnitudine. *Tertius* suc-
cus est detruncatione ramorum a falce
destillans. *Locum* si spectes, ancipi-
tis vitæ censetur. Provenit ἐν γῇ διελ-
ματώδει, aquosis & palustribus, & in
lacu Orchomenio; provenit & in pla-
nis. In Theneo Arcadiæ, ὡς περ ἐξερ-
ράγη τὸ συναθροισθὲν ὕδωρ ἐν τῷ πεδίῳ
φραχθέντων τῶν βερέθρων, ubi prope a
loco inundato salices steterant, ibi se-
cundo anno sole resiccato iterum pro-
diere. *Usus ligni, corticis, foliorum,
succis, florum & fructus.* Ex ligno quia
lentum, leve, & rarum, ideoque istum
contrahit plagam, scuta parantur. *Cor-
ticis* cinis illitus cum aceto verrucas
extirpat & clavos. Siccioris tempe-
raturæ, quam alia. *Folia* quia adstri-
ctoria cruenta vulnera glutinant; cum
aqua sumta conceptum impediunt, &
libidinis intemperantiam coercent, at-
que in totum auferunt usu sæpius sum-
ta. Iisdem in vino cum cortice deco-
ctis foveri artus utilissimum. *Succus*
cum rosaceo in calyce Punici calefa-
ctus, infunditur auribus. *Floribus*
ea desiccatio ut mordacitate careat,
& egregia adstrictio. Tritus cum fo-
liis furfures purgat in facie. *Fru-
ctus* epotus sanguinem exspuentibus
prodest. Pabulo pecudum admixti
pingues faciunt idem. Et paucis dicam.
Nullius tutior est reditus minorisque

Theophr. καὶ ἀλωὶν faciunt. *Folia* an amittat,
H.P. l. 1. 8. varia olim sententia. *Fructum* ocys-
& l. 3. c. 4. sime amittit, & quidem πρὸ τῆς τελείας
6. 7. ἀδρύναι καὶ πέσαι, antequam omnino
maturitatem sentiat, ob id dicta Ho-
mero *frugiperda*, secutaque ætas sce-
lere suo interpretata est hanc senten-
tiam, quando semen salicis mulieri
sterilitatis medicamentum esse con-
stat. Sed in hoc quoque provida na-
tura facile nascenti & depacto surcu-
lo, incuriosius semen dedit. Una ta-
men pròditur ad maturitatem perfer-
re solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Jovis speluncæ, torvum li-
gneumque magnitudine Ciceris. Abit
ante maturitatem in *araneam*, quæ
nihil aliud, quam spuma albicans. *Suc-
cus* ei secundum Plinium in *cortice* trium
generum. *Unum* arbor ipsa exsudat
gummi modo. *Alterum* manat in pla-
ga cum floret exciso cortice trium di-
gitorum magnitudine. *Tertius* suc-
cus est detruncatione ramorum a falce
destillans. *Locum* si spectes, ancipi-
tis vitæ censetur. Provenit ἐν γῇ διελ-
ματώδει, aquosis & palustribus, & in
lacu Orchomenio; provenit & in pla-
nis. In Theneo Arcadiæ, ὡς περ ἐξερ-
ράγη τὸ συναθροισθὲν ὕδωρ ἐν τῷ πεδίῳ
φραχθέντων τῶν βερέθρων, ubi prope a
loco inundato salices steterant, ibi se-
cundo anno sole resiccato iterum pro-
diere. *Usus ligni, corticis, foliorum,
succis, florum & fructus.* Ex ligno quia
lentum, leve, & rarum, ideoque istum
contrahit plagam, scuta parantur. *Cor-
ticis* cinis illitus cum aceto verrucas
extirpat & clavos. Siccioris tempe-
raturæ, quam alia. *Folia* quia adstri-
ctoria cruenta vulnera glutinant; cum
aqua sumta conceptum impediunt, &
libidinis intemperantiam coercent, at-
que in totum auferunt usu sæpius sum-
ta. Iisdem in vino cum cortice deco-
ctis foveri artus utilissimum. *Succus*
cum rosaceo in calyce Punici calefa-
ctus, infunditur auribus. *Floribus*
ea desiccatio ut mordacitate careat,
& egregia adstrictio. Tritus cum fo-
liis furfures purgat in facie. *Fru-
ctus* epotus sanguinem exspuentibus
prodest. Pabulo pecudum admixti
pingues faciunt idem. Et paucis dicam.
Nullius tutior est reditus minorisque

Dioscor. καὶ ἀλωὶν faciunt. *Folia* an amittat,
M. M. l. 1. 8. varia olim sententia. *Fructum* ocys-
c. 136. sime amittit, & quidem πρὸ τῆς τελείας
ἀδρύναι καὶ πέσαι, antequam omnino
maturitatem sentiat, ob id dicta Ho-
mero *frugiperda*, secutaque ætas sce-
lere suo interpretata est hanc senten-
tiam, quando semen salicis mulieri
sterilitatis medicamentum esse con-
stat. Sed in hoc quoque provida na-
tura facile nascenti & depacto surcu-
lo, incuriosius semen dedit. Una ta-
men pròditur ad maturitatem perfer-
re solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Jovis speluncæ, torvum li-
gneumque magnitudine Ciceris. Abit
ante maturitatem in *araneam*, quæ
nihil aliud, quam spuma albicans. *Suc-
cus* ei secundum Plinium in *cortice* trium
generum. *Unum* arbor ipsa exsudat
gummi modo. *Alterum* manat in pla-
ga cum floret exciso cortice trium di-
gitorum magnitudine. *Tertius* suc-
cus est detruncatione ramorum a falce
destillans. *Locum* si spectes, ancipi-
tis vitæ censetur. Provenit ἐν γῇ διελ-
ματώδει, aquosis & palustribus, & in
lacu Orchomenio; provenit & in pla-
nis. In Theneo Arcadiæ, ὡς περ ἐξερ-
ράγη τὸ συναθροισθὲν ὕδωρ ἐν τῷ πεδίῳ
φραχθέντων τῶν βερέθρων, ubi prope a
loco inundato salices steterant, ibi se-
cundo anno sole resiccato iterum pro-
diere. *Usus ligni, corticis, foliorum,
succis, florum & fructus.* Ex ligno quia
lentum, leve, & rarum, ideoque istum
contrahit plagam, scuta parantur. *Cor-
ticis* cinis illitus cum aceto verrucas
extirpat & clavos. Siccioris tempe-
raturæ, quam alia. *Folia* quia adstri-
ctoria cruenta vulnera glutinant; cum
aqua sumta conceptum impediunt, &
libidinis intemperantiam coercent, at-
que in totum auferunt usu sæpius sum-
ta. Iisdem in vino cum cortice deco-
ctis foveri artus utilissimum. *Succus*
cum rosaceo in calyce Punici calefa-
ctus, infunditur auribus. *Floribus*
ea desiccatio ut mordacitate careat,
& egregia adstrictio. Tritus cum fo-
liis furfures purgat in facie. *Fru-
ctus* epotus sanguinem exspuentibus
prodest. Pabulo pecudum admixti
pingues faciunt idem. Et paucis dicam.
Nullius tutior est reditus minorisque

Plin. H. N. καὶ ἀλωὶν faciunt. *Folia* an amittat,
l. 24. c. 9. varia olim sententia. *Fructum* ocys-
sime amittit, & quidem πρὸ τῆς τελείας
ἀδρύναι καὶ πέσαι, antequam omnino
maturitatem sentiat, ob id dicta Ho-
mero *frugiperda*, secutaque ætas sce-
lere suo interpretata est hanc senten-
tiam, quando semen salicis mulieri
sterilitatis medicamentum esse con-
stat. Sed in hoc quoque provida na-
tura facile nascenti & depacto surcu-
lo, incuriosius semen dedit. Una ta-
men pròditur ad maturitatem perfer-
re solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Jovis speluncæ, torvum li-
gneumque magnitudine Ciceris. Abit
ante maturitatem in *araneam*, quæ
nihil aliud, quam spuma albicans. *Suc-
cus* ei secundum Plinium in *cortice* trium
generum. *Unum* arbor ipsa exsudat
gummi modo. *Alterum* manat in pla-
ga cum floret exciso cortice trium di-
gitorum magnitudine. *Tertius* suc-
cus est detruncatione ramorum a falce
destillans. *Locum* si spectes, ancipi-
tis vitæ censetur. Provenit ἐν γῇ διελ-
ματώδει, aquosis & palustribus, & in
lacu Orchomenio; provenit & in pla-
nis. In Theneo Arcadiæ, ὡς περ ἐξερ-
ράγη τὸ συναθροισθὲν ὕδωρ ἐν τῷ πεδίῳ
φραχθέντων τῶν βερέθρων, ubi prope a
loco inundato salices steterant, ibi se-
cundo anno sole resiccato iterum pro-
diere. *Usus ligni, corticis, foliorum,
succis, florum & fructus.* Ex ligno quia
lentum, leve, & rarum, ideoque istum
contrahit plagam, scuta parantur. *Cor-
ticis* cinis illitus cum aceto verrucas
extirpat & clavos. Siccioris tempe-
raturæ, quam alia. *Folia* quia adstri-
ctoria cruenta vulnera glutinant; cum
aqua sumta conceptum impediunt, &
libidinis intemperantiam coercent, at-
que in totum auferunt usu sæpius sum-
ta. Iisdem in vino cum cortice deco-
ctis foveri artus utilissimum. *Succus*
cum rosaceo in calyce Punici calefa-
ctus, infunditur auribus. *Floribus*
ea desiccatio ut mordacitate careat,
& egregia adstrictio. Tritus cum fo-
liis furfures purgat in facie. *Fru-
ctus* epotus sanguinem exspuentibus
prodest. Pabulo pecudum admixti
pingues faciunt idem. Et paucis dicam.
Nullius tutior est reditus minorisque

Salix. *μέλαν* nomine exprimunt) alteram *Nitelinam* a colore (nitelinus color, rufus rutilus, qualis nitelæ sive sciuri): tertiam *Gallicam*, quæ tenuissima.

Columella
R. R. l. 4.
c. 30.

III. *Columella* ex aliorum sententia tria quoque genera ponit. 1. *Sabinam*, quam plurimi vocant *amerinam*. *Gracilem* & *rutilam* virgam gerit. 2. *Græcam*, quæ flavi coloris est. 3. *Gallicam*, obsoleti purpurei & tenuissimi viminis.

II. Apud MODERNOS viginti & quinque, si non plura obveniunt genera, quæ ad aliquot summa reducimus. Est 1. *Vulgaris*. 2. *Sativa lutea folio crenato*. 3. *Folio amygdalino utrinque virente aurito*. 4. *Folio longissimo angustissimo utrinque albido*. 5. *Folio oblongo, incano, acuto*. 6. *Folio glauco & per ambitum serrato*. 7. *Humilis*. 8. *Fragilis*. 9. *Latifolia*. 10. *Pumila*. 11. *Exotica*, quo 12. & *Arbor Americana folio salicis* pertinet.

1. *Salix vulgaris* est triplex 1. *Alba arborescens*. 2. *Nigricans folio non serrato*. 3. *Rubens*.

Lugd. H.
P. l. 2. c. 72.
Bauh. H.
P. l. 8. c. 20.
p. 212.
Lobel. Ob-
serv. p.
567. Ad.
vers. p.
422.

1. *Salix alba arborescens* Theophr. & Plin. *alba*, Cordo *perticalis*, Lugd. *alba perticalis*, Bauhino *maxima fragilis alba hirsuta*, in magnam excrescit arborem. *Cortex* cineraceus aut rufescens, *vimen* fragile. *Folia* semunciam plus minus lata, duas uncias cum dimidia longa, utrinque hirsuta & incana, in extremitatibus supremarum virgarum inprimis, alternatim pendent. Aliquando superior pars prope pilis destituitur modum: serrata eadem aliquando, nonnunquam vix crenæ adparent. *Lugdunensis* oleæ similia facit, oblonga, angusta, superne virentia, inferne candicantia. *Virgis* adnascuntur multæ *florum* spicæ molles & incanæ, quæ maturitate in pappum abeunt. Gerit aliquando forte & viscum. Sed & *spuma albicans*, delapsis statim floribus, e ramusculis uvæ modo pendet, donec a ventis arrepta, hinc & inde plumæ modo impellatur. *Crescit* in locis madidis, circa prata rigua maxime. Fiunt ex ea pali ad vitium pedamenta, & stipites ad sepes firmandas. *Cortex radices* cum oleo dissolutus nigram barbam facit. Ex ligno

Matthiol.
in Dioscor.
l. 1. c. 117.

bacilli parantur, quibus in Causo raditur lingua. *Folia* pediluvio in febribus adhibentur, & cubiculis instrata aërem infrigidant.

2. *Salix vulgaris nigricans folio non serrato*, Cordo *Gallica*, Lugd. *Phænophlæos sive phænicea*, aliis *nigra*, vulgo *capillaris*, hominis est altitudine & ultra: *Cortex* palmularum colorem refert: *folium* venosum, minus serratum, *Vimina* omnium tenuissima. *Colitur* in pratorum & hortorum marginibus, Bauhinus *salicem suam rubram minime fragilem folio longo angusto* pro eadem cum *Lugdunensis* ponit. Differunt tamen. Hujus enim *cortex* intense rubet. *folia* sunt oblonga, acuta, utrinque glabra, subtus nonnihil candicantia, argutis denticulis undique crenata. *Vimen* lentum & obsequiosum. Datur & cortice minus rubente folisque latioribus.

Lugd. H.
P. l. c. p.
277. Cord.
in Diosc. l.
1. c. 137.

Bauh. H.
P. l. 8. p.
215.

3. *Salix vulgaris rubens*, Plinio *Amerina nigra & rubens*, Dodon. *Salix minor viminalis & gallica*, Thal. *Sabina sive Amerina*, a capite paululum eminente tenues progignit virgas. *Cortex* nonnihil rubet aut viret April, vel si serius Majo, cum foliis prodeunt juli, in quibus semen citius cum pappis abripitur, quam ad perfectionem veniat. Seritur taleis aut virgis in terram depositis, quarum ubi incrementum accepere, superior pars præscinditur, & caput subnascitur. *Prodit* in palustribus riguis. *Vincula* ex ea, quibus in aqua maceratis vites & doliorum circuli vinciuntur: & alteri *Cortex* magis rubet, alteri nigricat.

Dodon.
pemt. 6. l.
4. c. 20.

II. *Salix sativa lutea folio crenato*, Bauh. H. P. l. 8. p. 214. *Tabern. angustifolio sylvestris*, Bauh. *lutea tenuior, sativa viminea*, in pulcrum adolefcit arborem. *Virgarum* lenta & rupturæ secunda flexilitas, *Cortex* vitellini coloris, amarus. *Folia* rara, acuta, superne cum virore splendens, incana, glabra; inferne nonnihil pilosa, exiguis per ambitum denticulis crenata, adstrictoriæ facultatis, sed levis. *Colitur* ad vites & hortorum septa nectenda. *Procera* circa *Rufficum* & *Basileam*. *Ramos*, inquit Bauhinus, crassiores præfectos contorquent & connectunt, ut deinceps velu-

ti scalas ostentent, pluresque ejusmodi, annuatim sibi invicem incumben-
tibus, mirabili figura.

Lugd. H. *Salix folio amygdalino utrinque*
P. l. c. p. *virente aurito*, Theophr. *μελανόφλοιος*,
277. Plin. *purpurea*, Lugd. *purpurea ni-*

gra viminalis, hominis est altitudine,
virgis tenuibus, cortice nigro; foliis ve-
nosis obscure virentibus in ambitu
ferratis. Singulis auriculis binæ cre-
natæ aures adpositæ sunt. In fluviorum
fabulosis ripis, qui præcipiti cursu vor-
ticosi ruunt, *provenit*. Observata & in
valle fontium acidorum Griesbacensi-
um & Basileæ in dumetis. Jam olim vir-
gas tenues præbuit viminibus texendis
quibus corbes, sportas, qualos, canistra,
fiscinas & id genus alia utensilia vasaque

Bauh. H. conficiebant, spectabili subtilitate. Bau-
P. l. 8. p. hini *Salix spontanea fragilis amygdalino*
214. *folio auriculata*, cortice est rarius albo,
validæ adstrictionis: folia longa, me-
diocriter lata, mucronata, lenticulata
tam supra quam infra virentia & gla-
bra. Virgulas tenuiores flexum vix
ferre, nisi torqueantur, majores rum-
pi, scribit. Caret & auriculis aliquando.
In icone pauca foliorum crenæ rite ex-
pressæ, melior apud Lugdunensem.

IV. *Salix folio longissimo angustissimo*
utrinque albido, Lugd. *Salicis genus*
sextum, seu *Eleagnus*, Patavinis *Zeni-*
gole. Bauhino *Salix angustis* & *lon-*
gissimis foliis crispis subtus albicantibus,
cortice est luteo. foliis inter omnia sa-
licis genera longissimis, angustissimis,
minime venosis, nervo medio discrimi-
natis, in ambitu minime ferratis,
utrobique albicantibus, aversa parte
lanuginosis, ex Lugdunensis descri-
ptione. Bauhino, virgæ sunt longissi-
mæ simplices nullis adnatis virgultis,
obsequiosæ. Cortex virescens aut ci-
neraceus. Folia, crebro agmine ra-
mos stipant, superius virescunt, infe-
rius cum nitore ad objectum luminis
vario canescunt, nervo medio secan-
tur, in ambitu magna ex parte crispa.
Variare ergo vides. Observavit in ea
excrementum gallæ simile foliis adna-
tum. Crescit in riguis & fabulosis.
In Gallia ad Rhodani ripas, quæ hu-
jus sunt feracissimæ, cum in Araris pro-
pinqui amnis marginibus nusquam re-
periatur. Putatur esse *Eleagnus Theo-*

phrastris ἐλέαγνος, seu agnus palustris, *Salix*.
non ἐλαίαγνος quasi ex olea & vitice
constaret. Est stirps frutici propior,
καὶ παρόμοιος τοῖς ἄγνοις (male ἄλλοις)
Folium iisdem simile figura, sed mali
instar molle, μαλακὸν ὥσπερ τῆς μηλέας
(sic lege, non ὥσπερ αἱ μηλέαι) χροῶ-
δεις τὸ ἀνδρὶ τῷ τῆς λευκῆς ὅμοιον.
Flos lanuginosus similis populi albæ,
sed minor. Fructum fert nullum.
Nascitur plurima ἐπὶ τῶν πλοῶδων νή-
σων, super insulas fluitantes & in lacu
Orchomenio. Non abludit sane de-
scriptio: & verius hæc erit, quam
vel Zyziphus alba seu olea Bohemica;
vel Myrtus Brabantica, quæ Belgis
Gagel, ut ex comparatione patebit.
Nec multum & illud *salicis genus*
quod apud Batavos in insulis fluitan-
tibus, quas *Veenen* vocant, nascitur,
& a Bodæo Stapelio descriptum est.
Non excedit magnitudine agnum,
ramulis & virgis non dissimilibus; fo-
liis optima folia agni referentibus,
sed mollioribus. Fructum fert salicum
reliquarum modo, minorem, lanugi-
nosum, qui ante seminis maturitatem
a vento abripitur, ita, ut semen non
ferre recte statui possit. Icon Lugdu-
nensis a Bauhino differt. Folia ibi
rara.

V. *Salix folio incano, oblongo, acu-*
to, caules habet cortice atro rubente
vestitos, in breves & plures ramulos
divisos: folia oblonga, superna parte
obscurè virentia, prona cinerea & in-
cana: flores copiosos aliarum salicum
modo. semen parvum, nigrum quod
cum albißima lanugine abit. Fre-
quens Basileæ, in primis in minore ur-
be, ad molendinum ærarium, in se-
pibus ad aquas.

VI. *Salix folio glauco* & *per ambi-*
tum hirsuto, nihil forte ab aliis diver-
sum habebit, præter foliorum con-
stitutionem.

VII. *Salix humilis* est duplex. 1. *An-*
gustifolia. 2. *Capitulo squamoso*.

1. *Salix humilis angustifolia*, Lo-
bel. *Salix humilis repens angustifolia*,
in ericetis Antverpiani agri, palmari-
bus & sesquipalmaribus cauliculis re-
pit, folio Rhamni primi, floribus mus-
cosis salicis, gustu amaro.

Theophr.
H. P. l. 4.
c. 11.

Bauh. Pro-
drom.
theatri
botan. l.
11. c. 8.

Bauh. phy-
top. l. 12.
f. 3.

Lugd. H.
P. l. 2. c. 72.
p. 278.
Lobel. ob-
serv. p.
568.

Salix.
Clus. H.P.
l. 1. c. 54.

2. *Salix humilis capitato squamoso*, Lugd. *Salix helice Theophrasti*, Clus. *Salix angustifolia Pannonica*, Bauh. *Salix tenuior*, folio minore utrinque glabro, fragilis dicitur: differunt tamen in descriptionibus. *Lugdunensis* ei tribuit virgas tenuissimas maximeque exiles, quibus cortex subluteus: folia paribus semper intervallis gemina, brevissima, conferta, candicante, non lanuginosa, in ambitu minime crenata, protuberante semper ad foliorum radicem velut novo aliorum conceptu, quod huic proprium est. Foliis insident vesicæ; ramorum vertici foliosa capitula, quæ delapsis jam foliis in arbore manent. Clusius suæ adscribit, caudicem crassum, ramos frequentes & tenues: folia in ramis frequentiora, angustiora, quæ subtus canescunt, superne licet viridia alba lanugine pubescunt; & in longiorem mucronem desinunt. Flores sunt pallidi; semen minutissimum, nigrum, quod candida mollique lanugine exceptum levis auræ arbitrio huc illuc fertur. Foliis plerumque innascuntur subrubentia tubercula baphico cocco fere similia. Nascitur juxta torrentes & udis locis. Vienna torrens, sub urbe ejusdem nominis Danubio se miscens, ea maxime abundat. In *Bauhini* salice tenuiore, utraque parte glabra sunt folia, tres aliquando uncias longa, per ambitum ut plurimum crenata, ex adverso fere posita. Icon paulo a descriptione aberrat. Quatuor in ea singularia occurrunt. *Nucamentum* nempe, *Excrementum bombycinum*, *Insectum*, & *Excrementum rosæ æmulum*. 1. *Nucamentum* est longum, racemosum, e plurimis vasculis ceu acinulis, qui in duas carinulas dehiscentes lanuginem ostentant; præcedentibus mucosis flosculis. 2. *Excrementum bombycinum*, flosculis jam jam defluere incipientibus ad nucamenti fastigium adnascitur, uncia longius, candidum, lanam substantia fungosa & colore per omnia referens, teres atque oblongum. In exteriori parte flosculorum lutei apices toto se præferunt ambitu, exsertique suis finibus conspiciuntur, suis tamen longiori-

bus petiolis excrementitiæ substantiæ toti involvuntur & obteguntur. 3. *Insectum* in excrementi aperti meditullio invenitur, minimum, albicans, pediculum capitis æquans, teres, oblongiusculum, depes, nec progredi vim habens. 4. *Excrementum rosæ æmulum*, in ramulorum prodit fastigio, foliis confertim stipatis compactile, partim hirsutis, partim glabris. Videre ea passim in Polonia & Silesia licet. Adde his pillulas scabras, quæ surculis insidere solent.

VIII. *Salix fragilis*, mediocris est altitudinis, caulibus ramosis, rotundis, rubente cortice vestitis. Folia longa, angusta, prona parte incana, superius atrovirentia, & tandem pene nigra. Juliquam in cæteris breviores. Vitri modo frangi Cæsalius prodidit, unde *Vitricis* nomen. Folia ei tribuit lata, subrotunda & hirsuta. Frequens ad Birsam & S. Iacobum.

IX. *Salix latifolia*, est sextuplex. 1. Rotunda. 2. Folio ex rotunditate acuminato. 3. Minor. 4. Subrotundo argenteo folio. 5. Non hirsuta cum gallis. 6. Maritima ostrearum testis innascens.

1. *Salix latifolia rotunda*, Angvill. *Siler arbor*, Gesn. *Chaleb Syrorum*, Tabern. *Salix caprea rotundifolia*, Lugd. *platyphyllos* seu *leucophleas*. Cortice est candido, sed in cinereum vergente; interiore rubro, quod huic generi proprium est, ligno fragiliore, folio latiore, adversa parte incano, adversa pallidius virente, in ambitu ferrato. Quidam pro Elæagno depinxerunt. Gignitur in solo macro, lapidoso, arenoso, sed udo, ad torrentium margines & in sylvis umbrosis, præsertim qua collectis in lacunas aquis terra humescit, aut qua fontium scaturigines profiliunt. Carbo ejus citissime ignem concipit, ideo ad pulverem tormentarium adhibetur. Cortice externo Allobroges rustici fasces lignorum vincunt. Clusius eam sub nomine *salicis latifoliæ* describit. Folia ampliora candidiora, quam cæteris, quæque ad mali folia quam proxime accedunt. Lignum reliquis salicibus lentius. Flos seu

Bauh. Pro-
drom.
Theatri
Botan. l.
II. c. 8.

Lugd. H.
P. l. 2. c. 72.

Clus. H. P.
l. 1. c. 21.

julus

Plin.H.N.
l.16.c.18.
& 21. l.
24. c. 10.

julus mollis, villosus, candicans, antequam se expandat, populi albæ julo similis. Nascitur secundum aquas. An sit Siler arbor, difficile est dictu. Plinius ei folia non decidere, scribit, nec nisi in aquosis nasci. Lignum serpentes fugat, folia illita capitis dolores sedant; semen tritum phiriasas coërcet. Quid inde concludas?

Tabern.H.
P.1.3. p.
762. Bauh.
H.P. l.8. p.
215.

2. *Salix folio ex rotunditate acuminato*, Tabern. *Salix caprea latifolia*, Bauh. *Salix latifolia inferne hirsuta*, habet *vimina* crassiuscula fragilia, quibus *cortex* incanus amarescens, aliquando veluti fuligine obductus, tuberculis quandoque ex dulcedine leviter adstringentibus nodosus. *Folia* sesquipal- mum interdum longa, quadrantem & ultra lata, nervosa, prona parte incana & hirsuta, supina viridantia, saporis adstringentis, pediculo sæpe auriculæ caulem amplectentes adnascuntur. *Catuli* sunt in staminulis crocantibus pleni; quibus in receptaculis racematim coherentibus capillitium quoddam candidum adnascitur. *Nascitur* Basileæ in montibus vicinis Genevæ in colle Abbatiae, in valle Griesbachiana prope fontes acidos, in Alsatia multis locis, ubi Juli Julio conspiciuntur.

Thalio in
sylva Her-
nia.

3. *Salix latifolia minor*, Thalio est *Salicis platyphyllæ* species alia. Descriptionem apud auctorem vide. Nec enim ad manum liber est.

Bauh.Pro-
dro.Thea-
tri Botan.
l. 11. c. 8.

4. *Salix obrotundo argenteo folio*, est *caulibus* cubito altioribus, rotundis, incanis, ramosis. *Folia* subrotunda, superne nigricantia, parte prona incana, argentei coloris, splendentia, tactu mollia, & veluti tenui lanugine pubescentia, per ambitum raris crenis exasperata.

Bauh.H.P.
l.8.p.216.

5. *Salix latifolia non hirsuta cum gallis*, ita a *Baubino* describitur. Est & illud *salicis latifoliæ* genus, cujus folia non ad maximam prioris latifoliæ (i. e. inferne hirsutæ) latitudi-

nem accedunt, mediocribus tamen *Salix*. ejus generis paria & serrata, verum nec subtus nec supra hirsuta, neque etiam candicantia, sed lævi glabritie viridantia, *cortice* vimen obtegente nigro: quæ ob id, nisi folia essent lata ad nigram Theophrasti referri posset. Lugduni, addit, colligimus cum pilulis in foliis.

6. *Salix maritima ostrearum testis* Lugd.H.
P.1.2. p.
279.

innascens, Lugd. *Salix marina*, dicitur. *Rami* multi ex glauco nonnihil rubentes in aqua natant, *foliis* comantibus longis, salici similibus, maxima ex parte per oras non incis, quibusdam veluti incisuras nonnullas ostendentibus, gustu salis. Inter ramos *virgæ* subriguntur, *florem* salicis sustinente surculo haud absimiles, apicibus plurimis veluti squamatum compactis, non alia forma quam quæ spectatur in salice, dum herba- ceo julo florem parturit. Et ostrea- rum testis & faxis quæ sub aquis, ita adhæret, ut iis adglutinata, non radice defixa videatur.

X. *Salix pumila* est duplex, *Latifolia* & *Angustifolia*.

1. *Salix pumila latifolia* est quintuplex 1. *Erecta*. 2. *Repens*. 3. *Alpina rotundifolia repens, inferne subcineræ*. 4. *Foliis utrinque candicantibus* & *lanuginosis*. 5. *Saxatilis minima*.

1. *Salix pumila latifolia erecta*, latifoliæ aquaticæ acuto folio similis est, sed humilior, cum hujus *virgæ* striate, vix cubitum superent, *folia* minora sunt ex rotunditate oblongata, in acumen desinentia, rugosa, parte prona lanuginosa, mollia. *juli* rotundi, parvi, flavi. Colligitur Michel- feldæ in humidis.

2. *Salix pumila latifolia repens* Clus. Bauh.H.P.
l.c. 55.

Salicis pumilæ genus secundum Lugd. *leucophlæos palmum alta*, vocatur. *Virgæ* minimi digiti crassitudine, quæ secundum radicis caput interdum fibras agunt; *Cortex* scaber, *folia* mucronata, superne viridia, inferne splendentia, licet tenui lanugine pubescant, *julus* crassiusculus, & illi

N n n

pene

Salix. pene similis qui in *salice latifolia* nascuntur. Forte *Salicula repens* Camerarii, quæ copiose in Sabaudia & circa Lugdunum reperitur.

Clus. H.P.
l. c.

3. *Salix alpina pumila rotundifolia repens inferne subcinerea*, Clus. *Salix latifolia prior*, virgas habet minimi digiti crassitudine, humi fusas, pedales, cui frequentes *rami*, qui sursum attolluntur, & inter gramina emergunt. *Folia* uncialia, superne viridia & splendentia, inferne subcinerea & quodam modo canescentia. In tenellis ramulis moles *florum* spicæ, quibus succedunt capitula, quæ maturæ Augusto aperiuntur, mollemque lanuginem fundunt, in qua pusilla nigra grana latent.

Lugd. H.
P. l. c. p.
278.

4. *Salix pumila foliis utrinque candicantibus & lanuginosis*, Lugd. *Salix abortiva*, non est palmo altior. *Folia* tam exigua, ut teruncium vix æquent, rotunda, utrinque ut dixi candicantia & lanuginosa. *Nascitur* in montium Segusiani tractus convallibus, ad fontium scaturigines & stagnantes in pratis rivulorum aquas.

Bauh. Pro-
drom. l. II.
c. 8.

5. *Salix saxatilis minima*, duas uncias vix superat. *Caudex* crassiusculus vix semiuncialis. *folia* parva, oblonga, subrotunda, atrovirentia, venosa; quorum medio *capitulum* parvum, subrotundum, veluti ex multis baccis compositum, insidet. Ex apertis veluti ex triangulari calyculo mollis, candida & brevis lanugo effertur. Reperitur in Alpium Helvetiorum jugis saxi insidens. Respondet ei, *Salix pumila folio rotundo Johannis Bauhini*, quæ se humo vix attollit. *Ramuli* rubentes magnam partem nudi. *folia* in fastigiis circinata rotunditatis, crassiuscula, rigidula, rugosa, venosa, glabra utrinque sed inferiore parte canescentia, superiore atrovirentia. Ad horum imum fortuita *capitula* lanugine saligna plena. Privato furculo insidet tomento similis *julus*. Collecta in Rhæticiis montibus.

Bauh. H.P.
l. 8. p. 217.

2. *Salix pumila angustifolia* quadruplex 1. *Limifolia incana*, 2. Bre-

vi angustoque folio incano, 3. *Alpina*, 4. *folio utrinque glabro*.

1. *Salix pumila linifolia incana*, Clus. H.P. l. I. c. 55. Clus. *angustifolia prior*. Virgas habet pedales, rectas, lentas, subflavo cortice vestitas. *Folia* uncialia, fateri lini foliorum modo angusta, supina parte viridia, prona cinerea, & novella adhuc, omnino incana. *Flos* flavescent, exigua, brevi mollique spica ante folia nascitur, ac in candidam lanuginem resolvitur. *Crescit* etiam in udis & cæduis circa Francofurtum ad Mœnum sylvis.

2. *Salix brevi angustoque folio incano*, Clus. *angustifolia altera*, cubitalibus adsurgit *virgis* lentis; quæ a medio ad summum ramulorum multas ferunt exiguas *florum* spicas, molles & incanas, quæ maturitate in pappum & lanuginem abeunt. *Folia* superiore breviora, angustiora, superne viridia; quæ inferne cana lanugine pubescunt. *Nascitur* in cæduis & depressis Pannoniæ & Austriæ sylvis, nec non pratis uliginosis. Quæ passim in sabulosis Hollandiæ aggeribus Oceano objectis inter gramina & spartum prodit, *latioribus est foliis*.

Clus. H.P.
l. I. c. 55.

3. *Salix Alpina* est duplex, 1. *Pyrenaica*. 2. *Angustifolia repens non incana*. I. *Salix Alpina Pyrenaica*, ad semicubitalem altitudinem vix adsurgit, *virgis* tenuibus ramosis; *foliis* oblongis, parvis, per circumferentiam pilosis, tactu holoserici instar, ob minutissimos pilos mollibus. *Spicæ florum* unciales, angustæ, molles. In summitatibus Pyrenæi D. Burserus legit. II. *Salix Alpina angustifolia repens non incana*, habet radicem atrovirentem cortice tectam. *Cauliculi* palmares humi profusi, capillaceis radicibus terræ adfiguntur, ramulis tamen paucis sursum elatis. *Folia* oblonga, latiuscula, breviora. *Flores* ut in cæteris, quibus absentibus nullus salicem esse crederet. *Frequens* in Helvetiorum Alpibus, & monte Fracto.

Bauh. Pro-
drom. l. II.
c. 8.

Bauh. Pro-
drom. l. c.

4. *Salix*

Bauh.H.P.
l.8. p.217.

4. *Salix pumila folio utrinque glabro* *Baubini*, virgulas habet palmares aut sesquipalmares, cortice rubente vestitas, quæ fibris tenuibus radicantur. *Folia* per semunciam aut unciam longa, parum supra unciam trientem lata, utrinque glabra, leviter in mucronem desinunt. Capitula pro plantulæ proportionem magna racematim coherencia, in duas retortas veluti corniculatas carinas dehiscencia, lanuginem candidam exhibent. Eandem cum *salice humili repente Lobelii esse putat*. Humilis hæc, serpens humi, pedem & sesquipalmum alta; *foliis* parvulis Myrti minoribus. *Flores* amento mucoso in pubem avolante cani. Montibus Sabaudia, Lugdunensibus & Veganis multa, ad speciem decora. Icones conveniunt, descriptio non item.

Lobel.Ad
vers. p.
423.

XI. *Salix Exotica* est quadruplex
1. *Syriaca folio oleagineo argenteo*. 2. *Arabica foliis Atriplicis*. 3. *Ægyptia floribus globulosis*, & 4. *Brasilensis*.

Rauwolf.
in itiner.
Rhasis c.
353.

1. *Salix Syriaca folio oleagineo argenteo*, Rhauwolf. *Sassaf Syrorum*, & secundum eundem Rhasi *Zarneb* vel *Zarnabum*, Serapioni *Zurumbeth*, Theophrasto *Eleagnus*, Æginetæ *Arnabo*, vocatur. An se res ita habeat, descriptiones ostendent. *Sassaf* magnitudine variat, betule truncis ramis frondibusque similis. *Virgæ* longæ, graciles, molles, ex pallido flavescent. *Folia* viticis furculis mollicellis hærent. Eramis *germina* spithamea hinc inde prodeunt, haud secus fere ac in ficu Cypriotica: e quibus primo vere *flosculi* mollicelli, pallidi, lanuginosi, populneorum æmuli pendent, jucundi odoris. *Provenit* Halepi; ubi etiam ex *flosculis* aqua Cardiaca pretiosissima elicatur. *Zurumbeth* Ibensinæ lignum est simile Cypero, sed majus & minus odoratum & calidum & siccum ordine tertio; quod flatu dissolvit, vomitum compescit, muliebria adstringit, & uteri ventositates dissipat. *Isaaco* arbor est magna in montibus Orientis nascens, foliis longis, colore inter viridem & Citrinum, salicis similibus, odore Cypri. Calida &

Bauh.H.
P. l.8. p.
219.

ficca. Sternutamentum ex ea & oleo violaceo dolori capitis a frigido & humido prodest. *Arnabo* apud Æginetam, ex aromaticis est, unde maxime in Unguenta miscetur, ut qui calidæ & siccae sit facultatis in ordine tertio, Cassiæ & Carpesio similis.

2. *Salix Arabica foliis Atriplicis*, Ibensinæ *Garb Arabum*, Rhauwolf *Salix Exotica Garb incolis*, Lugd. *Garab Maurorum*, Persis *Fer*, patula est arbor, sed non nimis adsurgens. *Surculi* extremi teneri & fragiles. *Cortex* ex pallido flavescit. *Folia* palmum circiter oblonga, duos digitos lata, Atriplicis modo per ambitum sinuata, flavescent quoque. Nec fructum nec florem vidit Rhauwolfius. Paratur ex ea Aphronitrum, optimum pro igniario pulvere conficiendo. *Surculi* extremi cum foliis in cinerem combusti adfusa aqua macerati, separati, multa ebullitione coagulantur. Non æquivalet nostro. Fundit & gummi incisa. Ibensinæ *cortices* radices tingunt capillos; & cum foliis contusi vulneribus recentibus imponuntur. *Florum* succus sine mordicatione exsiccatur, cum adstrictione quadam. *Gummi* obscuritatem visus tollit.

Bauh.H.P.
l.8. p.221
Rhauwolf
itiner.

3. *Salix Ægyptia floribus globulosis*, Alpino *Calaf* seu *Ban* & *Caleb* crescit ad viticis magnitudinem, stolonibus multis rectis. *Folia* longitudine indicem digitum, latitudine vero eundem etiam geminatum adæquant, cum adulta jam ætate robur suum collegit. Nulla eam insidet lanugo; nec a medio nervo productæ fibræ, ambitum foliorum divisuris interstinguunt. Ad foliorum exortus *folliculi* emergunt singuli, rubro leviter colorati, cordisque diastole sese stringentis figuram exprimunt, unde nominis ratio. Dehiscens tandem folliculus florem dicam an laneum partem excludit, interfusa candori flavedine pictum, quem in rectum exiens semineus Scapus fulcit. *Provenit* in locis humidis. Destillatur ex floribus aqua *Macahalaf* dicta, quam in febribus pestilentialibus inter secreta habent:

Alpin. de
plant. Æ-
gypti. c.15.
Vesling. ad
Alpin. c.15.

Salix. & in variolis cum Bezoaris aliquot granis utilissime exhibetur. In Syria contractioribus est foliis.

Maregr.
H.P.B. l. 2.
c. 1.

4. *Salix Brasiliensis* duplex est
1. *Folliculifera*. 2. *Capitulifera*. I. *Salix Brasiliensis folliculifera*, salicis pumilæ instar est. *Lignum* & *folia* salicis, sed paulo lætiora, egregie viridia, nervo secundum longitudinem prominente. *Flosculi* umbellatim congeruntur, albi, parvi, sambuci instar: quibus succedunt *folliculi* plane compressi, figuræ elegantis, in quibus *semen* rotundum nigrum, & quod macula alba notatur. II. *Salix Brasiliensis capitulifera*, folio, ligno iisdem est. *Capitula* habet rotunda,

viridia, in longis pediculis, qui & iuxta folia & separatim e caule enascuntur, & in iis congestos flosculos luteos. Succedunt his *capitula* ut in lupulo minoris olivæ magnitudine, sed dura, & quibus *semen* triangulare.

XII. *Arbor Americana foliis salicis*, incolis *Xonequilpatlis*, frutex est, cui *radices* surculosæ, *caules* fulvi; *folia* salicis sed minora & angustiora. *flores* pallescentes, parvi, calyculorum figura. Calida est in tertio & urens guttur, quanquam initio dulcis adpareat glycyrrhizæ instar. *Folia* tusa & cum aqua soluta sudores eliciunt, & articulorum dolores a causa frigida ortos mitigant.

Recessus R.
M. N. H.
l. 4. c. 7.

Vid.

TAB.
CXXVI.

Theophr.
H.P. l. 1. c.
25. & l. 6.
c. 1.

Clus. H. P.
l. 1. c. 53.
p. 81.

DE Spiræa pauca occurrunt. Theophrastus ex illis esse quæ fructum cacumine fundunt, & inter coronamenta veniunt scripsit; nec plus de ea tam apud ipsum quam apud alios invenies. Clusius sub ejus nomine descripsit fruticem Brega Silesiorum a Doctore Sebizio ad se missum, cui Bauhinus nomen *Fruticis spicati foliis salignis ferratis* indidit. Duorum cubitorum altitudine adsurgit. *Virgis* puniceus cortex, per quos sine ordine frequentia longiuscula & angusta folia, salignis proxima per ambitum ferrata, superne dilucius virentia, inferne veluti ærugine adpersa, gustus cum quadam amaritudine exsiccantis sparguntur. Extremi ramuli, inquit Clusius,

ARTICULUS II.

De Spiræa.

digitalis fere longitudinis, satis crassam spicam ferunt exiguum florum, uvæ, in modum congestorum, quinis foliis constantium, e quorum umbilico multa staminula prodeunt, coloris cum suo flore ex albo rubescentes sive carnei, nullo peculiari odore præditi, nisi qualis fere in florente olea est. In his enascentibus succedunt pusilla pentagona Capitula, quæ ad plenam maturitatem pervenientia, tenuissimum & pulvereum quoddam semen flavescens effundunt. Spiræam *Viburnum* non esse vel inde colligas, quod quamvis fructum in cacumine gerat, inter coronamenta tamen non numeretur.

CAPUT V.

De Arboribus miscellis Classis quintæ.

ARTICULUS I.

De Myrica seu Tamarisco.

Vid.
TAB.
CXXVI.

AD Classem quintam spectant,
1. *Myrica* seu *Tamariscus*. 2. *Erica* & 3. *Camphorata*, Scopariæ fere omnes.

Dioscor.
M.M. l. 1.
c. 116.
Theophr.
H. P. l. 1.
c. 16. l. 5.
c. 6.

I. *Myrice* seu *Tamariscus* breviter ab Antiquis describitur. Arbor est nota inter frutices relata, similis Scopis Amerinis, cui folia carnoscupressi, nec decidua, quod cum veritate non congruit; fructus ὡσπερ

ἀνδρὶ βρωῶδες κατὰ τὴν σύσασιν. Plinius ne semen quidem ferre scripsit, ideo inter infelices referri: sed alibi sui quasi immemor, seminis peculiarem ulum

Plin. H.N.
l. 13. c. 21.
l. 16. c. 21.
24. l. 24.
c. 9.

ponit. Nascitur περὶ λίμναις ἢ τοῖς εὐαίμοις ὕδασι, sed & in desertis, vitæ dubiæ. In Tylo Arabiæ insula fert lignum, non ut apud nos imbecillum, sed validum, sicuti iligneum.

Usum

Usum si spectes, folis scopis nascitur apud Plinium: apud alios non item, quibus & ipse accedit. Abstergentis & incidentis est facultatis Galeno absque desiccatione perspicua, & cum adstrictione nonnulla. Parantur e caudice calices, ex quibus lienosi potare solebant: & pro suis canales e trunco (non rusco) contra splenis incrementum, quo sues dulcedinem pabuli confectantes, æstate supra modum laborant: adeo mirabilem antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt. *Folia* lienem liquant, si in vino decocta adsumantur; dentiumque dolores tollunt, *διὰ τοῦ οἴνου*. Ex floribus mella faciunt apes; probatissimaque huic bono apud Columellam rutila atque alba Ziziphus, nec minus tamarica vel tamarix. (male scribitur, *nec minus amarantibus*; vel *nec minus amaricus*) Gravis auctor in medicina, inquit Plinius, virgam ex ea defractam, ut neque terram neque ferrum attingeret, sedare ventris dolores, adseveravit impositam, ita ut tunica cinctumque corpori adprimeretur. *Duplex* vero ea Antiquis I. *Sylvestris*, quæ *πανακαρπῆς* Nicandro, quamvis fructum ferat, sed cibo inutilem, quæ in Italia & Achaja circa Corinthum venit, & *βοῦα*, propter florem muscosum vocatur. II. *Sativa* & *mitior*, quæ in Ægypto & Syria copiosa, sylvestri similis, fructum fert lignosum, majorem Galla, ei tamen proximum, quo Medici vice gallæ utuntur. Datur contra cruentam excreationem in potu, & contra sceminarum profluvia.

II. RECENTIORIBVS duplex est I. *Fruticosa*. 2. *Arborescens*, seu Arbor.

I. *Tamarix fruticosa* est iterum duplex I. *Folio crassiore* sive *Germanica*, 2. *Folio tenuiore*, sive *Gallica*.

I. *Tamarix fruticosa folio crassiore* sive *Germanica*, aliis *Tamariscus*, *Myrica humilis* &c. est radice crassa & crassante, cortice crassiusculo insigniter amaro vestita. *Virgulta* plurima, fragilia, in plures ramos divisa, purpurascens cortice obducuntur. *Folia* parva oblonga, teretia & tenuia, lineolis quasi transversis ac obliquis sine incisuris superficietenus exasperantur, indivisa tamen, duplici adscen-

dunt versu. *Floret* spicatum in extre-
mis ramulis digesti, foliolis externis
virescentibus, aliis purpurascens
constant, apicibus in medio luteis.
Sequuntur *calyculi* sive pericarpia
mucronata, triquetra: quibus dehiscentibus, *pappus* evolat candidissimus, adpenso semine minutissimo, coloris rari. Ex majusculorum foliorum furculos ambientium alis, nascuntur alii ramuli exiguis foliolis onusti. *Floret* Majo & Junio, totaque fere æstate semen ferre non desinit. *Nascitur* ad amnes & fluentia, inque locis, quæ ab iis inundantur, ad Rhenum prope Brisacum & Neoburgum; juxta Danubium ad Viennam arenosis, locis quæ pontibus longis adjacent, in Tyrolensi Comitatu, in Italia etiam, & Silesia. Turnerus in Anglia non crescere tradit: & Lobelius bruma plerumque ibidem perire. Radicum decoctum cum uvis passis, elephantiasin ex liene obortam sanasse scribit Matthiolus. Ligno contra luem Gallicam quidam tantumquam Guajaco utuntur. *Duplex* ejus *genus* in Germania reperiri Cordus prodidit. Unum *Rhenanum* solidiore ligno, medulla admodum exili, & foliis tenuioribus, quod copiose circa Argentinam ad Rhenum provenit. Alterum, *Danubianum*, ligno non adeo solido, medulla ampliore, foliis latiusculis, quod in Danubii & Uvertachii ripis in Vindelicis, prope Augustam inprimis nascitur.

2. *Tamarix fruticosa folio tenuiore* seu *Gallica* Gesn. *Myrica* circa Mons-
pelium, alii *Tamarix Narbonensis*,
Clus. *Myrica sylvestris prima*, Bauhino *Major* sive *Arborea Narbonensis*, magna ex parte tantummodo fruticat, sed aliquando in vastam arborem adolescit; in Hispania in tantam, ut hominis ulna vix amplecti possit. *Cortex* caudicis scaber ramorum punicans. *Folia* cupressi ex viridi ad cinereum tendentia. *Flores* in extremis ramis conferti & racematim compacti, exigui, *πενταφύλλοι*, foris purpurascens, cum expansi sunt, candidi: qui deinde in exiguum semen tomento involutum efformantur, exiguis veluti valvulis inclusum, quibus dehiscentibus per maturitatem effluit.

Columella
R. R. l. 7.
c. 10.

Pallad. in
Nov. tit. 8.

Plin. H. N.
l. 24. c. 9.

Plin. H. N.
l. c.

Clus. H. P.
l. 1. c. 27.
Stapel. Bo-
dæus ad
Theophr.
H. P. l. 4. c. 7.
p. 410.
Bauhin. H.
P. l. 10. c. 1.

Gesner. in
hortis
germ.
Clus. H. P.
l. c.

Cord. in
Dioscor. l. 1.
c. 117.

Tamari-
scus.

Ter plerumque in anno floret, Vere nempe æstate & auctumno; recentibus floribus semen jam evanescens semper subsequenter. *Luxuriat* in Hispania, Italia, & Gallia Narbonensi; juxta flumina plerumque, aliquando sat procul ab illis. Oblectabat se ejus umbra Romæ ad Tiberis ripas Matthiolus. Insignis erat proceritatis, sed eorundem cum sylvestri florum & fructus. Sub Compluto ad fluvium Henares visa ea, cujus magnitudinem superius tetigimus a Clusio. Nemo perpetua coma virentem observavit, semper nova foliorum germina Vere profert. Ex ligno fiunt pocula.

Bellon. ob-
serv. l. 2.
c. 26.
Alpin. de
plant. Æ-
gypt. c. 9.

II. *Tamarix arbor, Ægyptia*, Alpino *Atle*, Arabibus *Chermasel*, Bauh. *Tamariscus Ægyptia gallifera*, ad Olivæ magnæ magnitudinem, imo supra Ægyptum in loco Sahit ad magnæ quercus excrescit. *Folia* sunt sylvestris Tamaricis foliis proxima, sed

longiora & graciliora; adparentque multa viridia capillamenta, qualia in aliquibus equisetis visuntur, ramo adpenso semper virentia. *Fructus* pauci, rari, virides, Nucum magnitudine, duri, lignosi, sine nucleo, & ejusdem fere cum gallis substantiæ. Variant figura. Sunt oblongi, breves, rotundi, lati, crassi, graciles: sed omnes asperi. Adeo aliquando copiosi, ut onere eorum arbores gravatæ fatiscant. *Crescit* & in humidis prope flumina, & in aridis ac sabulosis, ubi nulla alia nascitur arbor, in Ægypto & Syria. Ex ligno fiunt carbonēs, quibus Ægyptus & Arabia utuntur: sed & vasa, ex quibus lienosi potant. Paratur & ex eo pro lue venerea scabieque laborantibus, summa cum felicitate potus. *Cortex* pro sistendo nimio mensium fluxu mulieribus in esu: omnibus, in hæmorrhoidibus immodicis, sputo sanguinis, lienteria &c.

ARTICVLVS II.

De Erica.

Erica.

TAB.
CXXVII.
CXXIIX.
Dioscor. M.
M. l. i.
c. 117. Plin.
l. 11. c. 16.
l. 24. c. 9.

Theophr.
H. P. l. i.
c. 23.

Theophr.
H. R. l. 6. c. 4.

I.

Haud multa de Erica apud Veteres invenies. Arbor est fruticosa Dioscoridi, similis Myricæ, sed multo minor; colore Rorismarini & pene folio Plinio; qui alibi memoriæ prodidit, post primos auctumni imbres solam florere in sylvis, ac ad æquinoctium quidem plurimam esse; Athenienses *vetralicem* adpellare, Eubæam vero *Sisaram*, quam putent apibus gratissimam; fortassis quia tunc nulla sit alia (florum) copia. Sed non bonum inde mel; etsi id Baptistæ in deserto in usu fuisse videatur quibusdam. Ut ut sit, alia Tetralix planta esse videtur Theophrasto, spinosa & aculeatis foliis pungens: Ericæ vero coma & flos imposita, serpentum morsus Dioscoridi sanant. Per habitum digerere dixit Galenus; discutere citra rofionem Ægineta. Folio huic adfinis est *Coris*; sed pinguius est & minus, de eaque alibi.

II. MODERNI quatuor ejus summa genera constituunt. Est enim Erica 1. *Folio Myricæ*. 2. *Folio Coridis*. 3. *Procumbens*. 4. *Baccifera*.

1. Erica folio Myricæ, est triplex

1. *Vulgaris glabra*. 2. *Folio hirsuto*. 3. *Græcis Phana dicta*.

1. *Erica folio Myricæ vulgaris glabra*, Matthiol. & Lugd. *Erica prima*, Clus. & Lobel. *Erica Myricæ folio*, Bauh. *Erica vulgaris humilis semper virens flore purpureo & albo*, Matthiol. frutex est humilis. *Radices* longissimæ fractu contumaces, spadiceæ. *Virgulta* numerosa, lignosa, dodrantalia, spadicea, aut in nigro rubescencia. *Folia* quatuor versiculis squammatim incumbentium foliorum minimorum constant, ut superne deorsum insipienti cruces continuæ videantur, & temporis successu in ramulos abeunt. *Flosculi* spicam veluti exprimentes & quodammodo bullati, secundum ramulos e medio ad summum usque propendent, τετραφύλλοι, in quorum medio apices rufi. Bis floret, sed majore ex parte auctumno. *Nascitur* frequentissima in regionibus septentrionalibus, locis incultis, rarius in calidioribus. Circa Montbelgardum, Basileam, & Geneviam

Clus. H. P.
l. 1. c. 27.
Bauhin. H.
P. l. 13. c. 2.
p. 354.
Lugd. H. P.
l. 2. c. 31.
Matthiol.
in Dioscor.
p. 141.

nevam frequentissima. In Scorïa ex ea lecti parantur. *Ufus in Medicina, pecoris pastu & aliis.* In *Medicina.* Nam aqua e floribus elicita, colica præsente calore & siti laborantibus feliciter adhibetur; & ruborem oculorum tollit. Fomentis & balneis ex iisdem adornatis, recentibus imprimis, podagrici & paralytici levantur. Decoctum unciarum quinque que pondere, singulis diebus sumptum per triginta dies, vesicam a calculis liberat. In *pecoris pastu, & aliis.* Ericeta enim Scotiæ præterquam quod in vastis solitudinibus ovium gregibus pabulum præbent, suppleant in ignibus fovendis sæpe lignorum vicem. Materiarii e terra pulla inculcato stramine ex aqua subacta leviter, & alternis Ericæ stratis, extrorsum utrinque spectantibus comis, concurrentibus in medio lignosis radicibus, parietes tum casarum rusticarum, tum hortorum artificiose exstruunt, qui vinculo straminis & Ericæ nec pluvias metuentes, nec atterentium jumentorum adfrictibus, concussi in multis annos durant. Est flore aliquando dilutioris purpuræ, aliquando albo.

Plin. H. N.
l. 24. c. 11.
Clus. H. P.
l. c.

2. *Erica Myricæ folio hirsuta*, Clus. *Ericæ Myricæ folio similis*, quibusdam *Selago Plinii*, est superiore paulo elatior; foliis tomentosis & incanis; flore paulo dilutiore. Clusius locis incultis supra Windesoram Regum Angliæ regiam invenit.

3. *Ericæ Græcis Phanæ dictæ* meminit Bellonius, sed sine descriptione.

II. *Erica folio Coridis*, est multiplex 1. *Maxima*, 2. *Fruticescens peregrina*, 3. *Major*, 4. *Ex rubro nigricans Scoparia*. 5. *Humilis cortice cinereo arbuti flore*. 6. *Hirsuta Anglica*. 7. *Ternis intervalla ramulis*, cui adde 8. *Ericæ folio Coridis adfinem*.

Clus. H. P.
l. c.

1. *Erica folio Coridis maxima* est duplex 1. *Maxima alba*. 2. *Maxima purpurascens longioribus foliis*. 1. *Erica folio Coridis maxima alba*, Clus. prima, humanam altitudinem aliquando superat, fruticosa admodum, ligno duro ex rubro nigricante; floribus exilibus & brevibus, quaterno ordine ramos obsidentibus, gustu ad-

modum adstringente: flore copioso, qui concavus veluti exiguum cymbalum, oblongus, odoratus, albus. Nascitur in Lusitaniæ solitudinibus inter Ulyssiponem & Conimbricam. Floret Novembri, Decembri & Januario. II. *Erica folio Coridis maxima purpurascens longioribus foliis*, Clus. *Erica Coridis folio altera*, Lobel. *juni-perifolia dense fruticans Narbonensis*, ejusdem est altitudinis, tenuioribus tamen ramis, exilibus similiter foliis quaternis ramulos simul amplectentibus; quorum extremis oblongiusculi flores insident superioribus similes, colore purpurascens. Provenit iisdem locis, & quidem frequentior.

2. *Erica fruticescens peregrina* in horti Brancionis pensilibus & urceis visa, aliorum ritu fruticescit. *Foliola longiuscula*; juxta ramos *flosculi* purpurascens quaternis foliolis constantes.

Lobel. ob.
serv. p. 623.

3. *Erica floribus Coridis major* duplex est, 1. *floribus ex herbaceo purpureis*. 2. *Scoparia foliis deciduis*.

1. *Erica major floribus ex herbaceo purpureis*, Clus. *Erica Coris folio tertia*, Gerh. *Cruciata*, aliquanto maximis humilior. *Folia* latiuscula majora, nigrioraque, quaternis ordinibus circa ramulos nascuntur. *Flores* plurimi herbacei primum coloris, deinde ex albo purpurascens. Floret Decembri & Januario. Supra Ulyssiponem & circa Tagum frequens. Est ejus & altera species, cujus flosculi herbacei racematim & spicatim coherent.

II. *Erica major scoparia foliis deciduis*, Lugd. *Erica quarta Monspeliensium*, Clus. *Coris folio quarta*, Gerh. *Pyramidalis*, Guil. *Pyraea Theophrasti*, Bauh. *Erica arborescens floribus luteo-* Bauh. H. P.
l. 10. p. 356.
lis vel herbaceis minimis duorum cu-
bitorum est altitudine, ligno fragili; foliis tenuibus & minutis, viridibus, quæ inde siccatis ramis facile defluunt. *Flos* minor, cavus & herbacei coloris. Extremis ramulis *Capitula* e multis foliis compacta, his quæ in vulgari & duriore Thymo conspiciuntur, non absimilia, nonnunquam gignit. *Vulgaris* est toti Hispaniæ & Lusitaniæ. In Aquitaniæ saltibus

Erica. prope Burdegalam, ubi frequentissima ad hominis proceritatem adsurgit, nisi amputetur, aut a pecore arrodatur. Est & in Apennino circa Florentiam & Bononiam in monte Rua, Nemausi, & alibi. Ex Radice carbones fiunt, expetiti fabris ferrariis, quod nonnisi flatu accendantur, flatuque cessante protinus exstinguantur, fabris sic sæpius recoquentibus. Biflora est, & ex hac scopæ apud Mons-pelienses.

Lobel. ob-
serv. l. c.

Lugd. H. P.
l. c.

Dodon.
pempt. 6. l. 2.
c. 6.

4. *Erica ex rubro nigricans scoparia*, Lobel. *Erica pumila altera Belgarum*, Clus. folio *Coris decima tertia*, Bauhin. *Erica Brabantica folio Coris hirsuto quaterno*, fruticat virgis, pedalibus, ex rubro nigricantibus, frequentibus eas cingentibus foliis, quaterno ordine dispositis, superiore ordine angustioribus, & Thymi vulgaris minoribus, hirsutis tamen & pilosis. In summis ramulis dependent quini aut seni flores simul juncti, floribus lilii convallium similes, paulo tamen oblongiores, albi interdum, ut plurimum ex rubro dilutius purpurascens. Floret Vere & Autumno. Fiunt ex ea scopæ ad vestes purgandas. Eadem sine dubio cum hac Erica, quam sub Dodonæi *Ericæ tertiæ* ex Gallico herbario describit Lugdunensis. Flores parte extrema sunt aperti dolioli instar. Gaudet locis sabulosis, muscosis & rivulorum fontiumque uligine madentibus: in Avernorum inprimis pago, quem Divum Anthemium vocant. Rothomagenses Lugdunenses scoparii inde virgulta mercantur. Adfinis & priori & huic *Erica tertia Dodonæi*, in Latina editione descripta, quæ humilis, & lignosis virgulis luxurians. Foliola habet exigua, angusta, & oblongioris formæ. Ad fastigia virgularum, unico tamen tantum latere, spicato ordine, exeunt flosculi eleganter rubentes, nigris prominentibus. Nascitur in illo Germaniæ tractu, qui ex Bohemia Norimbergam ducit, locis aridis, incultis & juxta sylvas. Mense Aprili cum elegantibus flosculis reperta.

5. *Erica Coridis folio humilis cortice cinereo arbuti flore*, Clus. *Coris*

folio sexta, humilis est nec fruticosa; sed omnes fere virgas a radice singulares profert, quibus cortex cinereus. Has serie quadam ambiunt ramulorum rudimenta seu germina e multis foliis confertim nascentibus constantia nigrioris coloris: flores concavi, coloris saturationis purpuræ, e longissimis pedicellis, verticillato ambitu, per intervalla & e summis ramis dependent. Vidit nascentem in Castella veteri, supra Lutetiam in Gallia, & supra Windesforam in Anglia mense Septembri florentem.

6. *Erica Coridis folio hirsuta Anglica*, Lobel. *juniperifolia altera*, Clus. folio *Coris folio duodecima*, Cæsalp. *Scopa*, cubitali fere est altitudine, fruticosa. Virgulæ tenues ternæ semper circa majores ex intervallis. Folia similiter terna, exigua, nonnihil candidantia, hirsuta, gustus adstringentis, ramulis innascuntur. Flores numero sex, novem, duodecim, quindecim, concavi, ventre turgido ex rubro purpurascens, in summis ramulis ad foliorum exortus, verticillatim per intervalla terni perpetuo, æquali inter se spatio nascuntur. Semen, postquam in Octobri floruit, profert exiguum, nigricans. Provenit in Lusitaniæ arenosis locis.

7. *Erica Coridis folio ternis per intervalla ramulis*, Clus. *Coris folio quinta*, cubitalis est, ramis gracilibus fruticosa, quos terni per intervalla ambiunt, ternis foliis admodum exilibus circa illos disposito quodam ordine & serie nascentibus. Flores plurimi, purpuræ obsoletioris. Incultis Lusitaniæ locis circa Ulyssiponem floret Decembri.

8. *Ericæ folio Coridis adfinis*, ex Bauh. H. P. Hispania a Barone quodam Germano adlata est. Folia erant, parva, crebra, terna, sensim latiuscula, superne viridantia, pilis paucis ac minimis pubescentia, inferne incana, nonnihil adstringentia, cum aliqua acredine.

III. *Erica procumbens* est triplex
1. *Ternis foliolis carnea*. 2. *Herbacea*. 3. *Dilute purpurea*. 4. *Anglicana hirsuto capitello*.

1. *Erica procumbens ternis foliolis carnea*, Clus. *Coris folio nona*, virgulis

Clus. H. P.
l. 1. c. 28.
p. 46.
Lobel. ob-
serv. p. 620.

Bauh. H. P.
l. 10. p. 359.

Clus. H. P.
l. c.

ta & velut triangula grana. *Radix* lis est humi diffusis. *Folia* in ordines digeruntur & versus, tenuia admodum, terna semper, æquali inter se situ. *Flosculi* in extremis ramulis concavi, oblongi, extrema parte in quatuor angulos secti, coloris cum quatuor illis, unde enascuntur, foliolis carnei, octonis staminulis nigricantibus, styloque purpurascente e medio flosculo emergentibus. *Semen* maturitate nigricans exiguum. Ramulis adnascuntur aliquando viridia, ex latioribus foliolis, compacta, Capitulorum *Thymi* modo, capitula. Floret ut plurimum Aprili & Majo, quo tempore venustissima est. Nascitur apud arcem *Stichstein* in sylva illi imminente, qua ad *Sneeberg* ex arce iter est: nec non quibusdam montanis *Pannoniæ* sylvis.

Clus. H. P.
l. 1. c. 28.

2. *Erica procumbens herbacea*, Clus. *Coris folio octava*, vix pedalem altitudinem superat. *Folia* quaterna ramulos contrario exortu semper ambiunt. *Flores* secundum ramulorum longitudinem inter folia dependent cavi, pusilli, in quatuor angulos desinentes, herbacei coloris, in quibus semen. *Radix* lignosa. Profert Augusto foliacea capitula. Crescit maxima copia in adscensu montis illius, qui superandus est illis, qui *Gaminga* ad *Seehoff* vicinaque loca proficisci cupiunt.

Clus. H. P.
l. c.

3. *Erica procumbens dilute purpurea*, Clus. *Erica Coris folio septima*, habet ramos teretes, pedales, cubitales aliquando, qui ex atro purpurascunt, & tenelli capillares fibras agunt. *Foliola* quaternis & quinis versibus ordine disposita, gracilia, gustu adstringente, ambiunt ramulos. *Flosculi* in summis oblongi, concavi, dilute purpurei, ex quatuor ejusdem coloris foliis prodeunt, & maturi nigricans & minutum semen continent. Crescit copiose in *Alpium Austriacorum* præaltis jugis, inter saxa & scopulos, ubi *Junio* & serius floret. Invenitur & inter *Pragam* & *Noribergam*.

Bauh. H. P.
l. 10. p. 358.

4. *Erica procumbens Anglicana hirsuta capitello Bauhini*, tota pulchella vix dodrantalis. ramuli tenues multi. folia admodum breviora, crebra in am-

bitu hirsuta, ex modicis intervallis ceu geniculis terna vel quaterna, in summitate capitula hirsuta. Ex *Anglia* miserat *Turnerus*.

IV. *Erica baccifera* est duplex 1. *Erecta baccis candidis*, 2. *Procumbens nigra*.

1. *Erica baccifera erecta baccis candidis*, Amato *Acacalis Dioscoridis*, Clus. *Coris folio decima*, Tabern. P. 1. c. 14. *baccifera tenuifolia*, Bauh. *baccifera* p. 528.

Lusitanica, cubitalibus adsurgit ramulis, illisque fragilibus, & nigriore cortice tectis. *Folia* reliquis similia, sed crassiora & nigriora, gustu cum adstrictione calidiusculo, trino ordine circa ramulos disponuntur. *Fructus* in summis ramulis prodit Septembre & Octobre mensibus, succulentus, sapore acido, uniones obscuriores tum forma tum colore referens, qui exsiccatus per se decedit, tria intus granula. An floreat, nondum constat. Incolæ negabant; & fructum, donec maturuisset, intumescente. Nascitur solo arenoso in *Lusitania*, non procul *Ulyssipone* non procul inter *Riofrio* & *Aldea Calega*; nec putant quidam in *Europa* universa reperiri. *Lusitani Camarinham* vocant. *Fructus* edulis est, & febricitantibus ad sitim extinguendam exhibetur. De *Acacalide* habet *Dioscorides*, fructum esse nascentis in *Ægypto* fruticis *myricæ* fructu quadrantenus similem; cujus dilutum ad collyria quæ visus claritati conveniunt, additur. *Myricæ* fructus qualis sit, superius dictum.

2. *Erica baccifera procumbens nigra*, Clus. *Coris folio undecima*, Bauh. *Erica baccifera Matthioli*, diffusa est humi, & latas occupat areas. Rami multi, lignosi, flexiles, ex atro rufescente cortice tecti, qui interdum fibras agunt. *Foliola* ad ramos, crassa, carnosa, sapore primo exsiccante, post acri, ternis interdum quaternis versibus disponuntur. *Flosculi* ad foliorum exortus pusilli, triflori coloris ex herbaceo subalbicantis, quibus staminula purpurascencia interne. Succedunt his rotundæ baccæ juniperinis haud minores, maturitate nigra, succo turgida, quibus multum lignosa,

Ppp

Erica. lignosa. *Invenitur* florens & viridibus baccis onusta, in præcelſi montis, vulgo *Weschel* adpellati, scopulis, mense Junio: Augusto, in Sneberg & Snealben. Matthiolus in montibus, qui Bohemiam a Sileſia diſjungunt, *collegit*, immaturis forte baccis, quia subvireſcenti pulpa, quæ matura purpureo ſucco manus inficit. Habetur & in arenosis Hollandiæ tumulis. Differt ab *Oxycocco*

ſeu *Vacciniis paluſtribus Dodonæi*, ut Cluſius oſtendit: ſed parum ab ea abſudere videtur; *Coris Cordi*, quæ a gravi & cimiſibus ſimili odore nomen invenit. Fruticulus dodranſalis eſt, foliis *Ericæ* ſimilibus, baccis Juniperi minoribus, quæ attritæ medium inter Juniperum, Pinum, & Cimiſes odorem remittunt; qui tamen minime ingratus.

Cord. in
Dioſcor.
l. 3. c. 173.

ARTICVLVS III.

De Camphorata.

I.

Camphorata.
Vid.

TAB.
CXXVIII.
CXXIX.
Plin. H. N.
l. 24. c. 11.
15.

De Camphorata nihil plane apud Veteres, quidam *Selaginem* Plinii eſſe volunt, quam Sabinæ ſimilem dicit: alii ejusdem *Chamaepeucen*. Sunt, qui Cneorum nigrum eſſe volunt.

II. MODERNIS eſt duplex I. *Hirſuta*. 2. *Glabra*, quibus 3. *Conger* accedit.

I. *Camphora hirſuta* Anguill. *Chamaepeuce*, aliis *Camphorata Monſpelienſium*, Lugd. *Selago Plinii*, habet radicem pollicaris fere craſſitudinis multorum capitum; *Caules* lignoſos, craſſiuſculos, cubitales, ramoſos, ſubhirſutos, albicantes. Enodis *foliola* trientem uncia non excedentia, tenuia, piloſa, mediocriter rigida, odore aromatico, ſapore aliquantum acri prodeunt. *Gignitur* in ſqualidis & arenosis via Frontignana, & Montbelgardi in horto Ducis Wirtembergici. Admittitur in Martiati compoſitionem a Myreſo. *Selaginem* con-

tra omnem perniciem adhibendam prodidere Druidæ Gallorum; & contra omnia oculorum vitia ſumum ejus prodeſſe.

II. *Camphorata glabra*, Lugd. *Chamaepeuce* & *Camphorata minor*, eſt radice ſubnigra, longa, craſſa, ſurculoſa; ramis multis humi circa radicem jacentibus; foliis numeroſiſſimis per cauliculos ex intervallis conſertim prodeuntibus, larici ſimilibus, nullo flore, nullo fructu. Suam *Chamaepeucen* laricis foliis ſimilem, lumborum & ſpinæ doloribus propriam vult eſſe Plinius. Adhibetur, ut prior, ad emplaſtra vulneraria.

III. *Camphorata congener*, Lobel. & Lugd. *Anthillis altera Italarum*, Tabern. *Camphorata altera*, ſurculis, foliis, ortu & facie Camphoratam adumbrat: ſed exilior tota, & ſummis virgultis, tomentosis, muſcoſis floſculibus, luteo pallentibus, guſtatu præſiccis.

Lugd. H. P.
l. 10. c. 53.

Lugd. H. P.
l. 10. c. 33.

CAPVT VI.

De Arboribus miſcellis Claiſis ſextæ.

ARTICVLVS I.

De Aſpalatho.

Aſpala-
thus.

TABULA
CXXIX.

Dioſcor. M.
M. l. 1. c. 19.

Claſſi hac ſexta, *Aſpalathum*, *Santalum* & *Agallochum* exhibebimus.

I. *Aſpalathi* deſcriptionem ex Dioſcoride & Plinio dabimus. Dioſcoridi frutex lignoſus eſt, ἀκάνθας πολλάς κεκτημένος (aliis ἀκάνθαις πολλαῖς κεχρη-

μένοι imo κεκρυμμένος) multis ſpinis præditus ſeu rectus. Probatuſ ponderoſus, καὶ μετὰ τὸ περιφλοιῶσθαι (male apud Ætium, μετὰ τὸ φλογεῖσθαι, poſt incenſionem) rubens, aut in purpuram vergens, denſus, odoratus, & guſtu amareſcens. *Nāſcitur* in Iſtro, Syria

Syria & Rhodo. Vim *Σερμάντιν* μετὰ ψύξης obtinet: quo fit, ut ad terra oris ulcera in vino decoctus, ad ozanas, & genitalium nomas adhibeatur. Pesto additus foetus detrahit: ejus vero decoctum alvum sistit, &c. Utuntur eo & Unguentarii πρὸς τὰς τῶν μύρων εὐψείας. Theocriti scholiastes percussos eo cervos mori scribit, indeque nomen. Est & alterum genus candidum, lignosum, inodorum, quod etiam deterius habetur. Plinio est spina candida, magnitudine arboris modica, flore rosæ, nasciturque in Ægypto. Radix unguentis expetitur: traduntque in quocunque frutice curvetur arcus coelestis, eandem, quæ sit aspalatho, suavitatem odoris existere, sed in aspalatho inenarrabilem quandam. Probatio ejus in colore rufo vel igneo, tactuque spisso, & odore castorei. Optimus, qui minime ferulaceus, rubeus, & in purpuram vergens, detracto cortice. Nascitur pluribus locis, sed non ubique odoratus. Duplicem videtur facere, Orientalem nempe, candidum, magnitudine arboris justæ. Alterum fruticem humiliorem æque spinosum, in Nisyro & Rhodiorum insulis. Sed non adeo veteres ad arboris & fruticis definitionem respiciunt. Per Hispanias multi & inter odores & unguenta utuntur. Addo his Galenum, qui gustu quidem acrem, sed & adstringentem simul facit. Utriusque ratione deficcare & ad putredines & fluxiones inutilem. Cortex radicis in magma teledychroo adhibetur; apud Aetium in suffumigio quodam.

II. MODERNIS quadruplex est Aspalathus 1. Cortice cinereo, ligno purpureo. 2. Colore buxi. 3. Albicans torulo citreo. 4. Rubeus, quibus adde Ligna Americana quædam.

I. Aspalathus cortice cinereo, ligno purpureo, Ponæ Aspalathi prima species Dioscoridis, substantiam quidem compactam satis & gravem habet, sed in aqua non subsidit. Cortex superior ex cinereo nigricat, & cum quadam acrimonia adstringit. Huic membrana fibrosa, colore rubro ignem imitante, longe priore si degustetur

efficacior, subest. Hac demta ex Aspalathus. parte inhærente lignum in superficie ad purpuram vergens detegitur, intus pallescens; pars vero interna ad nigrum vergens. Odoratum est, & tam cito ut Castoreum nares ferit, sarmentosum, spinis quibusdam oppletum, & quod cum aliqua acrimonia adstringit. In defectu ejus substituitur a plerisque Agallochum.

II. Aspalathus colore buxi, Lugd. Aspalathi genus primum, visus est Veronæ apud Calceolarium & Belicocum Pharmacopæos. Frustum, quod Pona habuit, erat densum, solidum & compactum, quasi ex cujusdam fruticis ima parte resectum, radiatis fibris, grave, colore buxæ, sed saturatiore, suavissimo odore & pertinace, sapore non ita amaro, nec gustu insuavi. Nescio, an huc lignum aureum & flavum in insula Tercera pertineat.

III. Aspalathus albicans torulo citreo, Lugd. Aspalathi tertium genus, Cordo, Agallochum forte, i. e. Xyloaloe solida, quibusdam Lignum Rhodium, rhadifum, Oleastrum lignum, foris est albidus, intus torulo subflavo aut citreo, Santali albi & Citrini similis. Redolet rosam, tantillumque calidus, ut vix gustu discerni calor possit. Accedit ad eum Lignum roseæ odore, quod Johannes Bauhinus Coudenbergio Antverpiano, ex Palma Canarianarum una adlatum, acceperat. Durum & solidum hoc, Guajaci fere textura, pectinibus utcumque rectis, secundum quos finditur, ponderosum, bicolor, in medio fulvum, in ambitu album. Cortex, qui alicubi adhuc adhærebat, satis crassus, scaber, coloris ex fusco cinerei, sapore paulo acriore, nonnihil amaricante. Ligno odor Rosæ, sapor aromaticus, amaricans primo, mox acris, & qui ad Schænanthum accederet. Prunis impositum flammam celeriter concipiebat, sed ἀναπνὸν, nec quicquam refinosi fundebat. Videtur ejus & Ruelius meminisse. Describit enim delatum ex novo Orbe lignum, ex arborescente frutice in nodos inflexo & scabioso, cortice facieque lacunosa;

Aspalathus.

materia dura crispaque, colore intus buxco, candido cingente orbiculo, quod prorsus olet rosas.

Bauhin. H.
P. 1. 4. c. 27.
P. 473.

IV. *Aspalathus rubeus*, Ruellio *Lignum Rhodium rubescens & purpurascens*, Lugd. *Aspalathi secundum genus*, est cortice exutus rubens. Taxo concolor, adeo fragrans, ut totum cubiculum odore suo impleret. Ruellius addit, aquis injectum protinus fidere; subrubere & in purpuram cortice exutum quodam modo tendere. Asportatur ex Rhodiorum insulis. Referri huc debent, tam *Lignum Americanum* rubrum, diversi a Brasilio generis, e quibus claves suas Barbari conficiunt; quam *Lignum Sangvinho* dictum totum rubrum & cruentulum, quod in Tercera habetur.

Ind. orient.
1. 3. c. 6.
Linsch.

Lerius in
Hist. Brasil.

V. *Ligna Americana* quinque, I. *Lignum Brasiliense* ut charta candidum, sed nullius apud incolas pretii. Linschottanus Cretæ & nivi, non Candore esse ait. II. *Lignum Brasiliense violaceum*, ex quo factæ regulæ. Thævetus *Ligni purpurei* meminit, ex quo tincturæ fieri possunt. Simile ex supre-

ma Africa, teste Plutarcho, delatum erat, in quo Cajus Marius Rucilius, primus Ordinis popularis inter Romanos dictator, bellum curavit sculpi, personarum imagines trecentas sexaginta novem, digitis minores. III. *Lignum Foxo*, quod, ut & alia varii generis ligna præstantissima, insula Pico promittunt. IV. *Lignum Coaba*, quibusdam *saccharinum*, quod cistæ in quibus impurum saccharum ad nos deferretur, ex eo plerumque conficiantur; odoratum, colore ad purpureum vergens, porosum, grave tamen, fibris varie discurrentibus, Quercinum referens. Magna ejus in Indiis copia. V. *Lignum Aspalathi nomine ex Belgio Wormio transmissum*, quod est colore ex luteo nigricante, gummosum, fibris rectis constans, odoratum, levi acrimonia præditum. Abit ab hoc *Lignum Lobelii* apud Pharmacopæum Delfensem visum, quod corticem etiamnum adhaerentem habebat, rugosum tortuosumque admodum, colore & textura illicis, inodorum; & in cujus rimis non nihil suavis odoris gummi hærebat.

Worm. in
Musæo 1. 2.
c. 15.

ARTICVLVS II.

De Santalo.

Santalum.
Vid.
TAB.
CXXIX.
& CXXX.

I.

Santalum Veteribus Græcis incognitum videtur. *Santalum* enim apud Plinium frumentacea herba est, nec ulla ratio, cur ejusdem *Sericatum* dicas: & quod in libro secretorum Galeno adscripto exstat, supposititium omnino est, & alicui ex Arabibus debetur: fecissetque sapius ejus Galenus mentionem, si habuisset exploratum. Prima ejus apud Arabes mentio; inter Græcos vero recentiores Actuarius in Diaromaton suum Basilicum inter alia tria Santali genera recipit. Cæpit magis innotescere, ex quo Orientalis India & novus orbis, nostræ Europæ patere cœperunt. Quinque vero sunt Santali genera. 1. *Album*. 2. *Pallidum*. 3. *Rubrum*. 4. *Cinericium*. 5. *Chilense*: quibus subjungam 6. *Arbores materie nobiles* & 7. *Ligna aliquot*.

I. *Santalum album*, in Nucis magnitudinem attollitur; foliis admodum virentibus, lentisci æmulis. *flos* ex cæruleo nigricat. *fructus* Cerasi magnitudine primo viridis, deinde niger, insipidus & admodum caducus. Inodora arbor est, nisi Cortice detracto exsiccat: sed & tum vix perceptibilem spirat. *Lignum* citrino magnitudine & materia omnino simile, nisi quod magis palleat, piri ligno æmulum; odore & sapore imbecillius. *Nascitur* in Timor, quæ undique portuosa est plurimum, nec non in Verballi portu Javæ. In exteris regiones delata arbor crescit. Vidit enim Garzias in Andenager regni Decan metropoli in hortis regiis crescentem; sed plane inodoram. Exportatur Lusitanorum onerariis ex Malacca, in Cochinchina & Goa, inde in Malavar, Bengala, Canara, Decan & Guza-

Garz. H.
Arom. 1. 1.
c. 17. Acofta
H. Arom.
c. 9.
Bontius in
Medic. In-
dor. ad Garz.
caput 17.
Linschott.
p. 4. Ind.
orient. c. 30.

Guzarate. Frigidum, esse credunt Arabes & Joubertus & quidem ex illis Serapio in tertio gradu. Si ita est, vix hoc, quod nunc habemus, Arabum erit. Dici tamen frigidum potest, si evanidum est. Cum albumine ovi subactum, bene temporibus contra fervores capitis, & humorum ad oculos defluxum imponitur.

II. *Santalum pallidum*, quibusdam *Citrinum*, & *flavum*, tantæ cum superiore quoad arborem est adfinitatis, ut unam ab altera nonnisi incolæ dignoscant. *Lignum* est solidum, ponderosum, & fundum si aquæ injiciatur petens, pectinibus rectis, pingue, colore ex pallido rufescente & nonnihil in *Citrinum* vergente; sapore aromatico suavi, amaricante: odore fragrantis moschum nonnihil redolente, qui facile caput tenter & repleat. *Fructus* masticatus purpureo & morino colore inficit. *Provenit* ibidem in locis apricis, sed minore copia. Vix enim quinquagesimus quisque truncus pallidus est. Quia fructus a specie quadam Turdorum comeduntur, quos per alvum excernunt, fit, ut confitis ita per arva & montes novis arboribus, sylvæ nunquam deficiant, quamvis multa millia a Lusitanis & Hollandis cædantur. *Usus* si spectes, primum hoc locum obtinet, magnusque ejus per universam Indiam usus; ideo tantum legitimi ibi pretium, ut multo pluris ematur, quam in Lusitaniam delatum vendi possit. Unde merito dubites, an legitimum habeamus. Ex confuso & tenuissime molito, cum floribus Champac & Mogori, radicibus Curcumæ, Camphora & oleo nucis Indicæ recenti conficiunt unguentum pulvis consistentia, quo tam viri quam mulieres in Malacca corpus contra solis & februm æstus inungunt. Egrege vigilas arcet, ventriculoque impositum choleram sistit. *Cortex* viridis casarum arborum, nescio quid expirat virosi, & cerebro inimici. Unde ardentium februm genus quoddam, in quo durante exacerbatione, quæ quatuor plerumque est horarum, ridiculas actiones ægri edunt, id mu-

neris & opificii imitati, quod sani ex-Santalu-
ercuere. Laborant & bulimo, cainaque fame, vorantque quicquid ipsis etiam foedissimum obtuleris. In ligno *varietas* aliqua. 1. Ad portum Matomea quod crescit, multum ligni parum cordis habet: in quo tota odoris gratia. 2. Ad portum Camanase, improbum est, quia plurimum ligni, nihil cordis obtinet. 3. In portu Verballi, vehementer quidem odoratum, sed quod brevi senescit: nec aliter odorem post annum revocaveris, nisi multo ligno adempto.

III. *Santalum rubrum*, Cæs. *lignum odoratum rubrum*, Cord. *Lotus veterum*, *sandalus rubra* *Officinarum*, arbor a nemine quod sciam descripta est. *Lignum* quod adfertur, lapideæ fere est duritiei & ponderis, pectinibus rectis densissimis, crispis interdum & tuber aut nodosum vestigia imitantibus; colore intensius rubente quam Brasilium, ut ad nigredinem accedat. Odor evidens nullus sapor cum levi adstrictione fere factus. Commansum vix modicum salivam tingit; linteum, si adfricetur, magis; aquam si in pulverem redactum diu maceraveris, aut siveris ebullire. *Nascitur* in India intra Gangem, in Tanasirim, & maritimis quibusdam Coromandel. Magna copia ad nos adfertur. *Usus* ligni in refrigerando major quam albi & pallidi, ideo santalum in tali indicatione absolute positum, pro rubrosumendum est. Inungitur temporibus fronti & arteriis in febris. Notus in Officinis pulvis diatrion santalon. Infusum aut decoctum in ardoribus februm delirantibus cum pauxillo granatorum succo loco vini exhiberi potest. Indi ex eodem idola & delubra sua fabricant. Santali rubri quod in Officinis *Lignum aquilinum* dicitur, & quo in regno Congo febres curentur, Pigafetta meminit.

IV. *Santalum Cinericium* idem Pigafetta proponit. Sanant eo Galliam scabiem, & tanti apud incolas est pretii, ut parva ejus particula servo robusto commutetur.

V. *Santalum Chilense* copiose in Chile provenit, sed ab illo quod in Timor

Santa-
lum.
Vid. TAB.
CXXX.

Timor insula crescit, plurimum su-
peratur.

VI. *Arbores materie nobiles sunt*
1. *Araboutan* seu *Pseudosantalum ru-*
brum Brasiliense. 2. *Araboutan ad-*
finis. 3. *Abelicea*, seu *Pseudosanta-*
lum Creticum. 4. *Arbores pigmen-*
tiferae. 5. *Curaqua*, seu *Brasilium*
Hispanorum. 6. *Arbor insulae Taba-*
go materie ligno Brasiliano simili. 7.
Pira Timinere seu *arbor Guajanensis*
& 8. *Pavana Moluccensis*.

1. *Araboutan* seu *Pseudosantalum*
rubrum Brasiliense arbor est, quæ in
quercuum altitudinem excrescit, *can-*
dide aliquando adeo crasso, ut vix tres
homines amplecti possint. *Folia* sunt
buxi, parva, densa, & spissa. *Fru-*
ctus nullus. *Ligni* maxima ratio. *Cor-*
tice tegitur cinericio, ipsum delibra-
tum ad nos deferitur, estque durum,
ponderosum, pectinibus satis rectis,
coloris foris & qua parte imbres so-
lemque passum est, sanguinei, intrin-
secus dilutius rufescens. Sapor est
dulcis, salivamque commanum aut
liquorem infusum tingit. Eligito ru-
berrimum. Decorticatum, inquit Cor-
dus ad nos adfertur, ut pluvias vel
alias ex industria adfusas aquas facilius
imbibere possit. Hoc enim pacto id,
quod pallidius est, floridiorem colo-
rem acquirit, quidam lixivio hume-
tant. Facile deprehenditur. Pur-
purascit enim in superficie, intus re-
manente pallore. *Frequens* in Brasi-
lia, & regione S. Crucis nomine vo-
cata. Adlatum Salomoni a Regina
Sabæ, sub nomine Almugim, som-
nium est Theveti. Munsterus in Ca-
lecut etiam & regno Pegu nasci scri-
bit. *Usus* in *Medicina* hucusque nul-
lus; in tingendo maximus. Nam &
Cinis lineæ inficit, ut nullo sapone elui
possint. Ruellius observavit in te-
nuissima segmenta vel taleolas findi &
aliquot diebus macerari lanas, elutria-
tasque cortinis incoqui ut succum li-
beraliter ebibant. Color tanto dilu-
cidior, quanto saturitate fraudata, mi-
nus saniei hujus epotarunt. Sed si
plus sitiunt vellera, ut largius succo
inebrientur, subnigricante colore re-
fulgebunt. Certaret is infestivus co-
lor cum purpura, si pannis tam per-

tinaciter hæreret, ut primam gratiam
gestatu, attritu aut usu non exueret.
Sed vellus hujus succi non semper te-
nax, in rubrum colorem degenerat.
Lixivio ferventi vitro derafum inje-
ctum cum modico aluminis liquorem
ad scripturam elegantem suppeditat.
Usus ejus & apud scriniarios aliosque
opifices. Liquore in quo lignum ita
decoctum est, ut pene nigrescat, di-
gnosces, an alumen in aquis medica-
tis contineatur. Nam si ille supra se-
dimentum destillationis hujus adfun-
datur, color ad nigredinem vergens,
dilutior clariorque evadet, si alumen
præsens sit. *Differunt* bonitate hæc
ligna, si Theveti fides. *Vilius* est quod
versus Canibales, & totam regionem
Marignan provenit. *Melius* quod
circa Capo de Frie & alibi.

2. *Araboutan* seu *Pseudosantalo ru-* Ind. orient.
bro Brasiliensi adfinis est illa in regno p. 6. c. 56.

Guineæ in insula Corisco arbor, quæ
ligna Brasiliensia rubedine superat, &
cujus lignum politissimi speculi instar
nitet, tantæ duritiæ, ut vix ingenti la-
bore inflecti possit. Forte lignum
Brasilianum flammei coloris Acosta.

3. *Abelicea ἀπελίκη* seu *Pseudosan-* Acosta hist.
talum Creticum, Johanni Bauhino Novi orbis
Santalus adulterina Cretica, arbor l. 4. c. 29.

est adpectu pulcra, magna, recta, ra-
mosa; cui *materies* dura & paulu-
lum odorata; pulvis quippe santala
imitatur; *folia* Alaterni sed rotundio-
ra, profunde serrata. *Flos* ignotus.
Fructus magnitudine quasi Piperis,
rotundus quasi, colore inter viridem
& nigrum medio. In solis monti-
bus Leucis, altissimisque eorum jugis Bellus epist.
provenit, trabesque ex ea fiunt. Ignor. 2. ad Clus.
ta veteribus, ni sit ulmus montana
Theophrasti, sed folia neque leviter
serrata sunt, neque magna ut Piri,
sed longe minora.

4. *Arbores pigmentiferae* in insula Ind. orient.
Madagascar seu S. Laurentii habent. tal. p. 4.

5. *Curaqua* seu *Brasilium Hispano-* Reccus R.
rum, Laetio Caburaqua, Mexicanis M. N. H.
Quamochitl, & *Vitzquabuitl* voca- l. 4. c. 28.
tur. Frutex est spinosus, cui *radices*
surculosi & candidi; *stipites* extra ful-
vescentes intra rubei, contorti. *Folia*
cordis

De Laet
Ind. occid.
l. 5. c. 23.

cordis fere figura, frequentibus interveniis, e dorso oblique in latera procedentia, mucrone adpenduntur. *Fructus* luteus *Ericæ* similis. *Nascitur* in frigidis, campestribus & montosis apud *Mechuacanenses* locis. *Temperies* ei frigida & sicca, sapor adstringens. Tingit fila coccineo colore. Jus decocti primo fulvum, postea rubescit, si amplius decoxeris, cogitur in purpureum pigmentum; sed alumen si admisceas, in rubeum & *Cinnabari* decentius. *Dux* ipsius species, quantum altera *Pinguica*, altera *Uxiqua* nuncupatur.

De Laet
Ind. occid.
l. 17. c. 28.

6. *Arbor insulæ Tabago materiei ligno Brasiliiano simili*, nascitur in dicta insula juxta littora. *Materies* est ligni *Brasiliiani* instar rubra. folia pene orbicularia. *Fructus* racemosus uvis hand dissimilis, saporis admodum grati.

7. *Pira Timinere*, seu *arbor Guajanensis*, procera est & recta, glabro *Cortice*. *Frondes* in fastigio trunci tantummodo fert, quæ ad pyri folia quam proxime accedunt. *Lignum* fert solidum, durum, & grave, colore rosso elegantibus notis subnigris, grata varietate distinctum, magni ad fabrilis opera usus; *Barbari Pira Timinere* vocant, *Hollandi Letterhout*.

Lugd. H. P.
l. 18. c. 100.
p. 1864.

8. *Pavana Moluccensis*, *Acostæ* & *Lugd. Lignum Moluccense*, *Tabern. Lignum Pavanum*, arbor est domestica, *Mali* *Cotoneæ* magnitudine, cujus folia *Malvæ* vulgaris foliis similia; *fructus* *Avellanis* sed minor, molliore cortice & nigricante. *Seritur* coliturque in hortis, nec alibi facile invenias: tantique ab incolis æstimatur, ut peregrinos ne ad ejus quidem adspectum admittant. *Usus* ligni insignis, in evacuando, contra venenatorum morsus, morbos alios & avium captura. *In evacuando*, Pulvis enim, (teritur lima e pelle caniculæ marinæ, vel tenui ferrea) scrupuli dimidii pondere, robustissimo etiam, ex aqua tepida, rosacea, vel juscule gallinæ, mane exhibitus crassos, lentos, & melancholicos humores, sine nausea, vomitu & dolore,

nisi forte in biliosis, evacuat. *Cibus* *Santalum* nonnisi peracta evacuatione sumentus: post eum abstinendum a potu: hypercatharsis vero decocti *Oryzæ* *Cyatho* vel *aviculæ* subito sistitur. In nonnullis tamen ani pruritus & exoriationem, quibusdam hæmorrhoides excitat. *Venenatorum morsus*, in eadem dosi seu sumtus in aqua rosacea vel juscule galli pulvis seu ad motus retundit. *Morbos alios*. Experimento namque cognitum, febribus diuturnis, & continuis, iliakis colicisque doloribus, flatibus, hydropi, arenulis, calculo, urinæ difficultatibus, *Cholericæ* passioni, & articulorum doloribus prodesse. *Avium captura*. Illico enim concidunt, si de oryza, cui pulvis immistus est, degustant; si nimium adsumserint, moriuntur, graculi inprimis.

VII. *Ligna* sunt aliquot. 1. *E Siam*. 2. *Cocogola*. 3. *Sapou*. 4. *Sambarane*. 5. *Lignum ex freto Magellanico medulla flavescens*. 6. *Lignum Bresilio simile cæruleo tingens*. 7. *Ligna pretiosissima ex Havana*. 8. *Ligna, fructus & gummata tingentia Guajanæ*.

1. *Lignum e Siam*, rubicundum est, flavedine eleganti mistum & odoratum; & valde leve. De Laet ad *Pernabucense* accedere ait.

Wormius
Musæi l. 2.
c. 19.

2. *Lignum Cocogola*, coloris est purpurei obscuri, & fragile admodum. Masticatum rubro colore sputum tingit.

Wormius
Musæi l. 2.
c. 15.

3. De *Ligno Sapou* hoc duntaxat scimus, lanis tingendis percommo- dum esse.

Linschott.
Ind. orient.
p. 2. c. 24.

4. *Lignum Sambarane*, odoratum est, & *Santalo albo* persimile, quo se in febribus *Malaccenses* inungunt. Putatur esse *Santali* species, commendaturque ad *Erysipelata* & inflammationes.

Garz. H.
Arom. l. 1.
c. 17.

5. *Lignum ex freto Magellanico medulla flavescens*, arboris est cujusdam, quæ fructum nigrum *Myrtillo* similem profert. Solidum hoc, grave, medullis medulaceum, a quo velut a centro venæ recta fere linea ad circumferentiam excurrunt. Cor-

Clus. exot.
l. 1. c. 7.

Santalum.

tex geminus; Externus scaber & inæqualis, ex parte fuscus, ex parte cineraceus; internus mollior, flavescens seu pallidus. Ejusdem substantiæ coloris, falsum quid natura an casu recipiens.

Bauhin. H.
P. l. 4. c. 41.
p. 422.

6. *Lignum Bresilio simile cæruleo tingens*, a Pharmacopæo Porentrunsi Bauhinus acceperat. Colore & pectinibus Bresilii vulgaris odore grato, sapore cum dulcedine nonnihil acri. Leniter masticatum cæruleo tingit colore, melior tinctura si alumen admiscueris. Montbelgardenfes ex Trecensi urbe & Argentina accersunt.

Acosta Hist.
Novi orbis
l. 4. c. 30.

7. *Ligna pretiosissima ex Havana & insula Cuba* sunt plurima; ex qui-

bus Ebanos, Caovana, Granadillos & similia in Hispaniam invehuntur.

8. *Ligna fructus & gummata tinctia Guajana* sunt varia. Ex lignis *unum* elegantem colorem purpureum fundit; *alterum* croceum; *tertiu* liquor excoctus fervens purpureo tingit; frigidus coccineo. Ex *fructibus* eo qui dicitur *Annoto*, aliis *Orellana*, lanæ & præsertim byssus colore aurantio inficiuntur: *Acinus* vero quidam cæruleum reddit. *Gummi* quod a certa arbore funditur, pannos pertinaci flavedine tingit. Adde denique arboris cujusdam *frondes*, quæ bene præparatæ colorem obscure rubentem emittunt.

De Laet
Ind. occid.
l. 17. c. 14.

ARTICULVS III.

De Agallocho.

Agallochus.

T. A. R.
CXXXV.
Dioscor. M.
M. l. l. c. 21.

I. De *Agallocho* pauca Dioscorides, pauciora si sub *Taril* nomine Plinius, plura Arabes, Serapio inprimis & Iben Sina prodidere. Dioscorides Thyiæ ligno simile facit, forma sine dubio & colore, non soliditate ac gravitate, *εσχυμένον*, id est punctis maculisque distinctum (in optimo cinereæ discurrent venæ) odoratum, accensum inprimis. *Cortex* cutis instar mollis: hinc Plinius cute magis quam cortice vestiri ait; & versicolor. *Fructum* rotundum Piperis modo & rubentem an bene ipsi adscribat Serapio, vix scitur; cum nec reliqui Arabes ejus unquam meminerint; & ipse Serapio sibi contradicere videatur, dum solum lignum in Arabia ex eo nasci scribit. Ex India & Arabia deportatur; ex confinio Casiæ Cinnamique per Nabataeos Troglydytas Plinio. Sethi in diversis Orientis partibus, meridionalibus inprimis nasci reliquit. Ramos a fluminum inundationibus raptos, per circumstantes regiones deferri; ab arbore sectos integro anno sepeliri scribit, ut ita obruti ligni cortex marcescat, lignumque purum remaneat, nihil tamen ex illo erodatur, eorundem fide traditur. Chamælea adulterari, quod Pandectarius prodidit

Plin. H. N.
l. 12. c. 20.

omnino falsum. Mirum nihil de eo Galenum prodidisse, periere forte in quibus egit libri. *Usum & vires* si respicias calidum est in secundo & sicum *lignum*, subtiliumque partium, cerebro, cordi, & ventriculo infirmo convenientissimum. Facit *περὶ διωδιαν σώματος*: toti corpori est *Διὰ πάσα*: (siccis odoribus constant quæ *Διὰ πάσα* vocantur) *Συμίζεται ἀντὶ λιβανωτῆς*, seu quod thus eo vilium temporis fuerit; seu quod non secus ac thus in suffumigio locum habeat. Si crebro suffiatur, pediculus creditur gignere. Radix drachm. j. pondere stomachi *πλάδον καὶ ἀτονίαν* mitigat. *Genera* diversa Sepio prodidit. 1. *Arabicum* quod nihil præter lignum fert. 2. *Indum* proprie inter alia, quæ ibi proveniunt, genera ita dictum, quod præfertur, inprimis si nigrum, ad varium colorem inclinans, multa humiditate repletum, grave, durum, densum, omni albedine carens, & diu supra ignem durans. Quia acre, prohibet pediculorum generationem suffitum. Provenit in insula Fimua, quam me ignorare fateor. 3. *Monduni* ab Indiæ loco Mondel (Melinda forte) dictum quod illi proximum. 4. *Seisi*, quod aquæ immersum fidit ob pondus, melius

Plin. H. N.
l. 13. c. 11.

melius quo crassius, bonitatisque nota, si aliquid luti adhæreat. 5. *Alkumeri* quod prædicto bonitate cedit. Præfertur nigrum, mundum aut etiam ad albedinem vergens, grave, diu permanens in igne. 6. *Semi*, in quo humiditas superflua. 7. *Albel* quod defertur ex terris *Sufellæ* (*Sofalæ* fertur) simile cæteris, *Semi* si excipias. 8. *Alhabeli* omnium maximum & crassissimum, ex quo pectines & tabulæ. 9. *Neuig* quod in Arabia provenit, & ad species ejus accedit. 10. *Samphium* quæ in *Samphi* civitate nascitur; nec proprie est *Xylo aloë*. 11. *Humida*, cujus *Sethi* mentionem facit, & cujus quatuor sunt differentia. Egregiarum est post *Indicam* virium, ventremque sistit.

II. NOBIS *Agallochum* est triplex 1. *Præstantissimum*. 2. *Officinarum*. 3. *Sylvestre*.

Linschott.
p. 2. Ind.
orient. c. 24.
32.
Garz. ab
Horta H.
Arom. l. 1.
c. 16.
Bontius
Medic. In-
dor. p. 19.

I. *Agallochum præstantissimum*, Romano *Calampart*, Linschott. *Lignum Calamba*, *Colamba*, *Calambes* sive *Aloës*, Arabibus *Agalugem*, & *Haud*, *Guzarati* & *Decan* incolis *Ud*, arbor est *Oleæ* instar, interdum major; materie, quæ *Cortice* crasso tegitur, gustus aromatici & subamari, nec tam suavis, dum viridis, odoris, hunc siccata acquirit, & in ipsa matrice forte quod putrescente cortice & ligno, oleosus humor ipsi sese insinuat, colligitur. *Folia* non describit *Garzias* etsi ex *Malacca* adlata; nec flos vel fructus additus, quod ob *Tigrium* illis locis frequentiam haberi non possit. *Nascitur* in *Sumatra*, *Cambaja*, *Siana* & alibi. Optimum in *Champas*, vicina regno *Chinæ* regione, & in *Cochin China*. In *Arabia* non provenit. *Cortice* nudatum adfertur, quod uno sæpe trunco diversæ stirpium species coalescant. Ut separentur, trunci in ripis fluviorum deponuntur in cæno. *Carie*, diversi generis lignum, cum ligni *aloës* *Cortice* secedit; materia, quæ quia densa minus putredini obnoxia est, (per L.

annos nulla putredine tactam obser-
vavit *Bodæus*) relicta. *Usus* ejus apud *Chinenses* in suffumigiis. Adeo quippe odoratum est, ut sola tractatione sine ullo subiecto igni, spiret admodum valide, sed jucunde. *Prothure* substitui non credibile, si verum majorem hujus ibi copiam, thurisque selecti centum pondo aureo emi; *Agallochi* etiam in *India* nati, tribus aureis libram, tempore *Ludovici Romani* decem. Ejus nempe sincerum pretii est, ut cum argento & auro deponderetur, & inter solos *Indiæ* Reges distribuatur. Minus ergo bonum ad nos adfertur. Falsum, *Ibensinam*, ut odor eliciatur, elixari scribere: nec ulla apud eum recentiores vel alios veteres hujus mentio, aliud forte exemplar *Garzias* habuit. Pulvis scrupuli unius ponderæ *cholerae* & *ventriculi* adfectibus medetur, & *tineas* cum *ascaridibus* efficaciter necat. Præfertur multum nigricans, cinereis discurrentibus venis, ponderosum, plurimo humore pingui prægnans. Igni accensum, multum humoris exsudare debet; nec obest, etsi non subsidat in aquis; accidit id sæpe selectissimo. *Guzarate* & *Decan* incolæ magna frustra requirunt. *Cordus* exigit odoratissimum etiam per se ut est integrum; gustu valde aromaticum, modice amarescens, leviter adstringens, pingue & resinosum, cujus suffitus latissime spargat odorem, & gustatum ac palatum commendet. De *Differentiis* nihil occurrit. *Cordus* maculosum & crispum se sæpe vidisse scribit. *Radici* proximum fluctuantibus venis in crispum habitum vibratur. *Veneti* unum genus norunt, quod *Alexandria* habent, ex *Arabia* delatum. *Paludanus* aliquot se species habere notat, amenas odore omnes, varias & maculosas, pinguedine plenas, densas & crassas: sed quas non descripsit.

Agallo-
chum.
Bodæus ad
Theophr.
l. 9. c. 7.
Stalig. in
Exercit.

Paludan. ad
Linschott.
histor.

II. *Agallochum Officinarum*, aliis *Linschott*.
lignum aloës, *lignum Paradysi*, *li-* Ind. orient.
ignum sanctæ Crucis, *Palo d'Agula*, p. 2. c. 24.
feu *d'Aguilla*, lignum est pectinibus Bauhin. H.
R r r ple-

Agallo-
chum. P. l. 4. c. 30.
p. 747. plerumque densis & rectis, quod-
que transversim sectum quernei li-
gni pectines æmulatur, partim albi-
cans, durum, grave, pingue, &
cum quadam aromatica acrimonia
amaricans, suavissimumque spirans
odorem. Prunis injectum bullas
agit, totumque sensim colliquescit;
flammescit tandem si sufflando per-
gas. Frustrulum Lobelii e trunco
avulsum ponderosum erat, venis mul-
tis, fuscis, amaris, & pinguioribus,
quæ manducata ceræ modo lente-
scebant. Reliqua ligni materia &
superficies alba, fragilis, minus aro-

matica. Provenit in iisdem cum
superiore locis.

III. *Agallochum sylvestre*, Hispa- Lugd. H. P.
nis *Aquila brava*, Lugd. *Xyloaloe syl-* l. 18. c. 12.
vestris, in Zeilan, Comoria & tra- Garzias H.
ctu Coromandel provenit. Mirum A. l. c.
in modum æmulatur Agallochum,
inodorum tamen est. Concinnantur
ex eo sphærulæ precatoria; sacrapis-
que & sacerdotibus struuntur rogi Bauhin. H.
in India. *Adulteratur*, si Plateario P. l. 4. c. 29.
credimus, ligno quodam in monti- P. 481.
bus Almasiæ nato, quod pondere, no-
doso habitu, & quadam aromatica
vi notas ejus refert.



HISTORIÆ NATVRALIS

DE ARBORIBVS

LIBER X.

De Arboribus miscellis Exoticis.

CAPVT I.

De aliquot arboribus Novæ Hispaniæ.

Arbores
Novæ
Hispa-
niæ.

Reccus l. c.
c. 64.

TAB.
CXXXI.
—
CXXXIV.

Claudent tandem agmen *Arbores miscellæ Exoticæ*, recensibimusque inter eos primo *Arbores quasdam novæ Hispaniæ*, mox *Brasilenses*, tum *Venenatas*, tandem *Admirandas*. *Arbores Novæ Hispaniæ* occurrunt septendecim. 1. *Quauhxiloti*. 2. *Tlapalezpatli*. 3. *Chichictlapalezquahuil*. 4. *Ahuapatli Tilacensis*. 5. *Bitoncus*. 6. *Toloxochitl*. 7. *Tiztlehuayopatli*. 8. *Cocoquahuil*. 9. *Soconam*. 10. *Tepeyquixochitl*. 11. *Ihuxochitl*. 12. *Acopatli*. 13. *Tzopetic quahuil*. 14. *Tzitzin*. 15. *Tlitzapoti*. 16. *Totocapollin*. 17. *Tlaco-tezquipatli*, quibus adde fructus duos in Persia, & aliquot Americanas arbores.

Reccus R.
M. N. H.
l. 3. c. 61.

I. *Quauhxiloti* seu *arbor Cucumeris moschati*, magna est foliis ternis ocyminis proximis, sed majoribus & latioribus, spinulis undique horrentibus; floribus candicantibus cymbalorum figura; fructu Cucumeris falcati forma, viridi sed in luteum vergente striato, eduli prædulci, & qui Galliam moschatam redolet, sed odore evanido. Provenit in calidis Jauhtepecensibus juxta aquarum decursus. Folia decocta & auribus infusa surditatem a frigiditate exortam tollunt, calida & sicca in primo. Datur & altera species, sed spinis carens, foliis ferratis, pennatisque ramulis.

Reccus l. c.
c. 63.

II. *Tlapalezpatli*, seu *arbor sanguinem sistens*, aliis *Etzpatlis* mediocris est, foliis Origani, flore parvo & candido, qui racematim dependet; & in Septembre prodit. Fructu, ut ferunt, nullo. Gaudet gelidis montosisque, aut aliquanto calidioribus. Cortices decocti urinam evocant, sanguinemque per colem fluentem cohibent: ipse cortex alvum coëret.

III. *Chichictlapalezquahuil*, seu *arbor sanguiflua*, fert folia oblonga, obtusa & circa pediculum sensim attenuata; lacque primo candens, tandem rubescens fundit. Flore & fructu carere ajunt. Nasctur apud Quauhnacenses temperatis plagis, aut paulo frigidioribus. Calida est, glutinosa, resinosa, odora, & adstringens. Cortex stipitis tusus & ex aqua potus sistit hæmoptysin.

IV. *Ahuapatlis Tilacensis*, arbor est magna, cui stipes intrinsecus pallidus, folia spinosa, Ilicis similia, sed paulo longiora: flos parvus luteus, orbicularis; fructus nigrescens. Provenit in collibus planisque Mistecæ superioris locis. Ramenta stipitis decocta istericis magnopere conferunt.

Reccus l. c.
c. 65.

V. *Bitoncus* arbuscula est ulnam unicam longa, radice alba, stipite circa exteriora subfusco; foliis ternis, quorum medium hastarum mucronibus simile, bina minora & orbiculatiora. Nasctur in Philppinis insulis. Radix calida & sicca ordine tertio, amara, odora & acris. Vacuat moderate & citra anxietatem.

VI. *Toloxochitl*, arbor est magna, foliis Mali Medicæ, sed duplo longioribus; umbilico ac flore cordis figura, multis foliis candidis, interius rubescentibus, pinguibus, levibus, tenacibus, glutinosis, & suaviter odoratis stipatus. Crescit in Mexicanæ campestribus humilibusque locis. Flores calidi sunt in secundo & sicci, roborantque ventriculolum. Infunduntur utero contra sterilitatem.

Reccus
l. 2. c. 20.
De Laet
Ind. Occid.
l. 5. c. 4.

VII. *Tiztlehuayopatli*, seu *radix Caryophyllæ*, arbor est mediocris, foliis moniæ mali, sed inferne candidis hirsutis.

Reccus
Li-l. 2. c. 26.

Arbores tisque, superne nigricantibus; Flores
Novæ candicant, fructus orbicularis & par-
Hispa- vus. *Nascitur* in calidis Tilanci collibus.
niæ. *Radix*, quæ in tertio calida & sicca, Ca-
ryophillos sapit, eorum bene suppletu-
ra locum. *Folia* stæchadem odore imi-
tantur. *Cortices* tusi & adsumti dysen-
teriam tollunt.

Reccus R. *VIII. Cocôquahuil Vexacensis* seu ar-
M. N. H. bor *Cardiaca*, leguminis fert folia, & cir-
l. 3. c. 73. ca eorum exortum exiles *flosculos*, ac
rubescensem succum. Hic semuncie
pondere Syncopi & lassitudini confert,
si singulis diebus sumatur.

Reccus *IX. Soconam* arbor est *stipite fusco* can-
l. 3. c. 74. didis punctis distincto; *foliis* Senæ mi-
noribus; *floribus* in muscarii modum
albis, & ex albo rubescentibus. *Nasci-
tur* in jugis Ytztoluce. Planta auctori
insignis propter duo morborum genera
fere insanabilia, quorum tamen non me-
minit. *Folia*, quæ amara & adstringen-
tia, tusa & cum resina permixta, tineæ
ac lichenibus medentur.

Reccus *X. Tepeyzquixochitl* arbor est magna,
l. 3. c. 76. *foliis* Yzquixochitl, sed majoribus; *flori-
bus* candidis, calycibus hirsutis conten-
tis, ac in magna muscaria compositis
inodoris. *Provenit* Cocolani & Chiatlæ
calidis regionibus. Frigida natura sic-
caque est, sapore paulatim dulci. *Cor-
tex* tritus ardorem gingivarum tollit,
& dentes firmat, duar. drach. pondere
fistit alvum,

Reccus *XI. Thuixochitl*, seu *flos pennas avium*
l. 3. c. 77. *referens*, est arbor magna, *foliis* quin-
is per intervalla prodeuntibus, oblongis,
incurvis; *floribus* rubeo pennis avium si-
milli, qui vere primo funditur. Rami
amabilem ferentem facere dicuntur,
quod nugæ. *folia*, quia frigida, extin-
guunt febres. *Provenit* calidis & hu-
midis locis. Duæ ejus *species*. altera fert
flores candentes; altera ex viridi albe-
scentes.

Reccus *XII. Acapatlis* arbuscula est hominis
l. 3. c. 83. altitudine; radice furculosa, stipes est
lævis, cavus & quadratus: *folia* ra-

phani per ambitum crenata serræ in
modum, *flos* albus, *fructus* nullus. *Na-
scitur* apud Panucenses. *Folia* tusa &
adplicata absumunt lienem, & dolorem
ejus sedant.

XIII. Tlopelicquahuil arbor videtur. *Terent.*
Folia atrovirent, & multum inflectun- *apud Rec-*
tur. Rami flavi ex viridi. *cum p. 437.*

XIV. Tzitzin videtur ramus arboris. *Terent.*
Folia bina Castaneæ similia, saturati co- *ibid. p. 436.*
loris valde, duos digitos transversos
lata, longa quatuor.

XV. Tlacotequitpatli, est ramus ar- *Terent.*
boris, *folia* oleam quodammado repræ- *ibid. p. 416.*
sentant.

XVI. Totocapollin videtur arbor. Ra- *Terent.*
mi virides punctis albis confersi; in *ibid. p. 432.*
quavis ala videtur latitare quasi bacca
viridis.

XVII. Thilzapoti forte arbor; pomum *Terent.*
adnascitur brevi pediculo Cydonio simi- *p. 430.*
le sulcis aliquot conspicuum, colore fe-
re Castaneæ.

XVIII. Fructus duo in Persia sunt *De Laet*
nis & Carbase circa Castellum Sellizure; *Reip. Pers.*
quorum ille magnæ molis & succi ple- *p. 262.*
nus, quam incolæ post cibum loco po-
tus usurpant; hic mole est Cucumeris,
flavo colore & suavi sapore.

XIX. Arbores & frutices Americani sunt *De Laet*
sequentes. 1. *Higillo pintado* in insula *Ind. Occid.*
S. Johannis de portu divite, frutex, cu- *l. 1. c. 2.*
jus foliorum succus vulnera potenter
conglutinat. 2. *Frutex S. Mariae*, su-
periore in medendo haud inferior. 3. *Ar-* *De Laet*
bor cortice Zingiberis insar acri, cujus *l. c. c. 17.*
cortex lævis, *materies* dura, interius
subnigra; *folia* rotunda, obscure viren-
tia; *floribus* in umbellam collecti exterius
purpurei, intus aurei. Amat ripas &
uliginosa loca. 4. *Arbor fructu variega-*
to, qui est pyro haud abfimilis, elegan-
ti colorum varietate distinctus, & velu-
ti maculis sparsus. 5. *Annedan* arbor *De Laet*
Canadensis, cujus frondium decoctum *Ind. Occid.*
scorbuticis vehementer opitulatur. 6. *l. 4. c. 14.*

Esquine arbor Floridana, decantati con-
tra luem veneream usus:

CAPUT II.

De aliquot arboribus Brasiliensibus, & aliis.

Arbores
Brasili-
enses.

Arbores Brasilienses sunt, 1. *Zamou-
na*. 2. *Cuipouna*. 3. *Iperoba*. 4.
Arariba. 5. *Saiimbe Iba*. 6. *Gvapa-
reiba*. 7. *Guirapariba*. 8. *Atzpan*. 9. *Je-
couiba*. 10. *Cabui Iba*. 11. *Tremate*. 12.
Atlyna. 13. *Jaborandi*. 14. *Canambaja*.
15. *Arbores duæ innominate*. 16. *Frutices*
quinque innominate. 17. *Tipi*.

1. *Zamouna* est arbor excelsa & in me-
dio duplo plus obesa, mulierisque ute-
rum ferentis instar tumida. *Materies*
trunci intus alba, medullosa & subero-
sa; exterius cinerea, validis & horri-
dis spinis a pede ad verticem usque ob-
fessa. Rami quinque foliis acuminatis
& oblongis vestiuntur. Elicitur ex spi-
nis

Piso de fa-
cult. simpl.
l. 4. c. 35.

nis rasis & contusis succus, qui inflammatis & lacrymantibus oculis medetur.

Piso l. c. c. 39. II. *Caipoune* flores flavi. Succus e cortice raso expressus, & cum aqua limpida permixtus, ulcera inveterata & purulenta mundificat.

Marcgr. H. N. l. 3. c. 3. III. *Iperoba* arbor cortice cinereo punctulis albis variegato. Folia crassiuscula cinerei ex viridi coloris, tria more phaselorum adponuntur. Lignum album instar betulae ad varia utile.

Marcgr. l. c. c. 8. IV. *Arariba* cortice est cinereae instar fraxini interius albo, qui in aqua coctus fit ruber, & cum illo tingitur.

Marcgr. l. c. c. 10. p. III. V. *Saiimbe Iba* Lusitanis *Caiveira brava*, arbor Acajuibae similis. Folia illius aemula, verum ad tactum duriora, rugosa, & hispida. Flores in umbellam congesti, multi, parvi, inodori, mense Martio visuntur. Fructus nullus.

Marcgr. l. c. p. 118. VI. *Guapereiba* Lusitanis *Mangue verdeiro*, habet lignum grave solidum, cortice brunno tectum; folia crassa, nervosa, laete viridia; flores in calycibus longiusculis multos ex viridi subluteos. Fructus decidens cancrorum terrestrium, qui sub his arboribus degunt, fit pabulum.

Marcgr. l. c. c. 11. VII. *Guirapariba*, vel *Urupariba*, Lusitanis *Pao d'arco*, est arbor alta, laetæ & mediocris crassitie; folia in frondes congesta ferens. Quolibet enim frons quatuor aut quinque habet, inaequalis magnitudinis, oblonga, saturate virentia, splendentia, ad tactum membranacea, nervo secundum longitudinem excurrente. Mense Decembri ἀπύλλος, flores protrudit. Copiosissimos, magnos, flavos, tres aut amplius digitos longos, superius in quinque quasi folia sectos, sine staminibus, inodoros; quibus decidentibus folia iterum erumpunt. Florens tota flava adparet, & ad tria vel quatuor milliaria dignoscitur.

Nieremb. H. N. l. 15. c. 59. VIII. *Atzpan* frutex est duorum cubitorum altitudine, radicibus fibrarum in modum, foliis amygdali ferratis & paulo minoribus, caulibus tenuibus, e quorum postremis flagellis flores albi erumpunt. qui priusquam hient, similes semini Coriandri videntur, ac demum senescentes in pappos abeunt, a quibus flagellis flore onustis vexilli nomen invenit. Temperatum solum amat, quale est Mexicanum. Sapor est acris, vehemens odor, ac calefaciens & exsiccans ordine fere quarto naturæ. Quamobrem confricatam foliis faciem mire dicitur exstergere, leprasque, ti-

neas, lichenas & varos cum aliis fordibus cutis vitiiis curare. Eadem & succus operatio.

IX. *Jecuibá* est arbor satis alta, cortice subcano, foliis sibi alternatim oppositis, tres digitos circiter longis, acuminatis, nervo secundum longitudinem & venis transversis. Flos est caeruleus. Lignum ex raso brunnum & nigro undulatum, ad sculpturas egregium.

X. De *Cabui Iba* hoc tantum exstat, Lusitanis *Pan amorello* dici, arboremque esse magnam & altam, cui rami & folia arbori Tamarindiferae similia.

XI. *Tremate* frutex est arborescens, Mali Punice figura similis, cortice fambucino, ligno albo & medullam continente. Folia obscure viridia, aspera, multis venis conspicua. In ramorum extremis umbellae magnae, floribus lutescentibus onustae, quibus aliquid purpurei admiscetur, & in quorum medio multa staminula flavescunt. Facies sunt in pappos & exacte odorem styracis referunt. In papposis capitulis est semen minimum, rotundum, nigrum, papaverino minus. Brasilienses foliis contusis in oculorum rubedine utuntur.

XII. *Allyna* arbor est, quae juxta Caoferas plantari solet, ut eas inumbret, & a ferventibus solis radiis defendat. Nam ad nihil praeterea utilis est, quod sciam.

XIII. *Jaborandi*, planta est frutescens. Radix lignosa, tenuis fusca. Caulis minimum digitum crassi, per longa intervalla nodosi, teretes & saturate virentes, quibus ad nodos rami itidem nodosi & virentes. Folia a sex ad decem digitos longa, saturate viridia, splendentia, membranaceae chartae instar; in extremitate incurvata, nervo secundum longitudinem & venis obliquis conspicua. Radicis, quae, si masticeetur, linguam adurit, in liberando a Catarrhis capite, usus. In gonorrhoea praesentissimum est remedium, si contusae in aqua maceratæ decoctum adhibeas. Prodest & contra venena, urinæque suppressionem.

XIV. *Canambaja* frutex est ligno exterius cinereo, foliis crassis, substantia Aloës similibus, semipedem & amplius longis, in ambitu exsectis. Per medium folium interius transit ligneus nervus, secundum longitudinem.

XV. *Arbores duæ innominate* Brasilienses apud Marcgraviu habentur.

I. *Prima* est caudice recto, & mediocris altitudinis, cortice cinereo, ligno fragili & meduloso. Abit superius in multos

Arbores
dis cutis
vitiis curare.
Eadem & succus
operatio.

Marcgr. H.
N. l. 3. c. 16.

Marcgr. l. c.
c. 20.

Marcgr. L. 2.
c. 2.

De Laet
Ind. Occid.
l. 7. c. 2.

Marcgr. H.
N. l. 2. c. 8.

Marcgr. H.
N. l. 3. c. 14.

Marcgr. H.
N. l. 3. c. 18.

Arbores multos ramos foliis nudos. *Folia* in extremitatibus in frondes congesta, quinque sex aut septem, superne dilute viridia, inferne albicantia, quædam oblonga, quædam pene rotunda, nervo secundum longitudinem & venis transversis ordine sibi oppositis. *Flosculos* oblongos in umbellam congestos, longi pediculi, qui inter frondes proveniunt, sustinent, albos, *ἑξαφύλλας*, & suavis odoris. *Fructus* non meminit auctor. In icone male folia venulis reticulata ponuntur.

Maregr. H. N. l. 3. c. 18. 2. *Arbor secunda innominata*, est ligno lento, cortice cinereo albicante; foliis oblongis, solidis, lævibus, superius viriditate splendentibus, inferius olivaceis & ad tactum holoserici instar glabris. *Flosculi* in extremitate ramorum multi, spicatim congesti, lutei coloris; quos *bacca* ribium magnitudine excipiunt. Poterat ad bacciferas referri.

XVI. Frutices innominati quinque Brasilienses quoque sunt.

Maregr. H. N. l. 2. c. 3. 1. *Frutex innominatus primus*, cortice est gryseo, foliis carinatis scaphæ figura, dentatis, læte viridibus. *Flores* in extremitate ramorum spicatim proveniunt, suavis odoris. Spica floribus adhuc clausis coloris est sanguinei; hinc fit flava, prout & flores pendente, qui sunt quinquefolii.

Maregr. H. N. l. 2. c. 14. 2. *Frutex innominatus secundus*, in albæ spinæ altitudinem excrescit. Rami rari, ligni cortex viridans. *Folia* tres circiter digitos longa, superiore parte dilute viridia, & siccata nigra, inferiore lanuginosa & alba. *Flosculi* copiosi, minimi, lutei, racematim in ramorum extremitatibus pendent, qui aperti stel-

lulas referunt quinque aut sex foliolis constantes. *Fructus* non describitur.

3. *Frutex innominatus tertius*, ligno est albo, meduloso; foliis acuminatis, latis, ferratis, plane hirsutis, inferne viridioribus, superne nigricantibus. *Fert* echinos seu globulos aculeatos, fuscis magnitudine pisorum, qui verticillatim ramis adhærent, duodecim & quindecim sæpe. Tacti, vel centum numero simul vestimentis & capitibus, jubisque equorum adhærent.

4. *Frutex innominatus quartus*, aculeatus est. In quolibet aculeo tria foliorum, buxi foliis similia paria. *Flosculi* *τετραφύλλοι*, longi, dilute ex albo purpurascens, staminulis albis instructi. *Bacca* in proprio pediculo ovals, Sambuci baccarum magnitudine, obscure purpureæ, nigricante brunno tingentes: in quibus lapis parvus, albus compressus.

5. *Frutex innominatus quintus*, multis virgultis rectis colore Cerasi ex una radice adscendit. *Folia* in ramulis, læte viridia & splendentia, quæ cum strepitu franguntur. *Flosculi* candicantes, cavi, figuræ pilei Brasiliensis, in quinque crenas superius divisi, in quorum medio staminulum album, filo haud crassius, quod interius alia minutula staminula flavescentia ambiunt.

XVII. Tipi est frutex arboreescens, qui in sylvis Brasiliæ, & Olindæ promontorio reperitur. Fit ex cortice in aqua contuso mucus viscidus, quo adultorum a vagis articulorum doloribus infestata membra, cum felici successu fricantur.

Piso de fac.
cult. simpl.
l. 4. c. 91.

CAPVT III.

De Arboribus venenatis.

Arbores
venenatæ.

Arbores venenatæ sunt plures 1. *Penoabsou*. 2. *Guchon*. 3. *Uhebehassou*. 4. *Macanillo*. 5. *Baxana*. 6. *Aguapa*. 7. *Madiopera*. 8. *Anda*. 9. *Tangaraca*. 10. *Arbores aliquot innominate*, quibus 11. *Herbas duas* adjicio.

Thevet. c. 58. Singul. I. *Penoabsou* arbor est Americana, cui cortex odoris plane admirandi, folia portulacæ spissa, & perpetuo virentia. *Fructus* fert grandioris pomi magnitudine, venenatos. Singulis senæ nuce insunt, Amygdalis nostris similes, nisi quod latiusculæ & compressæ, in quibus singuli nuclei conduntur. Ex contusis oleum exprimitur rufum, quo vulnera ad miraculum glutinantur.

II. *Guchon* pestilentissima est planta. Nieremb. Ros ejus virus. Quisquis contingat, perinde ac veneno contaminatur. Qui fixo inspexerit obtutu, duos morbos contrahit; obcæcatur & turget ut hydropicus.

III. *Uhebehassou* inter venenatas Bauhinus recenset. Arbor est altitudinis miræ, foliis brassicæ, fructu pedem longo, non eduli, sed solarum apum pabulo. Fert gummi rubrum, & mellis tantam copiam, ut pertuso cortice quinque vel sex mensuræ limpidissimi & optimi prodeant. A longe visa artificio potius quam natura efficta videtur. Adpetitur & ab animali quodam *He grat* dicto.

Thevet. l. Singul. c. 51.

IV.

De Laet
Ind. Occid.
l. 1. c. 1. *IV. Macanillo* est arbor modica, & ramos humi spargens. Folia nostratis fere pyri; flores plurimi; quibus succedunt poma exigua, rotunda, & producta, pauxilla rubedine distincta, odore tam suavi, ut vix quisquam comparari possit; sed præsentissimi veneni. Arboris umbra adeo noxia, ut qui sub ea obdormiscunt, horrendum in modum inflentur: & gutta roris e ramis decidens, cutem erodentis aquæ instar excoriet. Ex fructu venenum immedicabile conficiunt Barbari. Nascitur in insula S. Johannis de portu Ricco.

Thevet. T.
r. Cosmog.
l. 10. c. 3. *V. Baxana* provenit in insula quadam ab Armuzio decem milliariibus distante, nunc deserta. Fructus vel minimum degustatus, suffocat; ut & umbra, si quis vel per quadrantem horæ sub ea moretur: cum tamen in aliis regionibus radix ejus omnium venenorum sit antidotus, ut & fructus qui *Rabaxit* vocatur.

De Laet
Ind. Occid.
l. 9. c. 4. *VI. Aguapam* fert novum regnum Granatense, ejusque ita noxia umbra est, ut si quis Hispanus sub illa somnum capiat, supra modum inflatur: si nudus, barbarus etiam, disrumpatur.

De Laet
Ind. Occid.
l. 15. c. 4. *VII. Madiopera* arbor in Brasilia, cujusque fructus pruno persimilis, colore aureo, nuce intus Amygdalæ instar dulci, adeo venenatæ est qualitatis, ut si quis paulo largius eo vescatur, statim emori sit necesse. Comprobatum id sedecim e consortio morte, magno reliquorum periculo.

Idem l. 15.
c. 8. *VIII. Anda* vasta & elegans in Brasilia arbor, ex ejusque fructu oleum elicitur, quo corpora sua barbari inungunt; Cortex in aqua maceratus, animantes soporat.

Piso de sim.
plic. facult.
l. 4. c. 52. *IX. Tangaracæ*, quæ Hispanis *Erva do Rato*, duæ sunt species. Priori folia læte virentia, acuminata, sesquidigitum circiter, longa, & multis nervis atque venulis distincta; flos primo albicans, mox aureo colore nitescens. Alteri folia longiora & triste viridia; flos saturo purpureus & umbilicatus; fructus rubo sylvestri haud dissimilis. Flos folium & semen manducata, confestim hominem interimunt: at radix ejus, ex vino vel alio aliquo liquore propinata, præsentissima est antidotus. Diversam a Baxuna vide.

X. Arbores innominata sunt I. *Arbor Arbores* fructu pile palmaris magnitudine, qui qui-venenadem visu speciosus sed venenatus. Succo imbuunt Barbari sagittas. II. *Arbor* succo venenato radice esculenta, ex qua scarificata succus mortifer emanat; ex radice fit farina, qua barbari in insulis Canibalinis utuntur. III. *Arbor in Orel* lana pisces soporans, quæ plerumque juxta domicilia plantatur. Ramuli non-nihil fracti manibus inter undas, repletis a marino æstu elycibus, teruntur, ut succus Corticis se diffundat. Sic pisces statim supernatant, & manibus capiuntur. IV. *Arbor pomis venenatis in Darien*, quæ manducata in vermes ab-eunt. Umbra adeo lethalis, ut qui sub ea aliquando dormierunt, turgido capite & amisso penitus lumine expefacti sint. V. *Arbor foliis & ligno venenatis in Hispaniola*, cujus folia, necdum attacto corpore vibices elevant ingentes, & nisi eis aqua marina vel saliva matutina obstetur, lethalem dolorem excitant. Lignum olfactu mortiferum esse ajunt, nec portari a quouam sine vitæ periculo, nisi remedium ab odore cujusdam herbæ accesserit. VI. *Fruticeta in insula S. Johannis de portu Ricco*, quæ juxta littora nascuntur, & poma piscibus exitiosa, si in aquam decidunt, ferunt. VII. *Arbor in insulis Canibalum*, quæ fructum fert pomi viridis instar, quo manso lingua hominibus ita inflatur, ut viginti quatuor horarum spatio nullus illius sit usus, nulla impotenter noxa, sponte enim tumor remittit. Eadem forte cum Baxina vel Macanillo. Addo *Arborem filiquatam in Sierra Liona*, cujus fructus exitialis.

XI. Herbæ sunt sequentes I. *Quibei* quæ foliis est aculeatis, flore violarum æmulo, sed longiore. Feris devorata præsentissimum advert exitium. Provenit in insula S. Johannis de portu divite. II. *Herba in valle Gvaxaca*, virtute mirabili. Nam si quis lento veneno intra annum tollere in animum inducat, ei hancherbam jam annuo tempore decerptam exhibeat necesse est; sin statim, recentem. III. *Mio herba* in Peruvia, quæ animalia, si attigerint, enecat.

CAPVT. IV.

De Arboribus admirandis.

Vid. TAB.
CXXXIII.
CXXXIV.

Admirandæ plantæ sunt Arbores, Frutices, & Herbæ aliquot.

I. ARBORES sunt plures.

I. *Arbor fructu impregnante*, quæ pro-

Arbores
admi-
randæ.

Arbores prodente ex auctore quodam Ecchelen-
Admi- fi, in Indica quadam insula nascitur.
randæ. Suavissimus est, & si a virgine vel nup-
Eschelenf. ta comedatur, intumescit utero, &
Hist. O. post biduum vel triduum ad summum,
rient. p. 221. parit foetum exanimem, nullis notis ab
 humano distinctum. Fides sit penes
 auctorem.

Clus. Exot. II. *Arbor sanguineos sudores excitans*,
p. 352. ex qua Indus quidam in urbe Posto in cu-
epist. ad randis morbis utebatur. Illito artubus
Monardem. & parti adfectæ succo tectoque stragulis
 bene corpore, merus ex partibus inun-
 ctis manabat sanguis. Multos sanitati
 restituit, sed nullo modo induci potuit,
 ut plantam indicaret.

III. *Arbor venereos stimulos domans*,
 quæ materie est spongiosa, & in Peru-
 via crescit. Nunquam ex ea ignem stru-
 unt Indi, metu impotentiae.

Nieremb. IV. *Arbor foliis ambulantiis Pigafet-*
H. N. l. 14. *te*, Nieremb. *Arbor frondiviva*, quæ in
c. 23. insula Cimbubon vicina prodit. *Folia*
Gviland. l. *mori foliis similia sunt*, & utraque par-
de papyro. te binos pedes breves & acutos habent,
 quibus abstractis sanguis minime fluit.
 Attacta vel in terram delapsa gradiuntur.
 Pigafetta octo dies unum in sca-
 tula habuit, quod cum tangeret circa
 scatulam ibat; nullaque alia re, quam
 aëre, vivere existimabatur.

Acosta H. V. *Arbor pudica*, quæ in Malabar ha-
Arom. c. 55. betur, Turcis & Arabibus *Sulus*, Persis
Suluque dicta, aliis *Arbor foliis tactu se*
contrahentibus. Octonum pedum est pro-
 ceritate; foliis polypodii, utrinque in
 ordinem digestis, gratissimi viroris.
Flores sunt flavi, minoribus caryophyl-
 lis similes, sed ἀόσμοι. *Nascitur cali-*
dis & humidis locis. Natura ipsius, fo-
 lia contrahere & sub tenues ramos re-
 condere, si quis etiam maxime vi-
 rentem adprehendere cupiat: subito
 marcida reddere, si adprehendat: sed
 quæ, remota manu pristino viro-
 ri restituntur. Putatur esse inter
 amoris illicia, reperturque gentilis
 Medicus, qui cervice interposita pro-
 mitteret, obsequentem se ea sibi cujus-
 cunque status redditurum foeminam,
 nomen modo indicaret, & foliis ex præ-
 scripto uteretur. Virginitatem ea re-
 stitui somnium est. Sortilegi in India
 incantamenta super ea adhibent. Plu-
 res ejus species dari non dubito. Nam
 & *Pinahuitzichuitl*, quam quidam *Co-*
cochiatl vocant, ejusdem est naturæ,
 sed diversæ figuræ a præterita. *Frutex*
 est quatuor palmos altus, cui caudices
 tenues & spinis pleni; *folia in sex sinus*
divisa, & ad modum fasciculi florum
 inter se conjuncta, nonnihil raphanos

resipiscentia; *flores & fructus ad modum*
Castanearum, principio virides, postea
 rossi, racematim pendentes. *Nascitur*
in locis calidis Teputzlan & Quauhtlæ,
 & in collibus Acapitzlo. *Frutex* capiti
 impositus somnum conciliat. Radicis
 succus febres tertianas sanat, & oculos
 inflammatos, estque utilis ad dysente-
 riam. Sed & *Juqueri-omnino* Brasiliën-
 sium easdem vires obtinet. Fruticis ve-
 ro hujus *caules quadrati & striati sunt*,
 spinulisque frequentissimis flavescenti-
 bus muniuntur. Ramos habet in extre-
 mitate duplices, spinosos; *folia bina &*
bina albis pilis inferius vestita, supe-
 rius viridia. Ad ramulos in pediculis
 capitulum rotundum villosum, album,
 cui aliquid purpurei admixtum, quod
 floris loco est. Huic succedunt octo,
 novem, aut duodecim filiquulæ unum
 digitum longæ, juxta se instar rosæ in
 orbem positæ, longis pilis hirtis can-
 didis vestitæ, in quibus semen. Prope
 ad eam accedit & illa, cujus Theophras-
 tus & Plinius meminere. Sylvestris,
 inquit iste, & circa Memphim fuit regis
 tam vastis arboribus, ut terni nequirent
 vel circumplecti, unius peculiari mira-
 culo, nec pomum propter usumque ali-
 quem, sed eventum. Facies enim spi-
 næ, folia habet ceu pennas, quæ tac-
 tis ab homine ramis cadunt protinus,
 ac postea renascuntur. Monardes duas
 herbas ficas ad se delatas scribit. Unam,
 quæ suo solo stans ac in vigore, manu
 tactam subito in terram quasi mortuam
 decidisse: alteram in terram delapsam,
 collegisse se & crispasse attactam.

VI. *Arbor aquam fundens* in una ex in-
 sulis Canariis, *Ferro dicta*, visitur. Tan-
 tum aquæ fundit, ut incolis, armentis,
 & navibus ad aquandum impellentibus
 sufficiat. Perpetua ac densa circumve-
 stitur nebula, quæ aliquando nimio so-
 lis æstu discuti & resolvi videtur. Alii
 nubem quandam spissam circa meridiem
 tempus se de cœlo demittere, & nocte
 proxima una aut altera ante Solis or-
 tum hora resolvi produnt; inde tantam
 aquarum copiam. Benzo mediocris
 magnitudinis arborem esse, nucis jug-
 landis folio, sed paulo majore, muro
 circum lapideo septam, perennesque ex
 foliis exsudare aquas prodidit. *Ramum*,
 quem Dux Wirtembergicus a Paludano
 accepit, ita describit Bauhinus. *Ramus*
 est crassitudinis vulgaris vel digiti pue-
 ruli, substantia lignea sed satis fragili,
 colore subfusco, & quodammodo ad ru-
 dum tendente: per cujus medium me-
 dulla transit fungosa. *Cortex* exterior
 tenuis, rugosus, multis nodulis scatens;
 cui

Marogr. H.
N.B. l. 2. c. 54

Theophr.
H.P. l. 4. c. 3.
Plin. H. N.
l. 13. c. 19

India Oe-
cid. p. 6.
Linschott.
Ind. Orient.
p. 3. c. 5.
Cardan. de
rerum va-
riet. l. 6. c. 22.

Bauh. H. P.
l. 4. c. 25.

Reccus R.
M. N. H.
l. 4. c. 32.
Nieremb.
H. N. l. 15.
c. 7.

cui adhæret certis quibusdam locis muscus parvus, citrinus aut subviridis, ex minutissimis filamentis congestis, musco nostratum arborum non multum absimilis, sed brevissimus. Vestigia quoque adparent, foliorum alternatim positorum. Divisus est in alios, qui etiam crassiusculi in quaternos fere minores subdividuntur. *Folia* hærent laurinis similia, sed breviora, crassitudine aliqui pari. Juglandis foliis particularibus non male quis comparaverit, ex quorum costa media satis insigni, alii minores nervi fursum versus, sed in obliquum, per folii substantiam disseminantur. Eadem parte adversa instar foliorum Malabathri splendent, averfa nequaquam. Sed & verrucosis quibusdam tuberculis juxta pediculos maxime & costam obsita sunt. *Ramorum* extrema, Lauri Tini in morem quasi in umbellam cessant: quibus *flosculi* adhærent perexigui, stellati, ob parvitatem specialius vix describendi. *Sapor* ligni nullus: Cortex nonnihil aromaticus, non sine acrimonia & adstrictione. *Foliorum* item aromaticus & glutinosus; ita ut dentium attritu cum saliva in mucilaginem abeant. Johannes Hawkins Anglus multas se in Gvineâ vidisse dicit, sed nullas, quæ tam abundanter aquam stillarent. Sunt, qui *Ombrien* sive *Pluvialem* Plinii & Solini insulam esse putant; in qua arbores similes ferulæ, ex quibus aqua exprimitur; ex nigris amara, ex candidioribus, potui jucunda.

Plin. H. N.
l. 6. c. 32.

De Laet
Ind. Occid.
l. 14. c. 8.

De Laet

Ind. Occid.

l. 5. c. 3.

Ind. Occid.

p. 6. c. 61. &

l. 4. c. 30.

Bauhin. Fl.

p. l. 4. c. 59.

p. 504.

ex Cardano

Nieremb.

H. N. l. 14.

c. 113.

Cicca p. l.

VII. *Arbor foraminulenta aquoso humore plena*, crescit in Brasiliæ mediterraneis, juxta sinum omnium sanctorum locis ficcis & inaquosis. Vasta est & patula. Ramis foramina admodum profunda insunt, quæ æstivis & hybernis mensibus humore aqueo limbo & sapido replentur, qui nunquam exundat, nunquam minuitur, nec unde oriatur constat. Licet vel quingentis sub ea hospitari & bibere, ad satietatem. Habetur & in Nova Hispania ex Magvey incisa & excavata copiosissimus liquor. VIII. *Ceiba* seu *Cerba arbor*, quæ in Nicaragua habetur, tantæ crassitudinis, ut quindecim homines amplecti non possint. *Ligno* est fungoso ut suberis; *fructu* lana referto, & semine bombacis. Indis supra domicilia, quæ plures integras familias capiunt. Erat inter cæteras trifida, cujus singuli trunci viginti pedum ambitu cingebantur. Spatia ipsa inter truncos juxta terram totidem pedibus distabant; per quæ currus

onustus duci poterat. Ubi trunci coibant, quadraginta quinque pedum crassitudo arboris erat. Ab ima crassioris randæ trunci parte ad locum, ubi primo rami prodibant, pedes octoginta: superior pars, unde rami pendebant absque mensuræ modo. An illius altitudinis sint, ut nulla virilis lacerti vis, domum in illis ædificatam jactu lapidis attingere possit, penes Martyrem qui talia prodit, fides sit. Scripsit sane & Plinius tam alte arbores in India suis fastigiis adscendere, ut sagittis superari nequeant; esseque ad CXIV. pedes quarundam proceritatem.

IX. *Arbor in summo cacumine tantum frondes gerens*, & quidem minimas, de qua nihil habeo, quod dicam, nisi quod ex ejus trunco integro Canoas Indi sex struant.

X. *Licondo arbor* tantæ magnitudinis, ut sex viri brachiis expansis vix possint circumdare, & tantæ magnitudinis, ut 200. viros cum armis & remis capiat, exque ejus trunco scaphæ in regno Congiano conficiantur. At in China ad civitatem Sunghiang invenies arbores, quarum crassities octoginta hominum amplexum superat; & in quarum trunci cavitare triginta octo recipiuntur.

XI. *Rattiak arbor*, ex qua in Virginia lintres fabricant.

XII. XIII. *Tga & Tuvera arbores* in Brasilia, quas integras cortice illæso decorticant, exque eo ignibus excalescit, & in utroque extremo multum incurvato religatis per medium transversis lignis scapham trigina armatorum capacem parant. Est scilicet Cortex pollicaris crassitudinis, quatuor pedes latus, quadraginta longus. Ibidem lintres singuli ex cortice arborum confecti, quinqueaginta homines capiunt. Ex arboris vero *Tuire* vocatæ cortice tilix perfimili, funos conficiuntur.

XIV. *Gelsomoro*, cujus Cortex in quibusdam Indiæ locis pecunia est.

XV. *Arbor Ostreifera*, quæ in Sierra Lione provenit. Rami in mare propendent, illisque innumera ostrea adhærent. Fit ejus & in Draci navigatione mentio. Tanta ostreorum copia, ut folium vix cerni possit. Crescunt & in Gvajana in arboribus.

XVI. *Ciennien*, i. e. mille annorum, arbor, quæ in Suchuen urbe Paoning in idoleio Kien civitatis, tantæ est magnitudinis, ut sub uno ramo ducentæ oves stare & circumire possint, absque eo quod viderentur, licet ad rami initia accederes.

T t t 2

XVII

Arbores
Admi-
randæ.
Purchaf.
Navig. l. 9.
p. 1537.

XVII. *Arbor cornigera*, de qua sub Aca-
cia egimus.

XVIII. *Arbor* in Sofala, quæ per to-
tum annum arida & ἀφύλλος permanet,
fed si ramum etiam decennalem deci-
fum aquæ injeceris, spatio decem hora-
rum germinat & folia viridia profert;
fed & amittit, quamprimum exemeris.
Lignum hoc contusum & in aqua ma-
ceratum, sistit sanguinem.

Purchaf. l.c.

XIX. *Matuui* arbor in Sofala, quæ
stercus humanum adeo olet, ut vix fer-
ri possit. Unde ipsi nomen. Habetur
& in India.

Purchaf.

Navig. l. 3.
p. 152.

XX. *Arbor* in Sumatra, quæ magnum
vermem pro radice habet. Sidit si de-
cerptere volueris, nisi valide teneas. Au-
gescente arbore diminuitur vermis, nec
citius figit radices, majorque evadit,
quam totus vermis in arborem abiverit.
Caudex decerptis foliis exaridus verti-
tur in lapidem durum & Corallo simi-
lem.

Kircher.

Artis Ma-
gnet. l. 3. p. 5.
p. 493.

XXI. *Arbor Chilensis*, cujus in foliis
vermes primo nascuntur, qui dum in
terram concidunt in serpentes tandem
mutantur, qualium tota terra plena est.
Trahit scilicet per radices ad se succum
semine serpentifero sætum arbor; qui
virtute solis succoque arboris in vermes,
ac inde in serpentes tandem animatos
degenerat.

Kircher. l.c.

XXII. *Arbor Philippinarum insularum*,
cujus folia Orientalem plagam respicien-
tia salutifera sunt; Occidentalem vero
venenosa. Diversitas succi in causa,
quem hæc & illa pars trahit. Sic quæ-
dam mala brassicam olent, quod illam
vicinam adspiciant, ejusque diurna &
nocturna effluvia exhauriant, ac modo
quodam imperceptibili vectore aëre im-
bibant. In Peruvia ea arborum proprie-
tas est, ut medio anni spatio fructus
ferant ad latus suum Orientale, reliquo
ad Occidentale.

De Laet
Ind. Occid.
l. 10. c. 24.
Nieremb.
H. N. l. 14.
c. 2.

XXIII. *Arbor in Hispaniola*, quæ auri
venas habet. Quacunque pateat e ra-
dice iter, inquit Petrus Martyr, per
apertas mollesque scatebras ramos ad
superna supercilia montis emittit: ne-
que unquam datur quiescere, donec coe-
li auram adsequatur. Formare ibi viso
aëris fulgore, bracteas & grumos pro
fructu animadverterunt. Hæ sunt, quæ
per universam disseminantur insulam,
per alluvies raptata ad ima, de natura
ponderosorum. Non autem illic pro-
creari putant, ubi leguntur in sicco
præsertim; in fluminibus aliter. Radi-
cem arboris aureæ tendere ad terræ
centrum, inquiunt, & ibi coalescere:

quoniamque profundius effodiatur, eo
truncos reperiunt crassiores, si per mon-
tis scatebras liceat. E ramis filo subti-
liores aliquos captant, digitos æquan-
tes, alios pro scissurarum hiato. Ac-
cidit & incidisse in cavernulas auro ful-
tas. Per ramorum tamen adscenden-
tium vias, quibus repletis ex substan-
tia trunci serpente, ab imo carpitur ra-
mus qua pateat. Intercipitur sæpe saxi
soliditate, in cæteris tamen rimis nu-
tritur ex halitu & virtute radicum. De
vitibus auriferis dicemus alibi.

XXIV. *Borachera* arbor, cujus folio-
rum succus ex aqua sumtus inebriat.
Admirandi floris est; excedis lilium,
æquat albedine. Odoriferus est, longus,
extensus, vacuefactus, sine foliorum
distinctione in extremitate.

XXV. *Arbor in Orcadibus & Hibridi-
bus insulis anatifera*, quæ triplex apud
Auctores occurrit. Ex unius ligni pu-
tredine vermes & ex his Anates viven-
tes & volantes gigni creduntur. Ex
alterius fructibus conopini similibus, fo-
liis involutis, anates immediate quibus
etiam in quadragesima uti licet. Tertiæ
folia si decidant super terram in aves
volantes, si in aquam in pisces mutari
putantur, pingitque figuram Duretus.
Egi de ea in Admirandis, opposuique
Mayeri disquisitionem, in qua causas in-
quirat. Fit forte, Kircheri conjicien-
te, ut, cum tractus Septentrionalis infi-
nitis fere Anatibus plenus sit, innume-
ram ovorum multitudinem frustis istis
glacialibus exponant, quæ cum glacia-
lium undarum agitatione fracta vitellis-
que diffusis, ventorum ope, in Hebrides
primum obvias insulas adferantur,
materia semine anatum productivo sæ-
ta arbutis quibusdam, putridarumque
navium fragmentis adlapsa, ibi tandem
sive terræ locique, sive insita quadam
arbutorum succo virtute, in vermes
primum, deinde in alas volucres ani-
mentur. Simile quid in China sub Vu-
ting ad lacum Haniao accidit. Folia
cujusdam arboris in nigras mutantur
aves.

XXVI. *Arbor in Borneo insua*, cujus
folia si supra terram cadant, in vermes
convertuntur. Facit ejus Fumee men-
tionem.

XXVII. *Arbor muscarum splendentium*,
quæ noctu examine muscarum cingitur,
quarum quæque radiantem lucem de se
spargit, non aliter ac si plurimæ can-
delæ circa lucem accensæ essent.

II. FRUTEX duplex est, *Scythicus &
Antipatheticus*.

I. Fru-

Nieremb.
H. N. l. 14.
c. 10.

Kircher.
Artis Ma-
gnet. l. 3.
p. 493.

Admir. Si-
ne p. 1036.

Fumee in
Hist. gener.
Ind. apud
Baubin. H.
l. 4. c. 58.
& 60, p. 503

Scalig. Exerc. 181.
f. 29.

I. Frutex Scythicus, dicitur *Borametz*. Ex semine femini Melonis simillimo minus oblongo, apud Tartaros Zavolhenfes producitur. Crescit agni figura ad ternum fere pedum altitudinem; quem pedibus, ungulis, & toto capite, præterquam cornibus repræsentat. Pro cornibus pilos gerit, singularis cornu specie obducitur tenuissimo cornu, cujus detracti usus incolis ad tegmina. Dulcore est admirabili; feruntque internam pulpam gamari referre carnem; & ex vulnere manare sanguinem. Radicem exsertam surgit ad umbilicum usque; illudque miraculi facit magnitudinem, quod, quando vicinis obsidetur herbulis, tam diu vivat quasi agnus in læto pascuo; absuntis illis contabescat & intereat. Adpetitur a lupis, ab aliis bestiis, quæ carnem vorant non item: quod quasi condimentum atque intritum, inquit Scaliger, ad fabulæ & agni allusionem adjunctum arbitror. Simplicem putat Kircherus plantam: Sunt Orchides & apiformes & anthiopophoræ; quarum istæ hominis nudi, formam capite, brachiis, & pedibus, imo sexum mentiuntur. Est certi generis Persicum pomum, cujus extrema superficies alba lanugine inducta, dum inciditur, liquorem sanguinis instar fundere videtur. Minuuntur circumstitæ plantæ, quod humorem illis debitum tyrannica quadam violentia ad se pertrahat.

Kircher. Artis Magnet. l. 3. p. 504. novæ edit.

II. Frutex antipatheticus in Mexicana provenit. Punico malo est non ablimilis, ejusque tenerioris virgæ certa ratione sectæ partes, occulto quodam odio ita se averfantur, ut simul ne violenter quidem contineri possint, sitque ibi passim puerorum jocus.

Kircher. Artis Magnet. l. 3. p. 510.

III. HERBÆ sunt varix, quas per saturam recensebo.

Joseph. de bello Judaico.

I. Radix Baharas, in Judæa colore flammæ adsimilis, & circa vesperam veluti jubare refulgens, quæ accedentem & evellere cupientem tam diu refugit, nec prius fugam sistit, quam urina muliebri aut menstruo sanguine conspersa fuerit. Eadem forte est cum Aglaophotide seu Cynospasto terrestri *Æliani*; *Marmaritide* *Democriti*; *Cynocéphalea* & *Osiritide* *Appionis*; *Moly* *Homeri*; & *Pæonia* *Galenii*.

Nieremb. H. N. l. 14. c. 32.

II. Herba Peruana, quæ vitam & mortem ægris indicat. Si mœsti & anxii sunt, dum ramum tenent, moriuntur; si læti, sanitatem recuperant. Earundem & *Teoamatl* virium. Nam si succum ejus evomunt ægri, signum mortis est; si non, vitam promittit.

III. Cahobba herba, cujus pulveris Arbores contusi tanta vis est, ut sensum omnem Admimenti illico tollat. Tabacum putat *Nierembergius*.

IV. Herba Æthiopica, a qua venenatae cochleæ ita abhorrent, ut locum, in quo crescit, hominesque, qui eam ferunt, fugiant: nec quicquam morsus opus, si succum superfuderis.

V. Herba Quasi, in *Xensi*, apud *Sinen*ses, quæ comesta citissime tristitiam pellit, risum & lætitiā parit: potissimum quæ in monte *Nieuxieu* crescit.

VI. Herba Hoato, quæ apud *Cin*civitates in *Pochung* monte, in regno *Sinarum*, crescit, & comesta steriles redere putatur.

VII. Herba Lungfin, quæ ab equis devorata, robur ac velocitatem tribuit. Nascitur in insulis sub *Xantung* & urbe *Cincheu*.

VIII. Herba mille annorum, quæ aqua macerata & epota albos crines in nigros commutat, atque ad vitam producendam conducit.

IX. Herba Pusn, quæ inter medicas pro immortalitate habetur, quia semper virens domi adservatur.

X. Herba asbestos, quæ in regno *Tan*lyn supra lapides nascitur. In ignem coniecta non exurit, etiam diutissime relicta. Ignescit quidem; sed educta, pristinam nigredinem recuperat, ad cinerium colorem nonnihil declinantem. Aquæ injecta in lutum abit, statimque corrumpitur.

XI. Herba Chifung, quæ in *Quantung* ad *Kienchieu* prodit. Ex ejus nodulis colligunt nautæ, quo mense & quot toto anno sint futuræ tempestates. Hoc numerus, illud geniculorum inter se distantia ostendit.

XII. Herba Tu, ex qua sub *Quangsi* in *Chincheu* incolæ pannos sericum ipsum superantes conficiunt.

XIII. Herba sentiens, quæ ab Arbore pudica diversa, in insulis *Philippinis* reperitur. Producit e singulis radicibus decem aut duodecim caules rectos, pennæ gallinæ crassitie, singulis duodecim folia quatuor ordinibus inter se distantia intervallo sex digitorum transversorum, & similia *Raphano*. Flores cærulei linguæ passeris, antequam se pandant, similes, qui post in tria minora folia dividuntur. Tantopere contactu humano offenditur, ut si primoribus digitis summa plantæ folia contingas, statim quasi contristari aut alto somno opprimi videatur, caduntque omnia, si secundo attingas. Trunci contacti rumpuntur & con-

V v v

cidunt:

Purchaf. navig. T. 2. p. 1169. Nieremb. H. N. l. 14. c. 112.

Admir. Sinen. c. 32. p. 863.

Admir. Sinen. p. 864.

Admir. Sinen. p. 865.

Reccus R. M. N. H. l. 4. c. 32.

Arbores
admi-
randæ.

Lerius de-
script. Bra-
sil. c. 13.

Kircher.
Artis Ma-
gnet. l. 3.
p. 5. p. 510.
edit. recent.
Helmont.
de magnet.
vulner. cu-
rat. p. 753.

Ind. Orient.
p. 4. c. 17.

Admir. Si-
nenf. p. 881.

cidunt: præcisi nigredinem contrahunt, ac si exusti fuissent. Si ipsam plantam adflaveris, excutit folia & disrumpitur: non item, si virga aut baculo attingas. Insipida est, & nullius in Medicina usus.

XIV. *Pindo herba* caules aut palmarum rami ad januas ædium.

XV. *Herba attractiva in insula Zeilan*, quæ duo ligna in medio eorum posita conjungit. Ita vero ab ea trahuntur, ut vix violentiæ possit resisti, si ligna teneantur, etiam viginti passuum distantia. Huic similis in Bengala, quæ alia ligna non secus ac magnes ferrum sibi conjungit. Hisce adde, quæ Helmontius de herba passim obvia tradit; conciliare ad aliquot dies amorem, si manu, in qua contrita & detenta intepuit, alterius manum, donec intepescat, detinueris, probasque in catulo peregrino.

XVI. *Cornu plantabile*, de quo apud Linschottanum habemus. Provenit in Goa insula, ad civitatem ejusdem nominis, juxta murorum terminos, loco ubi omnis generis pecudes mactari solent, & cornua passim abjecta jacent. Agunt successu temporis radices, medulla quasi in plurima filamenta dissecta, protuberante, & hoc modo se terræ insinuante. *Radix* brassicæ similis, aliquando duas tresve spithamas longa.

XVII. *Peci fructus Sinensis*, cum quo si simul cupream monetam ori immiseris, eadem qua fructum facilitate den-

tibus comminues, ac in pulpam comestibilem rediges. Magnitudine est Castaneæ, figura rotunda pelle subtilissima pulli coloris; nucleo, cui caro candidissima, plena succi, acidi saporis, nostris pomis paulo durior. *Nascitur* per totam regionem urbis Kiahing in Chekiang aquis stagnantibus.

XVIII. *Teng vimen* Sinenfe, quod in Quangtung crescit, & a Lusitanis *Rotam* adpellatur. Funem a natura contortum dicas, quod in maximam extendatur longitudinem, ac veluti funis per terram & montes prorepat. Spinis horridum est, *foliisque* oblongioribus viret, vix digiti crassitie, & tamen sæpe ad integrum stadium diffunditur, tantæque per montes copia, ut inter se intricatæ stirpes etiam cervisimpervium reddant. Parantur ex eo funes & rudentes pro navibus, licia, vittulæ tenuissimæ, storeæ, lectuli & pulvinaria. Insula Hainan præstantissimum profert, quod *Rotam albam* adpellant. Et hæc de Arboribus sufficiant. Si in tanta copia & varietate alicubi erratum est, & forte aliquando una pro altera posita, non est, quod mireris Lector. Vel tot uni plantæ a barbaris imposita nomina, eaque vel sono ipso horrida, deducere scriptorem in devia possunt. Gratia interim Tibi sanctissime JESV. Largire ut & reliqua bono humani generis, cum Tui Nominis gloria absolvam!

Admir. Si-
nenf. p. 881.
Atlas Si-
nenfis,
p. 143.



MANTISSA

AD

HISTORIAM DE ARBORIBVS.

Quia Flora Sinensis a Michaële Boym S. I. Presbytero edita, & ante quadriennium a nobis visa, nunc demum ex Bibliotheca Illustris Baronis Nostitzii, Ducatum Jaurensis & Schweinitzensis Præfeti, literatorum patroni, a me obtineri potuit: ideo nec plantæ, quæ ibi describuntur, suis locis inferi potuerunt. Quamvis vero quædam ex his inter nostras Exoticas occurrant, malui tamen omnes dare, ut varietatem, si quæ in descriptione & iconibus occurreret, primo statim intuitu observare possis. Sunt autem traditarum ab eo arborum & fructuum undecim. 1. *Fan yay Cu*. 2. *Kiagiū*. 3. *Li-ci Lumyen*. 4. *Giambo*. 5. *Pi-pa*. 6. *Cieuko*, 7. *Po-lomie*. 8. *Supim*. 9. *Tata*. 10. *Duliam*. 11. *Innomi-natus fructus*.

I. *Fan yay Cu* fructus & arbor in India *Papaya* vocatur, a Sinis *Fanyaycu* dicitur, copioseque in Sinarum *Haynan* Insula progignitur; nec non in Junnan Quam-Afy, Quam-tum Folcien, Australibus Provinciis: Arbor ex ipso trunco, qui porosissimus est, multos producit fructus, singuli magnitudine superant magnum Melonem, interius carnem habent rufam dulcissimi saporis, adeoque mollem, ut cochleari possit accipi, frigidæ putantur esse qualitatis, pruritusque carnis, si multum quis de fructibus ipsis edat, compescere, generationique obflare. Propullulat & ex feminibus sui fructus, & ex virgultis, quæ ad radicem progerminat arbor; sæpe videntur in eadem arbore & flores, similes liliis gemmantes immaturi & virides fructus & maturi flavescentes; extra ordinarium habet, quod ramos nullos gignat, sed sola folia in vertice, & quod ex trunco, ubi illa incipiunt, albos flores, atque ex illis fructus producat; nullum tempus anni maturitati determinatum habet, & ea propter quolibet mense maturi aliqui fructus possunt reperiri. Tamen Decembre & Januario plures ex fructibus in Indiis maturescunt; si vero folium vel partem trunci terræ injicias, agit radices facile, ce-

leriterque in arborem magnam excre-scit. Fructus & folia arboris atque ipsa arbor onusta fructu gratissimum adspectum conciliat universis.

II. *Kiagiū* seu *Kagiū* apud Sinas non reperitur, verum in Regnis, quæ Sinarum olim fuerant, abundanter provenit: & crediderim adlatum in Junnan & Quam-si atque Insulis Sinicis posse produci. Arbor est magna foliis pulcherrimis & semper virentibus. Fructus imitatur pomum, flavum vel rubicundum, ubi maturescit odoriferum, verum pomi succus agrestis est, & caro, si comedatur, guttur mordet. Duabus vicibus apud Indos in eodem anno fructum gignit, ex flore primo semen & producto semine postea pomum educit, quod stomachale & corroborativum est ventriculi, si cum vino vel sale comedatur. Interius hic fructus nullum semen habet, sed in vertice illius ad instar nuclei prominet, quem cortex glaucus, albam carnem & solidam recondens, instar Castaneæ amygdalæ nucis cooperit, saporem earundem si elixetur referens. Indi & Lusitani nucieis dictis loco amygdalorum ad conficienda dulciaria interdum utuntur. Februario & Martio, Augusto & Septembre mensibus maturescit.

III. *Li-ci* & *Lumyen* arbores atque fructus, solum apud Sinas reperiuntur, atque non nisi in aliquot Australibus Provinciis: *Li-ci* fructus corticem sicut depictum vides, in modum piniferæ arboris fructus refert, sed *Lum-yen* lævissimam pelliculam habet, uterque sapit fraga & uvas. Sinenfes siccos fructus hyemis tempore venales deferant in alias partes. Vinum etiam ex fructu utroque suave conficiunt. Julio & Junio mensibus maturescunt; illorum nuclei inserviunt pro medicina: Sinenfes pulverem ex illis fructum bibendum præbent ægrotis. Sic dicti fructus sint sylvestres, nucleos grandes & de subacida carne parum, si transplantati nucleos exiguos, & de carne dulci plurimum habent. Caro est coloris unguium humanorum, ut autem pluribus diebus

conserventur recentes, salita aqua depositi ex arbore adspersitur, & durant multorum dierum spatio, abstractoque cortice, recentium saporem fructuum præstant, Li - ei creditur esse fructus calidæ qualitatis, Lum-yen vero temperatæ.

IV. *Giam-bo* arbor & fructus duplicem habet speciem. Nam & rubri & albi coloris in Indiis & subflavi rosarum fragrantium redolent odorem; in Malacca, Macao, & Sinarum Insula Hiam-xan reperitur. Prior species florem purpureum, posterior alboflavum habet; Truncus & rami cinerei coloris, folia pulcherrima lævia ac uno palmo longa, triumque digitorum lata sunt. Fructus ipse magnus, plane sicut pomum, frigidissimæ qualitatis, albam, subtilissimam, & spongiosam carnem, quæ nec prorsus dulcis, nec prorsus acida, continet. In eodem ramo flores, fructusque virides atque maturi alii simul videntur. Solent illos in principio prandii comedere; sitim nimii æstus tempore extinguunt egregie, pro febribus & colericis morbis, ex hoc fructu *conservam*, (ut vulgo vocant) præstantissimam faciunt in Indiis: loco seminis rotundum nucleum recondit interius; ejus caro solida viridis est cooperta pellicula, fructus adspectu pulcher, vel totus ruber, vel totus albus, vel partim rubeus, partim albicans. Verum *Giambo* flavi coloris, duos nucleos, aut potius unum in duos distinctum recondit, & coronam malo granatorum, vel ut propriissime loquar, rosarum, cum fragrantissimo odore refert. Caro illius dulcissima & porosissima est. Rubei coloris *Giam-bo* apud Indos Novembri & Decembri, Flavi autem, alicubi Martio, alicubi Julio mensibus producuntur.

V. *Pi-pa* arbor & fructus apud Sineses nascitur, cum viridis, maturefcit & ad flavum colorem declinat. Nostratia pruna sapore imitatur, arbor pulcherrimis foliis & floribus conspicua, jucundum præstat adspectum. *Officulum* solidum & ovalis figuræ habet. Plerique colligunt fructum in Februario & Martio, dulcissimi est saporis, & pelliculam similem prunis continet.

Vi. *Cieuko*, fructus Sinice, ab Indis atque Lusitanis Goyava nominatur, inassuetis Cimicum foetorem videtur redolere, revera tamen aromaticum acutum odorem fragrat, & ab illis ipsis, quibus foetebat, postea expetitur, cumque stipticus & calidus sit, sistendo fluxui ventris, & stomacho corroborando val-

de prodest. Officula lignea & plurima interius, fere figuræ rotundæ recondit, ex quibus arbores propagari possunt, quod si etiam abscissum ramum in terram defodias, idem & celerius obtinebis. Maximam copiam fructuum rami producunt, & folia omnino odorifera gignunt, quæ si atterantur, spirant gravius, & pro calidis morbis medicinalia esse creduntur, vocatur a Lusitanis alio nomine Pera, quod figuram Pyri Europæi repræsentet. Apud Indos Novembri, Decembre, immo & reliquis mensibus reperiuntur, apud Sinas Macai præcipue Junio & Julio progeneratur.

VII. *Po-lo-mie*, a Sinis, & *Giaca* a Lusitanis vocatur fructus & arbor, quæ illud admirabile habet, quod unum, duos, aut tres fructus miræ magnitudinis in trunco tantum producat. Sæpe singulis deferendis singuli homines sunt necessarii. Cortex fructus pungit, atque si viridibus scateret sentibus: discissus vero, viscum album qui cellulis reconditos favos & melleos fructus adglutinat, plurimum defert, & præcipue ad interiorum cavitatem corticis. Nucleus illius (quemadmodum pictum vides) elixus Castaneam dulcem sapit. Fructus unus, vel, ut verius dicam, plures in uno reclusi, decem seu viginti hominibus ad comedendum sufficere possunt. Figuræ est Ovalis, & magnitudine ac gravitate superat maximam Cucurbitam; Neque abs re quidam saccum repletum melleis facculis, recondentibus nuces Castaneas adpellavit. Sapore Melonem præcellit. Caro illa melior, quæ durior, diciturque a Lusitanis *Cocobarca*. Maturuisse fructum conjiciunt, si illius cortex sit mollis, nam si adhuc durus sit, vel in arbore illum sinunt maturefcere, vel depositi expectant cum tempore mollitiem & maturitatem. Maio & Junio sine floribus generatur.

VIII. *Su-pim*, arbor & fructus apud Sinas tantum nascitur, est & aurei & purpurei coloris, magnus pomum excedit, carnem mollem & rubeam cum similli pellicula refert; officula hinc inde interius abscondit; cum siccatur sicubus Europæis simillimus est, & per multos annos conservatus, a Sinis Medicis sæpenumero in pharmacis adhibetur. Egregius profecto fructus, in Quam-tum & Junkim regionibus Januario, Februario & Martio, sed in Xen-sy, & Honan, aliisque septentrionalibus Junio & Julio, & Augusto maturefcit. Arbor onerata purpureis hisce pomis gratissimum exhibet adspectum, quæ ne ab avibus

bus decerpantur, continuis vigilis custodiuntur.

IX. *Tata*, fructus & arbor in Indiis & potissimum agro Malacensi reperitur, qui Sinis olim tributum pendebat, ideoque Sinicus fructus optime dici potest, & quod etiam in Sinense solum translatus uberrime germinet; viridem corticem & piniferum habet, sed interius carnem liquidam nivis ad instar albam, sapore superat dulciarium, quod Lusitani adpellant *manglar Reale*, in multis cellulis *Officula*, nigra solida recludit; alicubi Octobre & Novembre, alicubi Februario & Martio mensibus maturefcit. Quanto major fructus, tanto melior & pretiosior putatur.

X. *Duliam*, arbor eadem est cum *Durione Acostæ*; sed icon differt.

XI. *Innominatum* vocavi fructum, inquit P. Boym, quia illius nominis Sinici non memini. Vidi illum primum in Insula Sinarum Haynan, & postea in provincia Quam-tum. Arbor procera, folia maxima, quæ medium hominem contegere possunt, producit; hoc admirabile habet, quod media radice telluri inhæreat, ex alia autem parte radice patente, flores rubros & simul fructus, similis Europæis ficibus progenerat, qui cum maturefcunt, rubent paululum; sed interior caro & sapor illorum figuram & saporem ficuum repræsentat. Julio & Augusto maturefcunt.

Claudat agmen hoc *Arbor febrisfuga Peruviana*, quæ incolis *Gannanaperide*, Hispanis *Palo de Calenturas*, seu lignum febrium vocatur. Cortex illi colore ferrugineo, sapore amaro, Gentianæ non valde dissimilis, Peruanis *China* seu febris dictus. Et hic in usu est contra *febres intermittentes*, in pulverem redactus, venalisque Romæ apud Patres Societatis prostat. Sumitur subtilissime tribus & per cribrum pollinarium, trajectus, drachmarum duarum pondere, tribus circiter horis ante paroxysmum, in phiala vini albi generosissimi infusus. Adsumitur ingruente febrili horrore, primoque paroxysmi vel levissimo indicio: committendusque æger lecto. Comperit experientia longa, omnes fere illos liberatos, qui eo purgato primum corpore usi sunt: nec ullo alio medicamento per quatuor dies ab adsumptione propinato. Si recidiva sublequitur, cras-

floribus pulveris partibus imputandum est. Longa ideo maceratione, 40. nempe, vel quinquaginta horarum opus, & ut per telam exprimatur. Raro propinatur altera vel tertia vice. Potest ex eodem liquor per destillationem parari earundem virium. Vide apud Bartholinum plura.

ICONES, ex Flora Sinensi.

Fan yay Cu seu Arbor Papaya. A.

Muza ex Flora Sinensi. B.

Lici arbor cum fructu. D.

Giambo arbor cum fructu. F.

Pi-pa arbor Sinensis. I.

Cieuko, seu Lusitanorum Goyava.

Po-lo-mie seu Gjaca Lusitanorum.

Su-pim Sinensium. M.

Ya-ta cum fructu.

Duliam seu Duriones Boymj. O.

Innominatus fructus Sinensis. P.

De Ceraso Sinensi

Ex *Atlantis Majoris Tomo Sinensi* p. 119. a.

Quod nos in ingentem sæpe perduxit admirationem, est illud, quod pinguedo in arboribus crescat, ex qua, veluti e sevo, candelæ optime albentes, tactæ manum non polluentes, extinctæque fœtorem non emittentes, a Sinensibus Kieuyeu vocatæ, parantur. Arbor est satis magna, piris nostris folia & figuram non dissimilis; album edit florem, ut cerasus; florem insequitur bacca admodum rotunda, cerasi magnitudine, corticem tenuem & nigricantem induta; caro contenta albet, quod, baccis maturitatem adeptis, per corticem rimam concipientem videre est. Baccas has colligunt, & si in calida aqua coquantur, caro dissolvitur; exemplo tamen a refrigeratione iterum, uti sebum, congelat: Tunc residuus est nucleus, quem imponunt aquæ, uti Nos olivas, ut oleum exprimere queant, quo tamen non pro cibo; sed in lampadibus utuntur. Hyberno tempore folia hujus arboris plane, ceu cuprum, rubescunt; hæcce arbores, cum integræ sylvæ his refertæ oculis nostris sæpe sese obtulerint, rubicunda sua pulcritudine Nos delectaverunt. Tandem decidunt folia, præbentque, cum pinguedinis quiddam habeant in sese, mirum quantum laudabile vaccis & ovibus pabulum.



INDEX

IN HISTORIAM NATURALEM

DE ARBORIBVS, LIBRIS HIS DECEM

COMPREHENSAM.

A.			
A bavo Honorati Belli	Pag. 33. l. 1	Agialalid	61. l. 5
Abella	146. l. 2	Agnus castus	47. l. 4
Abelmoluch Mauris, Imperat	8. l. 5	Agria Anguillar.	211. l. 4
Abhel. 123. l. 6. fructus pilul.	ibid.	<i>Agria</i> Theophr.	211. l. 4
Abies	118. l. 6	Agriomelea Bellon.	101. l. 1
Abies rubra Bauh.	118. l. 6	Agul & Alhagi Arab.	128. l. 6
prima & rubra Trag.	ibid.	Agriofolium Septentrionis	211. l. 4
Dodon.	ibid.	Abate de Panuce seu Ate Panucensis Mexic.	114. l. 6
mascula Theophr. Trag.	ibid.	Alaternus major Dalechampii Lugdun.	51. l. 5
legitima vel Mas Bellonii.	120. l. 6	Plinii 52 l. 5. Camer.	ibid.
Pilati du Chui Lugd.	ibid.	prima Clus.	16
Latinorum	ibid.	alter Clus.	16
Plinii & foemina Theophr.	ibid.	humilior, folio loti Lobel	53. l. 5
Mexicana	ibid.	Albanula pruna	81. l. 1
Abviga	154. l. 2	Album Cinamomum	174. l. 3
Acaba	7. l. 1	Album quercus	203. l. 4
Acacia Germaniae	30. l. 1	Alburnus	118. sq. l. 6
Acacia succus	124. l. 6	Alcanna Arabum	49. l. 5
Acacia Aegyptiaca	ibid.	Lobellii	ibid.
Germanica	ibid.	Alcanfor	134. l. 6
Acacia arbor	155. sq. l. 7	Aleodon Lusitanorum	138. l. 2
Acacia vera, aliis Acacia Aegyptiaca, & Alexandri-	155. l. 7	Alcorza pastilli Hispanor.	12. l. 1
na	156. l. 7	Alebo Hispanor.	50. l. 5
Acacia Schamouth, Schack Halepi Rauwolf	156. l. 7	Alexandrina vitis	35. l. 5
Acacia trifolia	156. l. 7	Aliga Vasconum	46. l. 1
Americana Recci	157. l. 7	Alifier Gallorum	71. l. 1
Indica Farnesiana	ibid.	Alkarca Arab.	7. l. 5
<i>Ακάνια</i> Officin. Constant.	156. l. 7	Alma Turc.	75. l. 1
Acacia Indica Cord.	176. l. 7	Almecega	102. l. 6
Acapatli Mexican.	184. sq. l. 3. & 182. l. 7	Almendras del Peru	129. l. 2
Acayaiba f. Acayaiba f. Acayou	42. l. 1	Albus	224. sq. l. 9
Acer	136. sq. l. 1	Altyna	128. l. 2
Acer Plinii	114. l. 2	Alypias Aetii	25. l. 5
Creticum Alp.	115. l. 2	Alypon	169. l. 7
Monspeffulanum Lugd.	ibid.	Alypum Penae	26. l. 5
Payonaceum Bauhini	ibid.	Monspelienfium	ibid.
Acer <i>κλονόροχον</i> Antiq.	114. l. 2	Montis Ceti	ibid.
Aceris species tertia, quae Platanus aquatica	17. l. 5	Amamelides	71. sq. l. 1
Acetarium totum purgans redditur a foliis sex vel octo		Amamelides Mespili pomum ap. Hesychium & Eusta-	
Rosae moschatae	191. l. 8	thium dicitur	71. l. 1
Achi vel Adi Canella	167. l. 3	Amarella & Agriotta	97. l. 1
Achar condimentum	180. l. 3	Amusa Serap.	146. l. 2
Acini Peruani	129. l. 2	Ambare Indorum Garziae	123. sq. l. 1
Acinaria palustris Gesn.	37. l. 5	Ambares Canat.	114
Acquajole Matth.	97. l. 1	Lusitan.	ibid.
Acylaca Cretensium	121. l. 4	Ambrae Perf.	75. l. 1
<i>Αδελφοί</i> palmulae Plinio	142. l. 2	Ambaigtinga arbor	104. l. 6
ad jus Sinapeos conficiendum	126. l. 2	Ambo Turc.	75. l. 1
Mammaram duritiem impediendam	122. l. 2	Ambela	134. l. 2
Mensum eruptionem promovendam	111. l. 2	Amberets Perf.	114. l. 2
Ventriculi dolores sacculus	138. l. 6	Amboina Molucar. Insula	150. l. 2
Adrachne Theophr.	67. l. 1	Ambre Castori	113. l. 2
Adracle Cretens.	ibid.	Ambulon Scaligeri	63. l. 1
Adoptiva mali Persicae	72. sq. l. 1	Amedanus Cresc.	225. l. 9
Adyl palma	154. l. 2	Amerina	47. l. 5
Ady palma Insulae S Thomae	154. l. 2	Amirbaris Bbenfinae	10 l. 5
Aeromeli arboris nucis juglandis	111. l. 2	Amomum	189. sq. l. 3
Aegis Abietis	118. l. 6	Amomum Officinarum nonnullarum Lobeleo	184 l. 3
Pinus	108. sq. l. 6	Sperlingii	191. l. 3
<i>Αιγύλας</i> Idaeorum	195 sq. l. 4	Bauhini odore Caryoph.	192. l. 3
<i>Αίμα δρεκόντων</i> Diosc.	133. l. 6	Amomis Clusii	ibid.
Aequum	47. l. 5	Amomum falsum	13. l. 5
Agalugem Arab.	252. l. 10	Amusa Serap.	146. l. 2
Agallochum	251. l. 10	Amomum recensum ligni Alpini	191. l. 3
Agallochum praestantissimum	ibid.	Dioscoridis	ibid.
Officinarum	ibid.	foliosum	ibid.
sylvestre	252. l. 10	Ammoniacum	124. l. 6
Agericum	203. l. 5	Amygdalus cum ipsius differentia	126. sq. l. 2
		Amygdalina pruna	80. l. 1
		Amyg-	

INDEX.

Amygdala petrea	61. 1. 5	Arbor Querciformis butyraceo fructu	129. 1. 2
Anacardium	162. 1. 2	Vitis & lacryma ex Guinea	22. 1. 5
Anagyris	153. 1. 1	tristis Malaccensis	34. 1. 5
Anana Ovied.	6. 1. 1	de Peru	89. 1. 6
Andirian Rhafis	66. 1. 5	Paroyso	85. 1. 5
Anetlinan	102. 1. 6	balsamifera Tolutana	99. 1. 6
Anime	133. 1. 6	resinifera Tabascensis Laet.	103. 1. 6
Anisum Indicum	114. 1. 2	Tecomahaca	ibid.
Anonymos flore Coluteæ Clus.	38. 1. 5	laccifera	104. 1. 6
Pervinæ folio Camer.	ibid.	finus S. Augustini	ibid.
Anthedon Theophr.	44	subtilibus frondibus	105. 1. 6
Anthedonoide	ibid.	Cypresso similis in Syria	123. 1. 6
Anthillis altera Italorum	243. 1. 9	Sinenfis pinguedinem sebi instar ferens	43. 1. 1
Apeiba	10. 1. 1	trifolia Cord.	154. 1. 7
Apaliura Græcor.	56. 1. 5	Oerio similis	180. 1. 7
Apharca	52. 1. 5	roleo odore Bras.	198. 1. 8
Aphyllon Indicum Bauh.	197. 1. 8	lominifera	10. 1. 1
Aproxis Plinii	28. 1. 5	Nigritica	27. 1. 1
Αρύγινος Theophr.	242. 1. 2	Soldaniæ pini fructu	115. 1. 6
Aqua Napha, quæ & Angelica	23. 1. 1	poma Paradisi ferens	22. 1. 1
Aqua ex baccis Rubi Idæi calculosis levamento	62. 1. 5	poma Adami ferens	ibid.
Aqua Mastichina August.	139. 1. 6	Arbor Thurifera	91. 1. 1
Aqua destillata e succo Ceraf. acid. æstuantium visce-	97. 1. 1	Arbores lachrymifera	100. 1. 1
rum solatium	97. 1. 1	Arbores lactiferae Cumanæ	104. 1. 6
Aqua Cardiaca pretiosissima Halepi	235. 1. 9	Gummiferae Novæ Hispaniæ Copal dictæ	105. 1. 6
Aquiceli Taurinor	109. 1. 6	lanigeræ	137. 1. 2
Aquifolium	211. 1. 4	Arbores siliquatæ quædam Exoticæ	180. 1. 1
Arazavali	134. 1. 2	Arbor Mangua Brasil.	215. 1. 9
Arcas	41. 1. 1	Arbor Cardiaca	254. 1. 10
Arayhan Morisco Hispan.	31. 1. 5	Arbor materiæ nobiles	456
Araticu Bras.	31. 1. 1	pigmentifera	456. 457
Aracaiba Bras.	33. 1. 1	miscellæ Exoticæ	462
miri	ibid.	Novæ Hispaniæ	462
Arafa Brasil.	43. 1. 1	Brasilienfes	454
Arac Aqua	152. 1. 2	Americana	463
Aratiæ nigrae usus ap. Hipp.	52. 1. 1	Arbores admirandæ cum omnibus earum speciebus	258. 1. 10
Arbor Americana oxyacanthæ similis	71. 1. 5	Arbores venenatæ	256. 1. 10
Amoris	172. 1. 7	Arbor Baxana	257. 1. 10
Arbor Benjuifera	101. 1. 1	Aguapam	ibid.
Chili	103. 1. 6	Madiapera	ibid.
Cornigera foliis Acaciæ	158. 1. 7	Auda	ibid.
Corallii	172. 1. 7	Tangaraca	ibid.
Cuci	137. 1. 2	Penoabsu	256. 1. 10
Arbor Judæ	167. 1. 2	Suchon	ibid.
igneæ	180. 1. 7	Uhebehafou	ibid.
gallophifera	103. 1. 6	Mancanillo	257. 1. 10
farinifera	150. 1. 2	Arbor fructu pilæ palmaris magnitudine	ibid.
dysenteria Acoftæ	166. 1. 3	succo venenato radice esculenta	ibid.
Goa	58. 1. 1	in Orellana pices soporans	ibid.
Gorifera	125. 1. 2	pomis venenatis in Darien	ibid.
Jucaje	208. 1. 4	foliis & ligno venenatis in Hispaniola	ibid.
Candu	ibid.	in insulis Canibulum	ibid.
Cacavifera Mexic.	129. 1. 2	siliquata in Sierra Lione	ibid.
chiapensis refinam styracis instar fundens	132. 1. 2	Arbores innominatæ Crafil.	256. 1. 10
Arbor Gadenfis Posidonii	79. 1. 5	Arbores aromaticæ	162. 1. 2
Javanensis foliis fraxini	82. 1. 5	Bactifera	1. 1. 1
fraxini folio, flore cœruleo Bauhin.	85. 1. 5	Glandifera	195. 1. 1
Arbol contra las erisipolas Lusit.	91. 1. 5	Nucifera	119. 1. 1
Arbor infana	102. 1. 6	Pomacinifera	1. 1. 1
liquidambar	ibid.	Pomossifera	72. 1. 1
leprosa Copalifera	105. 1. 6	Miscellæ	215. 1. 1
foliis Cassiæ	173. 1. 7	Rhodofloræ	186. 1. 1
fructus crepitantis	182. 1. 7	Siliquatæ	148. 1. 1
fabifera Javensis	184. 1. 7	Arbor vitæ Bellonii, Clusii & aliorum	73. 1. 1
Leuconifera Monard.	125. 1. 2	filici similis Oviedi	ibid.
Arbor Memba Congana	208. 1. 4	paradisica Lutetian. Lugd.	ibid.
Arbor Myrobalanifera	85. 1. 1	sive paradysica vulg. dicta odorata ad sabinam	ibid.
Arbor Piperifera	182. 1. 1	accedens Bauh.	ibid.
Arbor pomifera Ægypti Giraudeti	147. 1. 2	Arbores quoque mero infuso enutritæ	5. 1. 1
Arbor Socoterana Purchafii	150. 1. 2	Arbutus	66. 1. 1
sancta Acoftæ	166. 1. 2	Arbuscula floribus rubris	199. 1. 8
tingitoria Theveti	150. 1. 2	Arceuthis	96. 1. 5
Arbor Novæ Angliæ baccas Alkermes dictas ferens	211. 1. 4	Archenda Ægyptior.	49. 1. 5
Arbor de Rayz	58. 1. 1	Αρχαντόζυλον Bello	151. 1. 7
Nepal Cortesii	27. & 59. 1. 1	Αρχαντόζυλος Galeni	35. 1. 5
		X x x 2	Arde.

INDEX.

Ardefrigi Abensinae	66. l. 5	Beningenion	8. l. 2
Ardzopffen Valesian.	111. l. 6	Ben magnum Medicorum	117. l. 2
Arequiero Lusit.	157. l. 2	parvum	135. l. 2
Arecha Rom.	ibid.	Bengu	165. l. 3
Arecca	ibid.	Bepolo Malabr.	82. l. 5
Aria	71. sq. l. 1	Berberis	10. l. 5
Arienae	50. l. 1	Beretinus arbor	23. l. 5
Aronia Diofc.	44. l. 1	Betre	177. sq. l. 3
Aroeira Lusit.	90. l. 6	Betula	222. sq. l. 9
Arteriaca panchrestos Plin.	64. l. 1	Betulus Lobel.	3. l. 5
Afinina pruna	80. l. 1	Bichenbrunner	4. l. 1
Asop Virginiae	170. l. 3	Bifuri Sic.	131. l. 2
Alpalathus	243. l. 9	Bixa Ovied	123. l. 2
Alpris Macedonum	191. l. 4	Blatterlos Holland.	197. l. 8
Alparagus	74 sq. l. 5	Boabab Alpin.	33. l. 1
Alphendamnus	136. l. 2	Bodaglam Paludani	187. l. 3
Astergit Rhaf.	85. l. 7	Bola Arab.	141. l. 6
Atitara Braf.	181. l. 7	Boleti quercin.	203. l. 4
Atlyna	255. l. 10	Bombax	137. l. 2
Atramitae pagus Sabaeorum	92. l. 6	B er ylia Theophr.	81. l. 1
Augustana pruna	81. l. 1	Brabylla pruna Theocr.	80. l. 1
Aures Judae	15. l. 5	Brafma Diofc.	186. l. 3
Aurantia	23. sq. l. 1	Bravas	23. l. 5
Auzuba Ovied	67. l. 1	Brindoyne Linsch.	8. l. 1
Avenaria pruna	81. l. 1	Brindones Garz.	ibid.
Avenionense agrum	60. l. 5	Brotton	149. l. 7
Avellana urbana rotunda circa Lugd. Gefn.	116. l. 2	Bruta feu Brathys	74. l. 5
major Lugd. Camer.	ibid.	Bryon Plin.	198. l. 4
Italica	ibid.	Bubab Sini Indor.	158. l. 3
pumila Byzantina Tab. & Bauh.	ibid.	Bubula Gazae	81. l. 5
Indica C. Bauhin.	119. l. 2	Buxus	38. l. 5
Indica officulo trifido Joh. Bauh.	ibid.	Buyosono	184. l. 3
Indica Mehenbethene Cortusi	ibid.	Buyo Mexic.	ibid.
Macedonica Cord & Gefn.	116. l. 2		
Indicae tertium genus Matth.	119. l. 2		
Avellana Mexiocana, cujus fructum indigenae		Caaco Braf.	181. l. 7
adpellant Quiland.	128. l. 2	Caate	178. l. 3
Avornello Ananienf.	154. l. 7	Cabui-Iba	255. l. 10
Ayt Turc.	106. l. 3	Cacao Mexic.	128. l. 2
Azarolus Caefalp.	45. l. 1	Cacalochiti	182. l. 7
Azedaraeth	85. l. 5	Chamaeplatanus	5. l. 5
Azeite a Mato Hispan.	89. l. 6	Chamaecerasus	96. sq. l. 1
		Chamaecerasus spuria	100. sq. l. 1
		Chamaeae Diofc.	17. l. 5
		Chamaedaphnes	ibid.
		Chamaeplatanus clynotrochos	17. l. 5
		Chamaeplatanus	5. l. 5
		Champe	34. l. 5
		Champocca Javanorum	ibid.
		Chamaebuxus Bauhin.	39. l. 5
		Chamaepeuce	243. l. 9
		Chamaebatos Theophr.	63. l. 5
		Chamaerubus saxatilis Gefn.	ibid.
		Chamaerubus foliis Ribes	ibid.
		Chamaerubus Norwegica Bauh.	64. l. 5
		Anglica	ibid.
		Chamaemorus Cluf.	ibid.
		Chamaemorus Norwegica altera	ibid.
		Chamaerubus foliis vitis	ibid.
		Chamaelaegnus Dodon.	84. l. 5
		Charnub	158. l. 7
		Chamaeleuce Cord.	163. l. 7
		Chamaegenista	164. sq. l. 7
		Chamaecistus	203. l. 8
		Chamaroch Perf.	5. l. 1
		Cajulacca mala	132. l. 6
		Calafur Turcar.	180. l. 3
		Calveia	39. l. 1
		Camarronum Rhafis	186. l. 3
		Camarix Decan.	5. l. 1
		Cambaja	152. l. 2
		Camphora	134. l. 6
		Canambaja frutex	255. l. 10
		Canarinum piper	186. l. 3
		Cancellia	167. sq. l. 3
		Canna Arabum	49. l. 5
		Cancanum	132. l. 6
			Cani.
B.			
Baccae Coculae Elephantinae	161. l. 2		
orientales & piscatoriae	ibid.		
Bacca nodosa, Knotberries Anglic.	64. l. 5		
Bachapffel	4. l. 1		
Bacche Perfur.	187. l. 3		
Bahey	156. l. 2		
Baeotica myrrha	142. l. 6		
Bagolae Tridontinae	93. l. 1		
primum genus Caefalp.	36. l. 5		
alterum genus	71. l. 1		
Balado vel Baladar Arab.	162. l. 2		
Balanus myrepica	135. l. 2		
Balaustium	29 sq.		
Balfamodes Canella Plin.	167. l. 3		
Balfamum	95. sq. l. 6		
Bangué	183. l. 3		
Ban feu Bon Egypt.	179. l. 7		
Bananas Guineenf.	146. l. 2		
Banana Occidentalis	148. l. 2		
Orientalis	149. l. 2		
Baobab five Abavi Cluf.	33. l. 1		
Barca	160. l. 2		
Barba Jovis Gefn.	85. l. 5		
altera Anguill.	150. l. 7		
Batan Mayalenf.	31. l. 1		
Bdellium	144. sq. l. 6		
Bedeguar officin.	193. l. 8		
Befhale Arab. Abenf.	165. l. 3		
Beguill fructus	8. l. 1		
Bell	154. l. 2		
Beli	10. l. 1		
Belenicum Aristot.	78. l. 1		
Belzoinum Officinarum	145. sq. l. 6		

INDEX.

Canime Hispan.	133. 1. 6	Chicocapotes	100. 1. 1
Caningae Hisp.	170. 1. 3	Chuata Panuc	100. 1. 6
Capita multis squamis constantia Clus.	202. 1. 4	Chittagema, Chittajaman	129. 1. 6
Capitula squamata	203. 1. 4	Chermes Arabicum	132. 1. 4
Capparis	64. sq. 1. 5	Chocolaten	129. 1. 2
Capidae Hermolai	71. 1. 5	Cibage	115. 1. 6
Capota Herr.	10. 1. 1	Cicadae lacrymam Mannae exsugentes	127. 1. 6
Caprificus	49. 1. 1	Cinnamomum	172. sq. 1. 3
Capureiba	100. 1. 6	Cinnabari	133. 1. 6
Capura viva Qualcebeni	135. 1. 6	Ciriboa	185. 1. 3
Caphura	134. 1. 6	Cirmulo	111. 1. 6
Caragna	147. 1. 6	Cistus	199. sq. 1. 3
Caramano	150. 1. 2	Citri Elaeosaccharum	12. 1. 1
Carandas fructus	67. 1. 1	Citri Mali magisterium seu quinta essentia	ibid.
Caranna	147. 1. 6	Citrium malum monstrosum Stuttgardianum	13. 1. 1
Carambola Malab.	5. 1. 1	belluarum	ibid.
Carabelli Canar.	ibid.	Cucurbitinum	ibid.
Carcapuli Malab.	28. 1. 1	Citrum, Citrus, Cedrus, Cedromela, Citrangula	
Linfeh.	ibid.	Monard.	11. 1. 1
Cardamomum	192. sq. 1. 3	Citrus Atlantica Plinii	72. 1. 5
Carduus Indicus	59. 1. 1	Cneoron	28. sq. 1. 5
Carpesium Cord.	184. 1. 3	Coatlis	82. 1. 5
Carrapae	170. 1. 3	Cobban Ind.	76. 1. 1
Carras	154. 1. 2	Coccali	120. 1. 6
Carpinus	9. 1. 5	Coca Peruvianorum	33. 1. 5
Carpobalsamum	95. 1. 6	Coca occidentalisFragos.	ibid.
Carpata Bras.	9. 1. 5	Coco de Levante	161. 1. 2
Carabea	132. 1. 6	Coculus Officinarum	ibid.
Carphoton	139. 1. 6	Cocconileia	84. sq. 1. 5
Carpinas Theophr. Lonie.	178. 1. 7	Coccus five paima nucifera	151. sq. 1. 2
Carpinus	4. 1. 5	Coccus	203. 1. 4
Caryinon oleum	141. 1. 6	Coccus insectoria	209. 1. 4
Caryophyllum	178. sq. 1. 3	Indica	151. 1. 2
Caryoce	154. 1. 2	Cocculae Orientales Doam Sames in Aegypto	161. 1. 2
Caryosso Lufit.	ibid.	Coccognidium	25. 1. 5
Casca ex lacte amygdalino quomodo fiat	127. 1. 2	Cocoichne Jaenual Indi	151. 1. 2
Cassia	167. sq. 1. 3	Cochilia de Guigne	119. 1. 2
Cassia nigra	173. sq. 1. 7	Cochine	6. 1. 1
Castanea	121. sq. 1. 2	Cochinilla Hisp.	59. 1. 1
Catalonica pruna	80. 1. 1	Colutea	167. sq. 1. 7
Cataputia major Fragos.	7. 1. 5	Comalamasa	152. 1. 2
Cate	59. sq. 1. 5	Comacum Theoph.	163. 1. 3
Catuli	112. 1. 2	Comanda giura Marcgr.	180. 1. 7
Caucalis	142. 1. 6	Connarus	89. 1. 1
Cauda vulpina Turcarum Bellon.	219. 1. 9	Contra lippitudinem certum experimentum	141. 1. 6
Caunama	183. 1. 3	Contra rabidorum canum morsus	122. 1. 2
Cavizatare Goens.	33. 1. 5	Conus	111. 1. 6
Caeduae Palmarum sylvae	140. 1. 2	Convolvulus rectus Creticus	29. 1. 5
Caecae arbor	142. 1. 2	Copra nux	152. 1. 2
Ceanothus	11. sq. 1. 5	Cerculum	94. 1. 6
Cedrus	68. 1. 5	Corneolo	97. 1. 1
Cedrus confiera	106. sq. 1. 6	Corni arboris contactu a rabido olim demorsos, in ra-	
Cefaglione	145. 1. 2	biem iterum agi	91. 1. 1
Centromyrine Theophr. Anguill.	35. 1. 5	Cornus	90. sq. 1. 1
Celastus	53. 1. 5	Cornu plantabile	262. 1. 10
Celte Alve vel Elvo Gall.	111. 1. 6	Cortex Eriophorus Clusii	172. 1. 3
Cepaea Diofc.	66. 1. 5	Cortex Winteranus	26. 1. 5
Cerasus	94. sq. 1. 1	Cortex arboris Ulmo similis ad Catarrhos	222. 1. 9
Ceratum nobile adversus vulnera & haemorrhoidum fluxum	147. 1. 6	Cortices Cherleri albi	170. sq. 1. 3
Ceratonia	171. 1. 7	Corruda Plinii	76. 1. 5
Ceratia agrestis	172. 1. 7	Cor Pinus	109. 1. 6
Ceratum Monococcum Bauh.	175. 1. 7	Coryli virga vel caudice serpentes istum obtorpescere,	
Cercis Theoph.	169. 1. 7	emori tandem observatum	115. 1. 2
Cerosugaro Matth.	206. 1. 4	Corylus persimilis alno Lob.	ibid.
Cereus Peruvianus	59. 1. 1	Corylus avellana Turn.	116. 1. 2
Ceratum stomachale ex Ladano	201. 1. 8	Cotinos	44. 1. 5
Ceruach Slav.	211. 1. 4	Cotinus Coriaria	84. 1. 5
Cerris Plinii minore glande Lobel.	198. 1. 4	Cotonaster	101. 1. 1
Cerrus Aegylops Clus.	ibid.	Crespinus Matth.	11. 1. 5
Cerrus Latinorum	ibid.	Crispina uva Cord.	12. 1. 5
Cervi spina	57. 1. 5	Cubebae	188. sq. 1. 3
Ceyba Oviedi	138. 1. 2	Cuci	156. 1. 2
Checaninum	157. 1. 2	Cuculi fructus solani furiosi in Aegypto	161. 1. 2
Cheruach Maced.	211. 1. 4	Cupressus	121. sq. 1. 6
Chiapensis palma	149. sq. 1. 2	Curcas Americ.	8. 1. 5
		Curcas Cayensium	9. 1. 5
		Y y	Cura

INDEX.

Cura Bram.	27. 1. 1	Fabago Belgarum Lugd.	66. 1. 3
Cyanus arborea Cretenfis	101. 1. 1	Fagariae Abenlinae	159. 1. 3
fruticosa Candiae	ibid.	Fagus	113. 1. 4
Cydanago	ibid.	Fagus sepium Bauhini	3. 1. 5
Cydonium Bengalenfe Garz.	10. 1. 1	Fagulus herbariorum	ibid.
Cyparissius	121. 1. 6	Farfarius antiquorum	227. 1. 9
Cyprus	48. 1. 5	Farina Nachani	59. 1. 5
Cytiauis	29. 65. 1. 1	Farnia Caefalp.	198. 1. 4
Cytifus	149. 1. 7	Feinfteeling	4. 1. 1
Cytifus argenteus	164. 1. 7	Ferula Trag.	163. 1. 7
Cytifus defectum lactis in hominibus & animantibus	149. 1. 7	Ferruminatrix Indor.	59. 1. 1
supplet	149. 1. 7	Ficus	48. 1. 1
D.		Ficus infernalis Hifp.	7. 1. 5
Dactylus	139. 143. 1. 2	Flatus potenter difcutiens	112. 1. 2
Daphnoides	24. 1. 5	Flavum granum	60. 1. 5
Darach Perf.	151. 1. 2	Flos acidus Quineenf.	186. 1. 3
Darach Arab.	148. 1. 2	orbicularis	18. 1. 5
Darandanae Hifp.	27. 1. 1	Floribundio	34. 1. 5
Decoftum ficuum adverfus tormina & Nephritidem	54. 1. 1	Flores Exotici	ibid.
Delphinium Diofcor.	169. 1. 7	Flores Ballami	97. 1. 6
Demeffile Ballami	95. 1. 6	Flores Benzoni in difpnoea laudatiffimi	146. 1. 6
de Majdua genus vasorum fitilium	166. 1. 7	Flos tinctorius Bauh.	163. 1. 7
Dentatus Caryophyllus aromaticus	181. 1. 3	auriculæ	172. 1. 7
Destillatum ex Nucleis Cerafor. cum Melon. pulpa & faccharo	95. 1. 1	Flor de la Oreia Hifpan.	198. 1. 8
Diacaryon	112. 1. 2	Flores arboris Yolloxochitl	ibid.
Dialacca Officinarum	132. 1. 6	Cacaloxochitl.	ibid.
Diamoron offic.	65. 1. 1	Folium Ballami	95. 1. 6
Diofcoridis Thymiana	131. 1. 2	Indum	177. 1. 3
Dora	94. 1. 6	prae grande coriaceum ex Indiis	80. 1. 5
Dotem filiae plantari antiqui quid adpellent	122. 1. 6	thuris e Florida	92. 1. 6
Dourez Pharmacopœus Monfpelii optimum	210. 1. 8	Folliculorum Ulmi liquor præftans	221. 1. 9
fe confeciffe notat	210. 1. 8	Formicarum alatarum ftercus	132. 1. 6
Draco arbor	79. 1. 5	Formicae fulvae nigricantes & tenues	158. 1. 7
Draconis oculus	23. 1. 5	Fragre Serapionis	189. 1. 3
Duriaccon Linfch.	31. 1. 1	Frangula 100. 1. 1. Dodon.	225. 1. 9
Durianus	ibid.	Fraxinus	80. 1. 5
Durio Acoftae	31. 1. 1	Frifimeleca fucco hypociftidis ulus in fluxionibus mulierum calidis	200. 1. 8
Duo fofculorum veftigia Dodon.	100. 1. 1	Fruftus Exotici diverfarum figurarum	107. 1. 1
E.		Fruftus Tithymali paralii	161. 1. 2
Ebenus	215. 1. 9	Exoticus caryophylli odore	181. 1. 3
Ebenus Cretica	150. 1. 7	Fruftu rotundo caryophyllus aromaticus	ibid.
Ebrietatem arcent amygdalae amarae praemanfae	126. 1. 2	Fruftus fufcus forma caryoph. aromat. majoris	ibid.
Ebulus	17. 1. 5	Fruftus Clufii Walachrenfis	192. 1. 3
Ebuli radice Jus in Vino decoctum potui hydropicis	15. 1. 5	Ballami Robin.	200. 1. 4
apud Aeginetam datur	15. 1. 5	Orellanae materie intus infar Gallarum	ibid.
Eduium ex carne cydoniorum cum melle	8. 1. 1	Fruftus Mangas Recheadas & Mangas in Achar	76. 1. 1
Elaeagnon Theophr. Lob.	47. 1. 5	bravas	ibid.
Elaeagnus lacus Orchomenii Theophrast. Bellon. & Cord.	84. 1. 5	Matas	ibid.
Elaeomeli Lobelii	129. 1. 6	Fruftus elixus Caftaneae Graecis olim pro pane, hocque nutriti pueri	121. 1. 2
Electuarium contra Vomitus & fluxum	141. 1. 6	Fruftus Indicus Sanparanta	91. 1. 6
contra fcorbutum præfentiffimum remedium	64. 1. 5	Fruftus Ballami	95. 1. 6
dysentericis convenientiffimum	91. 1. 1	Fruftus pineos nucleos duos referens	115. 1. 6
adverfus fputum fanguinis & tuffim	122. 1. 2	Fruftus pineos nucleos duos referens	115. 1. 6
Elhanne Arab. Bauh.	49. 1. 5	Fruftus Exoticus pinei conii facie	ibid.
Elkarie	179. 1. 7	Fruftus Nerii filiquae figura	180. 1. 7
Eltepa Hifp.	199. 1. 8	Fruftus Indicus Tamarindi feminis facie Bauh.	177. 1. 7
Emplastrum Diafcomoru Aeginetae	62. 1. 1	Fruftus Ogor	184. 1. 7
Melinum	136. 1. 6	Fruftus filiquati	180. 1. 7
Emulfo ardorem Urinae vehementer reftinguens	122. 1. 2	filiquofus Orucoria dictus	186. 1. 7
Enzanas Hifp.	198. 1. 4	Fruftus Quercinus feu Agaricum	203. 1. 4
Enzanda Pigafettae	57. 1. 1	Fruftus duo in Perfia	263. 1. 9
Ergafima	142. 1. 6	Fruftus & Gummata tingentia Guajanae	261. 1. 9
Erica	169. 1. 9	Frutex primus innominatus Marcgr.	182. 1. 7
Ermelinus	94. 1. 1	fecundus innominatus Marcgr.	183. 1. 7
Evonymus	177. 1. 7	tertius innominatus Marcgr.	184. 1. 7
Excrementum bombycinum falicis	167. 1. 9	Frutex Antipatheticus	261. 1. 10
Rofae aemulum falicis	ibid.	Scythicus	ibid.
Exotica Myrtus Plinii	32. 1. 5	Frutices Americani	259. 1. 9
F.		innominati Brafil.	256. 1. 10
Faba inverfa Trag.	154. 1. 7	Fungi feu Fungi	111. 1. 2
		Fungus orientalis	161. 1. 2
		Fufterna	118. 1. 6
		G.	
		Galla	195. 1. 4
		Galbulus Cupreffii Varron.	121. 1. 6
		Genifta	

INDEX

Garcapuli Canar.	28. 1. 1	Herba attractiva	262. 1. 10
Genista spartium	158. sq. 1. 7	Herba asbestos cum reliquis	261. 1. 10
Gepalu	114. 1. 6	Hippoglossum Valentinum	26. 1. 5
Germen Mosyiticum	167. 1. 3	Hippomanes Cratevae	161. 1. 2
Gigartus	19. 1. 5	Hipponerantizium	26. 1. 1
Girada	160. 1. 2	Hoaxacan	216. 1. 9
Glans Indica magna subrotunda Plateri	200. 1. 4	Hortus Meterea prope Cairum alit Balsamum	96. 1. 6
Glans Unguentaria	134. 1. 2	Hypomelides Palladii	44. 1. 1
Glebae sanguinis Draconis	79. 1. 5	Hypocistis	200. 1. 8
ex Glomis cynorrhodi f. rosae sylvestris Arcuum f.		Hypospartium	162. 1. 7
Spiritus ad calculos renum	193. 1. 8	Hüttlingapffel	4. 1. 1
Gluten Romanum	137. 1. 6		
Gluten Albotin Abensf.	136. 1. 6	I.	
Alimbat, Alimbar & Alimbath	ibid.	Jaaca	159. 1. 2
Gola Nigritarum	114. 1. 2	Jaracanda	217. 1. 9
Gomandina Bras.	103. 1. 6	Jasminum	217. sqq. 1. 9
Gossypium	137. sq. 1. 2	Jatitara Bras.	181. 1. 7
Gossypium in Aceto	31. 1. 1	Idaea glæ Diofc.	35. 1. 5
Graciles admodum nuces avellanae Bauhin.	116. 1. 2	Idaea radix Diofc. Bauh.	37. 1. 5
Granum Anescen Abensinae	184. 1. 3	Ilattrum Caesalp.	51. 1. 5
Grana en pax Hisp.	59. 1. 1	Ilattrum folio ad Illicem accedente Caesalp.	52. 1. 5
Granum regium majus Mes.	7. 1. 5	Ilex	208. sqq. 1. 4
Granum Gnidium	26. 1. 5	Illita capitis dolori, praesertim in febre	126. 1. 2
Karmesinum	32. 1. 5	Indica Sassafraga Capivacc.	9. 1. 5
Granum viride Arab.	94. 1. 6	Indica radix quae Sassafras Codronch.	ibid.
Granata	29. 1. 1	Insula Formosa	215. 1. 9
Graeca pruna Camer.	81. 1. 1	Pico	ibid.
Grossularia	11. sq. 1. 5	S. Dominici	ibid.
Grübler Apffel	4. 1. 1	Jovis barba	170. 1. 7
Grüninger Apffel	ibid.	Juniperus	69. sqq. 1. 5
Guavas	114. 1. 2	Jusculum Maniar blanco Hisp. dictum	5. 1. 1
Guanavanus	160. 1. 2	Suppenwendtherapffel	4. 1. 1
Guajava	ibid.		
Guamochea Barb.	172. 1. 7	K.	
Guajabo Americ.	31. 1. 1	Karumfel Arab.	180. 1. 5
Guabam	34. 1. 1	Kesmesen vulgare ad oculi morbos remedium Con-	
Guanavanifera arbor Bauh.	42. 1. 1	stant.	172. 1. 7
Guajacum Patavinum Fallopii	94. 1. 1	Kernapffel	4. 1. 1
Guajacum lignum	215. sqq. 1. 9	Kikaion Jonae Arab.	7. 1. 5
Guinea Cerasa vulg. Gallic.	97. 1. 1	Kliva, Seg Diofc.	133. 1. 6
Guindola	ibid.	Kismisen Syr.	172. 1. 7
Guirapariba	214. 1. 9	Knotberries Anglic.	64. 1. 5
Gummi quid?	131. sqq. 1. 6	Kôu, ex tñs indus Diofc.	131. 1. 6
Arabicum	ibid.	Kohlrosen	190. 1. 8
Anime	132. 1. 6	Kornapffel in Zell	3. 1. 1
Juniperi	135. 1. 6	Kreisling	4. 1. 1
Cerasorum	136. 1. 6		
Caryophyllorum	180. 1. 3	L.	
Mali Armeniacae	77. 1. 1	Laburnum	153. 1. 7
Ulmi	136. 1. 6	Lac Amygdalarum chalybeatum adstrictorium proru-	
pruni sylvestris	79. 1. 1	tis alvi	127. 1. 2
Sambuci	15. 1. 5	Lacte amygdalino cum Aqua Carduibenedicti extracto	
Gummi Elemi Officinarum	147. 1. 6	infantes sustentari possunt	ibid.
Gummi Olle	129. 1. 2	Lacca Officinarum	132. 1. 6
Holli dictum	103. 1. 6	Lacryma quid & quomodo differat a Resina & Gummi	
Gummi minus usitata	136. 1. 6		123. 1. 6
		Lacryma abietis	119. 1. 6
H.		Juniperi	70. 1. 5
Habzeli Serapion.	184. 1. 3	rubea seu sanguis Draconis	79. 1. 5
Haberchleben	80. 1. 1	lentisci Peruanæ	98. 1. 6
Hacchis Indor.	59. 1. 5	Balsami	95. 1. 6
Hadbadh succus Arab.	66. 1. 5	Ladanum	207. sqq. 1. 8
Haemodori quoddam genus	163. 1. 7	Lapides in Quercubus	203. 1. 4
Härtling im Wald	3. 1. 1	Lapidum in India occidentali resina	147. 1. 6
Härtlingapffel	ibid.	Larix	115. sqq. 1. 6
Häflecher	4. 1. 1	Laurus	18. sqq. 1. 5
Hedera regens Plinii Caesalp.	211. 1. 4	Laureola	24. sq. 1. 5
Heil five Hil Serap. & Cord.	193. 1. 3	Lauchapffel	4. 1. 2
Heinigsapffel	4. 1. 1	Lectirota	136. 1. 1
Heydnisch Wundkraut	4. 1. 1	Ledum Alpinum	212. 1. 8
Helenium Cratevae	202. 1. 8	Silesiacum Clus.	211. 1. 8
Helianthe Plinii	204. 1. 8	Lentago Caesalp.	21. 1. 5
Heliocallis	ibid.	Italarum Cost.	ibid.
Heliofacte sylvestris Euboica	17. 1. 5	Lentiscus	88. sqq. 1. 6
Hemeris Idaeorum	197. 1. 4	Lethalium Venenorum vires retundere Cydonia, præ-	
Herba terribilis Narbon.	26. 1. 5	sertim Veratri observatum fuit	9. 1. 1
Malavarica Lus.	28. 1. 1	Reyerapffel	4. 1. 1
		Libri Numae reperti integri post annos 535 quod Ce-	
		drato liquore imbuti fuissent	141. 1. 6
		Yyy a	Lichen

INDEX.


Lichen marinus	60. l. 1	Medicina sanguinis coccinea	82. l. 3
Ligna durissima aliquot	214. sq. l. 9	Medicamentum ad robur conciliandum exsoluto ven-	
pretiosissima ex Havana & Insula Cuba	244. sq. l. 9	triculo	108. l. 1
Lignum Aquilae Lusit.	131. l. 2	ad pulsus in paroxysmis febrium	112. l. 2
aromaticum Monard.	170. l. 3	Μελανόβλοιος Plin.	231. l. 9
ligno Monardis simile Clusii	ibid.	Meli Cydrium Hipp.	125. l. 6
Brasilianum fomitis vicem præbens	208. l. 4	Mespilus	44. sq. l. 1
Javanense fungosum	ibid.	Metallum Italarum	71. l. 1
Anisi Goropii	10. l. 5	Meylinapffel	4. l. 3
Visci Quercini	204. l. 4	Morus	64. sq. l. 1
sempervivum	59. l. 5	Mori pillulae	61. l. 5
Nephriticum	82. l. 5	Myrica	236. sq. l. 9
Bezoardicum Cherler?	ibid.	Myrobalanifera arbor	85. sq. l. 1
Balsami	96. l. 6	Myrrha	141. sq. l. 6
Desiderii	103. l. 6	Myrtillus	35. l. 5
pice nigrius	214. l. 9	Myrtogenista	39. l. 5
Lignum ferrum Lusit.	215. l. 9	Myrtus	29. sq. l. 5
Ligustrum	48. sq. l. 5	Myxaria duplicia	87. l. 1
Lima quid	21. l. 1	Myxus alba Gefn.	85. l. 5
Limae	14. l. 1		
Limera Hisp.	ibid.	N.	
Limonia Mortelleti	18. l. 1	Nabeca	93. l. 1
Lingua sanguinea & offea	92. l. 1	Nebulam & Albuginem dispellens	116. l. 2
Linum	26. l. 5	Nerion	179. l. 7
Linternum	51. l. 5	Nobile remedium contra defluxiones externum	146. l. 6
Rinckherapffel	4. l. 1	Nucamentum falicis	232. l. 9
Liquidambar	144. l. 6	Nuces exoticæ	161. l. 2
Liquor a peste præservans	112. l. 2	Nucum Pinearum quatuor genera apud Plinium	109. l. 6
melleus	204. l. 4	Nuclei juglandium nucum ab jejuno manducati, rabiosi	
Lixivium ex cineribus ligni arboris Nucis juglandis		canis morfui imponuntur præfenti remedio	110. l. 2
ad furfurulosum caput commendabile	111. l. 2	Nuces juglandes	111. sq. l. 2
Locus Malsaigne circa montem du Pre in Burgundia		Nux Avellana	115. sq. l. 2
pinus sylvestris serax	111. l. 6	Juglans	113. l. 2
Longa vita Lob.	184. l. 3	metel occulta officin.	163. l. 2
Lotus	92. sq. l. 1	metel communis	ibid.
Lumia quid	20. l. 1	juglans fructu serotino ostente proxima	113. l. 2
Lungyen fructus Sinensis	231. l. 5	cathartica Marcgr.	113. l. 2
Lycium	58. l. 5	moschata	163. l. 3
Lycostaphylos mascula & foemina	17. l. 5	moschata, si nimium sumatur, carotieum quid in-	
		ducere potest	164. l. 3
		aromatites Garz.	165. l. 3
M.		Nucum myrticarum flos	ibid.
Macahala aqua Ægyptiorum præstantissima	236. l. 9	Nux Vesicaria	133. l. 2
Macer	165. sq. l. 3	Unguentaria	136. l. 2
Macis	165. l. 3		
Macim omnium aromatum principatum obtinere, credi-		O.	
dit Scaliger	ibid.	Ocelli Gefn.	100. l. 1
Macaleb Lugdun. Serapion.	50. l. 5	Offae Neapolitanor. ex Cerasis	95. l. 1
Magma expressiois amygd. amarar. gallinas & vul-		Olea	40. sq. l. 5
peculas interficit	128. l. 2	Bohemica	90. l. 1
Magisterium contra Calculos	193. l. 8	sylvestris septentrion.	ibid.
Malabathrum	175. sq. l. 3	Olivellæ	45. l. 5
Malagueta Hispan.	194. l. 3	Oleaster	46. l. 5
Mala Americana	7. l. 1	Olea sylvestris	44. l. 5
Guianensis	ibid.	Oleaster Germanicus Cord & Bauhin.	55. l. 5
Malus Aurantia	23. sq. l. 1	Oleum amygdal. dulcium recent. expr. πολύχρηστον est	
Malus aurea Dodonæi	30. l. 1	in confusata alve, dolorib. calculi & renum, tussi	
Malus Citria	10. sq. l. 1	secca & aliis	127. l. 2
Malus Cydonia	8. sq. l. 1	Oleum Nucis moschatae expressum	165. l. 3
Limonia	13. sq. l. 1	Macis expressum & ejus vires	ibid.
Persica	72. sq. l. 1	ex nucleis Cerasor.	95. l. 1
Malva Indica	197. l. 8	ficus infernalis N. H.	8. l. 5
Japonica	ibid.	flavum resinae lariceae in ulcerib. sanandis com-	
Mangifera arbor	74. sq. l. 1	modifimum	137. l. 6
Manay Hispan.	78. l. 1	ex Mastiche	138. l. 6
Manigoy pulmentum	83. l. 1	styracinum	144. l. 6
Maniar blanco condimentum Hisp.	31. 42. l. 1	ad Ventris puerorum dolorem sedandum	ibid.
Manna, cum omnibus, quae ad ipsam pertinent		Ben Juini duplex	146. l. 6
thuris	124. sq. l. 6	ex floribus Syringae Arabicae ad plurimos usus	
Margarita	140. l. 6		
Margarides seu Margaritides palmulae	146. l. 2	Oleander sylvestris Abensinae Myconi	220. l. 9
Maragnanæ insulae palmae	142. l. 2		28. l. 5
Martii panes	151. l. 2	Opobalsamum concretum Lob.	98. l. 6
Massiniana pruna Caes.	127. l. 2	solidum Bauhini	ibid.
Muscus arboris pruni	80. l. 1	Opocalpasum	142. l. 6
Mastiche, hodie Mastix	ibid.	Opuntia Loniceri	59. l. 1
Mausbirnen	137. sq. l. 6	marina de Bry	60. l. 1
	39. l. 1	Osteocollos	ibid.
		Oricella Theveti	163. l. 7
		Ornus	

INDEX.

Ornus	69. 1. 1	Pseudo Amomum	13. 1. 5
Orucoria Clus.	186. 1. 7	Pseudo ligustrum	97. sq. 1. 1
Ostria	4. 1. 5	Pseudoagnus	ibid.
Ostrys Theophr.	ibid.	Pulvis ad Vertiginem	189. 1. 3.
Ova formicarum	158. 1. 7	contra febres intermittentes	265
Oxyecum Clus.	37. 1. 5	e floribus ligustri Aegyptiaci cum succo Citri	49. 1. 5
Oxyarcuthis Lobel.	71. 1. 5	ad tingendos capillos	49. 1. 5
Oxymyrine Anguill.	35. 1. 5	foliorum ligustri Aegyptiaci angustifolii ad tin-	ibid.
		cturas flavas	141. 1. 6
		farcoticus	138. 1. 6
		contra alvi profluvium & hypercatharsin	29. sqq. 1. 1
Pacoury fructus	53. 1. 1		34. sqq. 1. 1
Palaj marina Bar.	28. 1. 5	Fyri radix a muliere portata impedit conceptum, si	36. 1. 1
Palae	50. 1. 1	Alberto fides	ibid.
Palatium leporis Caes.	76. 1. 5	Punica malus	178. 1. 7
Palma	139. sqq. 1. 2	Pyrus	197. sqq. 1. 4
Nucifera	151. sqq. 1. 2	Fyri radix a muliere portata impedit conceptum, si	200. 1. 4
Conifera & affines	158. sq. 1. 2	Alberto fides	198. 1. 4.
Palmitae	145. 1. 2	Pyrum Vino injectum, fundum petere, si aqua dilu-	ibid.
Palmites	ibid.	tum est, supernatare, si meracum fuerit, ex Grata-	
Palmae Americanae	149. 1. 2	rolo	
Palmapius	158. 1. 2		
Palma aculeata	211. 1. 4	Q.	
Christi	7. 1. 5	Quadratoria Gazae	178. 1. 7
Plinii	76. 1. 7	Quercus	197. sqq. 1. 4
aut Palum sanctum Lob.	217. 1. 9	Quercuum excrementa	200. 1. 4
Paltifera arbor	42. 1. 1	Quercus placida Gazae	198. 1. 4.
Pan amorello Lusit.	255. 1. 9	Quercus stupendae altitudinis in Gallia	ibid.
Panis pro hecticis & consumtis	127. 1. 2		
Peplinum Diosc.	169. 1. 7	R.	
Persea	78. 1. 1	Refina quid?	121. 1. 6
Perficum moschatum	74. 1. 1	Refina Cupressi	141. 1. 6
Petrocerasum	96. 1. 1	Refina quomodo a gummi differat	137. 1. 6
Phaselus Rom.	7. 1. 5	liquida	ibid.
Philica	52. 1. 5	ficca	ibid.
Phillyrea	56. 1. 5	Refina laricea	137. 1. 6.
Philippina arbor piperifera	184. 1. 3	Refina Cedri	141. 1. 6.
Phoenicobalanus Trall.	85. 1. 1	Refinae novi Orbis	148. 1. 6
Phitiophoron Graec.	117. 1. 6	Abiegna Indica	ibid.
Pilulae lanatae	202. 1. 4	Carthagenensis	ibid.
capillatae	ibid.	ambrae facie	ibid.
Myagdyneae	ibid.	Copal dista	ibid.
foliolae	ibid.	Rhamnus	54. 1. 5.
Aquosae	ibid.	Rhus arbuscula	82. 1. 5
Pilul. in alis ramorum Bauh.	197. 1. 4	Ribesum	12. 1. 5
e foliis convolutis Bauh.	ibid.	Ribes Officinarum	ibid.
Afininae Trag.	ibid.	Arabum	ibid.
ad urgentes Catarrhos Wieri	144. 1. 6	congener planta	ibid.
Pinus	108. 1. 6	Ricinus	6. 1. 5
Piper Alpinum majus Gesn. 25. 1. 5. montanum Gesn.	13. 1. 5	Ricinus Americanus	8. 1. 5
24. 1. 5. piperella	132. sq. 1. 2	Ricinum stirpem illam esse, quam Deus Jonae umbra-	ibid.
Pistacia	149. 1. 6	culo paraverat, quidam volunt	ibid.
Pix	205. 1. 4	Rosa	186. sqq. 1. 8
Planta Peruana, visco similis Taber.	159. 1. 7	sativa, rubra cum differentiis	189. sqq. 1. 8.
Planta spinosa mannam resipiens Bauh.	5. 1. 5	Rotharling vom Walde	4. 1. 1
Platanus	6. 1. 5	Roth Buchapfel	ibid.
vulgaris	ibid.	Rother Weilingapfel	ibid.
Indica	167. 1. 3	Rubus	61. sqq. 1. 5
Platea corymb. Diosc.	93. 1. 6	Ruscus	34. sqq. 1. 5
Pocula Thericlea ex Terebintho	83. 1. 1		
Pomum Cervinum	199. 1. 4	S.	
Poma de Coquo	7. 1. 1	Saba regio thurifera	91. 1. 6.
Sodomae & Gomorrhae	ibid.	Sabina	66. sq. 1. 5.
Nicaraguae Benzoni	ibid.	Salix	228. 1. 9
Hiaci	ibid.	exotica	236. 1. 9
Diuretica	ibid.	Syriaca folio oleaginoso argenteo	ibid.
Pomum Adami	20. 1. 1	Arabica foliis Atriplicis	ibid.
Poma Aurantia Nana Eystet.	26. 1. 1	Aegyptia floribus globulosis	ibid.
Pomum Suca Sinensium	34. 1. 1	Brasilensis	237. 1. 9
Pontica nux in Corylo vulgari Cord.	117. 1. 2	exotica Garb. incolis Rauw.	ibid.
Ponzires Caesalp.	13. 1. 1	Amerina	ibid.
Populus	227. 1. 9	Amerina Matthiol.	90. 1. 1
Prunus	80. sqq. 1. 1	Salicornia	47. 1. 5
Prunum insanum	85. 1. 1	Samaca	13. 1. 1
Prunus Sebestina Syriaca	86. 1. 1	Sambucus	15. sq. 1. 5.
Italica	ibid.	Sanctae Crucis de la Sierra	150. 1. 2.
Pseudo Caffia Diosc.	167. 1. 3	Sanguis Draconis	79. 1. 5
Pseudo Sycomorus Matth.	62. 1. 1	Sanguis Draconis officin.	133. 1. 6
		Santalum	245. 1. 9
		Santalus adulterina Cretica Joh. Bauhin.	246. 1. 9
		Sassafras	9. 1. 5.
		Z z z	Echam

I N D E X.

A circular arrangement of 16 decorative medallions, each featuring a different floral or geometric design. The medallions are arranged in a ring, with a central medallion at the top. The designs include various flowers, leaves, and geometric patterns. The entire arrangement is surrounded by a border of small flowers and leaves.



*Ostria olmo similis fructu in
umbilicis.*



Platanus.

*Tilia fœmina folio minore
Lindenbaum.*



Viburnum vulgo.

*Tilia mas folio maximo
montana*



Foliaceis.

Tab.
LXIV



Ricinus

Americanus.



*Ricinus Americanus
major.*



*Ricinus
Wunder-*

baum

g.

Creutzbaum



Sassafras
Wimanek
sassafras.



Mazaxocottli Nardi.

Fructus Exoticus Ricini similis




Berberis Alpini Cretica.

Hucipocott seu Ricinus
Americanus scandens **Tab: LXV.**



Berberis dumetorum



Grossularia silvestris non spinosa
fructu nigro.





Grossularia non spinosa silvestris



Grossularia non spinosa rubra.







Mureci Paramambucensium.



Ribes Rawolfij Congener plants.



Sambucus Vulgaris.
Holderbaum. Hollunder.

Ribes Arabum folijs
petafitidis



Frutex innominatus Brasiliensis
Primus. Morg.

Sambucus arborescens
racemosa rubra.



Sambucus similis non lacineata



Sambucus arborescens lacineata

Sambucus aquatica flore simplici



Ibapurunga Brasiliensium.



Enguamba Vrapavensium.



Sambucus aquatica flore glabro pleno.



Tab:
LXVII

Laurus Latifolia mas.



Laurus Latifolia faemina.



Laurus domestica tormi folia Lorberbaum.



Laurus silvestris folys Comi faeminae sub firsutis




Laurus tenuifolia serrata promintoris. Bona Spei



Laurus faemina.



1771



1754



Laurus Cretica Alpini



Laurus silvestris folijs Venosis



Arbor Lauri folijs Guineensis.



Arbor Innominata Brasiliensis.



Laurus Indica.



Laureola folio deceduo flore: purpureo.



Laureola perpelvifolia flore viridi.



Arbor Beretina Insulae.



Nextaalpe Nardi.



Thymelaea folijs glabris.

Chamelaea sirsute.



Thymelaea folijs acutes Capitula succise

Chamelaea tricoctos. Tab: LXIX.



Thymelaea folijs lini.



Thymelaea folijs caudicantibus serici in starmollibus.





Thymelaea folijs scali Lanuginosis fassis



Thymelaea folijs Chamelae minoribus sub sirsute







*Cneorum album folio oleæ
argenteo molli*



Thimelæa affinis facie exterum



*Thimelæa tomentosa folijs secti
minoris.*



Tab.
LXX

*Myrtus Latifolia
Romana.*



*Myrtus Communis Italica
Myrten Baum & Welsch,
Heidel Beern.*



*Cneorum album folio
argenteo molli.*



Myrtus angustifolia Batica



*Myrtus Latifolia Batica
folijs laurinis.*

Myrtus Latifolia Belgica.



Arbor tristis Clusij prima.



Hoitzxochitl. Tototepēcensium.



Vitis Idea folijs oblongis albicantib9.



Arbor tristis malacensis Acoftæ.



Cambui Pernambucensium. fruticeſcens.



Vitis Idea folijs oblongis coronatus fructu nigricante anguloſa.



*Myrtus anguſti folia folijs minimis
ex aucionatto.* **Tab. LXXX**




Arbor tristis Clusij ſecunda.



Rufcus. Meiſdorn.







Vitis idaea folijs carno- sis veluti punocratis.



Vitis Idæa folijs sub rotundis exalbides.



Vitis Idæa folijs sub rotundis non crenatis baccis rubris

Heidelbeer.

Tab:

LXXII



Vitis Idæa palustris.



Buxus arboreseens Buxbaum.



Vitis Idæa affinis polifolia montana.



Chamae buxus seu Wald buxbaum.



Chamae buxus flore coluteda.



Nana sua Quabuill Hociacotlea sum.



Vitex latiore folio.



Ligustrum Aegyptiacum
angusti folium.



Olea silvestris.



Vitex folijs angustioribus
Can nabis modo dis posites.



Phyllirea Latifolia laevis.



Olivenbaum.

Olea sativa. Tab. LXXIII



Embira Brasiliensium.



Ligustrum Germanicum
Hartigel.







Phyllirea folio aeterni.



Phyllirea folio leviter serrato.



Phyllirea latifolia spinosa.



Phyllirea angustifolia prima.



Philyca Elatior.



Phyllirea folio ligustri.



Amaz quilittl.



*Rhamnus flore candicante spinis
oblongis.*



Celastrus Theophrasti.



Philyrea humilibr. **Tab: LXXV.**



*Rhamnus flore herbaceo baccis
nigris.*



*Rhamnus flore purpureo folijs
salicis.*



*Rhamnus n. Discoridis mon:
spelensium.*



*Rhamnus folio subrotundo
fructu compesso.*





*Rhamnus folio salicis angusto fructu
flavescente.*



*Rhamnus folio salicis angusto fructu
flavescente.*







Rhamnus Catharticus
folio oleæ.



Lycium Italicum

Rhamnus Catharticus
vulgaris.



Lycium buxi folio

Rhamnus folijs oblongis Tab:
septratis LXXVI



Rhamnus Catharticus
minor.



Lycium Gallicum
Dalechampij.



Lycium Italicum Bodai stapelij



Lycium Italicum Bauhini.



Lycium Creticum.



Rubus Idaeus spinosus



*Chamaerubus spinosus
fructu caeruleo.*



*Lycium Indicum putatum
Alpino.*



*Rubus major vulgaris
Brombeeren.*



Rubus Exoticus.



*Lycium Indicum primum
facie.* **Tab: LXXVII**




*Lycio affinis Aegyptiaca
Agiabalia.*




*Rubus Idaeus laevis valen-
tini*



Tab.
IX.





Capparis spinosa Fructu
minore folio rotundo.



Capparis portulacaefolia.



Sabina folio Cupressi
prima.



Chamaerubus folijs Ribes
Anglicus.



Capparis officinarum
Cortex.



Sabina folio Cupressi
altera.




Chamaerubus saxatilis



Capparis spinosa folio acuto.



Sabina Tamarisci folio
Dioscoridis.



*Cedrus cupressi folijs media majoribus
Baccis*



Juniperus major caerulea



*Lignum Exoticum ab arbore
Americana oxyacantha simili
re sectum.*



Cedrus eadem Bauhini.



*Juniperus montana minor folio
latioro fructu longiore.*



*Juniperus major bacca
rufescente matthioli.*



*Cedrus Cupressi folijs Baccifera
major fructu flavescente
Tab. LXXIX*





*Juniperus vulgaris fruticosa
Weckholder.*



*Juniperus major bacca
rufescente Clusij.*







Asparagus molli et tenuissimo folio.



Asparagus molli folio sativus platij caules.



Asparagus molli folio sativus vulgaris
Zame Spargen. Garten Spargen.



Tab.
LXXX

*Asparagus aculeatus alter tribus
vel quatuor spinis eundem exor-
tum.*



Asparagus aculeatus petraeus



*Asparagus marinus molli et
Crassiore folio.*



*Ramulus Taxi cum Baccis Cavis et
monstrosis foliosis*



Taxus.



Asparagus aculeatus spinis horridis.



*Baccæ rotundæ ex mathiolo. Glandes et flores
Taxi.*



Baccæ ex Camerario




*Ramulus cum floribus
ex Lobelio.*



Yecolli Terenty



Fructus Draconis arboris
ex monarde.



Fraxinus
Eschbaum. excelsior

Draco arbor. Tab. LXXXI.




Rhus folio vlini.



Cocconilea.

Folium pragrãnde ex Indijs
allatum.





Cotinus
Pliny.



Rhus myrtifolia Mon.
speliensis.







Guabiraba.



Azed-ractz



Quauhxiotl Terentij.




Caaghiyuyō Brasiliensium



Arbor v. fera Tabacensis.



Guabiraba.



Tangaraca prima species.



Tangaraca secunda species.



Manaca Brasiliensium.



Tangaracæ flores et folia.



Copalxibuitl. Teotihuacanorum.



Totocapoli Terentij.




Aninga Peti Brasiliensium.






Thalictrum flavum



Thalictrum flavum





Lentiscus Pervana seu molle arbor.



Moringa

Tab: LXXXIV.
Lentiscus vulgaris
Mastixbaum.



Lentiscus Brasiliensis
seu Aroeira.



Arbor thurifera.



Bonduch Indorum.



Inimboy Brasilianorum



*Terebinthus peregrina fructu
majore. Pistacia similis eduli.*



*Terebinthus vulgaris.
Terpenteinbaum.*



*Thuris limpidi
folium.*



*Balsami Arbor
Mathioli.*



Balsamus syriacus rutæ folio.



*Terebinthus peregrina fructu
minore cœruleo eduli.*



Maripendæ folium.





Carpobalsamum officinarum.



Xilobalsamum officinarum.







Copaiba



Gabueriba seu Cabureiba.



Tab: LXXXVI.
Hoitziloxitl.



Tabuelilogan Ximenis.



Arboris Bdelli feræ
truncus.



Thus.
Weijrauch.



Arbor liquidambar.



Caopia



Icariba Brasiliensium



Hol qua buetl. seu arbor
Chilli.



Arbor laccifera Huato:
pecensium



Copal quahuatl.



Arbor Tecomachace



Arbor galliopifera
secunda



Istaiba.



Copeiba
fructus



Arbor resinifera
Tabascensis.





Arbor galliopifera
prima.



Ramus lacca cum folijs.







Pinus maritima major prima
mathioli.




Pinus sylvestris montana tertia.



Pinus sylvestris altera Tab.
Dodonei. LXXXIX.



Pinus maritima major
altera.



Pinaster II. Hispanicus
Clusij.



Pinus maritima major prima
Dodonei.



Pinus Conis erectus.



Pinus maritima minor



Pinus maritima major
altera Mathioli.



Tecopal quabuitl



Pinus sativa
Zitbelbaum Fichtenbaum

Copal quaubxiottl




Cedrus conifera folijs lariiis

Copal quabuitl pat la boac
Tab: LXXXVIII



Cuittacopal



Pinus sylvestris montana altera



Nux pinea




Pinus sylvestris montana prima



Pinus sylvestris montana prima







Quauhajobaatl.



Fructus Pineos nucleos
duros referens.



Larix Matthioli
Lerchenbaum.



Pinaster tenui folijs pilæ pur-
purefcente.



Abate de panuco.



Larix.
Lerchenbaum.



Pinaster lati folijs pilis vires-
centibus, aut pallescentibus. Tab. xc.



Pineæ purgantes Indiæ
Occidentalis.



Pinei Coni facia fructus
exoticus.



Iulus piceæ perfectus.



Picea minor



Picea major



Abies alba seu fœmina



Abies

Conis sursum spectantibus fivè mas.



Ramulus cum folijs veteribus & novis. Laminæ lingulae nucleus et semen.



Coni abietis scapus à laminis nudus.



Abietis flores crocei.



Abietis laminæ lingulae nucleus & semen. Abietis ramulus cum folijs veteribus & novis & squamulis furculorum.




Abietis conus perfectus





1791

1791



Abies Americana.



Abies alba seu fœmina Tab:xcii.
Stapely.



Abbel fructus Orient-
alis.

Cupressus Vulgaris *Stapely.*



Cupressus vulgaris Matthioli.
Cipresbaum.



Cytisus incanus Austriacus
folio oblongo.



Cytisus Creticus incanus.



Cytisus incanus siliquis
falcatis.



Cytisus albicans folio trifolij
vulgaris.



Cytisus incanus folio medio
longiore.



Cytisus incanus siliqua lon-
giore.



Cytisus hirsutus supinus folijs in-
cata lanugine inferne
pubescentib.




Cytisus hirsutus major folijs
pinnatis.



Cytisus hirsutus folijs sub ruffa
lanugine villosis.





Cytisus folijs glabris subrotundis, pediculis brevissimis.



Pseudo Cytisus flore Leucori luteo.



Cytisus hirsutus folijs minoribus ramulis tenellis villosis



Cytisus folijs incanis angustis quasi complicatis



Cytisus Gesneri folijs fere spicatis



Cytisus glaber nigricans



Anagyris non fœtens minor



Anagyris non fœtens major



Anagyris fœtida prima



Acacia folijs scorpioidis leguminosa
Veslingij.




Yztactlalamatl.




Tlamatl Tab:xcv



Acacia Aegyptia lobus.



Acacia folijs scorpioidis leguminosa
Alpinj.



Acacia Indica farnesiana.




Acacia trifolia.



Acacia Aegyptia Nea =
politana Columna.





Tab. 1.

Acacia robusta Forsk.
Acacia robusta Forsk.




Acacia robusta Forsk.



Acacia robusta Forsk.
Acacia robusta Forsk.

Acacia robusta Forsk.
Acacia robusta Forsk.



Acacia robusta Forsk.
Acacia robusta Forsk.



Acacia robusta Forsk.
Acacia robusta Forsk.



*Acacia Americana Recci
spinosa*



*Acaciæ Indicæ Farnesianæ
folia flores & silique.*



*Acacia Americana non
spinosa altera*



*Acacia Americana
Recci non spinosa*



*Frutex mesopotamicus
folijs acaciæ.*



*Arbor cornigera
folijs Acaciæ.*



Genista spartium spinosum majus
flore luteo.



Teboaxin Terenti.



Ibira pitanga Bras-
iliensium.



Genista spartium folijs lenticular
floribus ex caeruleo purpura scentibz



Genista spartium folijs
poligane.



Genista spartium spinosum
minus.



Genistella spinosa affinis
Nepa quibudam.




Genista spinosa major aculeis
longioribz.



Genista spinosa major
aculeis brevioribz.





Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Chamaecrista fasciculata
L.



Genista spinosa minor aspalathoides Bauhini.



Genistella aculeata foliosa Bauhini.



Genistella spinosa minor Germanica.



Genista non spinosa angulosa sicut parva cum rupo.



Genista vel spartium pungens.



Genista spinosa minor montana Ventosi.



Genista non spinosa tinctoria folijs latioribus Italica.



Genista non spinosa tinctoria folijs angustioribus Hispanica.



Genista non spinosa angulosa trifolia Bauhini.



Chamae genista folijs Genistae vulgaris.



Flos tinctorius Baubini.



Chamae spartium secundum.



Spartium arborescens semunibus lentisimilibus.



Chamae spartium primum.



Chamae genista folio articulato.





Chamae genista caule foliato.



Chamae genista sagittalis.







Spartium triphyllum.



Spartium tertium flore albo.



*Spartium alterum monos-peri
non seminiferi
simili.*



Spartium Creticum.



*Spartium Alpini spinosum
secundum*




*Spartium Alpini spinosum
primum.*



*Colutea siliquosa seu scorpioides
minor simplex.*



*Colutea siliquosa seu scorpioides
major.*



Colutea vesicaria.



Colutea Cauligena
fungosa.



Colutea Scorpoides odorata.



Colutea filigosa Scorpoides. Tab. CI
minor Coronata.




Senna Utricularis.



Senna Italica seu foota *Sariba*
folijs.



Senna Alexandrina seu acutiorib; folijs





Barba Iovis



Siliqua dulcis







*Siliqua Indica arbori
Coralij similis..*



*Siliqua Sylvestris Indica spinosa
feu Arbor Coralij.*



*Siliqua
rotundi*

*Sylvestris vulgaris
folia.*



*Cassia fistula purgatrix Ameris
cana.*



*Cassia fistula purgatrix
Alexandrina.*



Xochina catzli.



*Cassia fistulae non purgantis
Brasiliana Affinis.*



*Cassia fistulae non purgantis
in fulce folium & fructus.*



*Cassia fistula non purgans
Brasilensis.*



Camelxochotl, seu arbor floribus
Casria.

Chatalhuic seu arbor
folijs Casria.

Tamarindus Brasiliensis.



Tamarindus Arabica.

Tamarindi plantula.



Evonimus gravis radentibus vulgaris
Spindelbaum.







Tamarindi seminis facie
fructus Indicus.



Tamarindus Mexicana.







Ban vel Bon Agyptiorum.



Nerion Americanum.

Evonimus Latifolys.



Nerion floribus albis.

Evonimus granis nigris. Tab: CIV.



*Nerion floribus rubescentibus
Oleanderbaum.*



Fructus siliqua Nerij.



*Arbor altera Nerio
similis.*



*Arbor prima Nerio
similis.*



Silva de Agoa.



*Lobus longissimus arboris filiquosae
Juglandis folio Brasiliense.*

Caaco Brasiliense.




*Frutex innominatus secundus
margravij.*

Atitara Brasiliense.



Ecapatli.




*Arboris filiquosae Brasiliense lobo
latissimo lobus alter seu minor.*



*Arboris filiquosae Brasiliense lobo
latissimo lobus prior seu major.*







Arboris siliquosae lobo quadrato
gulari fusco lobus.

Arboris siliquosae ex Virginia
lobi.

Arboris siliquosae ex Virginia Tab:
loto fusco ramulus. C VI.



Arboris siliquosae
Africanae foliis fere
patri, semina fabaceo
siliqua



Lobus cortice membranaceo
atro tumido.



Lobi tres cortice cartilagineo,
rugoso fusco, duplici crista sinuosa
donate.



Arboris siliquosae Guineensis
fabaceo lobis cum praeolo.



Fructus flavescens lobo forte inclusus
Bauhini.




Fructus oblongus rimo rubeus
rugosus et gibbosus.



Lobus membranaceus atro spad-
iceus planus Guineensis.



Fructus siliquosus Siliqua parva In-
Orucoria dictus. dica femina oblonga
nigro.



Fructus fabro-
lindus durus,
elegantiter rubens.



Rosa sativa purpurea.



Rosa milesia rubro flore.



Rosa rubra sativa
Gemein Roth Ros.



Rosa sativa alba major flore pleno.



Rosa sativa major
Prænestina.



Rosa sativa multiplex
maxima.



Rosa moschata major
flore simplici.





Rosa sativa flore pleno.



Rosa sativa moschata
flore simplici.







*Rosa sylvestris flore rubro
oblatifolius*



Rosa sylvestris folijs odoratis.



*Rosa odore Cinnamomi
simplex.*



*Rosa sylvestris alba cum
aliquo rubore folio hirsuto.*



*Rosa rubra præcox flore
simplici.*



*Rosa odore Cinnamoi flore
pleno.*



Rosa sine spinis minima



*Rosa sine spinis flore
majore.*



*Rosa moschata flore
pleno.*



*Rosa sylvestris vulgaris flore
odorato incarnato.*



*Rosa folio subrotundo et
crispo.*





*Rosa sylvestris flore
majore & rubente.*



*Rosa sylvestris flore
pleno.*







Rosa lutea simplex.



Rosa majalis flore rubello. Tab. CX



Rosa campestris spinosissima flore albo.



Rosa multiplex.



Rosa poma spinoso folio hirsuto Cherleri.



Rosa Hierichuntina vulgo
dicta. Rose von Jericho.



Rosa Hierichuntina arida.



Rosa sinensis foliosior.



Rosa crevensis candida
cognata.



Rosa Hierichuntina
exsiccata similis.




Rosa sinensis arbuscula.




Rosa sylvestris pomifera minor
non spinosa. Tab: CXI.



Rosa Hierichuntina vulgo
dicta. Rose von Jericho.






Rosa sinensis quinq folia .



Rosa sinensis foliosa . Tab: CXII




*Rosæ sinensis semen triplici ad micros-
copium aspectu re presentatum.*



*Chilla patli Novæ
Hispaniæ .*



*Rosæ sinensis dimidiatus
& intiger seminis folliculus .*



*Izquioxchitl Novæ
Hispaniæ .*



*Cistus mas folio oblongo
incano.*



*Cistus mas folio rotundiore
mathioli.*



*Cistus mas folio rotundo
hirsutissimo. Cistenroslein.*



Cistus foemina folio salviae.



Cistus mas folio chamædrys...



Cistus mas angustifolio.



*Cistus foemina folio portu-
lacæ marinae latiore obliquo.*



*Cistus foemina folio plan-
taginis.*



*Cistis Hispanicæ species
flore albo.*







*Cistus fœmina folio
ramprechtii.*



Cistus fœmina folio spicæ.



Tab: CXIV.

*Cistus fœmina folio
portulacæ maritimæ
angustiore mucronato.*



Cistus folio thymii.



Cistus folio majoranæ.



*Cistus minimus folio
subrotundo.*



*Cistus annuus flore guttato
Ponæ.*



*Cistus annuus flore
guttato.*



*Tuberaria minor
myconi.*



Alyssum trigonum.



*Panax Chironium
Majoli.*



*Chamaecistus folijs
minoribus &
incanis.*



Cistus folio Ledi.



*Chamaecistus flore
vulgaris luteo.*



*Chamaecisto Nardi Cel =
Frisicus folijs
licæ.*



*Cisti species Tab. CXXV
annua angustifolia.*





Cisti folio albor exotica.



*Chamaecistus albo
vulgaris flore
majore.*







*Helianthemum folio Thymi
incano Cherleri*



*Helianthemum flore albo folio
angusto hirsuto Bauhins.*



Tab: CXVI
*Chamaecistus folio Thymi
incanis.*



Chamaecistus angustifolius.



Chamaecistus quadrifoliq.



Helianthemum Germanicum tertium Tabernomontani.



*Chamaecistus serpillifolius
repens luteus.*



*Chamaecistus serpillifolius
floribus carneis.*



*Chamaecistus folio myrti
minoris incanis.*



*Chamaecistus folio pilosello
minoris Fuchsii.*



*Chamaecistus ericæ folio
luteus.*



*Chamaecistus Hirsutus. Tab:
CXVII.*



*Helianthemum ad Numularianum
accedens Baubini.*



*Chamaecistus folio sampuchii
capitulis valde hirsutis*



*Chamaecistus folio poly
montani.*



*Cistus ladanifer Monspeli-
ensium.*





*Chamaecistus flore pur-
purecente Alpini.*



*Chamaecistus pusillus folio
candido flore luteo.*







*Cistus ledum folio populi
nigrae Majus.*



Cistus marinus Lugdunensis.



*Cistus ladanifer Hispanicus
incanus. Tab: CXVIII*



*Cistus ledum lati
Creticum. folium*



*Cistus ledum Cretense
Alpinj.*



*Cistus ledum folio populi nigrae
minus.*



*Cistus ledum folijs oleæ
sed angustioribz.*



Cistus ledum hirsutum.



Cistus ledum folio myrtj.



Cistus ledum angustis folijs.



*Cistus ledum folijs roris-
marinis subtus incanis.*



*Cistus ledum folijs roris-
marinis ferrugineis.*





*Cistus ledum folijs roris-
marinis sed non
incanis.*



*Ledum monspeliense
angusto folio Baubini.* **Tab.
CXIX.**







Myrtocistus Pennæ.



*Cistus ledum folijs
falicis angustifoliae.* Tab. CXX.



*Pseudocistus ledum Alpini
primum.*



Ledum Alpinum hirsutum.



*Pseudocistus ledum Alpini
secundum.*



Guajacum folijs lentisci.



*Jasminum humilior
luteum.*



*Jasminum luteum vulgo dictum
bacciferum.*



*Guajacum prope modum
sine matrice.*



*Jasminum Vulgatius flore.
albo. Veielreben.*



*Jasminum humilior
magno flore*





Tab: CXXI.
*Nucleus fructus ligni
Guajaci.*



Guajacum Orientale.









Ulmus montana.



Ulmus utriculi foliacei.



Ulmus campestris.



Syringa lutea Americana.



Syringa flore alba simpliciter.



Syringa alba flore pleno.



Syringa Arabica folio mali.



Syringa cerulea.



Jasminum mille folij.

Alnus altera Clusij
Erlbaum.



Populus alba folio minore
Weis Pappelbaum.



Salix vulgaris alba
Weiden.



Alnus Julifera folio incano.



Populus alba folio majore
Weis Pappelbaum.



Populus tremula seu Lybica.



Alnus Julifera rotundi Tab:
folio glutinosa viridis. CXXIII.





Alnus Baccifera nigra
vulgaris.



Populus nigra.







Salix folio Amygdalino
utrinque virente aurito.



Salix sativa lutea folio
cronato.



Salix rubra minime fragilis
folio longo angusto.



Tab:
CXXIV.

Salix tenuior folio minore utrinque
glabro fragilis.



Salix humilis angustifolia.



Salix folio angustissimo
utrinque albido.



Salix platyphyllos seu copuleos.
Dalechampii.



Salix latifolia rotunda.



Salix nuceamenta rosae
et capitula squamata.



*Salix folio angustissimo utrinque
alido ex Bugatensi.*



*Salix pumila
incana. lini folia*

Salix maritima osterarum testis in aescens.



Salix pumila Baubini folio rotundo

*Salix folio ex rotunditate
mucronato.*



Salix pumila repens. lati folia



*Salix syriaca folio deag =
iteo argenteo.*





*Salix pumila folio
utrinque glabro.*



*Salix brevis angustior
folio incana*







Salix Brasiliensis folliculi fera.



Salix Aegyptiacae floribus globosis.



Salix Arabica folijs atriplicis Tab: CXVI



*Tamarix fruticosa
seu Germanica
Tamarischken folio crassiore*



Frutex spicatus folijs salignis serratis



Salix Brasiliensis capituli fera.



*Erica folio myricae vulgaris
glabra. Heide.*



Tamarix arbor Aegyptiacae.



*Tamarix fruticosa folio tenuiore.
seu Gallica.*



Erica frutescens peregrina.



Erica folio coridis maxima purpurea folijs longioribus.



Erica folio coridis maxima alba.



Tab.
CXXVII

Erica tertia Dodonæi.



Erica major scoparia folijs deceduis.



Erica floribus Coridis major floribus ex herbaceo purpureis.



Erica Coridis hirsuta.

folio Anglicana.


Erica Coridis cinerea.


folio humilis cortice arbuti flore.



Erica ex rubro nigricans scoparia.







*Erica procumbens ternis
foliolis carnea.*



*Erica folio coridis ternis
per intervalla ramulis.*



*Erica Anglicana parva
capitulis hirsutis
Baubinf.*



*Erica Baccifera candi-
da baccis erectis.*



*Erica procumbens dilute
purpurea.*



Erica procumbens herbacea.



Camphorata hirsuta.



*Erica baccifera pro-
cumbens nigra.*



Camphorata glabra.


Camphorata Congener.



Aspalathus Cortice cinereo ligno purpureo.

Aspalathus rubeus.


Lignum rose odore.




Santalum Citrinum.

Santalum album.







Araboutan seu pseudo =
santalum Brasilianum..



Santalum rubrum.



Arboris Insulae Tabago
materie ligno Brasiliano
simili folium et fructus.



Curaqua seu Brasilium
Hispanorum.



Agallochum
Officinarum.



Tepeijx quixochitl.



Yoloxochitl.



Tlapoletzpalli. Tab: CXXXI.



Tlopelicquahuitl.



Acapalli.



Tlilzapotl.





Toto-capolin.



Tlacotex qui patli.







Guira pariba.

Zemouna.

Iecuiba.



Iaborandi.

Tremate.

Cabui Iba.



Frutex secundus in nominato
Brasilensis.

Arbor prima in nominata
Brasilensis.

Fructus primi in nominato
alt Flos.



Tangaraca.



Frutex quintus in nominatus
Brasilensis.





Arbor aquam fundens.



Arbor pudica.







Agnus Scythicus.



Teoamatl



*Arbor Anatifera
Entenbaum.*



*Arbor in summo cacumine
tantum frondes gerens.*



*Arbores supra quas
domicilia Indorum.*



Mespilus sylvestris non spinosa.



Mespilus apifolia laciniata.



Tab. cxxxv.
Fructus Babab Alpini.



Prunus Sebestena Sylvestris.



Arbutus ferruginea folio non serratis.



Sycomorus Alpini.



Azedarach.





Eloxochitl.



Arbor Peru febrifuga viana.









Fan yay Cu seu arbor.
Pap ya



Lici cum arbor D.
fructu.



Giam = bo arbor cum
fructu.

Pi-pa arbor sinensi.



CicuKo, seu Lusitano.
rum Goyava.



Kiagiu. seu
fructus

Kagiu
Indicus.

Polo-mie seu Ciaca-Lupia
nerum



Manco. seu Man
ga fructus

Su-pim. sinensium



Yata cum fructu.



Duliam. seu Duriones Boy
mi.



Innomminatus fructus
sinensis

